



17. 1. 23

17. 1. 23

17. 1. 3

XV  
BÖHR 4.  
SCHWET.  
J. 1.  
1761.





GERARDI B. DE VAN-SWIETEN.  
AUGUSTISSIMOR. IMPERATORIS, ET IMPERATRICIS  
A CONSILIIS, ARCHIATRI COMMUNIS.

INCLYTÆ FACULTATIS MEDICORUM VIENNENSIIUM PRÆSIDIS PERPETUI NEC NON  
ACADEMIÆ REGIÆ SCIENTIARUM, ET CHIRURGIE PARISIENSIS, INSTITUTI  
BONONIENSIS, ET LITERARIÆ INCOGNITORUM MEMBRI.

COMMENTARIA  
IN OMNES APHORISMOS  
HERMANNI BOERHAAVE  
DE COGNOSCENDIS, ET CURANDIS MORBIS.

EDITIO POSTREMA VENETA  
JUXTA TERTIAM LUGDUNO-BATAVAM

IN QUA PRÆTER TYPORUM ELEGANTIAM, ERRORES PROPE INNUMERABILES  
QUIBUS OMNES EDITIONES ITALICÆ SCATERANT

Ab ipso perillustri Auctore novis curis deleti sunt.

TOMUS PRIMUS  
A PARAGRAPHO PRIMO AD CCCXX.



MDCC LXI.

Typis J. BAPTISTÆ PASQUALI.

SUPERIORUM PERMISSU AC PRIVILEGIO.



# PRÆFATIO.

**D**UM acerbum MAGNI BOERHAAVII funus Academia, Civitas, Respublica, imo per orbem terrarum lugerent omnes boni, videbar & mihi non minimam iusti mororis causam habere, cum irreparabile damnum fecissem, & perdidissem oraculum, quod in rebus dubiis semper consulere licuit. Summa enim ingenii perpicacia, & longo artis usu, in difficillimis etiam atque intricatissimis morbis latentes causas detegere noverat, atque uno saepe vel altero verbulo his tenebris lucem affundere. Dum vero in curandis ægris felix successus meis aliquando respondebat votis, agnovi illico, me omnia debere optimo Magistro, qui cespitantem in gravioribus morbis curandis prudenti consilio toties firmaverat, blande correxerat devium quandoque, neque unquam repulerat interpellantem, licet forte sæpius, discendi aviditate, importunum. Probe enim memini, & gratus recordor, me nunquam accessisse hoc oraculum, quin redierim doctior.

Omnia hæc impulerunt me, alia quamvis dudum meditantem, ut, sepositis omnibus, primos labores MAGNI PRÆCEPTORIS scriptis illustrandis impenderem. Placuit imprimis hoc propositum, quia & gratum sic testari animum, & tanti Viri vestigia premere possem, dum & forte sic prodessem illis, qui salutarem artem addiscere cupiunt.

*Institutionum Medicarum* explicationem sublimioribus ingeniis relinquens, commentandis *Aphorismis de cognoscendis, & curandis morbis* me accinxit: quibus autem copiis instructus aggredi hoc ausus fuerim, paucis dicam.

Rara certe felicitate mihi contigit, forte unico, viginti fere annorum spatio MAGNI BOERHAAVII institutionibus frui, tam publicis, quam privatis: nec defuit occasio consulendi Magistrum, si quid minus recte percepissem. Cum interim angusto anni Academici curriculo hos Aphorismos explicaret suis discipulis Auctor, atque prima horum elementa sedulo inculcaret, imo & eadem repetere cogeretur, ut tardioris etiam ingenii auditoribus prodesset, sæpe contigit, ut circa finem harum exercitationum domesticarum, invitus quamvis, festinare deberet. Quot autem & quam utilium rerum jacturam patiebantur audiores, dum tempus dicentem deficeret, noverunt illi, qui interfuerunt mecum publicis prælectionibus, quas *De calculo, Ventree Luc, Nervis & Nervorum Morbis, & de Corde* habuit BOERHAAVEUS. Plurima enim, quæ in privatis cursim tantum, ob temporis angustiam, delibaverat, latius deduxit in publicis. Omnia autem hæc, quatenus explicandis his Aphorismis inservire poterant, in Commentariis his inveniuntur.

Præter hæc cuncta, quæ ex optimis auctoribus, & imprimis ex antiquorum Medicorum monumentis, in proprios usus collegeram, addidi: patebique, credo, quam pulchre BOERHAAVII dogmata Hippocratis & Galeni placitis, tot sculorum consensu probatis, consonent. Simul hic contuli illa, quæ attenta harum rerum meditatio suggessit, vel aliquis jam in arte salutari usus me docuit.

Adhibui autem Hippocratis & Galeni Opera a Renato Chartierio edita, in citationibus tamen notavi libros & capita, ut minori cum difficultate loca allegata etiam in aliis edigionibus inveniri possent. Ultimo vero tomo horum Commentariorum addam Catalogum auctorum & editionum, ex quibus collegi illa, quæ illustrandis ac confirmandis his Aphorismis convenire credidi. Subjungam & finito operi locupletem indicem.

Ut vero gratum animum publice testarer,

IMMORTALI MEMORIÆ  
MAGNI BOERHAAVII  
H Æ C  
COMMENTARIA  
S A C R A

V O L U I  
G. VAN-SWIETEN.

*Lugduni Batavorum*  
17  $\frac{1}{2}$  42.

HER.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
1100 EAST 58TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637



HERMANNUS BOERHAAVE  
Medicinæ, Botanices, Chemiæ  
& Collegii practici, in ACAD. LUGD. BAE  
PROFESSOR ORDINARIUS.

*Marcus Jansz. sculp.*

# HERMANNI BOERHAAVII

V I T A.

**H**ermannus Boerhaavius natus est extrema die anni sexcentissimi sexagesimi octavi supra millesimum hora prima post mediam noctem *Voorbout*, proximo *Lugdunum Batavorum* vico, qua iter est *Harlemum*. Majores ejus ab stirpe ultima e *Flandria* oriundi jam tum, quum Belgium defectionis tumultu perturbaretur, *Lugdunum* demigraverant; ibique mercaturam honeste facientes mediocrem fortunam paraverant. Marcus Hermannii proavus primus e familia doctrinae fama celebratus est, qui & Sacrorum Minister (Pastorem vocant) fuit *Medenblick*: & aliquot libros meram undique pietatem redolentes confecit. Jacobus Caroli filius, Marci nepos, pater Hermanoi Latine, Græcæ, & Hebraice sciens, atque in Historia apprime versatus Pastor munere functus est *Voorbout*. Hujus propria laus fuit simplex, apertus, & prærens animus: tum is paterfamil. erat non indiligens; quum enim vix æqua re familiari uteretur, prudens opus ei fuit oeconomia. Atque hæc sunt potissimum, quibus patrem celebrat Hermannus eo libro, quo suam ipse vitam breviter complexus est. Jacobus VI. Id. Julius An. 1663. uxorem duxit Agar *Daelderiam* patre natam Hermannio *Amsteldamensis* opifice industrio, eodemque honesto mercatore; matre vero Magdalena *Dubois*. Agar Medicinam adamavit, & calluit. Ex ea vir præter Hermannum filium quinque insuper habuit filias; qua mature mortua Augusto mense Ann. 1673, is inivit secundas nuptias cum Eva *Dubois* Jacobi Filia *Lugduni* Ministerio fungentis. Hæc & aliis virum liberis auxit: at eo animo, atque indulgentia fuit in

privignos, ut ab his æque, atque a filiis mater audiret. Hermannus certe noster tanti eam fecit, ut, quoad illa vixit, nec unquam ab ea discederet, & carissimæ matris loco diligeret. Hæc de genere. Literarum autem studia maturius suscepit Hermannus; patre enim usus diligente, inprimisque literarum studio, ab ipso eruditus est doctrinis omnibus, quibus puerilis ætas debet informari; quæque usui futuræ erant ministerio, cui filium is destinaverat. Itaque propter docilitatem ingenii, quum haberet annos circiter undecim, Latinas, Græcasque literas edictus probe, Historiæ etiam universæ bonam partem tenebat. Interea quum annos duodecim complexset, nactus est malignum ulcus, quod septem annos sinistræ ejus coxendici adhæsit; nec ulla Medicorum opera potuit depelli. Tandem, quum cum septennis doloris, Chirurgicæque pertæsum esset, medicina omni se abstulit, remotisque Medicis, novo usus remedii genere, urina cum sale commixta dies aliquot perficans ulcus ipse sanavit. Morbus hic, quamdiu duravit, Hermannus impetum, studiumque, quo in disciplinas incumbere, debilitavit, non fregit: nihilo enim secius Ann. 1682. *Lugdunum Batavorum* se deduci passus est; ibique eo conatu in publicis Scholis versatus fuit, ut studiorum suorum eo tempore finem faceret, quum discipuli ne dimidium quidem itineris tenebant; & quam celerrime literas humaniores, & Rhetoricam exhauriret. Id temporis, quum obnixæ studiis obsequeretur suis Hermannus, pater decessit. Eva, quæ permodicis facultatibus alere novem pueros debebat, quorum natus maximus Noster vix annum

quintumdecimum agebat; unde huic in studiorum causam quicquam suppeditaret, non habebat. Itaque jam desperatis prope rebus ad Jacobum *Triglandium* patris amicum accessit; qui paterni memor officii in suam benevolentiam Adolescentulum adiecit; & sic eum *Van-Alphaenio* commendavit, ac tradidit, ut is in fidem suam receperit Hermannum. Quibus ita constitutis hic egregiam operam, studiumque omne contulit in Scientias. Hinc Philosophiam apud *Senguerdium* didicit; Geographiam apud *Richeium*; quum interea Græcas literas a *Gronovio*, Hebraicas Chaldaicasque, in primis necessarias, quo collineabat, ministerio, acciperet a Jacobo ipso *Triglandio*, & a Carolo *Schanzio*. Exinde ulceris depulso jam incommodo Mathematicas disciplinas, quas leviter primum attigerat, diligentissime persequutus est: suapte enim ingenio ad eas incitabatur; quæ incredibilem profecto continent delectationem, atque elegantem quandam veritatem, & evidentem veluti saporem: ut non immerito eas unicuique commendaret Hippocrates facultati Medicæ studen- tibus; quum ceteroquin a plerisque Mathematica vel negligantur omnino, vel summis labiis delibentur. Eo loci erant Hermannii studia, quum An. 1688. viginti annos natus primum eruditionis, & eloquentiæ specimen dedit: præsidere enim V. Clar. *Gronovio* Orationem habuit luculentissimam, qua nitide sapienterque exponit, Ciceronem solide refutasse Epicuri de Summo Bono sententiam, argumentum sane difficile, & nisi ab homine satis culto, satique perspicaci non pertractandum. At Hermannus eo quidem successu rem conficit, ut Senatus *Lugdunensis* aureo cum donaverit Numismate. Biennio post Philosophiæ laurea ei decreta est a *Volderio*, qui tum præerat: *Volderius* enim Nostrum unice amabat propter ingenium, a quo vicissim omni officio egregie observabatur. Tum occasione oblata Hermannus pereleganti Oratione habita E-

picurum, & qui intermortuam Epicuri doctrinam revocarat, *Hobbesum*, & *Spinosam*, qui impiis omnibus antecelluit, tantis dicendi luminibus, tanta argumentorum vi, tanto sententiarum pondere confectus est, ut verisimile non fiat legentibus, id opus ab homine id ætatis potuisse constari. His perfunctis laboribus Theologiam ingreditur; ad quam rem Magistros habuit Viros Summos Jacobum *Triplandium*, Federicum *Spanhemium*, & Johannem *Markium*. In Ecclesiastica Historia maximos fecit progressus: in Ecclesiæ vero PP. legendis ita versatus est, ut non minus vitæ innocentiam, quam eorum puram simplicemque suspiceret doctrinam; quam porro pati non poterat corrumpi, atque adulterari subtilibus Scholæ subtilitatibus, spinosisque ineptiis, quæ nunquam ei stomachum non fecerunt. Estne sani hominis ad Metaphysices trutinam Christianam revocare veritatem, nostræque Religionis mysteria Philosophorum controversis coinquinare? Num est tolerandum Platonis, Aristotelis, & reliquorum hujuscemodi aut placitis accommodari, aut auctoritate explicari divinum Fidei lumen? Itaque eo fructu atque usura PP. volumina per- volutabat Hermannus: nec fidem suam aliorum versionibus unquam adhibuit; sed, prout is doctas linguas callebat, fontes ipsos adivit. Ceterum summarum in re Theologica contentionum relaxatio erat Hermannæ Mathesis, cui subcissa quædam, quæ perire non patiebatur, tempora destinaverat. Et sane operæ, quam ad eum modum Mathematicis navaverat disciplinis, is fructus fuit, ut ex ea re necessarios in vitam sumtus compararet: quum enim de sua opera vivere constituisset, ne amicorum officiis, qui cum hætenus egentem, quibus rebus opus fuerat, juverant, ad iacers otium impudenter abuti videretur, Mathematica cepit docere. Hac occasione amicitiam cum Johanne *Vanden-Bergio* Magistratum *Lugduni* gerente iniiit; qui,

ut



ut primum benevolentiae testimonium ei daret, fecit auctoritate sua, ut negotium Boerhaavio daretur, qui conferret Catalogum M.S. tum Bibliothecae Vossianae, quam dudum *Lugdunenses* magno emerant, & ex Anglia transportari sedulo fecerant. Hoc ille negotium tam studiose, ac diligenter curavit, ut doctrinam, industriamque suam Senatui univervo, & *Vanden-Bergio* potissimum probaret. Captus hominis ingenio *Vanden-Bergius* magnopere illi auctor fuit, ut se ad Medicinam conferret. Sie non minus sua, quam amici voluntate ad id studium adductus Hermannus, paulisper *Dreslingentium* audivit. Sed, prout in eo erat celeritas, & vis ingenii summa, statim ad optimos rei Medicæ Scriptores se contulit. Et quum intelligeret disciplinam illam circa curam nostri corporis totam esse; ab Anatomia discendi exordium capiendam esse censuit. Hanc præcipuam, & longe utilissimam Medicinæ partem didicit ex Vesalio, Fallopio, Bartholino, ceterisque; & ut commodius ea, quæ legebat, acciperet, non intermissam operam sectionibus apud *Nuckium* dedit; ex quibus eo mirabilis utilitatis fructum capiebat, quia ad corporis compagem cognoscendam Geometricos oculos adhiberet. Hinc ad reliquos Medicos Auctores accessit, eo quidem sectionis ordine, ut a vetustissimis ad recentiores, temporum habens rationem, descenderet. Sed ita perlectis Græcis omnibus, & Latinis, qui Medicam artem tractarunt, id manifestoprehendit, quodcumque in singulis boni esset, hoc omne ab uno Hippocrate, qui ceteros & ætate, & ingenii magnitudine antecelluit, esse derivatum. Quo factum est, ut in hunc potissimum incumbere Boerhaavius, hunc vehementer admiraretur, adamaret, in manu teneret semper, & legeret, memoriamque mandaret; & in sanguinem, quod ajunt, & succum converteret, ut plane videretur Hippocratis animus in Hermannum demigrasse. Recentioribus vero longe aliam

cogitandi rationem esse, atque Hippocrati porro intellexit: quod quum uni omnium contigisset Sydenhamio, Hippocratem æmulari, & certis firmisque observationibus opus tale inædificare, ut nec criticam meiueret, nec invidiam; proximo ab Hippocrate loco eum coluit Noster, nec semel, aut iterum, sed decies, & amplius ejus librum perlegit; tantique fecit, ut quum ipse de Variolis scribere deberet, in hanc sententiam loquutus sit Aph. 1379. *Sydenhami adeo accurata Variolarum descriptio, ut decies legi merenti paucis modo addenda habeam, &c.* Post hæc Chemiam, mox Botanicam ingreditur Hermannus, ita tamen ut nullum Auctorem fidei locum relinqueret: sed rem ipsam oculis subjiceret, manuque tractaret. Rogabit aliquis, num Hermannus exciderit Theologia, quum repente Medicus evaserit? Immo mirabili quodam nexu duo hæc studia sane juncta ita copulavit, ut parem operam in utrumque conferret; ne dicam per ludum jocumque Medicinam tractasse, & tam brevi tempore, ducente nemine, tantum cursum confecisse: quo superato An. 1693. VI. Id. Jul. Medicinæ lauream affectavit, habuitque *Hardervicæ*, disputatione habita *De utilitate explorandorum excrementorum in agris, & signorum*: quod certe negotium in re Medica caput est artis corpora curandi. Post illa continuo cogitaverat de Ministerio suscipiendo; quam in rem inauguralem orationem jam scripserat hoc argumentum: *Quid causa esset, cur olim, quum a simplicibus rudibusque hominibus, quales erant Apostoli, & primigenia Ecclesiæ Ministri, Christi Doctrina divulgaretur, maximos fecerit progressus; nunc a doctis, & sapientibus tractata viris minimum, aut nihil promoveret.* Pronum est intelligere, quo solertissimum, acerrimumque virum sententia hæc perduxerit; & quid stomachi, ac querelarum hujusmodi præ se tulerit oratio. Sed neque hæc dicta est, neque unquam vulgata; quum enim illi *Spiniosissimi* calumniam im-

pegissent, ac tantum non iurassent; ipse Theologiam, Ministeriumque valere iussit. Calumniz causa id fuit, quod nimirum, quum forte Hermannus navigaret, accidit casu, ut Vectores inter se de *Spinossismo* sermonem haberent, atque ex his unus satis inepte, odiose, ac putide *Spinossam* oppugnaret. Tum se non continuit Noster ab interrogando, num is Auctorem legisset, quem refutabat? Negat ille, se unquam legisse: sed nihilominus satis causz esse arbitratur, quare ob talem interrogationem ut *Spinossitam* traderet Boerhaavium. Exit hæc fama in vulgus, quæ subito omnium sermone percrebuit: quo nomine, quum ab omnibus male audiret, ad Hippocraticam artem quietis plenissimam transfugit, quæ inimicorum declinaret invidiam: satis enim noverat, eorum maxime pertimescendum esse odium, qui omnium scilicet religiosissimi Christianam caritatem semper habent in ore: nec ullam esse calumniam capitaliorem, quam quæ religionis nomine constaret. Itaque Hermannus ad Medicinam adpellens eam exercebat; principio magnum nomen, parvum lucrum nactus. Hominis fama ad primarium virum Gulielmo III. intimum pervenit: hic non contemnendis conditionibus Boerhaavium *Halam* invitat, apud se honorifice, liberaliterque tractandum. At is conditionem non accepit, constanterque repudiavit; tum quia ocio studebat inprimis, animumque a tumultibus aulicis alienum habebat; tum quia aperto erat, & libero ingenio, veritatisque litabat egregie. *Vanden Bergius* vero, & *Van-Alphenius*, qui amici ex animo, verique benevoli huic erant, hortati primum, ut ad Academiam *Lugdunensem* accederet; deinde, etiam eo modeste prudenterque renuente, tantum auctoritate sua apud Academiz Curatores valere, ut XV. Kal. Jun. An. 1701. in locum celeberrimi *Drelincurtii* sufficeretur Boerhaavius ad Institutiones Medicas prælegendas: quod munus auspica-

tus est elaborata oratione *De commendando studio Hippocratico*; qua pro virili parte Hippocratem jure, & vere fert in cælum, eumque omnibus in Medicina Tironibus proponit tamquam optimum, ac singulare potius exemplar ad imitandum. Ceterum id temporis Hippocrates apud plerosque omnes nullo loco habebatur; vix enim aliud, præter vetustatem, in eo observabant, tantum aberat, ut aliquid illum esse putarent. Contra hanc opinionem disputat Hermannus: Neminem feliciter in Naturam penetrasse: Regulas ad cognoscendos, & distinguendos, remedia ad curandos morbus ab eo proposita certissimam ideo esse, quia & experientiz consentanea, & observationibus innixa. Hæc oratione fractum prope, ac debilitatum Hippocratis nomen restituit, eique meritum *Divini* cognomen asseruit; & pristinam revocavit dignitatem. Et profecto siquis accurate Hippocratis libros expendat, nihil nisi perfectum ingenio, elaboratum industria inveniet: prudentiam in remediis adhibendis: accuratorem in observandis effectibus: sagacitatem in diagnostico, ac prognostico: apertam, simplicemque fidem in contrariis eventis: modestiam in successibus, perspicaciam, magnitudinem ingenii, pondus iudicii: cognitionis momentum: sincera omnia, & plana; hæc singula in eo mira prorsus, & summa; ut dicas, nihil Hippocratem scivisse, nisi verum loqui; nihil potuisse, nisi certum cogitare. Hinc illa consilii vis, scientiz lumina in singulis quibusque aphorismis: hinc ars illa, qua morbis imperator morbis inferiendo: hinc illud est, quod ad Naturam sive oppressam adiutandam, sive jaentem restituendam applicentur ab eo remedia communia quidem, & vulgaria, sed ea, quæ & experimentum, & successus approbavit. Itaque unus Hippocrates Medicinæ Parens, idemque Architectus. Et, verum si querimus, quicquid optimi in singulis Scriptoribus Medicis Græcis, Romanis, Arabibus est, illud omne tralatitium est,

est, & Hippocrati debetur. Neque vero minus legendi sunt Recentiores; maximo enim careret utilitatis fructu, si quis negligeret Vesalii, Afellii, Harvei, Glissoni, Pecqueti, Malpighii, Leuvenhoeckii, Eustachii, Fallopi, Boylii, Borellii, Bellini, Pitcarnii, ceterorumque inventa. Quicquid igitur aut Hippocrates invexerat, aut posteriores addiderant, omne id conjunxit Hermannus, atque summam inde conflavit & docendi, & curandi; quamquam vero ad eam rem ducem potissimum, ac Magistrum sibi sumerat Hippocratem; secundo tamen loco habuit Sydenhamium, quem plane *Anglum Hippocratem* licebit appellare; atque ex his demum duobus recte veræque regulæ Therapeutice sunt hauriendæ, quippe quæ e propriis deductæ sunt observationibus. Ea, quam habuit, oratio, atque hæc robusta ratio docendi incredibilem Hermano famam, claritatemque conciliavit. Quo factum, ut An. 1703. ad Academiam, quæ est *Groningæ*, evocaretur, mercede non contentenda: quum tamen conditionem is recusasset, Curatores Academicæ *Lugdunensis* summo consensu, adnente etiam *Vanden-Bergio*, desponderunt ei, destinaveruntque locum proxime vacaturum: & quum novissent Boerhaavium suis anteposuisse commodis officium in Academiam, caritatemque in patriam, nequid ex ea re detrimenti caperet, mercedem in duplam auxerunt. Tertio autem lux stationis anno incunte, VII. Kal. Oct. alteram habuit orationem *De usu rationis Mechanicæ in Medicina*. In hanc sententiam: Dolendum esse vehementer, a plerisque Medicinam facientibus Mechanicam negligi. Eam Mathematicæ partem longe utilissimam, Medicinæ imprimis necessariam esse: quum & solida nostri corporis Mechanicis legibus subsistant; & ex in sanguinis motu constanter observentur. Hinc fiet, ut, qui probe non teneat modum retinendis functionibus vitalibus, naturalibus, & animalibus aptum, ignoret is

etiam causas vitæ, sanitatisque: Eum enim, qui Mechanicæ expertus est, illam tantum corporis partem, quæ oculis subiecta est, superficiem scilicet, formamque externam cognoscere; at circa miras, quæ intus sunt, motiones allucinari prorsus debere; & quam apte inter se, colligatque sint corporis partes, tenere cum neutquam posse. Harum porro structuram qui nesciat, tantum abesse, ut, si quid in iis perturbatum sit, quod experientissimos sæpe, & solertes fugit viros, sentiat, ut etiam ipsarum usum, ac *Mechanismum* ne intelligat quidem. Medicinam eodem modo corpori ægrotæ admovedam, ac manus Horologio labefactato: Quænam modum autem horarum machinæ errores notare, & corrigere ex arte neminem posse, nisi illum, qui requisitæ structuræ gnarus vitæ partium, hinc & remedia invenit; sic prorsus in re Medica se rem habere. Medicum igitur, qui Physicæ, & Physiologia destitutus septuaginta annos, & eo amplius temere contraclaverit arterias, eodem semper loco futurum apud diligenter, navemque Theoricum, quo gregarius quidam e trivio Chirurgus esset apud *Morandum*, aut *Chefeldenum*: Quo successu versari possit in hac arte curandi corpora is, quem latet corporis ipsa compositio, ordoque mirabilis, partiumque usus, & vis; facile nos doceri exemplis Paracelsi, Van-Helmontii, Tachenii, & reliquorum, cetera experientissimorum ætatis lux Chemicorum; sed quos hæc lumina defecerunt: Empiricos enim tantum abesse, ut deliræ fabulis Naturam integram servent, vel corruptam restituant; ut etiam corrumpant, ac perdant valentem. Ex his palam esse, Medicinam ex officio exerceri non posse, & debilem videri semper, & mancā, nisi ad eam afferant accessionem sane maximam Anatome, ac Physicæ æternis potissimum operibus mechanicis Archimedis, Mariotti, Boylii, Cartesii, Hugenii, Newtoni, Borellii, ceterorum, qui in hoc doctrinæ genere versantur.

Quum Boerhaavius, quam hac Oratione artis methodum inculcat, & docendo, & faciendo adhiberet, incredibili successu partes suas sustinebat. Itaque Anno demum 1709. XII. Kal. Mart. quum novem annos Lectoris munere functus esset, Publicus Medicinæ Professor creatus est, mortuo viro summo Petro Hortono. Mense post inauguralem habuit Orationem, qua *repurgata Medicinæ facilis assertur simplicitas*: novum omnino argumentum, & ante eum diem inauditum. Qui enim hæcenus Chemicam tractaverant, rem cetera simplicem, Naturæque consentaneam, adulterarunt; eamque non disciplinam quampiam, sed sacrum quoddam venditabant, ut tali modo doctrinam suam mysterii specie proposita probarent vulgo imperitorum; qui, quod ignorant, vehementer suspiciunt; despiciunt vero quod planum est, & simplex. At, verum si querimus, nihil est neque purum, ac sincerum, quam Chemicæ cognitiones, quibus Naturam ipsius vestigiis persequimur, eamque adjuvare suis ipsius viribus conamur. Hermannus ea Oratione, ad veritatem composita puram putam, Chemicorum sacra aperuit, speciosasque nugas detexit; neque melius habuit Metaphysicorum fallacias coinaniores, quo magis spinosas. In Botanica vero, quam uno tempore *Lugdunensis* Academia ei demandaverat provinciam, omnium opinionem Noster vicit: nemo enim, ut ut optime de eo speraret, hoc sibi de Hermannno polliceri poterat, ut *Tournefortius Batavus* fieret. Is hortum plantis duplo pluribus auxit, sed iis levisimis. Anno 1714. *Rektor* creatur; & eodem anno postridie Non. Sextil. in Collegium *Præticum* cooptatur. Ad cetera igitur sua negotia hoc etiam accessit, quod bis in hebdomadas singulas Nosocomio se dabat, ibique de morbis dominantibus diserebat: quo ex facto & ægrotantes capiebant allevamentum, & Auditores utilitatem summam: quum enim Medicinæ, ut ita dicam, sit corpus Theoria, Praxis certe

artis hujus est spiritus. Si quis omnes omnium colligat cognitiones, unumque teneat, potis modo sit; doctus fortasse dicetur, & eruditus: nisi tamen experientia accedat, & usus, nec dicetur Medicus, nec erit. Audacter dicam, non temere, nec Batavos Boerhaavium suum, nec Anglos Sydenhamium, nec Gallos Duretum, nec Græcos ipsos Hippocratem habituros fuisse; si industri hac experientique Praxi caruissent Viri in re Medica Summi. Hermanus quum *Academix Rectoratus* deponeret, VI. Id. Februar. An. 1715. elegantissimum habuit Sermonem Academicum *De comparando certo in Physicis*. Disputat hic Noster de Philoophorum temeritate, qui plus nimio tribuentes ingenio suo tantum abest, ut Naturæ vestigiis insistant, ut malint rerum principia opinando confingere, quam res ipsas experiendo observare: qua in re Cartesium in primis errasse insigniter disserit copiose, & subtiliter. Hanc sententiam quantumvis veram & magnopere laudandam, ægre nihilominus tulit Theologiæ Professor quidam *Frankera*, magnoque molimine hominem adoritur, ac tantum caput ejus diris non devovet: clamat enim indignum facinus facere Boerhaavium, qui Physices principia sciri neget; his enim sublati Deum quoque de medio tolli; neque hanc vocem, nisi ab impudentissimo *Spinesista* potuisse proferri. Quam ingenue dicta hæc sint, facile cognosceret is, qui eam legerit Orationem; ubi id serio, sedulogue assertitur, Naturam nisi per se ipsam cognosci non posse; ab effectibus causas esse repetendas: quicquid experimento caret, hoc totum dubium esse, & phantasie plenum: Cartesium porro magnum quemdam esse opinatorem, fallacem vero Naturæ interpretem: libros ejus de Principiis Heliotropiæ comparari posse non invenisse, quæ solstitialis herba pulcherrima repente exorta mox repentino occidit. Hoc scilicet illud fuit, quod Theologum Cartesii studiosissimum male habuit; quem tamen

Aca-

Academia *Franeke* temeritatem suam impune ferre non patitur : & , quum illum ad *Pallinodium* eorum , quæ oseitanter , impudenterque *Hermanno* obiecterat , compulit ; tum literas ad hunc honorificentissimas dedit , quibus gravior se animadversuros Academix Curatores in Theologum significant , si eam satisfactionem non acciperet *Boerhaavius* . His *Noster* modeste humaneque respondet , si bi satis eumulateque factum iri , si adversario suo nihil incommoarent : itaque illi , si quid peccasset , remitterent , quem admodum ipse libens utroque condonaret . Tanta celebritate famæ notus erat etiam absentibus *Boerhaavius* , ut *Scientiarum Academia Parisiensis* summo consensu eum inter externos Honorarios loco *Comitis Marssilli* in ordinem suum receperit An. 1728. (*Fontanel. in Elogio Boerh. Hist. An.* 1738 ait id fuisse *An.* 1731.) neque minori studio Regia , quæ Londini est , Societas illum complexa est , aliquanto serius tamen , mortuo nimirum *V. Cl. Freindio* ; quamdiu enim hic vixit , eique præfuit Societati , reliquorum voluntati de *Hermanno* recipiendo restitit ; quippe quia *Nostro* , contra quam faserat , alienus fuit ; quod , quo merito factum sit , non liquet . Eo instituto , quum *Hermannus* laboriosissimas ageret partes & docendi , & faciendi , hæc onera sane quamgravia diutius non tulit valetudo ceteroqui firmissima . Quo facto de laboribus quidpiam remittendum censuit : quapropter honesta missione impetrata Botanicam , & Chemicam professionem publice posuit IV. Kal. Mayas An. 1729. præclara Oratione habitata , qua charitatem suam in Academiam , laboresque pro ea susceptos modeste exposuit ; ejusque contra in se beneficia eumularissima celebrat . Anno post *Academix* iterum *Rektor* est renunciatus ; quod quum poneret munus , orationem pronuntiavit *De honore Medici , Servitutis* ; qua haud scio , an ulla sit in toto hoc genere pulchrior , & robustior : *Schultensio* certe in hac & ipse *Noster*

superasse visus est . Et quidam profecto sunt hujus orationis loci , quos negligi hic non patiar . Qua gravitate rem inii ! *Cogitatione* quicquid attingunt homines , aut *Deus* est , aut *Res* *Universum* . *Supremum Numen* venerantur , *aeternum* , *simplex* , *unum* , & *aliorum omnium causam* . *Adorare Majestatem* hujus , & *amare mortalibus datur* , ut *se solus ipse novit* , ultra *hinc nihil datur* . In quam plane sententiam scripti sunt pulcherrimi , gravissimique verus , quibus tantum honorem habuit *Scientiarum Parisiensis Academia* .

Loin de rien décider sur cet Etre  
Suprême,  
Gardons, en l'adorant, un silence  
profond;  
Le Myſtère est immense , & l'esprit s'y confond ,  
Pour dire ce qu'il est, il faut être  
lui-même .

*Natura vero universa ratione incomprehensibili nobis , adeoque & ineffabili , a Jove producta , res completitur , singulari quasque præditas ingenio , eoque singulari prorsus definitas . Ad paucos hæc Planetas , Cometas raros , numero carentium Siellarum ordines , horumque Atmosphasas , reducuntur . Hæc autem omnia firmis adeo inter se teneri legibus , ut ultra quinquaginta jam sæcula , constantissimi ordinis tenacissima , ne minimum quidem aberraverint , varios quotidie per aspectus semper firma , Astronomi demonstrant : ut in his equidem mutare quid audax gentis humane temeritas nequidem affectaverit , nisi immanes Terra filios gigantes , magorum ineptissimos , delirantesve aniculas , siderum scilicet dominas , inter homines quis censuerit . Tellurem hanc , verum Planetam , contemplati propius , animantibus , stirpibus , fossilibus , igne , aere , aqua constitui discimus . Obnoxia iterum omnia certo Autoris Naturæ instituto , & nunquam violabili præcepto parere jussa . Ut , qui curatius ra-*  
excu-

excussere, pulchre viderint, cuncta rerum produci, & dirigi ab UNO, qui alius ab his omnibus, ante illa, supra eadem, & extra, existens, uno efficacia sapientia decreto constituit, regitque, & universa & singula. Atqui hac inter Homo est. Homo natura confidentissima Zoostro dicta machina. Hic omnium curiosus, negligens sui, infinita in alienis pervestigandis industria, & successuum quoque felicitate clarus, Delphici vero moniti vel immemor, vel contemtor, semet turpiter ignorat: se, inter illa, quae sui ponit arbitrii, omnium crebro gubernat quam stultissime. Futuras Astro- rum post secula apparitiones, ad scrupulos horae, certe telluris plage praefinit, ostenditque eo ipso vires humano ingenio a DEO infusas. At quotusquisque ille, qui iisdem facultatibus nitens, animum regere, & corpus curat? Sane ne Socratica quidem suada, suavisissima illa Euripidi philomela, & dulcissima Athenarum, at veri tenax, Siren eo vel unum perduxit Aleibiadem; cui tamen formando unice se dederat. Mente homo constat, & corpore, diversis, at reductis in unum. Intelligentiam, memoriam, voluntatem, affectus, & Hippocraticum, mirum illud, impetum faciens, una cum actiosa immensa imaginationis vi, habet animus. Corpus certam compagis fabricam, humores, & utrorumque motus. Sano corpore mens valet, aegrescente illo & hac laborat, doletve. Medendi ideo peritiam sapientum cuique scitu necessariam, Democriti vox est ad Hippocratem. Percipiendi aciem mathematicarum disciplinarum cultus acuit, affectus Philosophia moderatur, corpus sola Medicina curat. Corpus illud tantum gigni ab homine solo, mare, & femina, prius natis, aetate certa, definita lege, singulari de materie, uno modo, constat quam certissime. Hominum vero si quis primus fuerit, quam, quaso, hic origine? Si mas, si femina, sua speciei solus similem excitare impos erat. Si duo requiruntur illi simul, ut ceteri de his nascerentur

postea, duo tamen illi alia ergo lege, quam reliqui, nati fuerant. Nonne hinc colligitur, fuisse olim tempus, quo Telluris hujus non erat ullus homo incola? Quin &, si simul mortui essent, universa tum natura impossibile foret, gentem humanam de integro instaurare. Natos sponte de Terra Athenienses, ne citra quidem aetate, capillis locum in nexa, suadebunt.... Primus homo accepit ortum de causa infinites maiore, quam natura hominis est, imo vero quam totum universum. Auctorque primigeni posterorum bini, simul nati, suis instruali partibus, una facili, mas & femina, aetate integra, requirebantur. Corpus igitur hominis creando DEUS, masculinum vel tunc illud, & femininum fecit, dedique tum utrique simul; semelque cunctas partes, apta semper, semper eadem compositione ita consentientes in concinnam unius fabricam, ut actiones inde modo possent perfici, quas illi singulari proprias Creator destinaverat. Durare hunc in tempus certam, & speciem habili satuta, aliam ex alia prolem generando, sufficere valet. Quando vero exercendis omnibus officiis erat quam aptissimum, tum demum corpus hoc facultatem possidet illam, quam naturam hominis dicebat Hippocrates; sui scilicet in specie perfectissimam intelligendo valetudinem. Ut sapienti viro natura humana audiat summa requisitorum; omnibus ut muneribus suis corpus fungi queat, expedite, absque dolore, satisque constanter. Huic dein apponere aut subducere, qui incipit, legem natura violabit illico, efficietque longe minus aptum concessas a Natura facultates exsequi. Statim enim non hominis porro corpus, sed aliud quid ab eo, quod divinus Artifex formaverat, diversum. Volupe cui fuerit naturam hanc cognoscere, sensus ille suos, acres fidesque rationis speculatores, omni arte acuat, auctaque horum per artem facultate fabricae exploret: sola sic natura praemonstrante, per intentos sensus assequetur structura

modum. Neque alia datur, quicquid incauti fingant, quicquid moliantur precipites, via materiem ita, constructas inde partes, proprietates harum, viresque, concinnum apta per vincula nexum, usque ad minutissima usque compietetur animo, sed ab apparente sensibus natura unice eductus.... Quoties vero unam se corporis particulam seorsus excutere Artifex contendit, toties aliarum simul notione se egere experitur: haeret nempe omnibus, quam seclusam ab aliis eligit indagandam. Non finis hic, non principium, sed circulus est humanum corpus; in quo initium, medium, ultimumque ubique est idem; neque posterior pars ab altera prius nata hic gignitur, at nata profecto omnes simul; implexe, fateor; informata tamen. Cor partem clamat principem Philosophus, atque auctoritati facile credulum succinit vulgus; quasi vero vigor huius a nervis non penderet, ab arteria magna, & venis advehentibus. Non successiva nascuntur novarum formatione; sed simul jam & ille quoque genita, qua feris tandem longam in diem prospicient usibus. Cordis in satum pulmonisque contemplatio docet, simul semelque cuncta in unum usum adaptata: ut soli ita naturae dictamini hic rursus auscultandum sit, neque ultra fingendum quicquam. Imo vero & minima quoque particula productio toto eget corpore jam prius confecto: si enim illud antea non existeret, artium tunc omnium unitarum effectu unum pilum creare negaretur. Quin etiam universa scientia humana nefas, capillum facere unicuique de corpore jam sano, nisi vasa ibidem, instrumenta, humoresque pressio adhuc supererant, qua huic ipsi giendo jam in originis primordio praefecerat natura faber..... Quare, o Homo, cernis, te de fabrefacti corporis particula minutissima nihil quidquam intelligere posse, nisi quod Natura acceptum debeas uni, quatenus se per sensus observandi copiam tibi fecit.... Adeo hic nihil temerarium, superuacaneum nihil, casu nihil genitum

.... Cordis actione cessante, mors est: ea vigente, vita. Ut agat cor, nervorum eget virtute, qua lacertos ejus excitet. Neque nervis hac facultas, nisi a cerebello est. Atqui huius potentia imputanda arteriarum sanguini, per pulsuum ejusdem cordis ad cerebellum appresso. Causa ergo hic, effectu suo prior, tamen ab hoc pendet..... De iis, qua in partes exercet proprias atque in alimenta, pauca dixi; medicamenta vero, & venena jam perfunctior consideremus. In hac agit corpus nostrum, sed & agunt illa in idem. Pleraque tamen pendent unice a particulari profus indole, qua naturam instruxit humanam Conditor; neque ratione alia, quacumque demum de causa, unquam poterunt intelligi. Quacumque ad opem potentia applicantur viventi, corpus ita mutant, ut tandem mutantur, sicut operando amittant vires, desinantque ultra agere. Nullum tamen horum vim consuetam in cadaver exercet, excepto igne, & paucis rodentibus. Actione vita sola redduntur actiosa.... Remediorum ergo eadem, qua alimentorum, potestas hoc respectu: agunt nempe, quatenus a natura humana, ejusdemve reliquiis, accepta, motaque; inde suos in actus demum deducuntur, ut ita ope horum adjuncta natura morbos sanet medicabiles. Quis igitur apte dixerit de viribus Medicamentorum? Unus ille, qui mutatam ab his applicatis naturam, & mutantem alia, observavit caute. Extra haec qui vel pedem movet, errat ilico; neque & in his ex ingenio solertissimo vel minimum quid licet fingere. Nimis essem in singulis sententiarum luminibus, & vi exemplorum indigitandis. Orationis summa haec est; Medicam autem eo potentiorum esse, quo Naturae adhæret artius; cam Naturae fidissimam esse Ministram: Medicos hoc magis esse honoratos, quod Naturae rerum dominæ inserviant. Anceps Naturae nomen est: Boerhaavius certe eo sensu utitur, ut summum Opificem unicam rerum omnium causam

fam agnoscat, eique pariter, ac legibus, quas is partibus singulis nostri corporis constituit, Medicam artem submittendam contendat. At nihilo secius idem ex hac oratione Nostro accidit, quod Conorio ex suo *Evangelio Medici*: ut, tametsi spiritus, animæ, & huiuscemodi usi vocibus, Athei tamen ambo, & *Spinofiste* traducerentur, & ii, qui animæ immortalitatem denegarent. Huic calumniæ latis arbitror facere & Hermannii libros, & hanc ipsam orationem, & suam ipsius vitam pie, religioseque tractatam. At stulte profecto, & injuriose facerem, qui hanc invidiam ab eo removere serio contenderem. Melius operæ pretium me facturum opinor, si qualis, quantulusque fuerit is, ex suis operibus exhibuero, & ex earum rerum, quarum habuit notitiam. Hermannus igitur Mathematicus, Geometra, Botanicus, Chemicus, Anatomicus, Philosophus, Medicus & Theoriam, & Praxin caientissimus, Historicus, Mythologus, Theologus, Philologus, Jurisconsultus etiam, & Politicus (quod sane mirum videri posset) &, ut uno dicam verbo, unus omnia fuit. Neque hæc leviter attigerat, sed in omnibus ita versatus erat, ut singula rursus egregie studuisse videretur. Talem sane opinionem de homine apud externos omnium sermone percubuisse constat: sed certe, ut memoriæ prodidit V. Cl. *Astrucius*, quamvis hæc fama Orbi par esset, minor tamen fuit Hermannio. Reliquas profecto disciplinas coluit modo, & calluit; ac Medicinam excoluit, & accessionibus sane quam magnis amplificavit. Singulæ partes Medicinæ aliquid debent Hermannio: Chemia vero tantum, quantum antea nemini: quod aperte indicat oratio *De Chemia suis erroribus purgata* ab eo habita XI. Kal. Octobr. An. 1728, qua *Paracelsistas* infestatur vehementius; quorum errores, tametsi rationi repugnantes, ab omnibus tamen ultro acceptos, & longe diutius dominatos fuisse eo opinatur *Schultenius*,

quod Pauci nempe intelligunt, omnes iudicant, atque decidunt. Sed, ut ordinatim res palam fiat, indiculo librorum Boerhaavii proposito quid in singulis præstiterit, indicabitur.

*ORATIONES* De commendando studio Hippocratico.

*De Usu Ratiocinii Mechanici in Medicina.*

*Repurgata Medicina facili assersit simplicitas.*

*De Comparando certo in Physicis.*

*De Chemia suis erroribus purgata.*

*De vita, & obitu Clarissimi Bernardi Albini.*

*De honore Medici, servitute.*

## INSTITUTIONES MEDICÆ.

*Aphorismi de cognoscendis, & curandis morbis.*

*De Materia Medica, & Remediorum formulis.*

*Index Plantarum.*

*Epistola de Glandulis ad Cl. Ruy-schium.*

*Atrocis, nec descripti antea morbi historia.*

*Altera atrocis rarissimique morbi historia.*

*Editio procurata operum Anatomicorum, & Chirurgicorum Andrea Vesalii.*

*Tractatus de Peste.*

*Tractatus de Lue Aphrodisiaca.*

*Arctæi Editio de causis, signisque morborum, eorumque curatione.*

*Elementa Chemiæ.*

*Index alter Plantarum.*

*Observata de Argento vivo.*

*Editio Swammerdamiana.*

Institutiones Medice omnium primæ exierunt, An. nimirum 1707. Has Boerhaavii Abrahamo Drolenvaux Socero suo inscripsit, gratiam homini referens, quod is filiam unigenam optimam feminam sibi uxorem dederat. Nihil in his institutionibus desideres, sive elegantem spectes breviter, sive evidentiam principio-



cipiorum, sive ordinem, & æconomiam, sive propositionum nodos aptissimos, ut alia ex alia nexa, atque omnes inter se colligatæ, consertaque videantur. Librum hunc latine scriptum ab Auctore in Gallicam linguam transtulit ejus auditor D. *De la Mettrie* idem, qui Boerhaavii vitam hanc ipsam Gallice edidit, quæ hic Latina facta sistitur. *Musius* has Nostri Medicas Institutiones adeo probavit, ut ipse in Arabicam linguam verterit, edendaque CP. curaverit. An. 1708. Aphorismi in publicum prodierunt: huic libro is plausus ab omnibus ferme gentibus datus est, ut in suum quæque sermonem traduxerit & vestigio. Geometrica prorsus ratio, accuratio summa, facilitas maxima illum commendat in Medica eruditione versatis; qui enim antiqua scrutati nova non ignorant, videbunt quid præstitum sit: ut modestè de eo præfatus est ipse Hermannus. Ceterum, tametsi doctis viris hic liber simplex, facilis, idemque gravissimus semper videbitur; iis certe, qui a necessariis vacui notitiis illum attingunt, in tertio quoque verbo hærebit aqua: quum enim illic maxima rerum copia brevi verborum circuitu coarctetur, operam, & oleum perdet in eo legendo, quicumque triplicis præctice veteris historiam non tenet, quasque pulcherrimas ex Anatome, & Mechanica accessiones Medicæ arti fecerint Recentiores. Hic unus liber summum Theoricum, diligentissimum Practicum declarat Boerhaavium: quippe quo Hippocratica doctrina pura puta exhibetur: nec, hercle, nisi unus Hermannus, qua erat imbutus affatim, eam potuit in Aphorismos digerere. Ceterum in his nihil est loci mytherio, aut miris, singularibusque remediis: plana omnia, simplicitatè Naturæ consentanea maxime: ubique experientia dominatur, & observatio: clara diagnostica, prognostica certa: accidentium lolsers subtilisque, ac graphica prorsus descriptio: verba singula elegantissima, & rem propriè demonstrantia: quæque causa suo indicio, ap-

positoque ad eam remedio distincta. His igitur Aphorismis jussit modo indicationes, non librarium quoddam Medicamentorum continetur: nec enim ulla esse remedia Noster assererat, quæ quæ ex re ipsa nascuntur, appositeque ad eam adhibentur. Brevitas autem, quæ propria est, & præcipua styli Aphoristici nota, hic tanta est, ut multum Tirolibus negotium facessat, & Interpretem omnino desideret. Auctor id fatetur ingenuè in ea, quam huic libro Aphorismorum præposuit præfationem. Præclare profecto Medicinæ consultum esset, si has partes Auctor sibi ipse sumisset: quæ enim Commentaria in quinque Tomos digesta a quodam ex illius Auditoribus prostant, non imperfecta tantum sunt, nulliusque momenti; sed mali plurimum habent etiam, & detrimenti. Quod de *Materia medica* opus inscribitur, ab Aphorismorum libro nequit sejungi; tanta est utriusque connexio. Nihil aliud hoc libello exhibetur, quam Remediorum formulæ, tales vero quæ Aphorismis respondèant, ut vix, ac ne vix quidem, nisi cum is conferatur, is possit intelligi. Hermannus sane quum eum ederet, fateretur nulli futurum usui, nisi iis, quibus viva vox contigit Magistri: pleraque enim Medicamenta, quorum ibi usus est, nisi caute, & eo, quo convenit, modo adhibeantur, tantum abesse, ut salutaria sint, ut etiam noxia esse possint. Nec multum ponderis habere hoc opusculum & ipse Auctor asseruit. Hoc item Gallice reddidit Vir Cl. *De la Mettrie*. Id autem sedulo quis caveat, ne Nostro attribuat libellum alterum *De Viribus Medicamentorum*; qui cujusdam ex ejus Auditoribus est: quod quum ignoraret *Devaux* Parisiis Chirurgiam exercens in Gallicam vertit linguam, & Boerhaavii nomine in vulgus dedit. An. 1710. editus Index Plantarum Horti *Lugdunensis*: decennio post alter ejusmodi Index prodit in lucem, qui Plantas (*Fontenel. ibid.*) sex mille exhibet, quum prior dimidium contineat; per

per hæc enim tempora Plantarum numerus, accurate Hermannò, in duplum creverat; ut, quicquid id generis rarum, & singulare in toto orbe distributum est, hoc omne in uno Horto *Lugdunensi* videretur. An. 1722. ad *Ruysschium* Virum miris *injectionibus* clarissimum litteras dedit Noster de Glandulis; & ipso observatorum principe *Malpighio* felicior, neglectam ea de re sententiam renovavit & stabilivit. Quid in Anatome valuerit Boerhaavius, facile ex hac Epistola, primaque parte Institutionum Medicarum cognoscitur. Nec tam profecto mireretur quis, Nostrom in tercentas paginas, optima fide, minusteque singulis citatis Auctoribus, coniecisse, quicquid Anatomici, Physiologicique recentiores detexerant; quam jure meritoque obstupescat memoriam ejus tantam, tamque expromtam, ut præsentem illi silleret omnium musculorum insertionem, situm omnium nervorum, omnium distributionem vasculorum; quod æque *Winslowio*, opinor, aut *Hunoldo* potuit contingere in re Anatomica, aut *Bolducio* in Chemicis operationibus. An. 1725. editionem Operum Anatomicorum, & Chirurgicorum Andree Vesalii procuravit: ut inde intelligas, Hermannum in Chirurgicis cognitionibus non leviter etiam fuisse versatum; & si verum proferendum, optandum sane esset, ut eadem vi, momentoque, qua de Morbis Chirurgicis Noster egit in suis libris, Chirurgicæ rei Scriptores eam artem trassent; nec immerito *Morandus*, quum de *Pesito* minore scriberet, eum *Chirurgia Boerhaavium* appellat. Et si porro Editionis curam, quam dixi, cum Albino Noster partitus esset, ipse tamen potissimum eam accuravit, vitamque Vesalii scribendam in se suscepit. An. 1724. atrocissimi, nec descripti antea morbi Baronis *Wassener* Dynastæ *Rosemburgi* historia, & altera Ann. 1728. confecta rarissimi morbi Marchionis de *Saint Aubin*, observationibus, ratiociniisque Medicis redundantes perfectissimum pro-

ponunt *Consultationum* exemplar Tyronibus ad imitandum. Eodem An. 1728. prolatus est *Tractatus de Peste* excellens, hercle, & præstans opus. Scriptum hoc est, quum Pestis Massiliæ id temporis dominaretur. Mirari subit, qui factum sit, ut neque de Peste, neque de Asthmate Auctor noster egerit in libris suis. Ceterum hic prætereundum non est, quo modo Hermannus, vetus Hippocratis renovans exemplum, & *Lugdunum*, & se ipse ab hoc morbo libera-verit. Quum igitur se jam lue teneri sensit, Fratres accessiri jubet, quibus distulavit ordinatim singulas morbi significationes, ac symptomata; & quid facto in singulis opus esset, quibusque remediis cuique occurrendum, quum caput vis morbi teneret, imperavit. Quodcumque is prædixerat, evenit, progredientemque morbum ipsius vestigiis persequuta remedia fregerunt, ac tandem depulere. Prognosticum certe nihil allevat ægroti corpus; at in eo Medicus morbi prævidet insidias, easque opportune prævertit. Primus in Prognostico excelluit Hippocrates: posteriorum nullus hujus laudis æmulus extitit dignor Sydenhamio, & Boerhaavio. An. 1731. magnifice edendum curavit Aretæum Cappadocem *De causis, Signisque morborum, eorumque Curatione*. Nullas hic de Aretæo, primo Hippocratis æmulo, laudes habeo, satis enim fama celebratur: Id unum monco, hanc editionem non uni Hermannò deberi, sed collatis operis Johannis Van Groenmold Medici eruditissimi, ejusdemque Jurisconsulti præstantissimi procuratam. Hic Johannes, & Hermannus noster de Bibliotheca Medicorum Græcorum concinnanda cogitaverant: sed, quo Medicinæ fato factum fuerit, ut talibus viris, muneris certe paribus, non licuerit tam præclare de re Medica mereri, nescio. An. 1732. Chemicæ elementa prodierunt: quæ enim ante eum annum edita, suum quamvis inscripta nomen, Boerhaavii tamen non esse, illico palam fit ex rebus ipsis ineptissimis, & fatili genere dicendi.

His,

His, tamenſi ridiculis, nulliusque ponderis, nec Emtores deſuere, nec Laudatores: quæ res, quum nomen Hermannî magna macula aſperſiſſet, ſuis editis de Chemia libris eam delere conſtituit; quibus in hæc verba præfatus eſt. *Ingratus Auditorum quorundam animus, quibus tamen commoda ſedulo promovere annifus ſum; & inſatiabilis Libratorum quorundam avaritia, qui in re turpiſſima lucrum facere geſtiunt, amaram mihi fecerunt Chemiæ profeſſionem. Uirique ſcilicet falſo prætexentes Artium bonum, inhoneſta, & legibus coercenda licentia, & in publicum, & in me peccaverunt, dum, ignaro me, auſi ſunt protrudere Inſtitutiones, & Experimenta Chemia meum inſcripta nomen: in eo falſa, ridicula, barbarâ, in qualibet pagina mihi imputata, hæud indicabo, ne nauſeam conceitem. Eſſeſcit interim ſeculi calamitas, documenta inſelicitatis ſua datura poſteris, ut turpiſſer editum Emtores mox invenerit, magno certe ementium, imo & laudantium molo, & opprobrio. . . . Occutirebat Petrarchæ recordatio, qui infortunio ſeculi ſui deſolebat, quum tanti videret fieri ſua carmina, ut eximiis ideo Poetis infereretur. Quum in hac re Auctoris modeſtiam cognoſcis, tum plane intelligis, quantum pondus habuerit Hermannî nomen apud omnes. Ne autem quid tale in poſterum uluveniret, indicem dedit eorum omnium, quæ hæctenus ipſe ediderat, his uſus verbis: Scias, me nihil unquam edidiſſe, præter ſequentia: Eadem nimirum, quæ nos recentuiſmus. Hanc occaſionem habentes, alterum reliquorum librorum falſo attributorum Boerhaavio indiculum proponemus.*

*Commentaria in Aphoriſmos.  
Inſtitutiones, & Experimenta Chemia  
De viribus Medicamentorum.  
Methodus diſcendi Medicinam;*

*Index Plantarum, quæ in Horto Leydenſi creſcunt, cum appendicibus, & characteribus earum deſumptis ex ore Cl. Viri H. B.*

D. Andry, in ſecundo Tomo Operis ſui de præſerenda Medicina Chirurgia diſquiſitionem ſane curioſam exhibet de veris, falſiſque Boerhaavii libris. Itaque id cauſæ ſuit, quare vera Chemiæ Elementa prodirent. Nihil autem eſt, quod æque ſolidum, purum, limatumque ſit, in eo potiſſimum diſciplinæ genere, quæ verbis horrida, levis rebus, culturarum detreſtare videbatur. Hermannus attem hanc adeo perpolivit, edolavitque, ut Georgium Agricola longe multumque ſuperaret, de quo quidem Agricola has Noſter habuit laudes: *Vocabula evitare, quæ Arti unice familiaria, exemplo ſuo docuit, æterno opere de Foffilibus, Metallica re, & Subterraneis, Vir omnes exſuperans Georgius Agricola.* Neque vero minus eam auxit, ſeu novam potius fecit: quid enim præclarior quatuor illis Phyſicis Tractatibus quantivis pretii de Igne, de Aere, de Aqua, de Terra? Quid utiliſ Proceſſibus Chemicis? Eodem loco habenda ſunt obſervata de Argento vivo, quæ partim Pariſinæ Academiæ, partim Societati Anglicanæ impertivit An. 1734. Hæ (Fontenel. *ibid.*) obſervationes quindecim annos noſtu diuque cum exercuerunt. Fructus tam diuturni laboris uberrimus is fuit, ut demonſtraret, Mercurium ad alterationem ullam minime aptum eſſe, proindeque in aliud metallum verti, mutarique neutiquam poſſe. De Editione Svammerdamiana non multum habeo, quod dicam: librum enim illum Gaubius Chemicæ Profeſſor Lugduni in Latinum vertit, de conſilio tamen Boerhavii, qui eam editionem auxit etiam illuſtri Præfatione. De huiusmodi autem Præfationibus Hermannî dicam generatim tales eſſe, quibus intermotua Auctorum memoria renovatur; & adeo copioſe, graviterque eorum opera commendantur, ut nihil ſupra. Ultimo loco occurrit Editio Aphrodiſiæ. Volumen hoc ſatis grande merito diſplicet V. Cl. Aſtucio, doctiſque omnibus viris: vix enim eſt, aut ſane modicum, quod illic pro-

probes; at, quum ibidem Boerhaavii Præfatio legatur, qua is more modoque suo, acute nimirum, & eximie differit de Lue Venerea; tanti jam liber sit, ut ematur libenter, summaque voluntate pervolutetur. Hinc mirari subit, virum summum *Astrucium* in præstanti opere de *Morbis Venereis* plus nimio severe, nec pro Auctoris merito libellum hunc habuisse. Sed in ea re Hermannii prudentiam vide; nunquam enim digno ceteroqui Adversario respondit, suaque vindicavit: quum Hermannio idem fuerit animus, qui scilicet est sapientibus, nihil sua reprehendentibus repone. Hujus sententiæ, consilique rationem dedit Vir politissimus *Voltaire* in vita Caroli XII. Aut enim, quod objectatur, verum est, aut falsum: Si primum, ingenui est errorem agnoscere, & corrigere. Sin alterum, res ipsa, etiam eo tacente, loquetur. Nihil hic dico de Literis, Consultisque Hermannii, ne nimius videar: numquam mirum videri poterit cuiquam, talem Virum a Regibus, a Principibus Viris, a Pontifice, a totius Orbis terrarum gentibus de re Medica consuli? Id certe non negligam memorare, homini vehementer occupato nihil fuisse potius, quam, ut se consulentibus aut voce, aut scripto responderet. Tam multus is in ea re fuit, tantaque Consultorum frequentia domos ejus celebrata, ut *Æsculapii* jam *Ædes* videretur; neque minus eumulate satis consulentibus fiebat a vero hoc *Æsculapio*, quam a ficto illo, mendaeque factum esse dicitur. Neque minor Auditorum ejus frequentia, qui ex universa Europa *Lugdunum* confluebant, non magis celebritate ingenii, quam singularis in docendo artis fama adducti. Siquidem quamvis partes omnes pari felicitate sustineret Boerhaavius; ad docendum tamen nervos omnes intendens incredibilem afferebat industriam; qua in re non minus natura, quam consilio adjuvabatur: quod enim tradebat, id erat optimum; atque hoc rursus

summa elegantia & orationis, & actionis exponebat; ut quum de gestu jam prænotabatur, quid erat lingua expressurus; tum verba ipsa ad rem significandam apposita, apertissimaque pronunciabat venustissime. Quæ autem dicendi vis? Quæ sententiarum lumina? Quæ rerum ubertas? Quod momentum argumentorum? Quam puræ, nitidæ, facilesque demonstrationes? Quod veritatis studium? Quis evidentiae character? Quibus rebus fiebat, ut non magis erudiret Auditores, quam delectaret; & oratione alliceret æque, quos notitiis ipsis imbueret. Præterea eruditionis suæ prodigus in Discipulos, quorum sedulo expendebat ingenia, indulgentius parce se dabat; & benevolentiam suam declarabat amantissime, ut eo familiarius uterentur; Filios enim (*Fonten. ibid.*) adoptivos se eos habere dicebat. Tali modo, quum tantam famam nactus esset, quantam antea nemo; Medicinæ Oraeulum vulgo audiebat. Confluebat ergo ad eum frequentissima *Ægrotantium* turba, quibulcum liberaliter, benigneque agebat: pauperibus enim gratuito, nec gravate se dabat horis statutis; divites vero ita ab illo discedebant, ut, tamen si maximam dabant mercedem, parce tamen, nec pro merito ei satisfecisse opinarentur. Exemplo sit Anglus quidam, qui, quum Hermannio daret pro *Consulto*, non minus, quam quinque & quadraginta aureos (*Dix Lewis d'or.*) nimis stricte, tenuiterque eum exieperet sibi ipse visus est. At multo magis obstupefces id, quod cum Boerhaavio duas amplius horas familiarissime sermones habuit toto orbe celebratissimus Magnus Moscorum Dux Petrus An. 1715, qui porro ab eo ita discessit, ut magnitudinem ingenii rerum omnium scientia exculsi vehementer admiraretur. Non minori voluntate eum adivit An. 1735. Dux Lotharingæ, qui nunc Magnus Erruriæ Princeps. Maximo tamen studio, & benevolentia Nostrium prosequutus est Dux de *Richelieu*. Quum igitur duorum & qua-

& quadraginta is esset annorum, & gratia fortunisque floreret, tamque firma valetudine uteretur, quam qui maxime; animum ad uxorem appulit, quam nactus est ex animi sui sententia. Duxit ergo XVI. Kal. Octobr. An. 1710. Mariam *Drolevaux* Abrahami amplissimi Senatoris *Lugdunensis* filiam unicam. Poterit aliquis, Hermannum ab re uxoria abhorruisse, quum ad id ætatis negotium hoc protulerit; profecto enim iis, qui sapientiarum unice student, quidquid a proposito eos advocat, hoc omne placere non potest; unde fortasse factum est, ut vir omnium memoria dignissimus Newtonus a foeminis alieno semper animo fuisset tradatur. At verissimilius sit, Boerhaavium, morem veterum Batavorum imitatum, nonnisi bene constituta re familiari de uxore cogitasse. Ut ut certe se res habeat, nunquam æque par, simileque conjugium extitit. Nec dignior tali viro mulier; neque huic uxori vir aptior. Hinc illud fuit, ut octo, & viginti annos sine ulla alterutrius offensione, sine ullo jurgio viverent, eundemque amorem, caritatemque mutuam a nuptiis ad funus intaminatam produderint. Ex ea uxore filiam habuit Hermannus Mariam-Johannam, natam XIV. Kal. April. An. 1720. mox alteram Magdalenam; deinde tertiam Magdalenam-Jacobam; quæ tamen ambæ paulo post decesserunt. Tandem puer ei natus triduo victurus. Unica ergo superfuit Maria-Johanna, quæ bene, sapienterque educata Parentes optimos egregie æmulata est. Huic Patris hereditas delata est amplissima, quæ ad vicies (*Fontenel. ibid.*) centena millia *Florenorum* censetur; sive etiam ad sexagies centena millia *Francorum*. Hoc loco commodum est, Hermannum imaginem proponere, & corporis, & animi. Fuit igitur musculus nervisque potens, lato pectore; tandem habitudine adeo valida solidaque, ut omnia haberet longioris vitæ signa. Tum is habuit oculos acres, & acutos; nasum si-

mum; vultu autem toto fuit Socratis quam similis, urbano, comi, lato, eodemque gravi. Porro erat animo ad benevolentiam facto amicorum amantissimus; sincerus æque, & prudens; & quum esset veritatis studiosior, ei tamen ita inferviebat, ut neminem læderet. Exemplum ejus rei pulcherrimum sistit Epistola ad *Ruyschium* data. Nihil hic stomachi, nihil querelarum, nihil odii: quæstio unice discutitur, propositum urgetur; in utramque partem argumentorum pondus, veri conclusio: omnia aguntur bona fide, quam sane ejusmodi solent scriptorum genera desiderare. Minime suspiciosus tantum aberat, ut de quoquam malam faceret conjecturam, ut omnia in bonam partem acciperet. Ab ira, cum qua nihil recte fieri, nihil considerare potest, ita abhorruit, ut qui maxime: quare autem ab hac animi perturbatione vacuus esset, interroganti aliquando *Schultenio*, respondit Hermannus, se preces, & meditationem Iræ opponere, & tali modo hunc animi morbum curare. Consilia capiebat moderata, & prudentia; pacisque imprimis, quietisque auctor erat. Plures nactus adversarios, seu potius invidos, benefactis eos demulcere, ac frangere contendebat; siqui beneficiis insecti nollent, eorum accusationes palam omnibus faciebat; quæ facto conquiescebat. Iis vero, qui in ipsum Religionis calumniam adhibebant, nihil reponebat: Ut ut enim pietatem egregiam & scripta, & vita ejus præferrent, *Desiste* tamen invidiam declinare non potuit; & animæ materialis assertor plerumque audiit. Tales calumnias is similes esse dicebat scintillis, quæ, si nullo spiritu excipiantur, sua sponte extinguuntur. Magnifice, arroganterque de se nunquam loquutus, nec fæta modestia utebatur; quam ii potissimum adhibent, qui laudari maxime volunt: quo hominum genere nihil est invenustius, aut incommodius. Boerhaavio pluris erat sua conscientia, quam hominum sermo:

hoc

hoc certissimo, præclaroque teste sustentabatur. Amicorum, pauperumque egenam opibus suis allevabat, sed ita secreto, ut vix demum eo mortuo, quam effusus, ac prope prodigus in egenos fuerit, cognosceretur. Neque vero minus diligens Paterf. habebatur; et si enim circumfluere omnibus copiis, atque in omnium rerum abundantia viveret; tam parce tamen, contentaque se habuit, ut Philosophorum abstinentissimum cum eo vix conferas: nec cuiquam prandium dedit; nec ad cuiusquam prandium accessit. In utraque fortuna idem semper, sibi que constans nemo eum melius se ipse novit, Delphici oraculi memor ubique. Id conjuncto ex eo, quod Medicas Institutiones Socero suo, Chemiz elementa Fratri suo Jacobo Boerhaavio inscribens, humanissimis, amantissimisque verbis in eos utatur. Occasionem natus pauca de Jacobo Hermanni Fratre consanguineo dicam. Hic gravis Theologus, Minister insignis, Chemicus indutius fuit: quum hic Medicæ studebat, Hermannus Frater Theologiam affectabat, deinde permutatis muneribus hic Medicus, ille Pastor evasit: priusquam hæc fierent, noctes diesque Chemiz conjunctam operam dabat uterque. Sic eum alloquitur Hermannus, quum ei Chemiam inscriberet: *Novissi & ipse, neque, opinor, meminisse pigebit; ut solitos saepe dies, noctesque ordine vigilantes impenderimus una explorandis Artis Chemica corporibus naturalibus; eo jam tempore, quo Medicinam tu inprimis, ego Theologica maxime cogitabamus. Deo aliter visum, dum sorte permutata, tu dein Sacris totum te devovisti, cultumque Dei verum simplici sermone, vitæ integritate docere contendisti unice. Ego contra, minora modo ausus, atque impares altioribus facultates nimium expertus, ad medendi Artem dilapsus fui. Jure ergo tibi debebatur, cui absolvendo & operam ipse contuleras, opus. Et sane hic Jacobus auctor esse videtur Processuum Chemicorum, qui volumine secundo con-*

tinuerunt; nec enim verum sapiunt Boerhaavium; iisque aliquid deest, quod desideres. Non minori voluntate animum suum in *Van-Alphenium*, & *Vanden-Bergium*, ubicumque data est occasio, declarat adeo, ut cor in labiis, ut ita dicam, habere videatur. Siquis uno intuitu, quibus fuerit moribus Hermannus, velit noscere, hæc habeat: is bonus Pater, bonus Maritus, bonus Civis, Amicus bonus, bonus Christianus fuit. Si qualis in disciplinis extiterit, roges, hæc pauca addam: Belgice, Germanice, Gallice, Anglice, Italice, Hispanice, Latine, Græce, Hebraice, & Chaldaice luculenter scivit. In universa Medicina ita versatus, ut singulas ejus partes æternis operibus illustraverit; quæ scilicet Parisiis per Vir. Clar. *Huynoldum* incredibili successu in re Medica Tironibus præleguntur. Nec modo in Theoria, & Praxi calentissimus Medicus; sed idem (*Fomel. ibid.*) & juris, & Politicæ Sapientiæ sane non expertus: Theologicæ vero scientior: summus porro Mathematicus, Physicus gravissimus, Metaphysicus subtilis, & acer. Hermannus quidem Malebranchius magnus erat Philosophus, & ingeniosus; at phantasiæ pleus, veritatem scilicet unice affectans, fabellas ubique scribens: Cartesius eidem erat Geometria eximius, ut nullus Noster dubitaret asserere, Newtonus profecto tale non futurum, qualem omnes admirantur, nisi ei Renatus in re Geometrica præluxisset: nec tantum Geometris omnibus superioribus debere Cartesium, quantum uni Cartesio debet Newtonus. At, quum in Physicam delabatur Renatus, repente puer factus videbatur Boerhaavio, ludibriumque debere doctis omnibus, indutiusque Physicis; nec se risum tenere posse Noster aiebat, quoties Cartesii libellum *De formato sari* legeret: eundem scilicet sibi videri *Hominem* Cartesii, ac *Luem Veneram* Deiderii: ridiculum enim profecto est, Cartesium humani corporis partes ad arbitrium suum libidinemque confingere.

gere. Hermannus igitur Cartesium magnum quendam opinatorem in Physicis habebat, ingenioque suo plus nimio indulgentem, ut non e Naturæ sinu, sed ex cerebro suo rerum syllema extraxisse videatur. Itaque is ita de Cartesio sentit in orationibus: *Si severe discutere vicerat, quæ de impenetrabili infinito, prius quiescente, deinde moto; de legibus motus; de ortu Mundi; de vi elastica; de natura Magnetis; de corpusculis siviatis; de meatibus hæc admittentibus, aut respondentibus; de origine, fabrica, & actionibus corporis humani, conscripsit: quæres in Cartesio Cartesium.* Quo factum est, ut Noster & sæpe Renati studiosissimos homines demonstrationibus suis convinceret, & a Newtonoaret aperte, quem Naturæ familiarissimum amicum esse, citique uni mysteria sua Naturam aperuisse dicebat; quum nimirum intelligeret, unum eum esse Newtonum, qui nihil opinioni, omnia tribuit experientiz. *Isaacus Newtono viro certe tanta penetrationis in Mathematicis, & Physicis, ut humani ingenii ultimos limites transiisse videtur, &c.* Verba sunt Hermannii in Insitut. Medic. qui rursus in Element. Chemiz: *Revelatio ætæni Natura uni reservata Newtono.* Ceterum quid de duobus his Philosophiz luminibus sentiendum sit, siquis velit noscere, is adeat *Volnirium*, qui rem acu tetigit. Quantum in Medicina fuerit Boerhaavius, ex libris ejus hæcenus intelleximus: eundem porro agentem, operantemque cognoscamus. Quidam oculi lumen quum perdidisset, ad Boerhaavium accessit. Quid tum Medicus? Pupillam hominis excellenti microscopio intuetur acri attentoque animo: videt, humorem densum, rupto vasculo centri Cornez, inter binas hujus tunicæ laminulas se interjecisse: Parti scalpellum adhibet acurissimum; summa cum diligentia fecit leviter primam tunicæ laminam, sine ulla secundæ offensione: Qui vix altero videns oculo accesserat, duobus integris luminibus discessit. Quis plausus datus est Ruyschio

quum separatas exhibuit Cornez laminas æque ac Choroidis? At Noster quæ habebitur laus, quod, antequam id ab industrio viro demonstraretur, manu tantum opus præstiterit, quod ullus hominum ne fieri quidem posse cogitaverat? Minus certe mirabimur de Ruyschio, quod ei contigerit, membranam, quæ simplicissima videbatur, in duas dispartiri; quum satis constet, quantum ei debeat Anatomia, quantaque fuerit diligentia; nec quisquam ignoret, artem eum habuisse tantam, ut *Moscæ Dux* non dubitaverit amplecti puerum mortuum a Ruyschio præparatum, quem vivum putaverat esse infansem. Quod vero Hermannus parti huic manus tanto successu adhibuerit, id merito, & jure obstupescet. Hinc facile colligas, Medico Anatomiam imprimis esse necessariam; eoque præstantiorem illum fore, quo Anatomes erit scientior: ut enim cetera præteream commoda, ex hac quidem sæpe discet, qui morbi Medicinam recipiant, quive sanari nulla arte possint. Exemplo si unum, & alterum Boerhaavii nostri factum cum per se præclarum, atque egregium, tum expositum ad imitandum. Juvenis pulmone exceperat lati ensis istum: felici opportune vehementissimæ inspirationis conatu pulmo exiit e pectore, costisque interceptus hæsit: Boerhaavius pulmonis partem præcidi jubet; alteram vero apte ligari; residuum immitti, & in locum suum restitui. Quo facto sanus is factus fuit. Mulier parturiens ram multum sanguinem amisit, ut jam respiratione, pulsque arteriæ careret. Hermannus eam in cubiculo, libero aere, aperto, & ventilato imperat collocari: cibum autem vel modicum dari negat; in singulos dies ægrozæ præscribit jus tenuissimum pulli gallinæ. Quum tali modo dies quindecim Mulier curaretur, sanata est; & decem annos post illa vixit integre, & sane. Addenda his est & mira, quam proposuit Noster, ratio curandæ Arteriæ Carotidis. Si quis Medicus,

dicus, ait is, ab ægroto, cui Arteria Carotis præfixa sit accersitur; de eo ne desperet: sed interim, dum sanguis omnis foras projiciatur, primum brachia, femotaque confringenda sunt torculari, (*tourniquet* vocant) ne sanguis scilicet ab extremitatibus ad cor revertat: deinde vulneris ori propius infra, supraque digiti sunt applicandi, quo vulnus obligetur, itaque Ægrotus fiat *vivens tamquam non vivens*: tandem nihil omnino cibi capere is potest interea dum obductum vulnus solide coerit; quum in eo statu vel minimum pituitiæ, aut juris etiam tenuissimi, mortiferum esset. Boerhaavius ipse tali modo quum plures curasset, dies octo, & eo amplius, tamquam viventia cadavera, habens; eos a fati faucibus eripuit. Plura essent, quæ narrarem, hujusmodi Hermanni miracula, ut divinum eum in Praxi fuisse intelligas. Hoc autem hinc fuit potissimum: noverat is nempe satis, quid Natura possit, si libere eam per se agere patiamur, & neutiquam disturbemus operantem. Nec quisquam profecto erit, qui Boerhaavius multum praxi potuisse eo neget, quod unus omnium præstantissimus esset Theoria; hinc enim ridiculum quiddam liceret asserere, ut is, qui minime morborum causam, ingeniumque teneat, morbos unus optime curare sit potis. Qui *Voltaire*um admiratur, ut est auctor *Henriadis*, ut est Historicus, ut est elegans politusque Poeta; alium profecto putabit, si eundem de Newtono differenter legat. Logicæ Professor quidam, qui *Voltaire*o, uti Poetæ suavissimo, plauserat hætenus; animum nunquam inducere potuit, ut crederet, eum ipsum esse, qui Newtoni Systema Physico-Mathematicum tanto exposuerit momento. Fieri enim non posse putabat unum hominem & ad fabulas faciendas tantum ingenii, atque elegantiz, & ad Physicam porro, ac Mathematicam rem tractandam tantum gravitatis, & cogitationis asserre potuisse: quod eximie utrumque præstitit *Voltaire*.

*rius*; ut quum duas artes sane disjunctas copulabat, alterius asperitatem dulcedine alterius molliret; Poëcos autem levitatem Philosophiæ gravitate augeter. Non multo aliter Nostris usuenit. Quidam Chirurgus paganus quum intelligeret Boerhaavius tot libros edidisse, tantumque studii ad docendum adhibere, nunquam eundem summum esse posse *Prædicum* credidit usque, donec *Legendum* data opera profectus, quod audierat, præsens cognovit: magnitudinem ingenii Hermanni, tenui sua Minerva scilicet metitus. Neque vero minus scientior Naturalis Historiæ fuit Hermannus: id nusquam atque facile intelligas, quam ex oratione *De honore Medici, Servitutis*; & ex ea, quam ad Auditorem suum D. de la Mettrie dedit An. 1735. Epistolam de Serpente, qui *Quæfuit* audit *Inflator*, Gelnero autem *Prestet*, ipsi vero Boerhaavio dicitur *Physeter*, proprio fatique ad eum appposito vocabulo. Hermannus bonam nactus corporis habitudinem educatione sane quam apta firmatam, fecerat etiam solidiorem quotidianam prope exercitatione, cui potissimum pedibus, aut equo dabat operam; tum cibis siccis, solidisque, pane minime recentiori, bene vero fermentato, & plerumque etiam usus *bischo*, quem ipse iis vehementer probat, qui fibris utuntur laxis, acidoque vivunt obnoxii. Hæc nihilominus firmissima ejus valetudo laboribus debilitata, ac fracta tandem succubuit; quum is uno tempore & Doctoris, & Auctoris, & Medici partes idem egregie fulsineret. Quibus rebus factum est, ut in morbum incideret. Primum igitur An. 1722. Augusto mense oppressus est morbo, cui certe causam ipse dedit: a lecto enim surgens intempestive ab aere frigido non cavit, satisque inconsiderate se commisit nebulæ acuta glacie gravidæ. Illico pori aperti constipantur, cessat transpiratio, in nervos articulosque frigus irrepit: Podagram Paralysis excipiens cruris utriusque usuram homini eripuit. At, quum is summos

acer-



acerbosque ex ea re dolores habebat, magna animi praesentia sustinuit; & incredibili patientia usus adeo sedate placideque tulit, ut unica se consolatione sustentari diceret, memoria earum rerum, quas in vita sua cognoverat. Frustra Boerhaavius ad depellendos, aut ad mitigandos saltem dolores adhibuit, quaecumque ars Medica suppeditat remedia: sed aequè, ac Sydenhamius, qui de Podagra scripsit tum, quum eam ipse a se depellere non potuit; tristi comperit experimento, satis futilia esse medicamenta, nisi per se Natura ipsa operetur. Invitum igitur morbum noluit amplius tentare; sed anno post tractabiliorem eum nactus facile se, multo utens succo Cichorei, Endiviae, Fumariae, Simsbrii aquatici, Veronicæ, ex morbo expedit. Quum tandem in publicum prodire coepit, tantum civium suorum consequutum est gaudium, ut eum diem, quum primum exiit e domo, festum agerent *Leidenenses*, ignibusque & accensis luminibus tota urbe Boerhaavio jam valenti gratularentur; quæ tamen animorum significatio eum non elatum, sed benevolentiorē fecit, ejusque in patriam auxit charitatem. Alterum in morbum incidit An. 1727. Febris, quæ hominem sane robustum oppressit, brevi tantum aucta est, ut jam de salute ejus desperaretur. At quum eo, quem Noster in Aphorismis proponit, modo ipsum habuissent, sanatus est. At, quod firmata nondum esset valetudine, domi se continuit diutius; & per id temporis Tractatum eum, quem diximus, de lue Venerea scripsit, quem his terminavit verbis: *Neque rectius mihi videbar posse locare tempus, quod resurgenti a fatali fere morbo donec salendum erat, dum languor virium vetabat in publicum prodire. Fastidiosa cervæ agrimonia sensum levat tristēm tota cogitatio, quod hæc humano generi forte quandoque prodesse. Vale.* 1727. Hoc Libro ille Venereæ luis locum in Adipe esse docet; atque hoc illud est, quod V. Cl. Astrucius non ita

se habere contendit. Operæ hic pretium arbitror me facturum, si universam Boerhaavii Praxim ex Aphorismis excerptam in nucleo exhibeam. Fibrae aut satis validæ, aut plus nimio debiles sunt. Primum fit, quia terrestria, quibus constant, elementa nimis arctè conjuncta sunt & compacta. Alterum ex eo est, quod nexus hujusmodi molecularum laxior est, & remissior, quam convenit. Ad fibras porro intensas remittendas nihil aequè efficacius est, quam lactis serum: ad easdem vero laxiores constringendas, quales puerorum præsertim sunt, aptissimum est lac purum, commoda, viribusque convenienti exercitatione adiutum. Reliquis lactis generibus præfertur Lac Humanum, quippe quod sanguini nostro analogum magis est, & levius etiam Vaccino, adeoque aptius, ut se in sanguinem immittat, & in nutrimentum se vertat; lac enim, quod fermentationem non excitat acidis, aut alkalinis admixtum, nec acidum profecto est, nec alkalinum, optimoque hoc ipso habetur. Tale est lac semine & ætate, & valetudine florentis, exercitationi inservientis, & bis in die cibum sumentis. Hujuscemodi igitur lac aequè salutare erit (ne quid dicam majus) ac vaccæ optime se habentis: quo videas, quam rectè dixerit Auctor quidam, lac semine & *Moraliter*, & *Physice* corruptum videri. Frictiones corporisque exercitationes Noster non minus commendat, quam lactis serum. Quod autem ceteris probabat, eo & ipse utebatur; sæpe enim Equo vestus secedebat in suburbanum amœnissimum, plantis omnis generis exterisque præsertim consutum: hic procul a negotiis, curisque laboriosissimis animum relaxabat, sæpiusque per ocium Lyrae (*Chitarram* dicunt) pulsandæ se dabat. Exiretum, cui cessu summo Medicinæ fato Hermannus, morbum nactus fuit An. 1738. Huic morbo respirationis difficultas dedit initium, quæ singulos in dies sensim augebatur;

ut

ut tandem senserit satis iniquabiliter se habere arteriam; vim porro deprehenderit maximam insolitam ex dextra parte tolli; unde conjici poterat, Polypum esse, vasculaque ideo dilatata fuisse inter cor, & pulmones. De ea re literas ad Amicum dedit VI. Id. Sept. eodem anno, scriptas hoc exemplo: *Ætas, labor, fatumque meum me hebetiora, gravem, inertem reddidera: Ægre enim respiro, & ad quemlibet corporis motum vel minimum intercludi mihi animam sentio. Id autem tam crebro fit, arteriaque pulsus adeo est intermittens, ut nihil omnino agere possim. Quod mihi incommodat maxime, id est, quoties nimirum somno oculos inclino, respiratio- nem perdo: ut id ne fiat, somnum prohibere satago, eum eoque conficior, ne dormiens suffocer. Diu etiam est, quum inferiores partes omnes inflata fuerunt;*

*inflatione jam sublata dolor nunc superest imo ventri; quem dolorem anxietas, sollicitudoque summa, & extenuatio auget. Nulla requies; sopor vagus, & interruptus. Hinc conjicito, quo ego sim animo, tot malis oppressus, quorum finem una mihi faciet mors: Hanc ego brevi expecto; divina voluntati unice, libenterque acquiescens. Hoc tam placido sedatoque animo exitum expectans Hermannus domesticos, Amicosque ipse solabatur constantissime. Tandem pedes rursus instantur; ventri doloris accessio fit; respiratio difficillima evadit; supervenit his delirium; ratio turbatur; quod mortale ei fuit, deficit sensim. Extremum tali modo spiritum efflavit Hermannus Boerhaavius IX. kal. Octobr. An. 1738. quum esset annorum novem & sexaginta, mensium octo, & dierum virginti.*



I

# COMMENTARIA

I N

## HERMANNI BOERHAAVE APHORISMOS

D E  
COGNOSCENDIS, ET CURANDIS MORBIS.

PROLEGOMENA.

§. 1.

**O**MNIS humani corporis conditio, quæ actiones vitales, naturales, vel & animales, lædit, Morbus vocatur.

Absoluta hic traditur morbi definitio, necessario præmittenda, antequam aliquid certi de morborum cura dici possit. Ubi vident a sanitate deflectere corpus, morbum adesse dicunt omnes: sed pulchre notavit Galenus (*De Sanitate tuenda Lib. I. cap. 5. Character. Tom. VI. pag. 45.*) sanitatem habere latitudinem quandam, non enim absoluta ipsa est, nec indivisibilis simul, quæ est, & dicitur sanitas, verum etiam quæ ab hac deficit, modo adhuc visibus nostris non sit inepta.

Perfekte sanum invenire forte arduum foret, in quo nempe nec in solidis, nec in fluidis, nec in motu fluidorum per canales solidos, deficeret nihil: externi enim nos ambientis aeris vicissitudine, animi affectibus, alimentis, vel tenacioris indolis, vel parum largiori copia ingestis &c. sic mutamur quotidie, ut non nisi laxiori sub significatione sani possimus dici: hinc videtur hoc sensu Galenus (*De Sanitate tuenda Lib. VI. cap. 5. Tom. VI. pag. 170. & de morb. differentiis cap. 1. Tom. VII. pag. 1.*) sanitatem definitivisse: *perfekte sanus nemo dici potest; sed sani dicuntur, qui nulla corporis parte dolent, & ad vitæ munera haud quam sunt impediti.*

Sanitas vero læsa morbus est; sed ut in morbis indagandis haberent ordinem, sani corporis actiones ad tria genera redegerunt Medici, nempe vocaverunt VITALES, NA-

Tom. I.

TURALES, ANIMALES. VITALES ACTIONES dicuntur, quibus præsentibus vita adest, quibus absentibus vita adest. Certe possunt in corpore manere solida, & fluida dotibus, & copia eadem, & abesse vita; sic dum homo aquis submergitur, nihil perit, nihil accedit corpori, sed solus motus deest, hunc si resuscitare potes, redit vita.

In syncopem perfectam delapsus homo mortis imaginem quam bene exhibet! aspersa frigida contractæ venæ suum sanguinem versus cor derivant, hoc sic irritatum contrahitur, reviviscit mox.

Vita perfecta est sanitas, vita penitus abolita, mors; vita læsa morbus.

Post cognitum sanguinis circulum, demonstratum est, quod vita omnium minima adhuc consistat in actione cordis contracti, & aperti, sed ut hæc fiant, debet superesse motus muscularis cordis sanguinis venosi influxus in cava cordis, sanguinis arteriosi ex cavis cordis expulsi.

Ad actionem autem musculosam cordis requiritur cerebelli, & nervorum inde ad cor tendentium libera actio, & sanguinis arteriosi per communarias arterias impulsus.

Ut autem sanguis venosus in cor fluat, requiritur, ut sanguis saltem in quoddam venas adhuc redeat.

Sed in homine nato, ut sanguis ex dextro cordis ventriculo in sinistram possit transire,

A fire,

fire, requiritur liberum per pulmones iter.

Veteres dixerant, actionem vitalem esse duplicem, pulsum nempe, & respirationem: sed actiones vitales videntur esse omnes illæ conditiones, sine quibus vita non potest esse, pulsus autem, & respiratio sunt signa æterna vitæ.

Hinc morbi vitales sunt omnes illi, qui lædunt influxum venosi sanguinis in cava cordis, & expulsiōem sanguinis arteriosi ex cavis cordis: omnia enim mortium genera investigata hoc docuerunt.

An non appareat ex his veritas dicti Hippocrati in ipso principio libri de locis in homine: (Tom. VII. pag. 377.) *Principium corporis mihi quidem nullum esse videtur, sed partes omnes peragere principium, omnesque finis. Descriptio namque circulo principium non invenitur.*

Certe ad cordis actionem requiritur actio cerebelli per nervos in cor, sed ut cerebellum agat, & spiritus fecernat, & secretos moveat per nervos, requiritur actio cordis pellentis sanguinem per arterias cerebelli: idem de reliquis verum est.

Sic autem agit cor, quatenus communes causas sui motus cum aliis musculis habet, sed adest in corde nostra proprietas, qua sine his omnibus motum suum satis diu continuare potest.

Hinc in corde latere vitale principium crediderunt veteres, cordi innatum esse motum dixit Galenus (Adversus Lycum cap. 2. Tom. IX. pag. 359.).

Nec hoc absurdum videbitur cogitanti, quod cor, licet communibus motus muscularis causis per arterias, & nervos allatis instructum sit, tamen præter hæc omnia in se ipso recondat vim excitandi motus, quæ ex cognita partium fabrica deduci minime potest.

Cor enim rescissum a suis vasibus omnibus motum suum continuat, & satis diu quidem: sic cor anguilla de corpore exemptum pulsare perrexit, ino sub recipiente positum, exhausto aere, perrexit pulsare per horæ spatium; (Boyle nova Experimenta Pneumatica de Respiratione pag. 18.) cor pectunculis pilcis excissum, transversum in duas partes dissectum, compressum a sanguine purgatum, linteo ab utraque parte deversum, per spatium temporis notabile motum suum retinuit. (Boyle de Utilitate Philof. Experim. cæcæ. 1. pag. 112. &c.)

Ex similibus experimentis conclusit Galenus, (De anat. administrat. Lib. VII.

cap. 8. Tom. IV. pag. 355.) cor non indigere nervis ad suam functionem exercendam &c. illos maxime errare, qui cor musculum esse censent &c. sed esse nativi veluti caloris quandam fontem.

Plurima talia de animalium cordibus recenseri possent experimenta, sed & constitit, idem obtinere in ipso corde humano: Verulamius (Historia vitæ, & mortis pag. 559.) dicit, se vidisse hominis cor, qui evisceratus erat (supplicii genere apud nos versus proditores recepto) quod in ignem de more injectum saltabat in altum primo ad sesquipedem, dein gradatim ad minus, durante spatio (ut meminit) 7. vel 8. minutorum.

NATURALES sunt omnes illæ actiones, quæ faciunt, ut corpus impleatur talibus, qualia amisit; ut tot, & talia apponantur, quot, & qualia defecerunt. Vita enim se ipsam destruit, per ipsius vitæ actiones detrimur quotidie, & nisi ex ingestis reficeremur, brevi deficeremus. Galenus (Comment. II. in Lib. de alimento Hippocratis. Tom. 6. pag. 245.) verissime dixit: quod a singulis partibus destruit, tale est, qualis ipsa pars. Nihil autem eorum, quæ edimus, aut bibimus, tale profusum est, hinc necesse habuit natura prius immutare (παρασκευάζειν) & concoquere illa, & alendo corpori sinitia prius præparare (παρασκευάζειν).

Ingesta ergo non sufficiunt ad hanc rem alimenta, sed requiritur creati corporis perfectissima Machina, ut ex illis fiat nutrimentum.

Paucis multa comprehendere solitus Hippocrates dixit (De alimento Tom. VI. pag. 245.) alit concoctum.

Hinc in Aphorismis (31. Sect. II. Tom. IV. pag. 72.) monuit, a morbo bene comedenti nihil proficere corpus malum; designat enim deficere vires coquentes, id est, deficere naturam ipsam.

Natura (quævis) antiquum illud Hippocratis vocabulum, a multis tam male explicatum, qui designat? Nihil aliud, nisi aggregatum omnium conditionum physicarum, quæ requiruntur, ut vita sit constantissima, durabilissima, & simul agilissima mobilitas, sed hoc est perfecta sanitas: si aliquid deest, est natura deficiens, & ille defectus morbus est.

Non ergo summo Numini iniuriam faciunt Medici, dum naturæ tam multa tribuunt; per hanc enim intelligunt creati corporis fabricam.

Opti-

Optime ergo dixerat Helmontius (pag. 38.) *Naturam esse spiritum Dei, quæ res est id, quod est, & agit, quod agere iusta est.*

De hac dixit Hippocrates (6. Epidem. Tom. IX. pag. 509. & 513.) *natura omnia omnibus suisque (De alimento Tom. IX. pag. 264.) (ἡ φύσις ὁμοῦ καὶ ἑτέρου) morborum nature medicæ & invenit natura sibi ipsi viam, non ex intellectu (ὡς ἐκ διανοίας) a nullo edocta natura & citra disciplinam omnia, quæ conveniunt, efficit: & ad hunc locum Hippocratis videtur alluisse Galeus (De usu Partium Lib. 1. cap. 3. Tom. IV. pag. 286.) dum scribit (ἡ φύσις γὰρ, ὅντων ἀδιδασκῶν) *nature enim animalium a nullo doctæ sunt, dicit Hippocrates.* Et hanc rem pluribus confirmat exemplis: vitulus enim inermi adhuc fronte ferit, hinnulus molli adhuc ungula calcitrat &c.*

Ingestorum ergo manducatio, deglutitio, digestio in ventriculo, & intestinis, chyli secretio, distributio, excrementorum secretio &c. ad actiones naturales reducuntur, quia per hæc omnia cibi, & potus in nostram convertuntur naturam.

ANIMALES vocaverunt omnes mutationes corporis humani viventis, quæ mentem in suis cogitationibus mutant, vel a mente cogitante mutantur.

Omnes ergo hæc actiones cogitationem supponunt.

Illud, quod cogitat, dicitur mens, cogitare enim est primum, quod scitur de mente: an hoc cogitare est ipsa mens? certe maneat omnia, prout nunc sunt, si non cogitas, omnia nihil erunt respectu tui, & de mente nil aliud scimus.

Quædam ex illis actionibus fiunt, dum novæ oriuntur in mente cogitationes mutato prius organo corporeo, & fere tantum in sua superficie, sive hoc fiat a causa externa, sive a causa interna; sic mens videt objecta, dum bonus est oculus, sed & in morbis sæpe credunt ægri se videre objecta externa, quæ non adsunt, mutato organo corporeo per causas internas, & non per objecta externa.

Aliæ actiones animales fiunt, dum mens prius mutata in sua cogitatione corpus mutat, excitando motus musculares: v. g. dum quis vult brachium elevare, mox elevatum est: est enim in homine illa proprietas, ut pro voluntatis arbitrio possit motum excitare, sustinere, dirigere, mutare, sistere, renovare.

Maxime mirum est, quod quum motus

sic excitati sint adeo sensibiles, adeo mutantur vi mechanica alia corpora, tamen in sua origine vix videantur corporei, nulla appareat horum causa; id est nulla mutatio physica in corpore præter rem mutatam, nec, suppresso per voluntatem motu, maneat ullum vestigium.

Et hæc omnia fiunt sine cognitione causæ, nam peritissimus Anatomicus non melius hæc perficiet, quam idiota: profundè certe speculationis argumentum.

Reliquæ actiones animales ad sensus inter nos dictos solent referri, memoriam nempe, imaginationem, animi affectus, attentionem &c.

Potest enim mens nostra sine ullo sensuum externorum adminiculo cogitare ratione intimi fontis sui, & quasi in proprio fundo contemplari.

Sic sæpe memores sumus, nos habuisse aliquam ideam, quam non possumus nunc nobis præsentem reddere: quærit in suo intimo thesauro hoc principium cogitans, quid hoc sit, & nescit, quid quærat, distinguit tamen ab omnibus aliis, quæ tunc cogitat.

Possum tamen & intimè illæ cogitationes mutari corpore mutato, imo & deleri integre: quoties enim non videmus, sapientissimis viris imaginationem depravari, memoriam aboleri &c. dum atra bilis gravat præcordia?

Et licet dixerit Hippocrates (Aphor. 6. Sect. 2. Tom. IX. pag. 47.) *qui aliqua parte corporis dolentes, ubi plurimum dolorem non sentiunt, illis mens laborat (ἡ ψυχὴ νοσῶσι)* tamen ille corpus curabat, non mentem: dum enim Abderitarum precibus motus, ut Democritum, quem insanire credebant, curaret, Abderam versus tendere proposuit, salutaris juber Crateuz ut colligeret herbas, ut hanc dementiaem curet. (Si Hippocrati adscribenda sint hæc epistola, ut vulgo fit.)

Medicina fere semper in corpus agit etiam in illis morbis, ubi nihil in corpore mutatum invenitur, sed tantum cogitationis apparet mutatio, in quadam manie specie hoc observatur, verbi gratia, ubi vel sagacissimi Medici nullum possunt culpæ in corpore vitium, tamen delirat homo ferociter, & sine febre: in his casibus ab omni ævo dederunt talia, quæ incredibili vi fundendi, & movendi omnia sic totum systema nervorum, vasorum, musculorum movent, ut nullibi maneat eadem conditio, hac spe, ut sic rubato toto corpore deleatur illa impressio la-

4. tens in fenforio communi, unde oriebatur hoc malum.

Sic antiquissimus Melampus, diu ante bellum Trojanum vivens, furentes observa-

verat ab helleboro sanari capras, & felici successu infantes regis filias curaverat, unde & Hippocrates Melampodium vocavit Helleborum.

§. 2. **Q**Uæ vero disciplinæ Medicæ pars docet Morbum in ipso ægroto præsentem detegere, & curare, Praxis appellatur Medica. Sanitatem ægris Medici promittit. Cels. 1.

Ultimus scopus, ad quem universa artis medicæ cognitio collimat, est ægris sanitatem reddere; hinc merito dixit Celsus (pag. 1. in ipso initio Præfationis) ut alimenta sanis corporibus agricultura, sic sanitatem ægris Medicina promittit. Praxis jam: *ἀρχὴ τῆς ἰατρικῆς* dicta est illa pars medicæ doctrinæ, quæ docet, quam ratione in homine vivente ægroto per certa signa physica debeat detegi, an præsens sit morbus, & qualis, in quo sit statu, an in initio, ascensu, statu, descensu, qua methodo, & qui-

bus auxiliis præsens jam cognitus morbus tolli possit.

Omnia autem hæc determinari debent in ægro decumbente, longe enim aliud quid est describere pleuritidem, quam ex artis regulis definire, quod homo decumbens laboret pleuritide, cum morbus ille, idem licet nomen ferveat, vario tamen tempore variam medelam requirat.

Medici nunc artem exercentes vocabantur clinici apud veteres, quia ægri (ἐν κλινῇ) in lectulis decumbebant.

§. 3. **Q**Uæ ergo actionum vitalium, naturalium, atque animalium exercendarum requisita ignorat, adeoque Vitæ causas nescit, & sanitatis, ille defectum illarum, id est morbos, cognoscere non poterit.

Medico ergo morbum curaturo necesse est morbum nosse, sed morbus erat læsio functionis ad sanitatem requisitæ; qui ergo ignorat requisita ad functionem, quomodo cognoscet, quid deficiat? merito dixerat Galenus (De Methodo Med. ad Glaucon. Lib. 1. cap. 1. Tom. X. pag. 345.) cuiusque morbi tanta magnitudo est, quantum a naturali statu recedit, quantum vero recedit, is solus novit, qui naturalem habitum ad amissum tenuerit.

Cæcitas, verbi gratia, morbi nomen est, designans abolitum visum, sed potest ille morbus ortum ducere a concretionem palpebrarum, obscuracione cornæ post inflammationes validas, cicatricis relictas &c. potest humor aqueus turbidus factus, humor crystallinus opacus redditus visum tollere, potest nervus opticus in retinam expansus insensibilis fieri; potest idem nervus in toto suo decursu a cerebri ventriculis ad oculum usque comprimi a variis tumoribus, exstossi &c. potest in ipsis cerebri ventriculis hætere origo mali &c.

Qui jam per cognitam organi fabricam non novit ex tot possibilibus causam nunc præsentem distinguere, quomodo idonea

poterit adhibere auxilia?

Dum in febre ardenti, sanguine fere omni immeabili hærente in arteriis dissentis, fiebat cæcitas perfecta, frustra fovebantur collyriis oculi, qui puri, & limpidi manebant: peritus Medicus omnem spem ponebat in salubri, & larga superveniente hæmorrhagia narium, depleis sic vas, resolutio sic ipsius inflammatorio, redibat integer oculorum usus.

Obijci posset Hippocratis in arte peritia, tot sæculorum consensu probata, qui orbatus illis inventis pulcherrimis, quibus hodiernum gaudet sæculum, ex sola observatione phenomenonum in morbis artem salutarem adeo promovit.

Sed certe magnus Hippocrates, si novisset recentiorum inventa, major fuisset.

Unde ergo post tot detecta nova accessit major arti medicæ firmitas? ratio videtur hæc esse.

Multa detexit, circa corporis fabricam, recentiorum industria; plura tamen latent, & latebant forte diu: novis his superbiennes Medici ad hypotheses condensas nimis proni, ex paucis numero particularibus universales fecerunt in praxi regulas; quæ occur-

currebant in morbis, minus faventia præconcepit in hypothefi, neglexerunt penitus, vel vi detorserunt sic, ut favere viderentur.

Sic artem, quam longam sapiens pronunciarat antiquitas, voluerunt facere brevem.

Jam dudum hæc prurigo generalia condendi & pauca axiomata invaluit. Methodici fa-

ris esse credebant, quædam communia morborum intueri, & quidem horum tria genera esse, unam adstrictiorem, alterum fluens, tertium mixtum. (*Celsus in Prefatione. Lib. I. pag. 15.*)

Qui ergo castis veterum observationibus jungunt recentiorum inventa, videntur habere optima Medicinæ fundamenta.

§. 4. **S**anatio porro est morbi (1.) in sanitatem (2.) mutatio: pœnit ergo & hæc eadem cognita (3.) quare cognitio, & curatio morborum Scientiam Dogmatum, quæ explicant, quæ Vita, Sanitasque sit hominis, id est Instituta Physiologica Medica, requirunt.

Prior pars præctice disciplinæ versabatur circa morborum cognitionem, altera docet, quomodo morbus cognitus curetur.

Sed Sanatio ipsa requirit omnia eadem cognita; est enim Sanatio mutatio corporis viventis talis, ut conditio corporis, quæ vocabatur morbus, tollatur, & restitatur illud, quod ablatum faciebat morbum. In Exemplo res patebit evidenter.

Paronychiæ illa species, in qua sine ullo fere tumore acutissimus dolor ultimam digitorum phalangem occupat, & vel in corpore sanissimum validissima incenditur febris, syncope, phrenitis, convulsione, & ante tertium diem mors sæpe fit, totam suam malignitatem peculiari structuræ hujus partis debet: tendinibus enim flectentibus duas phalanges extremas digitorum circumponitur ligamen-

tum forte coercens, ad cartilaginis fere firmitatem accedens, Galeno jam descriptum (*Galen. Admin. Anatom. Lib. I. cap. 5. Tom. IV. pag. 36.*) sub hoc tenacissimo scuto si fiat inflammatio, siue ligamenti, membranæ cellulosa, periosteæ, vel tendinum vitio hoc fiat, non multum refert, oriuntur omnia illa horrenda symptomata, quia sub duro hoc regimine cedere non potenti locus inflammatus hæret; in tempore vocatus Medicis fabrice peritus jubet audacter scalpello discindi a parte laterali digiti omnia incumbencia ad os usque, sic mutat singularem hujus partis structuram in conditionem communem toti corpori, dolor sedatur statim, & mollissimis applicatis cedit adeo minax malum.

Possit hujus asserti veritas pluribus demonstrari, hoc pro exemplo sufficiat.

§. 5. **I**lla mutatio (4.) motum excitat, sopit, vel dirigit, per applicationem instrumentorum, quæ Artifex nosse debet, & regere: hinc ponitur perspecta vietus, medicamentorum, & Chirurgiæ materia, præparatio, usus.

Omnis sanatio requirit vitam superstitem, quam motus humorum vitalium per vasa comitatur, per hunc morum actiuosa sunt applicata remedia, quæ in cadaver nihil agunt: hunc morum, ubi languet in multis morbis chronicis, excitamus, dum furibundo impetu corpus destrueret in morbis acutissimis, sopimus prudenter, dum nimio impetu ruit in quasdam partes, revellendo versus alias partes dirigimus.

Dum languet alba pituita gravatum corpus, debilem vitam acribus excitamus stimulis, dum acuta phrenitide correptus homo fuerit, debilitamus vitam sanguinis missione, & per balnea, fomenta, cucurbitas, & similia impetum omnem, quantum fieri potest, a capite avertimus.

Tom. I.

Sed omnia hæc perficiuntur per quædam instrumenta, quæ applicata corpori ægrotanti illud sic mutant, ut fiat sanitas; hæc autem instrumenta vocantur medicamenta.

Dixit de his Hippocrates (*De locis in homine cap. 16. Tom. VII. pag. 375.*) omnia medicamenta sunt, quæ presentem statum (τὸ παρὸν) dimoveant, vehementiora autem omnia immutant ὅτε ægrotanti vero omnia & presentem statum dimovere conducit.

Hæc autem instrumenta corpori humano applicantur per victum, medicamenta, & Chirurgiam.

Primis Medicinæ temporibus horum omnium cura uni incumbere Medico.

Sed circa Herophili, & Erasistrati tempora Medicinæ in tres partes distincta est: ut una esset,

esset, quæ victu, altera, quæ medicamentis, tertia, quæ manu mederetur. ( *Celf. Prefatio pag. 3.* )

Turpe penitus videtur artifice propriæ artis instrumenta ignorare, & licet Medicus optime perspexerit, quid in corpore mutandum sit, ut fiat sanitas, si non noverit illa auxilia, quibus hæc mutatio perfici debet, prodesse non poterit.

Nec perfunctorie didicisse pharmacorum nomina sufficit, nisi enim quis horum indolem, & attributa noverit, ineptis formalis se ludibrio exponet, agrisque suis nocebit sæpius.

Quantum enim mutant variaz præparationes medicamentorum indolem! Scammonii Syriaci lacryma, ingesta corpori humano, in putridam aquam solvit humores, solutos per alvum evacuat, dum vero

sulphuris accensi vapori exponitur, ut fiat diagridium dictum sulphuratum, iners fere redditur.

Rhabarbari radix fervidæ infusa aquæ innoxium dat purgans omni ætati, & sexui, decocta diu & fragrantiam, & vires amittit.

Sed & varius usus nosci debet. Jalappæ resina assumta tenacitate sua ventriculi plis, & intestinorum adherens hypercatharism induxit sæpius, cum sacchari paulullo trita, vel vitello ovi fracta tenacitate illa resinsosa, datur tutius longe.

Tithymali acerrimum succum scibus instillabat Hippocrates, ne in transitu gulam læderet. ( *De vitæ acut. Tom. XI. pag. 183.* )

Innumera familia adduci possent, ut demonstraretur, quam necessaria sit Materiaz Medicæ cognitio.

§. 6. **D** Irigitor illa applicatio (§. 5.) a mente præscia futuri effectus, quo exigitur Scientia generalis legum, juxta quas actiones illæ exercentur; unde itaque doctrina Signorum, & Methodi Medendi necessaria est. Adeoque traditæ Praxin ( 2. ) omnes partes Institutionum Medicarum scitu necessariæ prius sunt: Eas ideo ponemus notas, & demonstratas alibi.

In dirigendis his instrumentis, ut fiat talis mutatio, quam ars requirebat, ut restitueretur sanitas, summa hæret difficultas.

Omnia enim medicamenta corpori viventi applicantur, per vitam actuosa sunt, & sæpe in variis hominibus diversos, imo oppositos, producunt effectus, ratione peculiaris diosyncrasiz; sed hoc nunquam a priori determinari potest, per sola experimenta cognoscitur.

Sed & idem remedium aliter afficit sanum hominem, quam ægrotantem: post æstivos calores summos incensa bilis, levi stimulo purgantes incitata, quam enormes facit sæpe dejectiones: sextupla dosi data hydropico languenti fecit nihil: maniacæ furentissimæ, a paucis granis scammonii ante hunc morbum in syncopen usque mobili, data quinque grana mercurii vitæ fuerunt nihil.

Dum in chronicis morbis, tabefactis fere & friabilibus redditis visceribus, vomitorium propinatur vel ex mitissima ypecacuanha, quantum imminet periculum!

Omnia hæc attendere debet prudens Me-

dicus, nam exhibitam medicamentum extra ejus potestatem est. Monuerat Galenus ( *Galen. de vena sectione adversus Erasistratum cap. 7. Tom. XI. pag. 401.* ) si ve purgans dederis, si ve vomitorium &c. prima exhibitio in tua potestate est, reliqua sibi fortuna vindicat.

Sed & in morbis toties natura modis incognitis nititur expellere latens morbosum, si ve morbi causa fuerit, si ve effectus: qui tunc imprudenti consilio remediis oppositis turbat inceptionem naturæ opus, nocebit semper.

Hinc doctrina signorum, & methodi medendi omnino necessaria, hinc adeo operosus in enarrandis signis Hippocrates.

Unde merito concluditur, institutionum medicarum omnes partes requiri cognitatas, antequam praxi addicendæ quis se accingat.

Idem concludit Galenus ( *Comment. in Hippocr. de officina Medici. Tom. XII. pag. 3.* ) dicens, at non propter se cetera omnia ad artem spectantia, aut discrimina, aut accensum, aut denique ansculamus, sed quod eorum unumquodque sit ad finem utile.

§. 7. **M** Orbus ( 1. ) cum corpori in hæreat, erit effectus corporeus singularis determinatæ causæ.

Ex



Ex ante dictis in §. 1. patuit, ab omni ergo Medicos corpus curasse etiam in illis morbis, ubi solæ mentis functiones videbantur læsæ: morbum quidem, & morbi causam corpori inherere, quando in corpore sensibilem mutationem percipiebant, dubitarunt nunquam, sed multis visum fuit magnum paradoxum, idem affirmare de illis morbis, in quibus sola cogitatio læsa apparebat.

Sed videtur illud in nobis principium cogitans, quatenus sibi conscium est, esse immutabile, esse simplex, idem semper, & ubique; de quacunque enim re cogito, scio me cogitare, præterea novi, de qua recogitem, sed cum omni momento cogitem alia, ergo in me cogitante manet aliquod semper idem, dum infinita varietas est, quæ me cogitantem afficit.

Hoc autem cogitans principium ex adorandi Creatoris voluntate sic unitum est cor-

pore, ut mutato corpore mutentur cogitationes, & vicissim mutata cogitationes mutari possit corpus.

Totum ergo, quod Medicina potest, est, ut mutato corpore læsam mentis corpori unitæ actionem emendet. Sæpe autem leve vitium corporis totam mentem turbat. Sic observaverunt, fatuos a nativitate semper ferre habere capitis vitiatam figuram: Sic uncia sanguinis effusi sub olla cranii totam humanitatem delet: (*Histoire l'Academie des Sciences* 1705. pag. 73.) puer oclennis magnis caloribus aeris perdebat memoriam ferre omnium, quæ dicerat, per duos, vel tres dies frigidissima tempestas reddebat perditam, calore redeunte eadem redibat calamitas. Innumera alia hanc rem evincunt observata.

In corporis ergo mutatione morbos considerat Medicus.

### §. 8. C Ujus accurata ablatio sanat.

Cum ergo sollicita indagatione invenerit Medicus, quid in functionibus a sanitate deviet, & a qua causa facta fuerit illa corporis mutatio, quæ morbus dicitur, omni artis molimine cognito nititur, ut hanc causam tollat: generale enim habetur axioma, sublata causa tolli effectum.

Notandum hic quam maxime, fieri posse, ut ablata morbi causa, hinc & morbo ipso, maneant tamen in corpore per morbum prægressum mutatae functiones: verbi gratia, homo laborat sæva quartana autumnali, repetitis paroxysmis sæpe sic debili-

tantur solida, sic dissolvantur fluida, ut nascatur hydrops, datur cortex pervivans, sanatur febris, manet hydrops: non tamen inde concludi potest, quod sublata morbi causa non tollitur effectus: Cortex enim Peruvianus latentem febris causam sic domuit, ut febris, effectus hujus causæ, evanescat; sed per febrim mutatum sic fuerat corpus, ut hydropicum fieret, & sublata febre per corticem, causæ illæ manent, ex quibus hydrops, ut effectus sequitur, debilitas nempe nimia in solidis, nimia dissolutio in liquidis.

### §. 9. A Ufertur correcto malo singulari, vel per remedium in illud solummodo agens; vel auxilio in omnia simul æqua vi agente. Hanc universionalem, illam propriam, Medelam vocabimus.

Duplex modus est, quo tollimus morbos, vel enim directe in morbos agimus, non mutato reliquo corpore, vel totum corpus mutando inertem reddimus, vel eliminamus morbum.

Quartana purgantibus, vomitoriis, sudoriferis, frustra tentata, imo per mediam salivationem (ut vidi) constanti typo pergens, tollitur Cortice Peruviano, qui cæterorum corpus non observatur mutare, vocatur propria, & specifica medela, quia dum febrim tollit, reliquum corpus non mutat. Opium deglutitum in ventriculo hærens do-

loris sensum tollit, nec turbat corpus. Forte plura talia latent ad alios morbos remedia, felices Medici, si novissent!

Calculus ex rene in pelvim, inde in ureterem delabitur, oritur intolerabilis dolor, spasmi abdominales, nauseæ, vomitus &c. si specificum cognosceret Medicus remedium, quo solvere posset impactum calculum, sanaret statim: sed tali auxilio caremus hæcenus. Fomentis, clysmatibus, venæ sectione, decoctis emollientissimis mutat totum corpus Medicus, ut laxatis, & lubricatis viis expellat hostem; hæc vocatur generalis medela.

Hæc fere semper agit inducendo alium morbum: dum enim Lue Venerea laborantem hominem salutatione curat Medicus, facit per mensem, & ultra ægrotare ut a diro hoc morbo liberet.

Hic imitatur salutaria naturæ molimina, quæ turbato sæpe toto corpore morbofam causam eliminat.

Per asperæ arteriæ rimam micula panis

§. 10. **U** Traque (9) reperitur observatione, similitudine, vel ratiocinio ex hisce binis.

Nullum est dubium, quin medicamenta, & medendi methodus inventa sint per observata singularia; hæc enim videntur fuisse Medicinæ primordia, dum illa, quæ in se ipsis, vel aliis ægrotantibus viderant profuisse, suadebant iterum aliis, hac spe, ut prodessent similiter.

Dumque videbant, morbum non omnino eundem, similem tamen morbo ante observato, affligere, ex similitudine concluderunt, eandem medelam esse adhibendam.

His binis contenta Empyricorum secta Medicinam absolvi posse contendebat: (Celsus prefat. Lib. 1. pag. 9.) dicebant enim, diligenter homines hac notasse, quæ plerumque melius responderent, dein ægrotantibus ea præcipere cepisse: sic Medicinam ortam, subinde aliorum salute, aliorum interitu, perniciofa discernentem a salutaribus.

§. 11. **O**bservatio habetur: 1. ex accurata historia morbi, enarrantem causas, naturam, effectusque mali. 2. ex enumeratione exquisita eorum, quæ profunt, vel nocent, dum casu, vel arte, morbo subministrata sunt. 3. ex introspectis cadaveribus incisis eorum, quorum morbi observati fuerunt prius.

1. Dum homo incipit ægrotare, habet in corpore aliquid mutatum a sanitate, aliter non foret morbus; hanc mutationem corporis prius sani sensibus detegere possumus: procedente morbo magis & magis descehit a sanitate, hinc novæ quotidie mutationes apparent, & quæ prius apparuerunt, augentur, persistant, minuantur, vel & desinunt aliquando; omnia hæc accurate notata illo ordine, quo se mutuo sequuntur, dant historiam morbi. Sed jam morbus, ut effectus adæquatus, idem est cum sua causa completa, sive proxima dicta, cuius præsentia morbum ponit, cuius absentia morbum tollit. Sed hæc causa proxima raro simplex est, semper fere composita ex aliis causis, quæ

illabitur, excitat natura per fideles custodes nervos tussim violentissimam, nec quiescit sit hæc, donec educatur.

Hinc ausus fuit concludere Sydenhamus (Pag. 39.) morborum, quantonlibet ejus causæ humanæ corpori adveniant, nihil esse aliud, quam naturæ communi materia morbifica exterminationem in ægri salutem omni opo molientis.

Quod si morbus incidat ignotus (Celsus ibid. pag. 10.) Medicum præcursu visum, cui morbo id proximum sit, tentaturumque remedia similia illis, quæ vicino malo sæpe ceciderint, & per ejus similitudinem opem reportantur &c. latentium vero rerum conjecturas ad rem non pertinere, quia non interit, quid morbum faciat, sed quid tollat.

Deinde possunt ex his binis casto ratiocinio plurima in arte utilissima deduci, modo nihil admittitur incerti quoad observationes, nihil concludatur ex his, quod repugnet experimentis: pulchro certe monito post examinatas Empyricæ, & Rationalis Medicorum sæctæ disceprationes concludit Celsus (ibid. pag. 20.) rationalem quidem Medicinam esse debere: instrui vero ab evidentibus causis; obscuris omnibus, non a cogitatione artificis, sed ab arte ipsa rejectis.

single non sufficerent morbo producendo, quæ junctæ simul morbum faciunt. V. g. Pleuritidis causa proxima est sanguis inflammatorius spissitudine peccans, adactus in valsa angustiora, aucto simul per febrim motu: nulla ex his tribus causis sola pleuritidem facit, simul junctæ morbum hunc constituunt. Illæ jam causæ, quæ simul unitæ causam proximam constituunt, sunt vel prædisponentes (πρæδικάσι) vel (προνάρτασι) dictæ, sive occasionales.

V. g. Homo valde plethoricus, calidissima aeris tempestate validos motus musculares faciens, rupta in cerebro arteria sit apoplecticus, causa remota prædisponens erat in hoc homine plethora, causæ occasionales erant

erant calor aeris, & imperus sanguinis auctus per motus musculares: sed ille aeris calor, & validi motus musculares non fecissent apoplexiam in hoc homine, nisi adeo fuisset plethoricus.

Pulchre hoc notavit Galenus (*Comment. 4. in Hippocrat. de victu acut. Tom. XI. pag. 178.*) dicens, corpore nostro ad morbos quasi preparato, externum quoddam adveniens febrem accendit, quod ex se morbum vehementem minime generaret &c. Et propter corporis dispositionem unumquodque horum non morbi causa, sed occasio redditur; has causas vocaverunt *προκαταρτις*.

Similia & Celsus habet (*In Prefat. Lib. 1. pag. 16.*) nihil omnino ob unam causam fit, sed id praecipua apprehenditur, quod contulisse plurimum videtur; praest autem id, dum solum est, non movere, quod junctum aliis maxime movet.

Qui jam accurata observatione sic causam proximam morbi detexit, intelligit morbi naturam.

Sed morbus, sic cognitus in suis causis, dum pergit, omni momento corpus plus mutatur, functiones plus laedit, & novos quasi morbos facit, qui vocantur effectus morbi, vocantur & symptomata; sic enim vocantur omnia illa praeternaturalia, quae ex morbo, ut causa, in corpore aegroti fiunt ita, ut distingui tamen queant ab ipso morbo, & ab ejus causa proxima.

V. g. Pleuriticus propter acerbitate doloris non audent inspirando pectus dilatare, hinc sanguis cordis dextri per pulmonem difficiliter transiens incipit ibi accumulari, & facit Peripneumoniam, quae tunc est novus morbus ex plenitudo ut causa natus.

2. Homo, qui aegrotat, vivit, vita semper actiosa est, ergo aliquid movet, agit, vel non agit, aeger aliquid bibit, vel comedit, vel non: post singula haec fit aliquid boni, vel mali. Medicus jam observat omnia illa, quae fiunt tempore morbi, notat nocentia & juvantia, illa prohibet, haec jubet: haec est illa doctrina de juvantibus, & nocentibus tantum in praxi usus, haec videtur arti Medicæ dedisse primam fere originem. Vide Celsum (*In Prefat. pag. 9.*)

CASU: Dum multa aliquando tentant aegri, fiunt saepe mutationes improvise in morbis & maxime notabiles, quae saepe anam dederunt pulchris in arte inventis. Galenus (*Galenus Meth. Med. Lib. IX. cap. 16.*)

sepe vidit, non paucos febre ardente laborantes, cum jam medicis concocli humores essent, statim ex frigida potione liberatos.

Epilepsiam sanaverunt manantia capitis ulcera sponte enata, unde & artificialia profutura conclusit Tulpus (*Observ. Medic. obs. 8.*) Vidi in acuta continua febre pessime delirantem hominem mox resipuisse, dum incendium satis vicinam domum occupasse audiret.

VELARTE. Licet omnia ex artis regulis adhibuerit Medicus, tamen attenta mente debet spectare eventum, an profuerint, an non. Hippocrates hoc in multis locis sollicitè inculcavit: sic certa data signa, quibus distinguimus, an purgans datum profuerit, nec ne, dicens (*Aphor. 15. Sect. 1.*) si, qualia purgari decet, purgatur, tum confert, tum facile ferunt, si contra, difficiulter. Ab illis enim, quae nocere videmus, abstinendum jubet ratio: ut autem quid certi de nocentibus & juvantibus statuatur, requiritur attenta circumspexio ad morbi indolem, aliter sapissime adscribetur remedio exhibitio, quod debebatur soli morbo; v. g. dum in hemitritæa alternis diebus fit exacerbatio ex morbi natura, male tunc adscriberetur remediis exhibitibus molestia ingravescentis circa hoc tempus morbi.

3. Utinam liceret saepius defunctorum cadavera scrutari! quam cauti essent in tractandis morbis Medici, si novissent, post mortem in cadavere se debere demonstrare, an bene nam male de morbi indole judicassent: quot non detegerentur latentes morborum causae. (*Celsus pref. Lib. 1. pag. 7.*) Herophilus, & Erasistratus nocentes homines inciderunt vivos, nec crudele putaverunt, paucorum nocentium supplicii remedia populis innocentibus omnium saeculorum queri: hodie foedum, imo crudele, clamant multi, mortuorum lacerare cadavera, ut viventibus certior medicina fieret. Summa tamen caute hic opus est: in cadavere enim invenitur tantum ille corporis status, in quo erat, dum mortui proximum fuit, plurima inveniuntur per morbum mutata, quae utpote effectus morbi male pro ejus causa venditantur: dum suppurata pleuritide mortui cadaver lustrans Medicus invenit in thoracis cavo ingentem copiam puris, quam male concluderet, pro illud fuisse morbi causam.

Infinita certe docuit prudens cadaverum inspectio, de quibus ne somniassem quidem Medici: quis credidisset per vomitum enormem posse œsophagum rumpi, lienem ingentis molis in pelvis posse prolabi elongatis vasis nescientibus, in ipsa cordis semi-

per moti substantia posse nasci calculos &c.?

Dum visa in cadaveribus collegit in Sepulchreto Anatomico Bonerus, & ordine disposuit, latentibus morborum causis indagandis summam attulit lucem.

§. 12. **E**X similitudine concludit, qui observatis jam (§. 11.), adeoque cognitis, casum præsentem, hæctenus ignotum, comparans de indole, & curatione mali incogniti argumentatur, a præteritis ad futura arguens.

In Exemplo res videbitur satis evidens. Vidit Medicus hominem febre acuta continua cum dolore lateris punctorio, inspirationem impediende, decubentem, observavit, nec per spura, nec venæ sectionem, & alia auxilia levatum morbum, sed orta dyspnoea sensim aucta post diuturnos languores extinctum hominem: notavit quæ profuerant, quæ nocuerant; in cadavere invenit saccum ingentem pure plenum pulmone compresso suffocasse hominem. Postea invenit alium agrotantem, in quo observat eadem phænomena, quæ in priori vidit in

initio morbi, ex similitudine concludit similem & in hoc agro eventum metuendum esse: quæ priori prorsus visa sunt, adhibet, & omni artis molimine funestum morbi eventum præcavere nititur: hoc vocatur ex similitudine, ex analogia, concludere.

Dum Epidemici novi morbi latentem rimabatur indolem Sydenhamus, sedulo observabat, quomodo in sanationem, mortem, vel alium morbum abiret, quenam adhiberet molimina sibi soli sufficiens natura, ut sanaret, hæc imitatus postea in simili casu ex analogia concludit.

§. 13. **Q**ui denique omnia, quæ agro accident, observando cognita (§. 11.), ad amissim ponderat seorsum singula, comparat deinde inter se universa, conferre iis, quæ in sanitate contingunt, hincque tandem severitate ratiocinii subacti affurgit in intellectum causæ proximæ, & auxiliorum ei tollendæ aptum, verum Medici nomen meretur.

Quenam sit idea optimi Medici, sequentibus temporibus futuri, nescimus, sed qui vitur omnibus illis administrandis, quibus sæculi sæculi felicitate ars medica illustratur, perfectus diceretur Medicus.

Geometræ docuerunt, quomodo in simplicissima quadam re diu examinata detegantur infinita, de quibus prius non cogitabatur: quid simplicius idea circuli, quam unusquisque facite percipit? sed applicando huic simplicem rectam, quam pulchra deduxerunt inde Geometræ!

Idem & in morborum consideratione verum est; illa enim, quæ observatio detexit, data sunt, ex quibus, attentæ mentis acumine sedulo lustratis, infinita, & saluberrima deducit in arte prudens Medicus.

Hæc autem singula seorsim, non perfunctorie consideranda sunt. V. g. dum in quartanæ exquisitæ initio oritur mirum illud frigus; quod sensum ex minimo gradu (auræ quasi frigidiusculæ sensu) in rigorem ascendit tantum, ut membra omnia tam rigida facias,

ut flecti nequeant, sæpe omnem tollat sensum sic, ut pedes ad ossa usque combusserint ægri sine ullo dolore. Quam multa illud Medicum docet! demonstratum enim habetur in physicis, quod ignis absentia, vel non determinatio ad locum, sit frigus; sed ex legibus corporis humani hodie certo concluditur, frigus sequi imminutam circulationem; sed quartanæ initio evidenter videmus imminutam circulationem, cor quidem celerius palpitat, sed auctas resistencias superare impotens ad extrema corporis vitalem sanguinem propellere nequit; hinc primo incipiunt pallescere extrema, nasi apex fit pallidissimus, ungues, & extrema digitorum pallent, sic & labia &c. & dum frigus omnia contrahit, contractæ venæ suos humores majori impetu versus cor dextrum ducunt, cor interim sinistrum non potest evacuare contentum suo cavo sanguinem in arterias plus contractas, hinc circa pulmonem, & cor accumulatur sanguis, & inexplicabilem illam anxietatem facit, unde adeo anhelant, & omni respiratio-

115

nis molimine nituntur prementem hanc amovere sarcinam; hinc concludimus magnum tunc adesse mortis periculum, & metuendum esse, ne stagnans fere in magnis venosis receptaculis sanguis in concretionibus polypofas abeat, sepe tota vita non resolvas.

Hinc non est bonus Medicus, qui tantum notat phenomena, sed qui illa ponderat, & quæ ex illis necessario sequuntur, determinat.

Nec hoc sufficit adhuc, sed requiritur, ut deim compareret inter se universa, sequetur enim post summum quartanæ frigus calor sensim increscens in seminum æstum usque, sed calor distendit, elongat omnia solida, auget liquidorum volumen; sic fibræ solidæ per præcedens frigus accuratæ, calore subsequente elongabuntur, sed nil plus debilitat solidarum partium fabricam, quam illa vicissitudo alterne contractionis & elongationis: hinc tanta sepe debilitas corporis post quartanam diu toleratam, & plurima, quæ inde sequuntur, mala.

Hic est secundus usus illorum, quæ in morbis apparent; primus usus erat singula seorsim considerare, & ab omni facie contemplari, deinde his in chartam congestis, ut memorie succurratur, secundus usus erat, illa considerata combinare, ita usque ad ultimum procedere, sic faciendo ad omnem in arte medica certitudinem possibilem pervenimus.

CONFERT IIS, QUÆ IN SANITATE CONFRINGUNT. Summi momenti in arte hæc regula est. Sapiens Hippocrates in *Prognostico* inde tot sæculis jam probata præfagia deduxit: jubet considerari faciem ægri, an similis sit bene valentium, sed maxime an sibi ipsi, pessimam autem dixit, quæ sanorum faciei prorsus contraria est; nāsus acutus, oculi concavi &c. faciem postea a Medicis dictam Hippocraticam describens. Decubi-

tum ægri considerans confert cum sanorum decubitu, & in tantum damnat, quantum inde recedit: a moderato homine ferox teposum damnat; præter consuetudinem aliquid facere, aliquid curare magno studio non consuetum, tanquam pravum & delirio proximum notatur in *Cocci præmonitionibus*: innumera talia apud Hippocratem habentur: hæc pro exemplo adduxisse sufficiat.

Nullum enim apparet in morbo phenomenon, quin sit actio læsa, quæ in sanitate exercebatur, & morbi magnitudo tanta est, quantus est a sanitate recessus.

HINCQUE TANDEM SEVERITATE &c. Qui enim jam quartanæ frigus juxta regulas prædictas expendit, concludet illius causam proximam esse imminutam circulationem ob cordis vires expellentes minutas, vel resistentias auctas circa fines arteriales, vel utrumque simul; sed cur distincte hic dicitur, quod sic acquiramus intellectum causæ proximæ? quia causæ remotæ plures possibiles esse possunt, nec tam facile intelliguntur omnes.

Sed ex intellectu causæ proximæ auxilia huic tollendæ idonea inveniuntur; dum enim novi, quid in quartana faciat hoc frigus, facile concludo, quid agendum sit, ut hoc curetur, vel mitigetur saltem: tequus, tepidus, leviter aromaticus potus, cum levi frictione, diluendo liquida, laxando vasa, excitando parum vires vitales, totum absolvunt. Veteres Medici in balneum ægros deducebant, ut frigus febrile præcaverent.

Dum aliam viam sequebantur Medici, quantum a veritate aberraverunt! dum videbant quædam corpora effervere simul mista, & tunc producere frigus, similem causam frigus febrile producere audacter dixerunt: sed mors majus frigus producit, quam in ulla quartana observatur.



Rdo itaque optimus describendæ historiz, & curationi morborum erit, qui

Datur hic casta methodus, qua morbi describi debent, & curari, utinam observaretur semper! multi enim Medici, dum communis consilii causa aliis casus examinandas traditur, non describunt phenomenon observata, sed erudent sufficere, si indicaverint, quid sentiant de morbo, dein agenda ex communi consilio determinanda

relinquunt: sed summpopere necessarium videtur, ut describantur omnia observata phenomena per totum morbi decursum, ut alii, qui consuluntur, Medici de morbi genio suum ferre possint judicium, & legitimam inde agendorum indicationem deducere. Hoc autem optima fieri posse videtur juxta sequentes regulas.

1. Uniuscujusque mali phenomena individua, propria, communia, considerate cognita, iusto ordine, vera fide, proponit.

1. PHAENOMENA vocantur omnia illa, quæ in morbis apparent a sanitate recedentia; hæc jam vel sunt INDIVIDUA & PROPRIA, quæ in morbo describendo adstant semper, & nunquam inde possunt separari: talia v.g. sunt in pleuritide dolor acutus punctorius inspirando valide auctus cum febre acuta continua: hæc vocantur signa pathognomica.

Præterea adstant in morbis phaenomena multis aliis morbis communia, v.g. in pleuritide sæpe adest dolor capitis, lumborum &c. quæ millenis aliis morbis adstant, hæc vocantur COMMUNIA; omnia autem hæc debent notari iusto ordine, prout sibi mutuo succedunt, aliter tota descriptionis utilitas tollitur: qui simpliciter diceret, variolis laborantem delirasse, nihil proferret, unde firma prognosis deduci posset: plurimum enim distat, an deliraverit in statu contagii, an post eruptionem variolarum: nisi hoc observassent antiqui Medici, quomodo potuissent ex illis, quæ quarto die morbi apparebant, prædicere, quid septimo die futurum esset?

*Præterita docere, præsentia noscere, futura prædicere, oportet*, dicit Hippocrates (*Epidem. Lib. I. Tom. IX. pag. 58.*).

VERA FIDE. Omnia hæc debent proponi, prout morbi decursus offert, non autem detorqueri ad præconcepas hypothesas.

vidit variolas Sydenhamus, dum calido, vel frigido regimine tractabantur! quantum exacerbantur omnia in morbis acutis, dum non quiescunt ægri! quam anouala apparuerunt symptomata in morbis ab imprudenter applicatis vel externe tantum Camtharidibus, Mercurio, Arsenico &c.! omnia enim hæc non agunt sola, sed cum morbo, nec morbus tunc agit solus, sed cum illis.

2. Cuncta, quæ acciderunt ægro ab iis, quæ gessit, ingessit, retinuit, excrevit, vel sibi applicuit, dum morbus adfuit, enarrat.

2. Summi momenti hæc regula est, & sine qua omnia in morborum descriptione obscura erunt & turbata: omnia enim hæc, quæ ingeruntur, vel applicantur corpori, illud mutant, & ab illo vicissim mutantur; sed illas mutationes sollicite distinguere debemus, ne confundantur cum illis, quæ ex morbi natura ægro accidunt: ingens enim in decursu morbi varietas est, dum variis tractatur modis. Quantum distat inter se

fatetur errorem, dum teli læsionem in vulnere capitis a futura non distinguerat: ægrorum plurimi, quorum morbos in Epidemicis descripsit, perierunt. Observatores plerique sollicitantum successus narrant, insuccessos tacent.

3. Auxilia victus, manus, medicamentorum, una cum vera methodo applicandi, prout casus, vel ars obtulit, exponit.

3. Candide enarranda sunt omnia, quæ per victum, Chirurgiam, medicamentorum exhibitionem, observata fuerunt proficua, vel noxia; dissimulandum nihil est. Hippocrates (*5. Epidem. Tom. IX. pag. 340. 341.*) ingenue

fatetur errorem, dum teli læsionem in vulnere capitis a futura non distinguerat: ægrorum plurimi, quorum morbos in Epidemicis descripsit, perierunt. Observatores plerique sollicitantum successus narrant, insuccessos tacent.

4. Ea, quæ ex hisce tribus, ut ex datis, juxta (13.) dictam legem effectum rationis verissime deduci queunt ita, ut pro regulis Praxios accipi tuto possint, concludendo elicit.

Si jam tria priora collecta habeantur, ex his datis casto ratiocinio possunt deduci regulæ fidelissimæ, quæ Praxi Medicæ dirigendæ inservient semper immutabiles. Certa observata dum docuerunt, quartanam febrem, quamdiu durat, epilepticos insultus cohibere, imo sæpe radicatus tollere, me-

rito concluditur, quartanam epileptico accidente esse relinquendam, tollendam minime.

Dum ingruentes morbos, tanquam incognitum quid, sollicite observabat Sydenhamus, vidit applicata quedam male, alia bene cessisse, quasdam vias naturam affe-

ctare

etare, opposita his methodo exacerbat omnia: ex illis deluxit metholum nuedendi, qua tam felix fuit, & tantam jure merito auctoritatem in arte obtinuit.

Debut hac observationum regia sepius devorare, dum nova constructio Epidemica, quamvis satis similis videretur prioribus, isdem tamen tentata remediis inausitos

plane exhiberet successus, quod tam candide fatetur; eisdem tamen indagationis via novam, & certam curandi metholum invenit.

Sic moniti ergo talem sepe diversitatem in morbis satis sibi similibus obtinere, per regulas has datas taslam morborum indolem rimari debemus, ut salutari arte egris prodesse possimus.

### §. 15. **M**ultitudo quidem morborum his ordinandis officit.

Qui omnia hodie cogita in arte Medica probe nasset, forte in nulla re plus tubaret morborum historiarum descripturus, quam dum deberet determinare, unde inciperet, quomodo pergeret, ubi finiret. Certe vel apud optimos auctores varius occurrit ordo; quidam a Chylopoiesi, & ejus

actionibus laxis, dein ab Hematopoiesi &c. inceperunt; alii singulas partes corporis a capite ad calcem usque percurrerant, harum morbos enarrantes: sed omnibus his methodis magnæ insunt difficultates; videtur sequens paragraphus simplicissimum ordinem dictare.

### §. 16. **S**ed ordinem dicat: 1. clarior morbi notitia. 2. simplicior ejus natura. 3. facillima sanatio. 4. ejus requisita ad alium intelligendum cognitio.

1. Ab evidentissimis enim incipiendum esse, omnis evincit doctrina, & Geometrae optimi veritatis magistri ex paucis postulatis tam evidentibus, ut de illis nemo sanæ mentis dubitare possit, sensim procedendo innumera pulcherrima deduxerunt.

2. Simplicissimus morbus foret, qui unum tantum haberet phenomenon, (si forte quis talis existat) si jam alter morbus duo, vel tria haberet phenomena, a priori, tanquam simplicissimo, foret incipiendum: sic enim a simplicissimis ad magis composita omnis ordinata doctrina procedit.

3. Facillima sanatio dicitur illa, cujus requisita morbum consideranti statim apparent, & quæ sine magno artis molimine perfici potest.

4. Ad hanc rem quam maxime attendendum est, ut ille morbus prius explicetur, cujus cognitio requiritur necessario, ut alii intelligi possint. Solebat Celeberrimus horum Aphorismorum Auctor hac occasione semper auditoribus suis enarrare, quod morbos in chartam conjecerit, & illis dein applicuerit has quatuor regulas, & deinde deduxerit sequentes conclusiones.

### §. 17. **E**X quo fundamento (16.) omnes sequenti serie tractabimus.

### §. 18. **M**orborum itaque simplicissimorum species, & curatio præmittenda reliquis.

Hæc sponte sequuntur ex prædictis.

### §. 19. **S**olidarum ergo partium morbi explicandi, & sanandi primum locum postulant.

Omnes morbi sunt vel solidorum, vel fluidorum, vel amborum simul; sed fluidorum indoles longe intricatior est, & magis com-

posita, quam solidorum, hinc secundum præmissas regulas a solidorum morbis est incipiendum.

### §. 20. **F**ibra simplicissima solidæ morbi explicati, sanati, inter hos (19.) denique primi sunt.

Inter

#### 14 MORBI FIBRÆ SOLIDÆ SIMPLICIS. §. 20. 21.

Inter partes solidas corporis nostri nihil possumus simplicius concipere fibra; vasa enim ex membranis, membrane ex fibris constant: fibra autem vocatur pars corporis humani secundum longitudinem extensa, quæ ratione latitudinis suæ considera-

tur habere partes nullas; hinc comparari potest lineæ geometricæ, quæ defuit esse longitudo latitudinis expers: mnet jam hæc fibra simplicissima, quantumcumque longa fuerit, modo nullam habuerit latitudinem.

### MORBI FIBRÆ SOLIDÆ SIMPLICIS.

§. 21. **I**llæ partes, quæ ex fluido vasis contento secreta, sibi mutuo vi vitæ, & ope glutinis tenuissimi, aquosi, pinguisve, applicatæ, Fibram minimam faciunt, sunt minimæ, simplicissimæ, terrestres, vixque mutabiles, per eas causas, quæ in nobis viventibus deprehenduntur.

Fibra jam simplicissima constat ex partibus minoribus secundum longitudinem sibi mutuo appositis; hæ partes fibram constituent, non amplius dividende in minores, vocantur elementa fibrarum. *Elementum enim dicitur, quodcumque minimus est pars illius rei, cuius est elementum.* ( *Galenus de Hippocratis & Platon. placit. Lib. VIII. cap. 2. Tom. V. pag. 229.* ) Quæ ex binis talibus elementis secundum longitudinem sibi appositis concrevit fibra, est omnium minima, unicuique tale elementum, solum consideratum; non facit solidum, sed in fluidis hæret, combinata elementa fibram constituunt.

Quomodo jam hæ fibræ nascuntur? Certe adultus homo ducentas libras pendens in prima sua origine latuit in spumantis libidinis guttula, & ex tantilla molecula excrevit in tam vastum pondus; totum illud augmentum in solidis partibus per fluida allatum fuit; docent hoc Malpighianæ observationes in ovo incubato factæ, jam tentatæ ab Hippocrate ( *De natura pueri cap. X. Tom. V. pag. 322.* ) ubi ex albuminis attenuato liquido per incubatum intra 21. dies pullus jam solida firma adeo habens ex invisibili molecula crevit.

Sed illud albuminis liquidum debuit per organa fabricata pulli adhuc ulterius attenuari, & perfici, antequam per vascula illa, quæ sua parvitate omnem captum fuerant, potuerit transire.

Et tamen cum hoc fluido subtilissimo vehabantur illa elementa solidarum partium.

Hinc merito concluditur, quod partes illæ confluentes fibram solidam sunt minimæ.

Sed & sunt SIMPLICISSIMÆ; si enim aliud

simplicius concipi posset, non forent elementa ex data definitione.

**TERRESTRES.** Audax videtur forte propositum determinare sic horum corpusculorum fibras constituentium naturam; terrestre vocamus illud, quod nec in aqua solvitur, nec ad ignem fluit, sed fixum persistat: sed partes solidæ animalium arte chemica omnibus volatilibus orbe tales dant reliquias. Numquid putrefactio, quæ terram a reliquis principiis perfectissime separatur, hoc evidenter docet: cadaver humanum sub terra desolatum per multos annos dum hæsit, & postea lustratur, quid exhibet? nisi exsiccatum induruerit, ut aliquoties observatum fuit, omnia pristinam figuram retinuerunt, sic ut facies distingui possit, sed levi concussa collabantur omnia, & reperitur terræ subtilissima pauculum, quæ firma plerumque adhuc ossa tegebat; eadem hæc ossa diu aeri aperto exposita, vel igne aperto usta, omnibus sic expulsi, meram terram relinquunt.

**VIXQUE MUTABILES** &c. Docuimus, ubi vividissimo igne meralla explorant cum plumbosula, testulas suas inde conficiunt omnium optimas, quæ cribri instar plumbum transmittunt, pretiosa metalla retinent: an credibile est tanta ignis vi immutabiles partes a causis in nobis viventibus deprehens mutari posse? possunt coherere inter se, possunt iterum dissolvi, ceteroquin immutabiles.

Mirum videri posset, fixam adeo, & insolubilem terram potuisse latere in subtilissimis liquidis. Chemia hoc fieri docet. Animalium spiritus salini alcalini, igne expressi, limpidissimi, terram gerunt, olea animalium destillatione educta, purissima quamvis, repetitis destillationibus terram relinquunt.



quant, tandemque terra sua deposita evanescent in auras. Videtur enim terra hæc stabilitatem dare reliquis principis.

Sed requiritur, dum ex his elementis terrestribus fiunt fibræ nostræ solidæ, ut cohererent inter se: hoc in nobis facit vis vitæ applicans fibris jam factis nova elementa, quæ deperditorum loca suppleant; illud vocamus nutrire. Et quantum appareret res factas considerando, dum forte modum, quo fiunt, ignoramus, fit hoc interpolatione gurginis aquosi, vel pinguis. Aqua enim incredibilem vim habet corpora adumandi: lapidis alabastrini exusta calx, oris halitus distillanda, (gypsum vocant) aqua addita fit ductilis pasta brevi in lapideam duritiem concretescens; conchyliis in calcem usta polinem exhibent tenuissimum, volatili levitate pulmonis tam sepe noxium, cum aqua subactis ille pulvis dat pastam igne in durissimum lapidem convertendam: & in durissimis animalium partibus, ubi nemo sus-

picaretur aquam adesse, incredibili copia haeret: dum succissimum ebur, vel quæ per annos latuerant in Otthinis cervorum cornua aridissima, ex rectoris vitreis destillantur, maxima pars volatilis fit, inque excipulum transtulit, & magna copia aquæ sic exprimitur, residuum fragile est.

An hoc voluit indicare sapiens Homerus! (Homer. *Iliad. Lib. VII. pag. 120.*) dum Heclorem Græcos ad singularem certamen provocante, hi obmutescerent, iratus Menelaus ipsis annihilationem quasi imprecatus dixit: *Αλλ' οὐσιγίων ἄδινε ὑδωρὰ γαίᾳ γινόμεθα. Vos quidem omnes aqua, & terra fiat.* Sed & pingue gluten terrestres partes coherere facit, docent iterum chemica experimenta: quamdiu enim ultimum illud oleum, nonnisi ignis in aere libero agentis vi separandum, adhæret partibus animalium, cohererent adhuc, hoc expulso in cineres fatiscunt: ossa calcinata fragilissima, oleo immixta, iterum cohererent.

§. 22. **Q**uare in his (21.) separatim spectatis nullos occurrit morbus, qui Medicis observatus, sanatusque

Si jam minima illa elementa, ex quibus adunatis fibræ simplicissima fit, separatim spectentur, de illis certe nihil dicere novimus: qui subtili speculatione voluerunt & horum morbos indagare, nihil unquam dixerunt bonæ frugis. Transponi posse, a cohezione cum cum aliis dimoveri concipimus; immutabilia autem penitus esse corporum elementa suadet

constans per sex mille annos Universi facies.

Hæc enim minima solidarum partium elementa vel considerantur, dum fluidis inhabitantia per vasa deferuntur, sed tunc horum morbi, licet cognoscerentur, fluidorum forent; vitia vel considerantur, dum adunata solidam partem faciunt, sed tunc non amplius sunt elementa, sed constatum ex his solidum.

§. 23. **S**ed in fibræ minima, ex adunatis his (21.) concreta, morbi simplicissimi sequentes (24. ad 38.) considerari merentur: sunt enim frequentes, & fundamenta jacent intellectui aliorum, licet prætervisi, vel non bene cogniti.

Omnium ergo simplicissimi morbi non in elementorum vitiis, quæ forte in æternum nos latebant; sed in fibræ minima horum adunatione facta querendi sunt. Dum enim vel bina tantum inter se cohererent elementa, varia cohesio potest morbum facere: & uti ex sequentibus patebit, nimia, vel nimis parva cohesio in fibris solidis simplicibus, & vasis, & visceribus inde formatis, infinitis morbis originem dare poterit.

Hi autem morbi fere prætervisi fuerunt,

nam ne quidem Methodici dicti, quibus de stricto, & laxo doctrina solet adscribi, de his simplicissimis morbis egerunt.

Patet ex horum doctrina a Celso (*Lib. 1. in præfatione pag. 15.*) descripta. *Sunt esse credebant, communia morborum intrinseci, & quidem horum tria genera esse; unum adstrictum, alterum fluens, tertium mixtum. Nam modo parum excernere agros, modo nimium: modo alia parte parum, alia nimium.*

## MORBI FIBRÆ DEBILIS, ET LAXÆ.

§. 24. **F**ibra (23.) debilitas vocatur adonatio partium minimarum (21.) cum nisu in cohesionem tam parvo, ut vel illo levi motu solvi queat, qui Sanitatis effectu sit, vel non multum majori.

A quacunque demum causa fiat cohesio elementorum, fibræ constituentium, inter se, poterit facile concipi, quod illa vis, qua cohererent, possit augeri, possit minui; debent vasa nostra ex fibris constata cedere posse impulsu liquido, & distendi, nec nimis tamen; debet manere cohesio sine ruptura, hinc requiritur certus, & determinatus cohesionis gradus in fibris nostris, qui, si major, vel minor fiat, morbum faciet.

Debilitas ergo fibræ nunquam poterit definiri, nisi relative: primis post conceptum septimanis hominis rudimentum ad tactum liquefcit, & nisi æquabili pressione ambientis fluidi sustineretur, in informem mucosam massulam collaberetur; tam parva cohesio fibrarum requirebatur hoc tempore: sed quantum jam robur cohesionis in his requiritur in adulto!

Sed & in variis partibus eiusdem hominis quam diversa requiritur cohesionis vis! Longe minor videtur esse cohesio ultimi solidi, quod mollem pulpam nervi acoustici facit, quam illius, quod durum Achillis dictum tendinem constituit.

Hinc fibra solida tunc minus debilis dicitur, quando non potest integra cohesione sustinere illum motum, qui ad functionem exercitum in sanitate requiritur.

Neque hoc adhuc sufficit, sed debent semper paulo maiorem vim posse sustinere: si enim solida illa ultima haberent tantumalem cohesionem, quæ placidum fluidorum per vasa nostrum in sanitate posset sustinere, non ultra, solveretur statim, ubi aucta circulatio majori monimento morus pelleret liquida per vasa: sed a levibus adeo nec ulla prudentia humana evitandis causis augetur circularionis velocitas; auditio subito fragore mox cor palpitat celerrime, omnes arteriæ pulsant velocius, risus, tussis, sternutatio quantum accelerant sanguinis motum?

In morbis aliquando apparuit, quam misera sit conditio hominis habentis fibras solidas tam debiles, ut tantum pacatissimo morui sustinendo pares sint.

Qui debili nimis pulmone sanguinem rupta arteriola expunt, si quiescant, per Venæ sectionem minuatur dissidentis vasa sanguinis quantitas, nil in victu fumant, quod movere, vel irritare potest, satis comode vivunt; si valida tussis miseros corripit, vel imprudenter clament, animi aspectu valido agitentur &c. tenera nimis pulmonis vasa, aucto sic impetu transmissi sanguinis, rumpuntur, & undatim profuso sanguine sæpe subito pereunt.

§. 25. **H**Anc (24.) antecedunt: 1. impedita ingestorum assimilatio in naturam liquidi vitalis sani; quæ debetur iacturæ nimis humoris boni, & inertie virtium permuantium in corpore virtus est. 2. debilis nimium applicatio partis unius (21.) ad aliam, quæ oritur a nimis debili motu liquorum, isque ut plurimum a defectu motus musculorum. 3. nimia distractio fibræ rupturæ proxima.

1. Certissimum est, quod consuemus illis, quibus nutrimur; sed materies, quæ nutrit, præparatur in corpore, ut nutriat: hinc ingesta sola ad hanc rem non sufficiunt, ut in §. 1. explicatione jam notatum est; sed requiritur actionum naturalium integritas, ut fiat illa assimilatio ingestorum in naturam nostram, & restituantur illa, quæ vitæ actuositas abstulit. Dum

conclamaris pthificis vel optima ingerunt alimenta Medici, mirantur non proficere, sed deficit in illis illa assimilans virtus, sine qua nulla perfici poterit nutritio. Merito igitur damnavit Galenus (*De ratione victus in morbis acutis ex Hippocratis sententia Cap. IV. Tom. X. pag. 189.*) ad hoc non attendentes Medicos, nomine quidem methodicos, opere vero ab omni methodo alie-

# §. 25. MORBI FIBRÆ DEBILIS, ET LAXÆ. 17

nos (αἷμα ἰσχυρὸν), vinum & carnes dures, ac sanguinem in vas inanimum (ἰσχυρὸν αἷμα ἰσχυρὸν) nutrimenta infundentes.

Quæ debetur JACTURÆ NIMIÆ HUMORIS BONI. Dum consideramus illa, quæ accidunt crudis ingestis, antequam in nostros humores convertuntur, videmus, quod incredibilis copia liquidorum humanorum illis admisceatur. Inter manducandum saliva, & mucus oris, lingue, palati, faucium &c. in ventriculo succus gastricus, inde exeuntibus utraque bilis, ingentis pancreatis larex, in omni intestinorum puncto novi admiscuntur jam per fabricam corporis elaborati humores: subtilissimis fistulis lacteis receptus chylus lymphæ copia ingenti diluitur, in ductu thoracico totius fere corporis lymphæ reduce perfunditur, ex hoc tandem guttatim in subclaviam venam deductus chylus integro sanguinis torrente abreptus absorbetur: hinc merito concludere licet, inter præcipuas assimilationis causas esse numerandam illam miscellam pauci crudi ingesti cum tanta copia humorum coëstorum.

Pulchre hanc rem confirmant experimenta: dum robustissimis militibus per vulnera fere omnis exhaustus fuit sanguis, alimenta avidè quamvis ingesta non subigunt & mutant in bonum sanguinem, sed hydropse sepulti languent, debilitata totius corporis compage.

Quantus manet languor & quam diu in foeminis per abortum maxima copia sanguinis orbatis!

Omnes aliz evacuationes nimis per alvum, urinam, sudorem &c. idem efficiunt.

INERTIÆ VIRIUM SOLIDORUM IN LIQUIDA. Dum chylus recens sanguini ingestus arteriarum pulmonis, & totius corporis efficaciam per aliquod tempus perpeffus est, jam lactis indolem habet, lac autem jam propius ad naturam nostram accedit quam chylus, post longius spatium, ut Lowerus (De corde pag. 239.) docuit, feri jam indolem habet: sed toto hoc tempore vasorum in fluida actionem expertus est, quæ est ille renixus, quo vasa nostra dissendens fluidum reprimunt, quo ergo hæc vasa firmiora sunt, (modo non nimis rigida cedere possint liquidis impulsis) eo plus agunt, & eo citior & melior fit subactio ingestorum in naturam nostram.

Dum debilis languida chlorosi torper paela, ingerit nutrimenta quidem, sed non in-

Tern. I.

de perficit bonum sanguinem, sed lac quasi tantum; unde tota pallet, immo imprudenter secta vena in tali casu vidi sanguinem exivisse album: si in his vires paulo plus valent, plus mutantur ingesta, non tamen perficiuntur integre, tunc oritur color flavescens, viridescens: deficit enim in his solidarum partium actio in fluida, tumens, implentur crudis, sed non fit bona nutritio.

Per ferrum ingestum, & corporis exercitia augeatur in hac puella vis firmarum partium in fluida contenta, incipit tumens subsidere facies, amœno roseo colore genæ & labia perfunduntur, redit debitus vigor toti corpori.

VEL ALIMENTIS MAGIS TENACIBUS &c. Admissio maximæ copię humorum coëstorum ad pauculum crudi chyli, & actio solidarum partium in contenta fluida, erant bini illi modi, quibus conspirantibus crudum ingestum in nostram convertitur substantiam. Sed, quamvis hæc actiones adeo efficaces sint, ut ex tot & tam variis ingestis ultimo suo effectu conficiant sanguinem humanum, tamen requiritur in alimentis talis dispositio, ut per has vires permutantes nostri corporis possint superari. (Galen. Comment. 2. in Epidem. 1. Tom. IX. pag. 55.) ipsa enim concoctio est in coquentis substantiam (ὡρίαις) deductio quedam ejus, quod concoquitur; corpore igitur secundum naturam habente, quando & concoquendum familiarem habuerit naturam respectu coquentis, mutatio & alteratio ratiis substantiæ coquendi fit, aut maxime ejus partis, paucissimo nobis immorante semicocto.

Dum in urbibus obesset fame pressi coguntur obvia quævis devorare, languent, debilitantur omnes. Cum (Dodonei Stierp. Hist. pag. 434.) propter annonæ penuriam panis & libis ex semine lini coctis vescerentur Middelburgi in Zelandia, distenta his valde cito hypocondria fuerunt, & facies aliæque partes tumide, quorum non pauci sic affecti etiam mortui sunt.

Non poterat indomabile gluten seminis lini in bonum nutrimentum converti.

Cum depravato appetitu arenam, calcem, lanam & plurima alia absurda devorant puellæ, quam debiles, quam pallide sunt?

Proportionalis ergo debet esse ingestorum tenacitas viribus assimulantibus, vel non reficitur inde corpus, sed gravatur. Dum teneris infantibus de plobe homines ex farinosis

B

noſis non fermentatis pultes, ſolani eſculen-  
ri ruhera &c. ingerunt, immo miſeris abdo-  
men inſurantiſſe, decreſcit reliquum corpus.

Hæc probe cognoscens Hippocrates juſſit  
(*Apher. 8. Sect. 1.*) ut dum morbus in vi-  
gore fuerit, tenuiſſimo uterentur viſtu;  
oppreſſa enim tunc vi morbi natura im-  
par eſt validioribus alimentis immuran-  
dis, & ex hoc fonte plures ſaluberrimas in  
viſtu regulas deduxit alibi.

2. Dum ſaniſſimus homo fuſciocatur ſub  
acquis, habet omnia ſolida & fluida ac an-  
te; nulla tamen fit aſſimilatio, nulla re-  
ſtituitur fibra, deſicit enim viſ viæ diſtri-  
buens, movens, applicans: licet enim in-  
gerantur in corpus talia, in quibus ſunt  
elementa fibræ reſtituendis idonea, niſi per  
viæ vitæ applicentur, firmantur, nulla fit  
nutritio.

In illis morbis, in quibus vitalis humo-  
rum circuitus languet, licet optima dede-  
ris nutrimenta, nil proſicis; potes hæc cor-  
pora replere, ut tumeant, graventur, imo  
fuſciocentur ſere; bene nutrire non poteris;  
docent hydropici.

Circulationis jam velocitas imminuta eſt  
cauſa præcipua, cur non fiat debita appli-  
catio elementorum ad fibræ nutriendam.

In corde autem videtur origo & ſons vi-  
talis motus hærrere, per quem motum ex-  
pulſo ex thalamis cordis ſanguine dilaran-  
tur arteriæ omnes, quæ poſtea contractæ  
motum impulſi ſanguinis continuant.

Sed inter cauſas, quæ cordis motum fa-  
ciunt, præcipua forte eſt venoſi ſanguinis  
influxus in cava cordis: diu enim poſt mor-  
tem protruſo ſanguine venoſo verſus cor-  
dis thalamum dextrum redit cordis motus,  
ut certiffima docuerunt experimenta: ve-  
rum turgentibus muſculi dum agunt, com-  
primunt adjacentes venas, ſic venoſi ſan-  
guinis motum verſus cor accelerant, hinc  
cor irritatum citius contrahitur, hinc ce-  
lerior ſanguinis circuitus.

Hanc rem confirmant certiffima experi-  
menta: dum bini iſdem parentibus orti

ſi aſtres varios utuntur vitæ genere, dum unus  
ſapientiæ ſtudia excolens ſedentariam degit  
vitam, alter venatu, equitatione, bellicis  
laboribus corpus firmat, quanta in corpo-  
ris robore eſt differentia! prior debilis puel-  
le inſtar labili valetudine fruſitur, alter,  
firmato per labores corpore, Herculeo ſe-  
re robore gaudet.

Validis curſibus quotidie aſſuerus equus  
quieſcat in ſtabulis, opima brevi pingue-  
dine turget, ſed ſimul longe debilior fiet,  
ſolus laboribus impar omnino.

Otium humectat, & corpus reddit debi-  
le, labor ſiccatur, & corpus robuſtum effi-  
cit. (*Hipp. de viſtû ratione ſenſum Lib. II. Cap. X. Tom. VI. pæp. 474.*)

3. Nil magis docet impoſſibilitatem ex-  
plicandi per principia mechanica ſingula-  
rium corporum naturam, quam coheſio,  
mira illa corporum proprietas: coheſcent  
partes ferri inter ſe, illud ferrum duci-  
tur in tenue filum instrumentis muſicis ap-  
plicandum, circumduſto vertibulo illud ſi-  
lum fir longius, fir tenuius, pauciores par-  
ticulæ ſe mutuo tangunt, tandem ulte-  
rius diſtractum rumpitur, & extrema ru-  
pta, licet ſibi mutuo applicata, cohe-  
rent nunquam: hinc coheſio poteſt ſen-  
ſim per gradus ita minui, ut tandem fiat  
nulla, & circa momentum rupturæ vix  
coherent amplius; vel ſaltem ſic tantum  
coherent, ut leviſſima vi accedente diſ-  
rumpantur: idem in fibræ noſtris ſolidis  
obinet.

Dum invitis maleficis per tormenta ve-  
ritatem exprimunt, ſolent ſuſpenſis appli-  
care ad pollices pedum poudera ſenſim au-  
cta: hæc tormenta paſſi per plures dies vix  
poſſunt membra movere, ſere paralytici à  
ſola diſtentione.

Nunquid diſtenta nimis per diu reten-  
tam urinam veſica omnem ſe contrahendi  
vim amittit? diſtenti abdominis in gravi-  
da muliere cutis, & panniculus adipoſus,  
excuiſo quamvis diſtendente ſetu, rota vi-  
ta ſaccida, & rugoſa manent.

§. 26. **P**roducit autem facilẽ vasculorum ex his ( 24 ) conſtatorum extenſio-  
nem, rupturam, in ſua liquida contenta inertiam; unde Tumores ab  
diſtentionibus, Putrefactiones ab ſtagnantibus vel extravafatis liquidis, tum ea, quæ  
ex binis hiſce ſequuntur, infinita.

Res hæc evidenter paret, ſi ſupponatur,  
corpus humanum perfecte ſanum ſtatim ſe-

ri nimis debile in omnibus fibræ ſolidis:  
omnia vaſa noſtra conſtant fibræ inter ſe  
infe-

# §. 26. 27. MORBI FIBRÆ DEBILIS, ET LAXÆ. 19

ipflexis & intricatis, hinc vasorum omnium robur pendet a robore harum fibrarum, sed maior aut minor cuiusque vasis capacitas mensuratur ratione composita ex ratione directa imperius liquidi impulsus, & ratione inversa resistentiæ laterum; cum ergo, debilitatis fibris constitutentibus latera vasorum, minuitur resistentia laterum, impetu interius liquidi impulsus manente eodem, necessario distendentur vasa.

Si pars corporis, per v. g. exponitur vapori tepidae aquæ, quo nil plus debilitat, tumebit paulo post & fiet œdematosus.

Dum pergit causa eadem fibras debilitare, a minima vi fiet cohesio nulla, id est ruptura, uti torques docuerunt tristica exempla, dum tenelli homines tam facile a tussi, cantu, clamore &c. babuerunt ruptam in pulmone arteriam.

IN SUA LIQUIDA CONTENTA INERTIAM. Distenta ab impulsu liquido vasa arteriosa suarum fibrarum efficacia reprimunt fluida: dum nituntur minuere fibræ capacitatem vasis, quod constituunt, liquida contenta premunt, compingunt, mutant: & ab his binis omnia in corpore pendunt; dum ergo minuitur fibrarum robur, facile patet, quod vasa ex his constata minus agant in fluida contenta.

TUMORES AB DISTENDENTURUS. Ratio dicta fuit: observata certissima rem demonstrant; dum incipit languida chlorosi debilitari tenera virgo, mox incipiunt laxissima illa sub palpebris loca (ὤρεα, ὑπερδίαμα) dixerunt veteres Græci) tumere, dein tota facies turgidula, alba, apparet; & dum quotidie increfcit humorum moles movenda,

non aucta causa motrice, tota incipit tumere in omnibus fere partibus: sic & in primo initio Cacoehymie Leucophlegmatice lærantur sæpe homines, dum credunt se bene valere, & pinguescere: dum per multos dies aer nebulosus est, corpora omnium hominum apparent inflata, quia partes externæ sic quasi in perpetuo ponuntur balneo, unde labefactaræ cedunt liquidis distendentibus.

PUTREFACTIONIS &c. Quamdiu æquabili motu per vasa circumducuntur humores, nulla nascitur in corpore putredo, omne illud, quod inciperet disponi ad putredinem, solitis corporis viis eliminatur: sed dum debilitata solida non possunt propellere distendentia fluida, fit stagnatio, & in calore aeris communis omnia liquida humana (si forte pingua exceperis) sibi relicta putrescunt solo lacte excepto, (quod nondum omnes doctes humani liquidi acquisivit) hinc longe plus in calore corporis nostri, qui semper aeris communis calorem superat: idem verum est, dum rupta ob nimiam ténacitatem vasa suos effundunt humores.

Si jam hæc applicentur variis partibus humani corporis, apparebit, ex simplici hæc causa oriri posse infinita & gravissima mala.

Dum tener nimis pulmo imperium sanguinis corde expulsi ferre nequit, ruptis vasis hæmorrhoe, & tories inde immedicabilis phthisis.

Dum cerebri vasa debilitata vel distendantur nimis, vel rupta effundunt suos humores, omnes morbi functionum animalium a levissima vertigine ad lethalem apoplexiam usque oriri possunt. Idem in aliis visceribus verum est, hæc pro exemplo sufficiunt.

§. 27. **E**x hisce (24. 25. 26.) præsens, futura, præteritave noscitur: effectus prævidetur; & Curationis requisita perspicuntur.

Qui jam bene intellexit omnia antedicta, de natura fibræ simplicis nimis debilis, de illis, quæ antecedunt hanc debilitatem, de phenomenis, quæ hoc docent, & de effectibus, quæ sequuntur: poterit facile definire, an adsit nimia fibrarum debilitas; hæc vocatur *diagnosis* in Medicina, sive evidens cognitio morbi præsentis distinctissimi ab omni alio, & denotat morbi naturam individuum: hæc *diagnosis* habetur, si novimus præcessisse tales causas physicas, quæ semper antea hunc morbum fecisse prehensæ sunt. Si v. g. homo a

propria temperie jam debilis, balneis aquosis, potibus similibus tepidis frequenter usus, inertis orio torpuit, tunc novi præcessisse tales causas, quæ fibræ debilem faciunt, hoc primum est *diagnosis* fundamentum. Alterum *diagnosis* fundamentum est cognitio morbi in sua natura & effectibus præsentibus, quæ, si sensibus patent, per illos observantur; sed morbi tecti natura cognoscitur, quando cognoscuntur effectus facti ab hoc morbo ut causa, unde qui novit effectus fibræ debilis, poterit detegere, an adsit, vel non.

*Prognosis* autem significat, cognoscere aliquid, antequam fiat, unde est cognitio, nata in mente Medici, morbi alicujus certo futuri, qui nondum est: cognoscitur morbus futurus ex causis cognitis talibus, ut nondum faciant morbum, sed quæ majores factæ, vel aliis unitæ faciant morbum: v. g. si noverit Medicus temperiem hominis vergere ad hæmoptoen, monabit hunc morbum ipsi metuendum esse, licet nunquam antea laboraverit, jubebit, ut caveat, ne aromata vel vinum copiose ingerat, abstineat a clamore, cantu &c. nam prognos non habetur ex eo, quod cognoscamus causam completam morbi in ægro, tunc enim jam adesset morbus, sed quod cognoscatur causa quædam physica, prædisponens ad morbum cognitum ut pars causæ totalis, & quod prævideat Medicus, alterari causam accessuram, quæ priorem illam prædisponentem faciet completam: dum pleuritide decumbit æger, & a Medico petitur prognos, & ille videt, non esse pessimam, nec tamen resolvi per naturam, nec ulla critica evacuatione vel meraciori causam morbi materialem eluctam fuisse, nec idonea adhibita fuisse medicamenta, tunc prædicet, quod pleuritis illa suppurabitur: hæc prædictio non pendebat a pleuritide præsentē, sed junctā talibus causis, quæ faciunt inflammationem in suppurationem tendere.

Sic evidenter intelligitur, quid sit *Diagnos*, quid sit *Prognosis*.

Si jam observatæ fuerint illæ mutationes, quas morbus, per *diagnosim* cognitus, fecit in corpore sano prius, possum ex his mutationibus visis in ægro concludere, morbum adfuisse; hæc vocatur *anamnesis recordatio*.

**CURATIONIS REQUISITA.** Hoc jam est magnum illud artis molimen: curare enim est, corporis præsentem conditionem physicam, unde morbus fit, sic permutare, ut salva vita redeat integritas læsarum functionum.

Postquam enim *Diagnos* docuit morbi nomen, ejus statum varium incrementi &c. partem affectam, & materiem peccantem in parte affecta, & *Prognosis* demonstraverit, quænam speranda, quænam metuenda sint; tunc ex his omnibus concluditur quænam sint agenda: hæc vocantur *Indicata*, & scientia sic nata in mente Medici vocatur *Indicatio*.

Semper hic primo consideramus, an morbus naturæ sit committendus, an vero ars aliquid addere debeat: vivit enim æger, & per vitæ superfluitis effectus multa fiunt, quæ nondum sunt; si hæc mutatio a vita superfluitate facta talis est, ut per certa observata constiterit, illam posse causam morbi sic mutare, ut redeat sanitas, nihil agendum est. V. g. si pleuriticus primo morbi stadio tussi rejicit mucosam flavam materiem cum strigementis sanguineis, cum levamine omnium symptomatum, ex fidis veterum observatis novimus, quod si possit hæc expectoratio sustineri, intra paucos dies sanabitur æger: hinc nec venæ sectionibus, nec aliis remediis turbabimus salutare hoc naturæ molimen, sed dabimus: tantum mollissima decocta, quæ hanc expurationem sustinere possunt: sed si v. g. in pleuritide videmus febrim magnam, calorem urentem, tussim siccam, linguæ siccitatem, nec ulla observantur signa, quæ docent, naturam affectare aliquam metastasim salutarem, tunc novimus, quod si pergant in hoc corpore agere illa, quæ nunc agunt, sequetur vel lethalis gangræna, vel, si mitior fuerit morbi indoles, suppuratio. Semper bona, ubi materies suppurata poterit extrorsum educi, sed hic magnum inflat periculum, ne pus factum in cavum thoracis decidat, & funesto empyemate ægrum necet: hinc tunc concludimus, hic non esse sibi relinquendam naturam, sed validis artis auxiliis mutandum esse sic morbum, ut non fiat suppuratio gangræna: hæc autem auxilia ex cognita morbi indole & causis prægressis patebunt.

§. 28. **H**æc enim obtinebitur: 1. nutrimento, in quo materies (21) abundet, quodque jam fere ita præparatum sit, ac in corpore sano & forti fit. Lac, Ova, Jura catinum, decocta panis bene fermentati, vina austera, primaria sunt. Quæ parva copia sæpe repetita sumenda. 2. aucto motu solidi & fluidi per frictiones, unctiones in equo, rheda, navi, ambulationes, cursus, exercitia corporis. 3. leni compressione vasorum liquidorumque repulsu. 4. medicamentis acidoausteris, aut & spirituosius fermentatis, prudenter, leniterque usurpatis. 5. omni modo, quo nimia distractio tollitur.

In hoc casu ponitur nullum vitium in toto corpore, nisi sola debilitas fibrarum, hinc ille morbus jam abstracte sumitur: non possumus facile curare fibram præsentem nimis debilem, ut fiat requisita ad sanitatem rigiditatis, sed futuræ ex lege corporis fibræ possumus talia suppeditare elementa, ex quibus per vires vitæ fiet fibra satis fortis.

Prima causa debilitatis nimix fibrarum recessēbatur impedita affinitatio crudi assumti in ultimum illud coctum, quod est materies omnium subtilissima, per minima vasa delata: sed ut fibræ fiant satis fortes, debet adesse materies debita illis apponenda, sed hæc est illa, quæ omnium viscerum & vasorum actiones passiva juxta sani corporis leges ultimæ elaborationis perfectionem adepta est: sed dum fibræ nimis debiles supponuntur, & omnium valorum in fluida contenta actio debito fibrarum robore pendeat, onus functiones permutantes crudum ingestum in nostram naturam erant minus efficaciæ, hinc in tali corpore per vires proprias non poterit præparari ultima illa materia, quæ nutrimento inseruit: narrantur hinc sæpe Medici, cur optimæ carnes debili tali homini ingestæ non nutrant, sed hæc tantum præbent materiem rectoriam, unde vitæ actiones nutrimentum faciunt, & his functionibus læsis frustra dantur optimi cibi.

Dum in utero materno hæret tenellus embryo, matris viribus præparati humores illum nutriunt, debile enim corpusculum non valeret ex aliis minus assimilatis suum facere nutrimentum; recens nato lac materno in corpore præparatos humores infundit: sic naturæ modum imitata ars medica debilibus talibus corporibus ingerit jam præparata in corpore sani animalis nutrimenta: inter illa præcipuum est.

**LAC.** Proprio lacte omnis homo nutritur, & ex eo solo omnia reliqua solida & fluida vi suæ vitæ perficit; est enim in viris æque ac sæminis semper præsens, licet nunquam pepererint, nunquam nutrices fuerint: ex sexagenario sene sola fustione lac educit narrantur (*Miscell. Cur. Dec. II. An. 5. pag. 60. Append.*) & ex mammis mulieris non prægnantis (*Miscell. Cur. Dec. I. An. 2. pag. 12.*) est enim chylus, cordis, pulmonis, arteriarum actiones passus, omnibus humoribus mistus, mammarum mirabili fabrica inde separatus.

Omnium jam optimum lac est humanum ad hæc usus, utpote naturæ nostræ maxime ana-

logum, hinc semper præferendum lacti aliorum animalium: lac illud debet esse sæminis sanæ, quæ salubri motu corpus exercet, & victu landabili utitur, & integro ætatis flore viget, omnium optimum, si quatuor vel quinque post partum horis ducantur ubera, tunc enim chylus in lac coctum jam mutatus est, & alimentorum indole deposita, inceptum humanam induere naturam: ingens enim est differentia, prout lac vario post ultimum partum tempore ducitur; quod statim post ingestos cibos & potus in mammis colligitur, crudum est, & multum de ingestorum indole retinet, quod duodecim ab ultimo partu horis ducitur, jam tenuæ, subtilavefens, foetorem suburinofum fere instar feri sanguinis habet; intermedio hinc tempore optimum lac est.

Sed & aliud maxime notandum hic est; omnia animalia, quæ lacte materno utuntur, illud ducunt de uberibus, nunquam aeri exponitur lac, sed omnibus suis partibus subtilissimis dives teneris præbetur animalibus: videtur enim lacti inesse subtilissimi spiritus, ultima concoctione in sano corpore elaborati; docent hoc tot nervi concurrentes ad chyli & lactis officinas, subtilissimus ros exhalans ex lacte recens multo adhuc calido, miræ mutationes observatæ in tenellis infantibus a lacte assumpto: vidi hic infantem, qui ira furentis nutricis ubera duxerat, mox fuisse convulsam, licet sanissimus fuisset ante.

Sed jam ab omni ævo corpora interitiora præ debilitate conati fuerunt Medici resocillare, dum subtilissima illa exhalantia de valido juvenili corpore insinuant debilissimis corporibus sub iidem stragulis decumbentibus.

Sic Davidis effectum senectutis corpus fovebatur sanissimæ puellæ in eodem lectulo decubitu (*Regum Lib. III. cap. 1.*) si ergo lac jam penitus frigidatum, vel postea igni admotum iterum exhibeatur, jam subtilissimum illud, quod præ cæteris requirebatur, abest.

Dixit hinc Galenus (*Method. Med. Lib. V. cap. 41. Tom. X. pag. 123.*) veteres vero etiam molliorem lactantem illis, qui tabe decumbant, adflare voluerunt, quorum sententia & ipse quoque accedo, & quod familiare id sit, & quod priusquam ab ambiente aere refrigeretur, id sumi voluerint.

Et alibi (*Method. Medendi Lib. VII. cap. 6. Tom. IX. pag. 160.*) postquam similia præfatus fuerat, lac comparat femini genitali, quod nec ipsam aliquandiu extra propriam vasam, si modo suam virtutem servabit, morari

putat, sed vel in muris partibus contineri, vel fœmine partes tangere debet: Et sane optimam luc est, si quis ex ipsi mammillis extraxerit &c. postea ridens quorundam morositatem addit: quod cum exuberet sibi, cen puerit, plerique recusant, utique cum a suis ipsis dicit abstinentiam convenit.

Confirmaverunt jam hanc rem observata plurima. Capivaccius nobilissime gentis unicui herodem servavit, dum inter binas florentis ætatis decumbentem nutrites ubera illarum ducere jussit.

Juvenis marasmo vero correptus Bononiæ, juvenicula nutritrix pulcherrime ubera ducibat, & in eodem cum illa lecto dormiebat, unde sic inflaturabatur exsuccum corpusculum, ut metuerent, ne intemptiva Venere perderet renalescentis ex lactis usu vires. (Forsij observat. Tom. I. Lib. V. pag. 152.)

Defectum lactis humani proxime supplet Atinum, post Caprinum, dein Vaccinum.

Ovis, quæ fragili sub tella tot miracula recondunt, & per immortalis Malpighii observationes tantam lucem animalium generationi affluerunt, ad hunc usum pariter adhibentur.

Albumen ovi, sero sanguinis humani plurimis donibus conveniens, habet in se materiam, quæ calore incubatus mutata intra viginti & unum dies in fæculo colliquamenti latens vitale flamen pulli in tantam molem facit excrecere, vitellus enim non consumitur, solum albumen videtur nutrimento pulli in ovo servire.

Hinc optimum in se nutrimentum habere merito attestatur: dixit Hippocrates (De ratione victus sanctorum Lib. II. cap. 5. Tom. VI. pag. 469.) volucrium ova validum quid & nutriendum & infans habent; validum quidem, quia animalis generatio est; nutriendum, quia lac est pulli; infans, quia ex parva mole in multum diffunditur.

Albumen ovi hinc præcipue commendatur ad nutriendos debiles homines, sed dilutum aqua, ut tencitatem amittat, & levi aromatizandum, ne nimis fatuo sapore displiceat; tepida autem aqua dilui debet, fervida enim aquæ calore coagulatur in scissilem massam, difficillime digestionis.

Multum tamen deficit a lactis usu, albuminis enim ovi liquor, antequam nutriti pullum, ejus vasorum, & viscerum actionem experiri debet, cum in lacte jam adsint humores subtilissimi animali fabricæ preparati.

Vitellus autem, licet nutrimentum optimum det, requirit firmiorem vitærum fabricam, nam ut Harvey (Harvæi Exercit. de generatione Animal. pag. 97.) post Aristotelem pulchre notaverat, pullus primis ab exclusione debet vitello, intra suum abdomen concluso, pro nutrimento utitur; albumen autem consumitur illo tempore, quo pullus ex invisibili molecula in quo ad debitam magnitudinem crevit, hinc videtur facilius in nutrimentum converti posse quam vitellus.

Videtur ego Galenus locutus fuisse de ovis coctis, non de crudis, ubi debilibus vitellus commendat præcipue, quia albumen difficile concoquitur (Περὶ τῆς γὰρ τῶ λυγροῦ) (Method. Medendi Lib. XII. cap. 6. Tom. X. pag. 285.) uti clare patet, dum in alio loco de ovis fortilibus loquens similia dicit. (Method. Medendi ad Glauco. Lib. I. cap. Tom. X. pag. 355.)

JURA CARNIUM. Imprimis si animalia, quorum carnes iusculis parandis adhibentur, viginti quatuor ante mortem horis jejuna manserint, tunc enim omnes crudi humores per fabricam animale mutati sunt in debitam iudolem: carnes mactatorum animalium succulentæ penitus sunt, sanguis tantum ruber pro maxima parte eductus fuit, reliqui omnes adsint humores, qui inter coquendum aquæ misti debilibus corporibus præbent materiam in sani animalis corpore jam elaboratam; sed inter coquendum pars subtilissima avolat, quæ retineri posset, si in machina Papiniana coquerentur; sed decocta sic parata saponaceum nauseosum satis saporem habent, dum pingue carnis semper adhærens ignis, & aquæ validissima actione in vase exactissime clauso sic attenuatur, ut aquæ intime miscetur; præterea nimis meraca sunt hæc iuscula, & dilutione indigent: hinc in vasis vulgaribus, quantum fieri potest, aliis, & clausis diuturna coctione omne solubile ex carnis educi potest, sic ut meræ solidæ fibræ musculosæ supersint, iuscula hæc dein refrigerata pingue supernatans, in frigore plerumque concrefcent, habent, quod sollicitè auferendum, ne debili ventriculo offendant cito rancefcent hoc oleum.

Magnus tamen error foret credere, eo meliora esse in hos usus jura carnis, quo meraciore, consummata enim dicta indomabili tenacitate debilem ventriculum potius



tius gravant, hinc moderata requiritur dilutio.

Sic tamen decoquendo in vasis vulgaribus multum perit de subtilissima parte, docet gratus & reficiens halitus ex vasis non bene clausis transpirans, dum carnes decoquuntur.

An ideo ferocissima sunt illa animalia, quæ vivas carnes laceratas devorant? certe canes crudas carnes vorantes ferocissimi evadunt.

Solent præferri ad iuscula carnes ex genere gallinaceo, vitulina dein, post ovilla, bubula denique. (*Herm. Boerh. Mater. Med. pag. 2.*) Si negligitur subtilissimum illud, pro maxima parte exhalans in vulgari coctione, reliquum quod nutrit hæret in parte illa gelatinosa, quam inspissata iuscula exhibent: experimenta tunc docuerunt, quod vitulina caro plus habeat de illa parte gelatinosa quam bubula, ovilla caro adhuc parum plus quam vitulina, pulli carnes minus dant, galli veteris carnes duplum fore respectu carnis vitulinæ. (*Academ. des sciences An. 170. Mem. 314. &c.*) In loco citato tabula habetur variam in diversis carnibus proportionem exhibens.

Ex vitulina, ovilla, bubula, & gallinacei generis carne permixtis optimis, & sapidissima habentur iuscula, imprimis si his postea pauculum succi citri, vel arantiorum adspersum, ut nimia in putredinem proclivitas tollatur.

DECOCTA PANIS BENE FERMENTATI. Magni usus apud illas gentes, quæ calidissimis regionibus viventes stricta & macilentia corpora habent, in quibus in morbis acutis statim omnia in lummam vergunt putredinem: requiritur, ut per fermentationem nimia frumentorum glutinositas frangatur, ne noceant, tunc decocta inde facta feri lætis spissitudinem fere habentia optime profunt, meraciora lætis cremorem fere æquantia minus facile digeruntur: tali decocto possunt grata aromata, vini pauculum addi, sic magis reficiunt.

Notandum tamen, quod hæc ex pane præparata decocta tantum eo usque perfici possint, ut chylo similissima fiant, quatenus chyli ex ingestis constat, non quatenus admixtis humoribus humanis conficitur: hinc semper de vegetabili natura participant, sed ut ex chylo fiat liquidum humanum, requiritur pulmonis imprimis, uti & reli-

quorum viscerum & vasorum actio: hinc in phthisicis, & omnibus aliis, quibus debiles nimis pulmones sunt, in solo fere lætis usu salutis spes posita est: ideo panis decocta longe magis remotam ab ultima perfectione nutrimenti materiam habent, quam lac.

VINA AUSTERA. In vinis omnibus mirus ille inest, & naturæ humanæ gratissimus stimulus, omnia excitans, omnia calefaciens: dum modica copia ab homine non admodum assueto sumuntur, oritur promptitudo omnium sensuum, summa in omnibus membris agilitas, incredibilis lætitia: dum meditationibus exhaustus Philosophus pauculum vini sorbet, mox inde reficitur, & redit menti pacata illa serenitas, & novus quasi vigor. Pericula illa vina, ut Campanum &c. hoc habent, sed cito evanescunt, austera vina firmius quasi hærens illud spirituosum magis durabili actione corpori applicat, & simul adstringente vi debiles fibras plus roborant, hinc in hoc casu præferuntur: omnium optimo successe exhibentur, dum panem biscotum his vinis madidum deglutiant omni trihorio, sic non tam cito dilabitur vini virtus, & novam quasi vitam flaccidis primis vis inspirat. In pane & vino robur & virtus est. (*Homerus Iliad. Lib. IX. circa finem σίτου οίνου τὸ γὰρ μὲν ἐστὶ καὶ ἀνὰ*) pag. 137.)

PARVA COPIA &c. Sæpissime hic peccatur, dum, volentes reficere debilia hæc corpuscula, nimia copia simul ingesta obruunt, quantæ sunt angustæ, dum phthisici plusculum licet optimi nutrimenti ingerentes novo chylo debilem pulmonem gravant nimis! Sapiens naturæ institutum jussit, ut debiles infantes sæpius sed parviori copia læc maternum sumerent: nisi hoc observetur, reliqua omnia, utilisissima quamvis, proderunt nihil.

2. Inter causas debilitatis nimie fibrarum debilis nimis applicatio partium ad se mutuo numerabatur; hæc tollitur, dum solida fortius agunt in fluida contenta, a solidorum enim in fluida actione & reactione mutua omnia in corpore pendens hæc autem actio & reactio insinatur.

FRICIONE, quæ est alterna quasi pressio & relaxatio partium corporis: levis frictio solas venas premit, validior & artérias: premendo venas per fricitionem acceleratur sanguinis venosi motus cor versus.

hinc cordis excitatur motus, ergo velocior fit propulsio per omnia vasa; potest ideo vis vitalis per frictiones augeri, nullo alio intra corpus introducto, ad quemvis gradum: potest enim per frictiones frigidissimo hydropico calida excitari febris: in illis corporibus, ubi præ inertia nullum fere ex chylotricis visceribus suo fungebatur munere, frictiones jejuno homini per totum abdomen factæ pannis asperis laneis dederunt mirabiles effectus: hinc veteres & ad tuendam sanitatem & ad curandos multos morbos tanti fecerunt frictiones.

Dum in stabulis equus relinquitur neglecta cutis sordide depuratione, intra paucos dies fit ad omnia inutilis, dum ferreo pectine quotidie cutis raditur, perficitur seitis, agilis manet per multos annos.

*Nec minus quotidie corpora pecudum quam hominum defricanda sunt: ac sæpe plus prodest pressa manus subegisse terga, quam si largissimi cibos præbeas: sic monuit Collumella: (De Re Rustica Lib. VI. cap. 30. pag. 597.)*

Frictiones autem variz erant, & oppositis sæpe serviebant usibus; hinc Hippocrates dixit (De Medici ossu. Tom. XII. pag. 94.) *frictio potest solvere, ligare, carnes implere, minuire, dura ligare, mollia solvere, multa minuire, moderata densare.* Dum enim cum oleosis mollibus fricatur pars, laxior fit.

In fibra autem debili curanda frictio pannis laneis asperis calidis, inprimis penetratis fumo accensi succini mastichæ &c. ut simul hoc aromaticum roborans thymiana laxis se infinet partibus, maxime prodest; sed sensim hic progrediendum, nec statim validissimis urendum frictionibus, ne stagnantia multa in distentis nimis vasibus nimia copia cor versus pressa, illud obstruant & suffocent, vel tenera nimis adhuc vasa aucto imprudenter motu frangantur.

**VECTIONES IN EQUO.** Omni momento tunc viscera abdominalia, imo & thoracica, pendula concutiuntur, sibi invicem leniter quasi affricantur, interim aer purus majori impetu in pulmones agit, omnibus his simul conspirantibus incredibiles fiunt mutationes: notandum, debilem hominem non debere equitare pleno ventriculo, sed ante prandium, vel post digestionem fere perfectam; distento enim ventriculo non sine molestia hos concussus equi ferunt debiles homines, jam fere vacuis primis viis

residuæ facies hoc concussu eliminantur.

Tanti fecit equitationem Sydenhamus, (In Dissertatione Epistolari pag. 527. 524.) ut non tantum leviora mala, sed tabem tantum non conclamaram, ubi jam nocturnis sudoribus funesta aden phthisicis diarrhæa accesserat, se curare posse confidat sola equitatione, nec magis efficacem credidit Mercurii in lue venerea, vel corticis Peruviani in febribus intermittentibus usum, quam equitationis in curanda phthisi.

Sed sensim auctis equitationis vehementia & tempore, non subito & semel validissima equitatione defatigandum monet, & pulchra ibidem curationum exempla adducit.

Deinde addit, quod licet equo veli phthisicis præcipue conferat, tamen & tritæ curru facta mirandos sane effectus ediderint.

Hinc tam debiles, ut se sustinere non possent equo insidentes, rheda vehantur, donec plus firmato corpore equitationem ferre possint. Ab omni tempore hominum debilissimis, infantibus nempe, profuit gestatio & in cunis agitatio.

NAVI autem vehi conducit debilibus: si placido navis feratur motu, miram alacritatem perspiratione aucta solet excitare, saniem augere, ingesta digestionem promovere: illa autem, quæ sit procelloso in mari, iactatio robustissimum hominem non assuerum vertigine, vomitu, anxietate intollerabili, ipso animi deliquio, afficit, hinc casu aliquando invenerat morbos sic sanari novimus, debilibus tamen tantæ in corpore excitatæ turbæ minime prodesse.

Omnia jam hæc imprimis profunt debilibus, quia sine defatigatione multa beneficio motus fruuntur, postquam autem sic inceperunt redire vires, tunc motu musculari firmandum corpus.

Hoc autem fit per **AMBULATIONES, CURSUS, EXERCITIA CORPORIS.**

Nisi enim tales ægri velint his uti, senes sim in eandem calamitatem relabuntur: hoc toties dolemus in praxi, dum a languid chlorosi curatæ puellæ, sedentariam vitam nimis amantes negligunt restauratum corporis robur sustinere corporis exercitiis, post paucas enim septimanas æque debiles æque pallidæ sunt ac ante; volunt ex ingestis nutrirî, & nihil agere, nunquam sic inde faciunt bonum sanguinem, sed iners & vapida redit cacochymia.

*Cibi enim & labores adversas inter se prætesta.*

*refrætes, nutius tamen ad sanitatem confreuerunt, habent, labores namque ea quæ adfunt folent confumere, cibi vero & potus, quæ vacuata funt replet.* ( Hippocrat. de vict. ratione Sanorum Lib. 1. cap. 2. Tom. IV. pag. 448. )

Quantum autem poffit ad firmandum corpus nimis debile motus mufcularis, dictum fuit ad num. 2. §. 25.

In his iterum a lentiffima ambulatione incipiendum, fenfim augendo in curfum ufque: profunè imprimis corporis exercitia, quæ mentem finul delectant, dum corpus mouet, ut pile ludus, ars gladiatoria &c. Unde & fapiens vetuftas præmia propofuit illis, qui in his exercitiis gymnasticis reliquos fuperarent, ut fic iuuenilia corpora ad ballicos labores firmarentur: Cyrus Perfis, quos recte inftituere femper fluduerat, quafi legem dedit, ne ipfi unquam fine labore cibum caperent. ( Mercurialis de Arte Gymnast. pag. 9. )

3. Maximi momenti eft hoc monitum, cum fepe pro desperatis habiti morbi fanati fuerint fola leni compreffione vaforum, quæ nunquam debet effe tanta, ut vaforum cavitatem integre tollat, tunc enim vita fuffocaretur in parte, fed ut tantum reddat vafa anguftiora, quam fine hac compreffione fuiffent, fic enim cauetur, ne vafa nimis debilia difflendantur nimium a fluidis contentis; vafis enim capacitas non a folo difflendente liquido, fed ab excessu huius fuper refilientiam vafis pender: fed quo fibra plus diftrahitur, eo fit debilior, hinc omne illud, quod diftractionem fibræ impedit, caufam debilitantem tollit: falciz jam vel velle: arctius apprefle corpori fulciendo vafa illud fupplet, quod deficiens folidorum robur facere non poterat, nempe impediunt nimiam dilatationem.

In morbis curandis plus per hanc methodum perficitur, quam per omnia alia. Dum hydrops anafarca crura, femora, tumida reddidit, & cafu vel arte rupta cute exstillauerit aqua omnis, flaccidæ pendulæ manent partes, & nifi circumductis falcis firmaueris, paulo post aque humidæ funt.

Dum afciticis perforato abdomine aquofum colluuium educunt, nifi ftatim circumductis loris stringant pendulum abdomen, fepe ipfo momento lethalis fyncope adest, vel pofttea omnia in pendulas & laxas partes ruunt, & cito recrefcit dirus hydrops.

Dum dilatatis vafis ftagnantia vel certe

minus mota liquida hærent in cruribus, accedente imprimis fcorbutica labe, rories erofa cute funt ulcera illa cacoethæ, ad optima quævis fepe rebellia; falciz circumductæ fic conftringentes partes, ut in vafis dilataris non poffint hære liquida, profuerunt rories.

Memini me curaffe nobilem puellam, qua in genere nervofo nuobitorem nunquam vidi: a minimo fono, lumine vividiori, convellebatur illico, miros motus cum lacerationis fenfu in abdomine fentiens: nec ferulacei fucci, nec adeo falubre in his cafibus caftorei virus, proderant: dum autem falcis crura, femora, totum abdomen ad nammas ufque firmabantur, remiffis ftatim moleftum malum, & datis dein idoneis remediis convaluit: per menses tamen fic, inftat Mummiæ Ægyptiacæ fere, falcis circumductis vixit non invita, cum illico tantum inde fentiret folamen.

4. Descripta hæftenus fuit curatio debilitatis nimiz in fibra folida fimplici, quatenus per ufum rerum non naturalium chirurgica remedia ( falciarum v.g. circumductionem ) perficitur: fupereft jam talia eligere medicamenta, quæ ingeffa corpori, & naturæ viribus commiffa, talem faciunt mutationem, qualis requiritur, ut fiat fanitas. Fibrarum elementa nimis debili cohzfione unita faciebant morbum: requirebantur ergo remedia, quæ corpori applicata facerent, ut fortior effet illa cohzfio: talia jam in materia medica habentur.

ACIDO AUSTERA, quæ adstringentia vocantur: omnia hæc applicata linguæ vim fuam fatis manifeffe extierunt: totum enim os exficcat, constrictis omnibus exhalantium vaforum oculis: lingua ipfa contracta quafi & breuior fit: hinc Galenus ( Meth. Med. Lib. VIII. cap. 2. Tom. X. pag. 18. ) dixit, *gustus folius proprium eft difcernere, quod vim adstringendi habet*. Videtur enim omnibus his medicamentis hæc inefle proprietas, ut applicata corporis partibus faciant elementa fibrarum propius quafi ad fe invicem accedere & plus cohzrere, imo vel mortuorum animalium partibus hæc applicata hoc efficiunt: dum enim coria animalium diuturna maceratione omni adhærente pingui orbauerunt coriarii, hæc emollita penitus fere diffluunt, tunc austeris his additis debitum robur reddunt: hoc vocavit Plinius ( Lib. XIII. cap. 19. ) coria perficere, dum de pu-

punicis malis dixit: *Corticis major usus ex acerbis ad perficienda coria*. Viliores longe quercus cortices his usibus hodie hic adhibent. Vegetabilia præcipua talibus viribus prædita in materia medica recententur.

Sed inter acida austera fossilia reliquis fere omnibus pulchram præcipit ferri, in acidis vege abilibus fermentatis soluti, usus; quo miraculi instar tumentia illa frigida debilia corpora reviviscunt: nulla fit inde evacuationis liquidis diffidentis, sed novum robur accedit vas, quo plus contracta promoveant stagnantes fere humores; illi autem, qui evacuando curare volunt hos morbos, plus debilitant.

Dum his uiuntur, sentiunt gratum calorem renasci toto corpore, subsident omnia tumoria, color pallidus laborum, genarum &c. in rutilum sanguineum mutatur, torpor ille & ad minimos motus anheliurus cedit, & pristina tedit agilitas, omnes insurgunt functiones, & nova quasi reddita vita.

Idem præstat ferrum in acidulis fontibus medicatis solutum.

**SPIRITUOSUS FERMENTATIS.** Si alcohol purum afluidius fero sanguinis, vel albumini ovi, illa mox coagulat: si partes solide animalium in alcohole detineantur, sunt duriores longe, & contrahuntur in omnem dimensionem; hinc revera vis hæc accurtandi solida animalium in alcohole adeit, sed simul humores coagulat: hinc in usu spirituum fermentatorum summa cautela opus est, nam duplici hoc effectu infundendi liquida & contrahendi solida infinita maia possunt producere, si imprudenter usumantur. In cadavere ebriosa mulieris lien, pancreas, hepar, pulmones, sicca, scirrhotica, pro parte quasi petrescenda, glandulae omnes interne, externae, inveniuntur lapideam fere habere duritiem. (*Acad. de Sciences Par. 1706. Hist. pag. 20.*) Plurima similia apud alios leguntur Observatores.

**PRUDENTER LENITIQUE &c.** Omnia enim hæc assumpta primo agunt in ventriculum & intestina, & nunquam integris suis viribus possunt ingredi sanguinem: tunc enim nocerent: unde debent dari pauca copia simul, & repetitis vicibus, ut diluta humoribus nostris sensim intrent in sanguinem. Acerbissimus Acaciae Egyptiacae succus si ad pauca grana tantum ore retineatur, omnia contrahit, omnia oris interni vascula inhalantia & exhalantia sic stringit.

ut per semiquadrantem horæ os totum scississimum maneat, si ita pæ illud vasorum lacteorum tenerissimis orificiis applicaretur, hæc contrahendo sibi ipsi viam intercluderetur: sed dum omnia hæc in primas vias agunt imprimis, nec nisi multum diluta ingredi possunt lacteorum oscula, & sursum quasi se sanguini infinuare: hinc non nisi valde jam imminutis viribus ad ultima illa venire possunt. Pulchre hic convenit monitum Galeni (*De Method. Med. ad Glauco. Lib. 11. cap. 5. Tom. X. pag. 375.*) dicentis. *Quæcirca medicamenti, sive id foras applicatum, sive ex illis fuerit, quæ devorantur vel potantur, potestatem præsentem non oportet considerare, sed qualem habebit, ubi ad affectum locum pervenerit.*

Hæc autem acido austera, imprimis validiora, imprudenter adhibita, partim coagulando liquida, partim claudendo omnia vasa tenerissima, quæ superficiem internam ventriculi & intestinorum constituunt, misserrimos possent producere morbos.

Hinc ferrum in lenibus acidis solutum reliquis fere præstat: quia non tantum vi austera adstringente agit, sed sulphuris sui metallici, naturæ humanæ adeo amici, miro stimulo vires vite incitat.

5. Distractio removebat a contractu mutuo minimarum fibrarum elementa: hinc disponebat ad cohesionem nullam, i. e. rupturam. Status ille proximus rupturæ est debilissima cohesio, minima vi superaddita separanda: omne ergo quod distrahit, minuendo cohesionem, facit debilitatem. Dum chorda musica appenso pondere tenditur, fit longior, aucto adhuc pondere, extensio augetur, tandem rumpitur. Momento ante rupturam coherebat adhuc, sed tam parum, ut exiguo pondere addito rumperetur: qui ergo tunc aufert pondera distrahentia, auct chordæ robur.

Idem in nostris fibris verum est: dum enim diffidentis causæ minuuntur, crescit omni fere momento fibrarum robur, quo nituntur se accurtare. In morbis exempla evidentissima hoc docent. Homini cuidam scirrhotus tumor oesophagum sic præferebat sensim auctus, ut ultimis miserrimæ vitæ mensibus non nisi paucas guttulas lactis aqua diluti, vel tenuis jusculi, & adhuc cum summa molesta, potnerit deglutire. In hujus cadavere vidi ventriculum non excedere fere sua capacitate tenuis intestini molem:

§ 28. 29. 30. MORBI FIBRÆ DEBILIS, ET LAXÆ. 27

tor enim septimanis nullo modo distensus fuerat ventriculus, hinc fibræ ejus sensum se sic contraxerant in tam breve spatium.

Mira enim hac proprietas in omnibus nostri corporis partibus firmis obtinet, ut si diu in eodem contactu maneat, postea sic cohereant, ut divelli non possint.

Dum fractio crure decumbit homo, nec Chirurgus subinde articulos leviter fleclit, sanatus postea habet immobiles illas articulationes: ligamenta enim, nullo motu articuli per tot septimanas distracta, induruerunt rigida facta.

§ 29. **L**axitas Fibræ vocatur ea cohesio partium ( 21 ) inter se; quæ parva vi potest mutari ita, ut fiat se ipsa longior; unde patet, hanc esse debilitatis ( 24 ) speciem, & flexilitatem inde pendere; adeoque hæc omnia clare ex dictis ( 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ) intelligi, ut & *imminutam Elasticitatem*. Namque vitrum corpus fragilissimum, arte ductum in filamenta subtiliora araneæ filo, coheret, estque flexile quaquaversum minima vi in omnes spiras, absque ruptura. Crescit pro subtilitate flexilitas. Ac. reg. sc. 1713. hist. 11.

*Laxitas*. Debilitas fibrarum nimia dicebatur adesse, quando non poterant, manente cohesione, sustinere illum impetum, qui ex sanitatis actionibus fieri debebat: vel licet periclitissimæ sanitatis efficaciam sustinere possent, aucto parum motu ( quod in vita humana inevitabile est ) rumpebantur. Laxitas autem nimia adesse intelligitur, quando fibræ impetum vitalis motus sine solutione cohesionis quidem ferunt, sed a parva vi distractæ nimis, sunt se ipsas longiores.

Filum sericeum, appensum pondus sine ruptura sustinere non potens, fibræ nimis debilis ideam dat: filum autem ex plumbo mollissimo factum, eodem pondere statim immaniter elongandum sine ruptura tam facili, fibræ nimis laxæ speciem præbet.

Sed a debita laxitate pendet

*Flexilitas*: ut enim omnia illa fiant in corpore, quæ per motum humorum, vasorum, musculorum, facta quotidie observantur, debebant solidarum partium elementa partim a contactu mutari, partimque in eo permanere, hinc elongari posse; ut fleclantur v.g. articuli, debent ligamenta coercentia posse elongari; requiritur hinc certus laxitatis gradus, ut sanitas sit, si augeatur, morbus est.

*Imminutam elasticitatem*. Fibrarum elasticitas in hoc consistit, quod extendi possint,

& ablata vi extendente iterum ad pristinam longitudinem redeant.

Sed tota hæc vis est tantum nixus, quo partes minimæ fibræ constituentes se invicem trahunt, dum per elongationem superficierum plus distant, manente tamen cohesione; si ergo a quacunque causa fibra sit nimis debilis; id est partes ejus se invicem minus valido nixu trahunt, necessario minuitur elasticitas.

Vasa nostra majora ex minoribus componuntur; hæc adhuc ex multo minoribus fiunt, sic ut hæcenus nullus limes in Anatomicis demonstratus sit: musculi ex minoribus musculis, & quæ nobis nudo oculo fibra muscularis apparet, microscopio lustrata fibrarum longe minorum fasciculum exhibet.

Idem in nervis &c. observatur: hinc videntur omnes partes corporis ex infinite parvis similibus conflare: hoc autem requirebatur ad flexilitatem partium: & experimento hic allegato patet, quomodo fragilissimum corpus ( vitrum ) simplici divisione in tenuissima filamenta reddatur ductile adeo, ut, textorii artibus illud adhiberi posse aliquando, non desperaverit acutissimus Reamur ( *Acad. des Sciences. l'an 1713. Mem. pag. 279.* ) Filicium ex vitro in fila ducto comam vidi, in qua vitrum sine ruptura poterat in cincinnos crispari.

§ 30. **Q**uin ex iisdem etiam respondetur ad hæc quæ sita: Cur aquosa, & pingua alimenta dant fibras? Cur frigidis, junioribus, & quiescentibus, crescentibusque debiles? Cur terrestria, austeraque dant fibras fortes? Cur calidis, exercitatisque fortes? Cur elasticitas robur concomitatur?

CUR AQUOSA & PINGUA &c. Experimenta hæc docent: durissimæ enim anima-

lium partes tepide aque, vaporis imprimis, expostæ, redduntur mollissimæ. Annosa cer-

cervorum cornua vapore tepidæ aquæ, vel & ebullientis, ut in præparatione cornu cervi philosophica officinarum fit, sunt scissilia.

Dum quotidie tepidos potus aquosos forbillant puellæ, quam debiles, quam flaccidæ sunt! In libro de liquidorum usu Hippocrati adscripto ( *Cap. 2. Tom. 6. pag. 441. & Aph. 16. Sect. 5. Tom. IX. pag. 203.* ) noxæ recensentur, quas calida copiosior adfert utentibus facit nempe *carnium effimationem, nervorum impotentiam, mentis stuporem, hæmorrhagias, animi deliquia.*

Debilitas fibræ in facile separabili cohesione partium consistit, sed aquæ elementa parum admodum cohererent: hinc forte si binæ vel plures aquæ particule se interponant elementis fibrarum, videtur inde debilior reddi fibræ; si vero singulæ hæreant aquæ particule inter elementa fibrarum, multo inde rigidiores sunt: elementa enim aquæ sola seorsim considerata videntur esse durissima & immutabilia, & miro modo crescere possunt cum aliis corporibus, ut in explicatione §. 21. demonstratum est: hinc forte ratio deduci potest, quare partes animalium aqua madefactæ fiant molliores; exciccatæ iterum longe fiant rigidiores, quam antea fuerant. Posse autem aquam se insinurare inter elementa corporum & illa a contactu remove docuerunt experimenta: chartarum lacinia aqua madefactæ fere sexta parte fiebant longiores. ( *Atadem. des Sciences Paris 1714. Mem. pag. 71.* )

Similem ob causam pingua mollire solidas partes plurima docent experimenta: rigidissima animalium coria, oleo penetrata, mollescunt; ut debitam flexibilitatem retineant muscoli, vaginis oleosis undique vestiuntur; ne rigescant ligamenta, attenuatum medullare oleum illis affunditur: dum in decrepita senectute illud oleum incipit deficere, quanta rigiditas! Dum in obesissimis abundat, quanta laxitas, quantas tumor totius debilitatæ compagis!

**CUR FRIGIDIS.** Intelliguntur hic frigidi temperie: frigus enim absolute consideratum elementa ad se invicem adducendo roborat. Sed in frigida temperiei hominibus minor est circulatio, sanguinem habent minus pressum, cruda minime mutata, elementa ultima minori vi ad invicem applicata; hinc minus cohererent.

**JUNIORIBUS.** In prima otigine sua Em-

bryo humanus infinitæ parvitate fere nucleola est: auctus dein, & jam sensibus observabilis, mucis intiar collabatur, nisi liquidæ ambientis pressione æquabili sustineatur. Recens natus infans mollis totus & pulposus omnia adhuc ossa flexilia habet; procedente ætate firmior fit sensum; hinc quo origini suæ propior homo est, eo molliores habet omnes partes suas: hinc fibræ ejus, licet debitam firmitatem habeant in hac ætate, comparatæ tamen cum adulti hominis fibris debiles dici possunt; hoc autem requirebatur, ut in omnem dimensionem facile extendi posset corpus humanum, ex tantilla molecula in tam magnam molem extenscens.

**QUIESCENTIBUS.** Vide §. 25. num. 2. Dum nolunt a languidis suis morbis curatæ puellæ, per salubrem ferri usum, exercere corpus, quam cito telabuntur in pristinum languorem! languentes hydropicos laborare iussit Hippocrates; acutis morbis decumbentibus absolutam imperabat quietem: in his enim nimia vitæ incitatio per febrem æstivitas consumebat omnia liquida, solida reddebatur sicciissima, hinc tota fere cura acutissimorum morborum in eo consistit, ut diathesis ad hydropem inducatur, id est, major debilitas.

**CRESCENTIBUS.** Humores pulsi per canales conicos plenos a basi versus apicem semper conantur producere latera suorum canalium secundum axim longitudinis: quamdiu cedere possunt & elongari canales ab hac vi, crescit homo: hinc requiritur minus firma cohesio, ut cedere possint; sed videmus incrementum omnium velocissimum, dum origini suæ propior est homo, & tunc fere non resistentia solida habet: crescit enim intra novem menses ex flamine omne pressum fugiente in molem sedecim imo viginti aliquando librarum.

Sed & observamus in juvene, nondum incrementi apicem adepti, natam febrem facile adhuc elonganda vasa producere sensibili admodum saturæ augmento. Requiritur ergo ad incrementum minus firma fibrarum cohesio, ut cedere possint: dum ergo valido labore nimis duraverint juniorum corpora, incremento obex ponitur ante tempus. An ideo, qui caniculos nutriunt, parvitate suæ puellis gratissimos, illis junioribus quotidie vini spiritum ingerunt?

**CUR TERRESTRIA ET AUSTERA.** De au-  
Actis

# §. 30. 31. MORBI FIBRÆ DEBILIS, ET LAXÆ. 29

steris dictum fuit §. 28. n. 4. nempe talia corpora videntur per experimenta prædita esse tali vi, ut elementa nostrarum fibrarum ad se invicem propius faciant accedere. Terrestria autem illa bibula corpora attrahunt omnia humida, quæ possunt attingere; & deinde concrelescunt cum illis firmissime: sicut tabacaria recens excocta, nulla crusta vitrea obdusa, labiis admota, mox pertinacissime coheret, sic ut vix sine læsione avelli possit. Cum ergo aquosa, ut ex ante dictis paruit, debilitent fibras; illa, quæ aquam absorbent, inter roborantia recenseri possunt.

**CUR CALIDIS.** Calor externus corpori applicatus omnia debilitat; facit enim elementa fibrarum plus distare a se invicem: hinc fibras reddit debiliores. Sed hic intelliguntur calidi temperie in quibus densi & compacti humores satis valido motu pelluntur per vasa: in his semper vis assimilans ingesta fortis est, & efficacissima applicatio elementorum fibrarum ad se invicem. Ab his autem robur fibrarum pendet.

Quantum interit inter calorem excitatum per validum corporis motum, & calorem foci, docemur ubique. Qui hyeme prope focum frigus pellit, surgit iners & debilis; qui valido motu corporis aeris frigus superare potuit, alacris & agilis manet.

**EXERCITATIS.** Dictum fuit de hac re §. 25. n. 2. dum duro labore victum sibi & suis comparat rusticus, quam firma habet omnia, quam robusta! Omnes aeris injurias spernit, durissimos vorans cibos digerit perfectissime: otio & luxu perditus homo quam debilis, quam misere vivit! Minimam aeris ambientis mutationem sentit illico; & milenis gulæ irritamentis, quæ satietas, non

fames, invenit, vix potest languentem excitare ventriculum.

**CUR ELASTICITAS &c.** Elastica dicuntur corpora, quæ distracta redeunt in tot puncta contactus, quot ante distensionem habebant: hic requiritur valida vis, quæ partes distractæ se mutuo trahant: sed in hac vi consistit fibrarum robur.

Exemplum sequens hanc rem illustrat. Bini magnetes sibi mutuo applicati cohererent: si parum removeantur a se invicem, sed maneant tamen in tali distantia, in qua in se mutuo agere possunt, iterum ununtur: sic & corporis elastici partes distractæ a se invicem, ablata causa distrahente, iterum se mutuo attrahunt, & manet pristina cohesio: dum debili leucophlegmaticæ puellæ premitur digitis pars corporis, pastacea mollior cedit, & vix, nec nisi lente, resurgit: si valido homini idem fiat, elasticae partes mox se restituunt.

Sic jam descriptus fuit morbus simplicissimus, & data fuit methodus, per quam ejus indolem cognoscimus; Dein enarratæ sunt causæ, quæ illum faciunt: Apparuit porro, quinam effectus præter naturam hic soleant oriri; quomodo ex cognita historia morbi, per sua signa descripti, habeatur indicatio, quæ docet, quomodo & per quæ Medicus debeat agere, ut sanet. Tandem ex omnibus illis deducta fuerunt quædam Corollaria generalia.

Raro autem sola debilitas fibræ solidæ simplicis peccat, sed plura mala simul: sed tamen hæc debebant sic abstracte considerari, ut liquido intelligerentur; unde supponebatur homo perfecte sanus, sed qui momento post haberet a quacunque causa fibras nimis debiles.

## MORBI FIBRÆ RIGIDÆ, ET ELASTICÆ.

§. 31. **R**igiditas fibræ nimia est illa adunatio partium minimarum (21), quæ tam valide faciat eas coherere, ut non cedant illi actioni fluidorum, quæ superare debet hanc resistantiam, ut maneant Sanitas.

Tota nostra vita & sanitas pendet ab eo, quod omnes fibræ omnium arteriarum sint adeo flexiles, ut a sanguine, cordis vi musculari expello, possint sic distendi, ut capiant illum sanguinem expulsum: dum enim cor est in sua diastole, arteriæ & venæ plenæ sunt, aliter non daretur propulsio continuata sanguinis. Momento post cor in sua

systole expellit sanguinem in arterias plenas, & per has in venas etiam plenas: hinc si vasa illa infinita vi resisterent suæ dilatationi, nec sanguis tamen sit adeo compressibilis, non posset cor evacuari: actum ergo esset de vita. Requiritur igitur fibrarum, hæc vasa constituentium, talis laxitas, ut possint cedere distendenti sanguini, a corde expulso.

# 30 MORBI FIBRÆ RIGIDÆ, ET ELASTICÆ. § 31. 32. 33.

expulso in plena hæc vasa. Quo jam sunt rigidiores hæc fibræ, eo maior sit resistentia.

Hinc, æque ac in fibra debili dictam, non potest dari absoluta definitio fibræ nimis rigidæ, & nimis perseverant:

§. 33. **H**Æc (31) sequitur eas causas, quas requirit sanatio fibræ debilis (28), si diu, & nimis perseverant:

Fibræ nimis debilis historia præmissa est, quia curatio hujus morbi dat intellectum causarum fibræ nimis rigidæ. Omnia ergo in cura fibræ nimis debilis hic repetenda sunt: sed unicum exemplum sufficit.

Moderatus labor corpora roborat: nimius

exsiccat, & omnia rigida facit. Dum a teneris annis jam nimis laboribus coguntur corpus exercere rustici, sæpe quadragesimo anno jam exsucci, & rigidi marasmo senili pereunt, ante ætatem incurvo corpore vera facti silicernia.

§. 33. **N**Ata (31) vero facit vasa, quæ ex his sunt, minus flexibilia, angustiora, breviora, liquidorum motui nimis resistentia, & quæ hinc sequuntur; vid. (50. 51. 52. 53.)

Vasa nostra semper renituntur suæ distensionis: hinc illorum capacitas pendet ab excessu virium distendentium supra hanc contractilitatem. Quando ergo increfcit hæc vis contractilis vasorum, eademque manet vis distendens, plus contrahentur vasa, id est, fiunt angustiora. Ultimus hujus morbi gradus est, quando vasa nullo modo cedunt liquidis distendentibus; hinc suffocatur illico motus sanguinis, & fit placidissima illa senilis mors, dum in ultima senectute rigida facta omnia resistunt fluidis impulsis. Simulac quacumque de causa liquida minuantur, robur vasorum sic coarctat vasa, ut plena maneant quidem, longe minus tamen distenta.

Homo potest intra 14. dies in febre acuta continua dimidium sui ponderis perdere contractis sic vas, prout minuitur liquidi copia. Hoc evidenter patet, quia omnia animalia, in quibus augetur robur fibrarum, habent vasa magis contracta.

Dum pastu abundans in stabulis quiescens equus, hinc pinguior factus, sensim aucto motu validis tandem quotidie exercetur laboribus, forte tertiam sui ponderis partem amittit: longe tamen ad labores ferendos erit robustior, & per hosce labores consolidatis vasorum fibris, licet postea quiescat in stabulis, non tam cito pinguescet iterum.

**BREVIORA.** Impetus liquidi impulsus per canales conicos flexiles nititur elongare hos canales; hinc quandiu fibrarum cohesio hoc patitur, elongantur: docet hoc juniorum incrementum tam notabile, post morbum acutum tolerarum. Memini me vidisse, dum uno ictu cunei fortis & acuti abscedebatur magnus pedis digitus, statim extra æquabilem vulneris superficiem promississe binas arterias, fere ad lineæ geometricæ longitudinem: tantum elongabantur hæc vasa in loco ram diffiso a corde. Quando nimia oritur fibrarum rigiditas, non patiuntur se elongari; imo tandem, prævalente fibrarum robore, accurtantur: Patet in senibus, qui revera decrefcunt.

**LIQUIDORUM MOTUI** &c. Dum cor pellit per arterias sanguinem, pars impetus a corde communicati impenditur dilatandis arteriis; reliqua pars sanguinem propellit per arterias. Si ergo arteriæ fiant minus facile dilatabiles, i. e. rigidiores, plus de motu a corde communicato impendi debet dilatationi arteriarum, minus impendetur sanguinis propulsioni. Hinc patet evidenter, quare fibræ nimis rigidæ augcant resistentias liquidis movendis.

Sed a debito motu humorum per vasa pendunt omnia in corpore humano: hinc infinita possunt a tam simplici causa oriri mala, de quibus postea in numeris citatis.

§. 34. **E**X quibus (31. 32. 33.) ipsis internoscutur id malum (31.), si, malque prævidetur inde secuturi effectus (33.), neque latet Cœratio.

Ex



§. 34-35. MORBI FIBRÆ RIGIDÆ, ET ELASTICÆ. 31

Ex tribus §§. præcedentibus facile colligitur diagnosi, quæ docet, an fibrarum nimia rigiditas addit? si enim videamus hominem esse macilentum, os internum & fauces habere sicciore, totam cutim externam esse aridiorē, omnes articulationes minus flexiles; & manere hæc omnia, licet implentia adhibeantur corpori; concludimus, solida nimis firma esse, liquidis prævalere, illa celerissime diffilare. Sunt tales homines macilenti penitus, & simul voracissimi, qui omnia assumpta digerunt velocissime, & de corpore distant.

Si jam novimus in victu & medicamentis adhibita illa esse, quæ in curatione fibræ nimis debilis enarrata sunt, prævidemus, hunc morbum nimis rigiditatis futurum.

Prout jam hæc rigiditas nimia in parte vel in toto fit, varii & mirabiles oriri possunt morbi: observationes enim medicæ docuerunt, omnes cognitos canales nostri corporis rigescere posse, sæpe a causis adeo subtilibus, ut nulla ratione possint detegi.

Sic aliquando digitus, aliquando brachium integrum ita sensum decrefcit & aridum fit: si enim resistentia vasorum a quacumque

causa fiat major, minor erit extensio: hinc lentissimus marasmus. Vidi feminam nondum quadragenariam, cui sine ullo vitio sensibili corporis, siue ulla suspitione internæ suppurationis, sine ulla evacuatione sensibili aucta, intra biennium lento marasmo tam exsuccum redditum fuerat corpus, ut squalida cutis ossa tantum tegeret. Forte similes morbos vocaverunt veteres Medici *in ussu yīpas* (Gal. Method. Med. Lib. VII. cap. 6. Tom. X. pag. 167.) ex morbo senescentem.

In observationibus suis Anatomicis accuratissimis Santorini (cap. 3. §. 14. pa. 64.) narrat, dum scrutabatur cadaver hominis, cui dexter oculus vera amaurosi dudum laboraverat; invenisse se nervum opticum ejusdem lateris æquo graciliorem, & colore obscuriorem. In hoc casu videtur a latente causa nimia rigiditas forte orta fuisse in nervo optico dextro. Idem fit in aliis organis sensuum, vel in visceribus, infiniti diversi morbi oriri possunt.

Ex illis omnibus jam facile inveniantur auxilia ad nimiam rigiditatem tollendam apta, quæ recensentur §. sequenti.

§. 35. **H**æc enim efficitur 1. cibo & potu aquosis, lenibusque, sero lactis imprimis, oleribus mollissimis, te in aere humido frigidiusculo, cum somno pleniore. 3. remediis aquosis externis, internisque, tepide applicatis vel assumptis, insulsis, levissimis & blandissimis oleosis, similiter adhibitis.

1. CIBO ET POTU AQUOSIS &c. Vocamus potum aquosum vel aquam ipsam, vel omnem potum, in quo aqua prædominatur. Cibos aquosos vocamus omnes illos, in quibus aqua maximam partem constituit: ut sunt pulcullæ, carniū iuscula & similia. Omnia hæc assumpta magnam aquæ copiam, interno corpori applicant, per omnia vasa deducunt, omnia emolliunt, omnia lubricant; hæc enim aquæ, & imprimis tepidæ virtus est, ut partes animalium durissimas possit emollescere: sic cornua, ungues, imo ipsa ossa aqua tepida possumus mollia reddere.

Hinc videmus, omnes illas gentes, quæ calidissimis locis viventes strictissima habent corpora, aquam & aquosa sola fere appetere. Non mirum debet videri, quod serum lactis hic commendetur, cum lactis usus ad roborandas fibras nimis debiles antea laudatus fuerit: sed in sero lactis abest jam subtilissimum illud spirituosum, abest pars

caseosa; superest sola pars aquosa graninis vi dissolvente dives. Imprimis laudatur ad hos usus serum lactis ebutyrati, omni pinguedine butyracea orbū, acidulum; quod hinc in morbis acutis tantum usus est. Huc etiam referuntur omnes succi fructuum horarum bene maturi.

OLERIBUS MOLLISSIMIS. Omnia hæc recensita sunt in Materia Medica Celeberrimi Auctoris: & in omnibus his fere nec magnus odor nec sapor est, sed aquosam quasi mucilaginem emollientissimam exhibent. Iuscula inde facta strictis illis atrabilariis corporibus adeo salubria sunt.

FARINOSIS DILUTIS. Dum strictissimis corporibus, in quibus semper sunt densi & compacti humores, ingeritur aqua, distillatur illico, nec diu manet in corpore. Hoc torres dolemus in morbis acutis, quod aqua ingesta illico per sudores vel urinam dilabatur; sed aquæ addiderunt farinosa illa in Materie Medica descripta hoc efficiunt.

At, ut semel ingesta aqua farinosa hoc lentore plus quasi hæreat, non tam cito expellatur de corpore. Hæc videtur esse ratio quare Hippocrates (*De vitæ Acutor. Morbor. Tom. XI. pag. 102.*) aque potum damnet, in acutis, dum in eodem libro pituitæ usum adeo laudat. Omnia hæc farinosa lentorem aque conciliant, atque recto & aque miscibili oleo (quod purum ex illis exprimi potest) emolliunt omnia. Solum certe avenæ decoctum, magna copia potatum quotidie, sic solvit torus corporis robur vel in validissimo homine, ut totus inde langueat. Sola farina, sero lactis vel aqua subacta, fues adeo laxos, adeo pingues noverrunt reddere rustici.

Plurimi in his locis de plebe homines sedentarios labores, nec validos, exercentes, interim his farinosis fere solis vitam sustentantes, laxissima semper habent corpora.

NEC FERMENTATIS. Idem de succis fructuum horarum verum est: nam & inter remedia fibræ debilis recensentur merito spirituosa fermentata. Per fermentationem enim ex omnibus his nascuntur liquida illa spiritiosa, quæ ad summam perfectionem redacta, ignis fere inflat, omnia solida corporis comburant, & sanguinem densant in massas irrefolubiles.

2. QUIETE &c. Motus muscularis præcipuum remedium habebatur ad curandam fibræ nimis debilem; non mirum ergo si quies contrarium faciat. Qui citissime volunt faginare animalia, illa semper ab omni motu prohibent, largo dato simul pabulo. Hinc in morbis acutis, ubi omnia adeo exsiccantur, quietem summam, imprimis in aere frigidiusculo & humido, imperaverunt veteres Medici: frigidus enim & siccus aer roborat fibras.

Nihil autem magis laxat corpora, quam tepor lecti, dum somno largiori indulgent ægri, hærent enim sic in proprio vaporum de corpore exhalantium balneo. Hinc omnia animalia a somno tument. Dixit ideo Hippocrates (*De victus ratione Sanorum Lib. II. cap. 10. Tom. 6. pag. 474.*) Longiores vero somni calefacientes colligunt carnem, & corpus dissolvendo resoluunt, & inebellum reddunt.

Et alibi. (*De Affectionibus cap. 12. Tom. VII. pag. 632.*) in quibuscumque morbis siccitas confert, conducit quam minimum dormire. Quibus vero humiditas confert, non debent mediam pati, nec cibo aut potu indigere,

neque laborare, & dormire quantum volunt.

3. Præcipuum inter hæc, & reliquorum omnium basis est aqua: quæ tepida, & in vaporibus resoluta, vel durissimas animalium partes sic emollire potest, ut dissiluant fere. In morbis acutis, ubi sæpe aridissima cutis, contractis penitus valis exhalantibus, nihil transpirat, frustra nituntur calidissimis remediis exhibitis provocare sudorem; dum vero nudato corpore tepidæ aque vaporibus exponuntur ægri, resolutis vaporum oculis, madescit cutis, & brevi post sudoribus dissilunt. Cum autem in his morbis interna aqua sicca sint, ac externa cutis, per clysmata similia injiciuntur, aquosa cum farinaceis decocta exhibentur, ut emolliantur omnia interna: imo dum nimis diu aquosis his debilitant corpus, sæpe oppositum malum, hydropem nempe, inducunt.

Omnia hæc aquosa debent applicari tepida: frigida enim densant fibras & roborant; nimis calida sanguinem coagulant, & in crustam gangranosam solida comburant.

Omnia autem hæc insulsa debent esse, quia sales omnia indurant: docent hoc carnes salitæ. Summum simul auxilium dant.

OLEOSA BLANDA. Certe cotia animalium aqua madefacta fiunt flaccida; sed postea exsiccata plus rigescunt: si vero cum oleo perfricentur, manent diutissime mollia: plus enim adhæret, nec tam cito diffilatur oleum. Dum spasmo contractæ intestinorum fibræ horrendos illos faciunt cruciatus, mollissima olea, ad libras usque potata, & per clysmata injecta, solvant hoc strictum laxatis fibris.

In morbis acutis, ubi summa ariditas, & nimium solidorum robur per morbum nascitur, vel sæpe præexistit, egregie hæc conducunt, nisi auctus calor facile ranciscentia hæc olea corrumpet, & ex blandissimis faceret acerrima: sed tunc decocta ex farinosis illis, in Materia Medica recensitis, oleorum vicem pulchre supplent: ex omnibus enim illis, imprimis siccatis, prælo potest exprimi purum & copiosum oleum, quod in decoctis horum mucilaginis unitum sic latet, ut integram vim emolliendi, quam olea habent, servet, sine ullo metu futuræ ranciditatis.

Dum topicum hæret in quodam articulo, rigi-

§. 35. 36. 37. MORBI FIBRÆ RIGIDÆ, ET ELASTICÆ. 33

rigiditatis nimia vitium ( sæpe enim anchylofes sunt a nimia duritie ligamentorum, qua non pariuntur se extendi, ut flectatur articulus ) optimo cum successu curatur, dum pars affecta lixivio saponis bene perfricatur undique, ut tota terfa nitida & perspirabilis sit; & tunc vaporis tepide aque exponatur sæpius de die; porro exsiccata pars mollissimo inungatur oleo; & dein lenis fiat distractio nimis rigidorum ligamentorum, flectendo articulum. Inter causas enim fibræ debilis recensebatur nimia distractio: hinc post hæc præmissa summo opere prodest distendere nimis rigidas partes.

Dum volebant emaciari partes ad pristinum reducere habitum Veteres, irritabant hæc loca, ut levis fieret inflammatio, & tumor: sic enim majori impetu & celeritate huc delati humores plus distendebant vasa nimis stricta. Dum autem hoc sæpius fieret, nimium robur vasorum sic minuebatur, ut cederet humoribus, ex lege sanitatis influentibus; atque ita redibat pristina torofitas: sic frictione a somno cum pinguibus multis longo tempore macie tabescentes paucis diebus facile carne implevit Galenus. ( *De Sanitate tuenda Lib. V. cap. 3. Tom. VI. pag. 123.* )

§. 36. **H**inc elasticitas nimia intelligitur, curaturque, quippe rigiditatis (31) ut plurimum comes, & effectus.

Explicatum fuit, quid sit rigiditas quæ semper cum elasticitate eadem proportionem progreditur; perfecte enim rigidum corpus, quod nulla vi flecti posset, non facile invenitur. Hinc cum elasticitas ( ut dictum fuit in §. 29. ) pendeat ab illa vi, qua partes fibrarum constituentes nituntur ut cohereant,

Hinc frictiones quidem hic conveniunt sed cum pinguibus, & tautum ut fiat levis rubor, si enim ultra pergas, discutitur illud, quod frictio attraxit ad partem; hinc autem requiritur distensio major vasorum nimis fortium; hoc sollicite monuit ( *Method. Med. Lib. VII. cap. 6. Tom. X. pag. 162. etc.* ) Galenus dicens. *Ideoque ubi carne implere quodlibet corpus volumus, id eo usque calefaciendum nobis est, dum intumescat: ubi vero discutere & vacuare cupimus, continuandum est eo usque, dum quod intumuit, subsidet.*

Sic alibi ( *Method. Medendi Lib. XIV. cap. 16. Tom. X. pag. 336.* ) dicit. *Ferulas parvas ac leves modice illinis gracilibus partibus incutimus, donec modice attollantur.* Tali percussione nates pueri graciliores brevi auctas fuisse narrat dum hoc fiebat quotidie vel alternis diebus, una cum moderata picatione.

Hinc apparet, quomodo frictio oppositos habeat aliquando effectus: fortis nempe, cum pannis asperis, siccis, laneis, imprimis accenso aromatum fumo penetratis, debiles nimis fibras curat; levis frictio cum pinguibus attrahendo humores, laxando solida, fibras nimis rigidas emollit.

hæc autem vis major sit in fibra nimis rigida; patet facile, quod nimia elasticitas rigiditatem nimiam comiteretur semper.

Ex argilla molli facti globi, opposita directione morus concurrentes, quiescunt; in chibano excocti, sunt elastici, & resiliunt a se mutuo.

§. 37. **C**ur pueris, foeminis, otiosis laxitas? contra vero adultis, viris, exercitatis, fibrarum, adeoque omnium solidarum partium rigiditas? & solutarum valida contractio?

**CUR PUERIS.** vide §. 30. nondum enim in his fibræ & vasa callosa facta sunt, quod vitæ actuositate postea fiet.

**FOEMINIS.** Ab Anatomicis confirmatur, foemininum corpus, ceteris paribus, longe mollius esse corpore virili. Hoc autem a Creatoris instituto pendet, qui sic fecit corpus foemininum, ut sine multo malo possit distendi quam maxime; ut nempe fetum possint locare & nutrire;

Tom. I.

& menstruum plethoram accumulare. Multum etiam huc confert, quod plerumque minus validis laboribus exerceantur, quam viri.

**OTIOSIS.** vidè §. 25. n. 2. & §. 30.

**CONTRA VERO ADULTIS.** Quia quo diutius vixit homo, eo vires consolidantes sæpius & fortius applicatæ fuerunt fibris: hinc crescente ætate crescit fibrarum robur. Puer omnia habet flexilia & obsequiosa

C

mem-

membra, decrepitis vero senex in omnibus rigescit, nec ratio dari potest, cur hoc in viris plus fiat, cæteris paribus, quam in fœminis, nisi ex primogenita corporis fabrica ab instituto Creatoris pendente.

**EXERCITATIS.** Quid corporis exercitia possint in roboranda fibra nimis debili, dictum fuit §. 28. n. 2. Illud enim, quod vocamus tenacitatem in partibus firmis, est continuatæ vitæ effectus: sed quo minus quis morum animalem superaddit motui vitali; eo solida debiliora manent. Qui nullum opus manibus exercet, habet

manus molles & teneras; qui valide illis operatur, easdem habebit duras & callosas; tandemque immobiles & rigidas.

**ET SOLUTARUM &c.** Quando unitatis solutio fit in parte solida in corpore vivente, semper partes solutæ retrahuntur a se invicem, quia vis illa, qua coherent fibrarum elementa, necessario retrahit utrumque extremum: quo ergo hæc vis fortior est, eo major fiet hiatus partium separatarum: hinc vulnus in corpore laxo statim coalescit; in corpore rigido plus hiant vulnera inflicta, & difficilius consolidantur.

## MORBI VASORUM MINIMORUM, & MAJORUM.

§. 38. **V**asorum minimorum, ex fibris simplicibus (21. 23.), applicatu, intertextu, vel intortu, adunatis, factorum morbi ex iisdem causis eandem indolem, effectum, & curationem habent; ergo ex dictis (ab 21. ad 38.) intelliguntur.

Morbi fibrarum consideratis, hincque etiam omnium partium solidarum corporis, quatenus fibris constant, apparuit, ad quam simpliciter potuerint reduci hi morbi, qui in omnibus partibus solidis occurrunt.

Sicut jam elementa sibi mutuo applicata fibrarum solidam constituunt, sic possunt concipere fibras minimas sibi mutuo apponi in omnibus punctis laterum contiguorum, quando sic coherent secundum longitudinem tantum. Si duæ tales fibræ sibi mutuo applicentur paralelo ductu, erit membrana omnium minima; si nullæ iuxta se invicem positæ uniuntur, erit membrana latior, non crassior. Hinc membrana simplicissima concipitur constare fibris secundum longitudinem adunatis.

Robur jam fibrarum pendebat a cohesione elementorum: sed singula elementa fibræ, membranam simplicissimam constituentis, coherent cum elementis binarum fibrarum proximarum utrumque; hinc duplo majus robur fibræ aliis fibris utrumque junctæ, respectu roboris in fibra simplici.

Hinc fibrarum robur crescit, dum in membrana simplicissima adunantur. Fibræ autem, qui ultimos limites membranz simplicissimæ constituunt, cum tantum ab uno la-

tere contiguam aliam fibrarum habeant, tantum dimidio majorem vim cohesionis suorum elementorum habent, quam fibra simplex.

Dum jam intertextis, vel intortis inter se, fibris membrana constat; multiplicatis punctis, quibus se contingunt, augetur fibrarum, talem membranam constituentium, robur.

Hinc patet, illam partem membranz simplicissimæ facillime a cohesione cum reliquis posse separari, quæ marginem constituit.

Si jam concipiatur talis membrana simplicissima convolvi in vas cavum, tunc omnes fibræ inter duas alias fibras positæ sunt, & nulli tunc habentur margines; sed omnium fibrarum, constituentium membranam simplicissimam, in vas cavum convolutam, cohesio duplo fortior est, quam in fibra solida simplici.

Illud jam vas, ex tali membrana simplicissima convoluta factum, vocatur vas minimum.

Sed omnes morbi talis vasculi minimi tantum pendent a nimia, vel nimis parva vi, qua fibrarum elementa cum se invicem & cum vicinis coherent. De illis autem jam actum est in morbis fibræ simplicis.

§. 39. **V**asa majora, ex minimis (§. 38) applicatu, intertextu, vel intortu, unitis, constata habent duo diversa morborum genera. Horum prius pendet ex morbis minimi carnalis (§. 38), majorem hunc componentis, adeoque origo, natura, efficacia, curatio ejus inde (§. 38) peti debet. Posterius vero pendet,

der, 1. a vi, qua fluidum, per majorem hunc canalem fluens, ejus latera extendendo premit: quæ latera ex aliis minoribus canalibus constantia, hac pressione orbantur suo liquido, ununtur quoad latera, concrefcunt in fibræ ( 21. 23. ) solidæ, fed craffioris, speciem: poteftque idem & vicinis communicari vafculis. 2. a liquido cum vafculo proprio concrefcente.

Uti jam fibræ, adunatz fecundum longitudinem, faciebant membranam, fic poffumus concipere, vafcula minima, ex fimpliciffima membrana convoluta facta, fibi mutuo applicari, & facere membranam; quæ iterum convoluta faciet vas, non minimum; fed majus jam; non ex fibris, fed ex vafis minimis fibrarum loco conftitutum.

Cum jam vaforum horum minimorum feftio perpendicularis ad axim fit circulus, non poterunt finguli circuli adjacentium fibi mutuo vaforum fe tangere nifi in puncto: hinc vafcula vicina fe mutuo tangent per lineum, i. e. per fibræ fimpliciffimam: ergo in illis locis contactuum iterum augebitur robur talis membranæ ex vafculis minimis loco fibrarum conftatæ.

Vas ergo minimum conftabit ex fibris in membranam adunatis: vas huic proximum magnitudine, five penultimum fimplitate erit, fi ejus membrana conftet ex vafculis minimis loco fibrarum: vas antepenultimum fimplitate non conftituitur ex vafis mifimis, uti penultimum, fed ex vafis minimis: & penultimum, fed ex vafis minimis & penultimis; & fic porro, donec ad maxima corporis vafa perveniat, quæ ex omnium vaforum feriebus, quæ in corpore inveniuntur, fiunt.

Aorta, maximum vas, per injectiones demonstrata fuit conftare membranæ ex minoribus vafis, fed adhuc magnis, conftatis: horum vaforum, aortæ membranæ conftituentium, membranæ iterum aliis, fed minoribus, conftant vafculis; & fic porro, donec ad ultima perveniat. Simpliciffimas olim habitas & folidas membranæ innumeris conftare vafculis, docuit arte fua Ruyfchius.

Hinc ex multiplici concrectione laterum robur continuo augeat in vafis majoribus; & fic incipimus intelligere, unde robur & firmitas corporis humani pendeant.

Quæritur jam, quanam morbi in vafis majoribus oriri poffint, non refpectu fluidorum contentorum, fed quatenus folida funt hæc vafa? Apparet primo quod pati poffint omnes morbos vaforum minimorum, ex quibus componuntur; fed de his actum eft.

POSTERIUS VERO PENDET 1. Dum aorta a fanguine ex corde finifiro expulfo diftenditur, canales conftituentes ejus membranas comprimuntur: dum iterum ceffat cordis actio, contrahens fe aorta liberat hos canales ab hac compreffione: Sed dum omni momento fic comprimuntur vafcula minima conftituentia membranæ majorum vaforum, hæc fenfim fic incipiunt orbari fuis liquidis, ut vix detur tempus influxui, tunc concrefcunt latera inter fe; & aboleretur cavitatis, & fit membrana, fed craffior: & fortior: cohefio enim membranæ in vas convolutæ erat duplo fortior, quam cohefio fibræ fimplicis, fed dum vas complanatum concrefcit, tunc oppofitæ fibræ concrefcunt, & fiet talis membranæ, ex vafe complanato concreto factæ; cohefio adhuc fortior, quam antea.

Quo jam vis cordis major eft, & diutius egit, eo pauciora numero vafa, fed fortiora folida funt. Hinc ultima feneftræ robur folidorum fit immenfum; & tandem, cum nimis refiftentes canales non patiantur fe extendi amplius a liquidis impulfis, fit quies omnium, & fatalis, fed placidiffima, in fummo fenio mors. Hinc nimio labore exercitatis animalibus cito venit feneftræ, callofis factis ante ætatem omnibus vafis.

Ridendi ergo funt jactatores illi, qui rugas & gravem feneftrætem fe avertere poffe clamant, paucis Elixiri guttis quotidie fumtis, dum inevitabili vitæ fanæ effectû, callofis factis omnibus vafis, ad fatalem ducimur terminum.

Sapientius certe Medæcæ inftitutum, quæ balneis fovebat exfucca hæc corpora: hinc credebatur fenibus juventutem reddere. ( Palæphatus de incredib. Hift. cap. 44. )

2. A LIQUIDO CUM VASCULO &c. Quando liquidum contentum, parte liquidiffima orbatum, tandem concrefcit cum proprio vafe. Ab omni ævo obfervatum fuit, quod in morbis, in quibus ( ut dicebant Veteres ) calidum innarum prævaleret humido radicali, five ubi vis vaforum vim liquidorum diftendentium excederet, fanguis fiat talis, ut concrefcant in pellem novacula vix di-

### 36 MORBI VASOR. MINIMOR. ET MAJOR. §-39.ad 43.

scendendam incerte plastica est in liquidis nostris indoles, nec ingesta sunt humores nostri antequam illam induerint naturam: Ruyschius (*Trajecto Sexto n. 7. & Theatro 7. n. 39.*) ex suo sanguine, simplici agitatione ramulo plantæ Africanæ, fecit membranam densam coherentem.

Hinc facile intelligitur, sanguinem, inflammatoria densitate in morbis acutis jam nimis in concretionem prorum, orbatum adhuc plus parte liquidissima per morbum vim, posse con crescere cum vasis continetibus.

Sed evidens habemus exemplum, quod va-

§. 40. **I**nde vasorum debilitas, laxitas, robur, rigiditas, elasticitas, de quibus multa imperitis memorantur, clare intelligi possunt. Et meretur dignitatem horum pertractationem.

Omnia hæc jam explicata sunt, recententur tantum hac paragrapho, ut exhibeant quasi summarium omnium illorum quæ ex

### MORBI VISCERUM DEBILIUM, ET LAXORUM.

§. 41. **V**asorum, & viscerum debilitas hæc constituentium, cohesio, quæ tam levi motu tolli potest, ut imparia sint iis efficiendis, quæ Sanitatis &

simplici hac doctrina intelligi possunt: sequentia capitula docebunt, infinitos morbos inde posse cognosci & curari.

vocatur illa partium (23. 38. 39.) quæ tam levi motu tolli potest, ut imparia sint iis efficiendis, quæ Sanitatis & Vitæ ratio ab his postulat.

Viscus solet plerumque definiri, quod sit pars organica corporis, quæ humores allatos per suam fabricam plurimum mutat, sic ut hæc mutatio proferat totius corporis vitæ & sanitati. Sic pulmo viscus est, accipiens omnem sanguinem, & mutans sic, ut aptus evadat fluere per omnia corporis vasa. Sic etiam cor omnem sanguinem recipit, & mutat in motus directione & miscela: idem de reliquis visceribus verum est.

Constat jam per Anatomicas injectiones omnia viscera constare vasis innumeris, va-

rio ordiuntur in variis visceribus dispositis; & ab his vasis viscerum actionem pendere, qua mutant allatos humores. Si ergo hæc vasa debiliora sint, quam requiruntur ad sanitatem, minus agent in contenta fluida, minus illa mutantur. Sic debilis nimis pulmo non poterit chylum mutare in bonum sanguinem. Si nimis laxum hepar fuerit in suis vasis, sanguis per illud viscus sine bilis secretionem fluat & refluat, & nascetur hydrops: Dum nimis debilis ventriculus languet, totum chylosificationis opus turbabitur.

§. 42. **Q**uæ alia ætate, atque sexu alia, sunt.

**ÆTATE.** Viscera omnia robur accipiunt, sensim auctum, prout vitæ vires diutius in hæc egerunt. In prima hinc origine debilissima omnia diffundunt, sensim major accedit firmitas, donec omnia in summo senio rigescant fere. Jam inter maximam illam debilitatem & maximam firmitatem infiniti gradus medii intercurrunt vario vitæ nostræ tempore.

**SEXU.** Viris enim hanc legem imposuit Deus, ut in sudore vultus panem lucrentur suum; feminis vero, ut sæctus concipiant, pariant, & nutrant. Apud illas gentes, quæ potius naturæ consilio quam legibus vitam suam moderantur, idem obtinet: ad hæc autem in diverso sexu varium robur requirebatur.

§. 43. **H**æc debilitas oritur 1. ab debilitate fibræ (24), ejusque causis. (25) 2. a debilitate canalium minimorum (28), atque causis hujus (38); 3. ab inertia liquidi per vasa majora (39) fluentis, quæ pendet a minuta copia, fluiditate aquo.

aqueosa aucta, motu musculari torpesciente. 4. A numero magno canalium minimo-  
rum, pro ratione ætatis, nimis diu remanentium.

Duz priores causæ jam sunt explicatæ.

3. Tota actio omnium viscerum pendet ab eo, quod liquida, vi cordis pressa, dilatent arterias; hæc, suo robore & elasticitate reagentes, promoveant dissidentes humores; sed motum semel impressum servant diutius omnia illa, quæ sub eodem volumine plus massæ corporeæ habent, idest, quæ sunt solidiora.

Requirebatur ergo in liquidis, cordis vi motis, certus soliditatis gradus, ut motum impressum non tam cito amitterent. Ubi illa debita soliditas abest, dicantur inertes esse humores: sed hæc soliditas conciliatur partibus constituentibus nostrorum humorum per efficaciam vasorum per quæ fluunt: sed hæc efficacia est illa vis, qua dissenta vasa reagent in humores dissidentes. Dum ergo minuta nimis liquorum copia non satis dissidentur vasa, minus reagent; hinc languent omnia & debilitantur. Ob hanc etiam causam ubi per vulnera, vel alias causas quascunque, ingens liquorum copia subducta est, ex ingestis non fit solidus ruber sanguis, sed omnia in aquosam degenerant tenuitatem.

FLUIDITATE AQUOSA AUCTA. Fuerunt quidam Medici in illa opinione, ac si tunc foret omnium perfectissima corporis conditio, quando omnia liquida nostra essent tenuissima, hincque per omnes canales expeditissima esset via: sed alia lege factum invenitur corpus humanum: Respondent diversis vasorum seriebus proportionalis crassitiei fluida; Si enim sanguis noster aquæ tenuitatem haberet, per patula in superficie corporis interna & externa vasorum exhalantium orificia dilaberetur, vel repleantur omnia cava corporis loca humoribus, tenuioribus quidem, sed non propulsis. Sanguinis enim pars crassissima rubra in arteriis & venis maximis, rubris nempe, semper manens in sanitate, momentum motus ad vitam & sanitatem requisiti a binis causis motricibus, corde & arteriis, recipit, & reliquis communicat; ab hac parte rubra,

ad sua vasa continentia attrita, calor noster producit; simul ac eum illud rubrum incipit deficere, omnia frigent. Docent hoc leucophlegmatici, & pallido morbo languentes puellæ.

Hinc adorandus Creator cerebri medullæ, collectæ in medullam oblongatam, circumposuit majora vasa, rubra, ut tenuissima hæc vasa, in quibus omnis attritus desinit, foveantur blando tepore.

Ergo inter debilitatis viscerum causas merito recensetur aquosa humorum fluiditas.

Robusti hominis de vena saliens sanguis in scissilem coherentem massam statim con- crescit: dum debili puellæ sanguis mittitur, subrubella, tenuis, vix concrefcens, effluit aqua.

MOTU MUSCULARI TORPESCENTE. De hac re dictum fuit §. 25. n. 2.

4. Constat certissime, quod in quavis ætatis diversitate requiratur certa callositas, & vasorum quorundam abolitio. Anatomici observaverunt, iniectiones felicissimo successu semper factas in junioribus. Videmus sic procedente ætate, multa aboleri vasa.

Glandula thymus, adeo insignis in recens natis, in adulto homine adeo decre- scit, ut vix sui vestigium relinquat. Quæ plures infantes successive plenis lactei ne- cularis fontibus nutritivæ mulier, annosa & strigosa facta, flaccidas, vix mammarum nomine dignas, habet pelliculas. Glandulæ vagæ mesenterii in proveciores ætatis ho- minibus abolentur penitus.

Magnum enim robur addit partibus fir- mis corporis, quando plurima vasa mini- ma compressa concreverunt in fortiores membranas: hæc autem concretio nascitur a valido motu, quo liquida feruntur per vasa majora; Ergo quo fortior fuerit ille motus, vel quo diutius egit, eo major con- solidatio corporis. Hinc in recens nato ho- minis maximus canalium numerus; sed laxa totius corporis compages: in adulto homine, pluribus vasis abolitis, major fir- mitas.

§. 44. **A**B hac debilitate (41), per suas causas (43) producta, oriuntur multi morbi, qui falso Temperiei, vel Congeniti; habentur; primarii sunt: facilis vasorum dilatatio, tumor; facilis horum compressio, inanitas; liquidi stagnatio; Cordi aucta resistentia: liquorum cruditas; spontanea corruptio ad actio-

nes vitales, animales, naturales exercendas ineptitudo; & illa omnia, quæ ex his sequi solent, quæ ut infinita numero, ita difficillima curatu, & secundissima novis morbis producendis sunt; maxime *καχεξία*, & *κακοχολία*. 2. Facilis vasorum dissolutio ab internis, externisve causis, acerbis vel motis; effusio, stagnatio, corruptio, evacuatio liquidi ad vitam sanitatemque necessarij; intercepto motu fluidi per vasa rupta; corruptio eorum, quæ hoc motu vigeant; qui rursus varij sunt, maxime *Θσίνος*, *εμπύημα*, *σπράγμα*.

Supponitur hic iterum corpus antea sanum nunc habere viscera & vasa nimis debilia: tunc apparent mutationes læsarum functionum, præcipue sequentes in textu enumeratæ.

Cum videatur unicuique homini sua esse & singularis sanitas, & diversa corpora hominum penitus inter se varia esse, tam in solidis quam in fluidis, appareat, licet singula sana sint, vocaverunt illam constitutionem singularium corporum, qua differunt ab aliis corporibus etiam sanis, *ιδιοσυγκρασίαν*; & quæ inde pendebant aliquando vita, habebantur incurabilia, quia jam a prima origine facti corporis credebantur adfuisse: sed morbos illos debilium nimis vasorum & viscerum non semper congenitæ conditioni adscribere possumus.

Nobili de stirpe ortæ puellæ, molliter educatæ, otiosa defluit vita; languet debile corpusculum: primis vitæ mensibus prioris similis rustica a teneris jam assuetior laboribus viget firmo corporis robore.

Debilis prioris, & morbi inde pendentes, falso habentur pro congenitis.

Dum robustissimus homo per vulnus omnem fere sanguinem amisit, fit hydropicus: quanta tunc sic distæ vulgo temperiei mutatio!

PRIMARIJ SUNT FACILIS VASORUM DILATATIO, TUMOR. Quomodo viscera quælibet conficiant humores suos, disputatum fuit a nata Medicina huc usque; nec multum boni dixerunt Auctores: donec *Ruy-schius* demonstraverit ubique in visceribus esse ad fines arteriarum aliam conformationem in variis locis; & videtur viscus factum esse ut hæc conformatio arteriarum maneat: si jam arteriæ fiant nimis debiles in quodam viscere, plus dilatantur necessario, cum eadem vis impulsu liquidi distendat vasorum latera minus resistentia: hinc non conficiunt viscera debilitata tales humores, quales in sanitate, sed longe alios; unde turbabitur totum corpus. Sic simul ac fabrica hepatis mutatur, non fit bilis,

sed longe alius & degenerans liquor; ut cetera docuerunt observata. Laxata renum vasa sanguinem transmittunt levo urina.

Sed dilatata vasa tumorem faciunt majorem torius, vel partis: debilia enim vasa & viscera habentes, faciem habent inflatam, buccas tumidas, fungosi toto corpore, ut bombyces, quando se parant ad fræ explicanda; hinc dum incipit sensim hoc malum subrepere, sæpe quasi aucto corporis habirus latantur.

FACILIS MORUM COMPRESSIO ET INANITAS. Vasa hominis robusti sibi commissa contrahuntur quidem, ut minuant cavitatis suæ diametrum, sed non collabuntur flaccida: imo contractioni, quæ naturali major est, valide resistunt. Hypodermi cruri impressa vestigia manent; in sano vero & robusto homine statim pars pressa reasurgit.

LIQUIDI STAGNATIO. Cordis enim vis fretota impenditur dilatandis arteriis: si jam debilitatæ arteriæ, a sanguine per cordis vim impulsu distentæ, se non satis contrahant, manebit sanguis immotus in vasibus dilatatis: binæ enim cruxæ sunt, quæ liquida nostra per canales suos movent: 1. Cordis vis, distendens impulsu sanguine vasa; 2. robur & contractilitas vasorum, cessante cordis actione, propellunt impulsu a corde sanguinem: ubi ergo hæc contractilitas vasorum deficit, liquida stagnant.

CORDI AUCTA RESISTENTIA. Hoc nimirum forte videtur, cum vasa debilitata facilius cedant impulsu a corde sanguini; sed dum arteriæ debilitatæ non satis valida systole contrahuntur, manent distentæ & plenæ; hinc momento sequenti cor non potest tam facile se evacuare in vasa plena & distenta jam nimis. Quotidie videmus tumida illa & pallida corpora, dum quiescunt, se satis bene habere; ad minimum vero motum anhelant, cor palpat, venæ jugulares tument, suffocantur sere: dum enim quiescentibus parca copia sanguinis venosi, lente moti, ad cor deferantur, illud adhuc exprimitur, sed per motum corporis san-



#### §. 44. MORBI VISCERUM DEBILium, ET LAXORUM. 39

sanguinis venosi celeritate auſta cor non valet tam cito acceptum ſanguinem per vaſa repleta pellere.

**LIQUIDORUM CRUDITAS.** Omne, quod aſſumimus, vocatur crudum, quia noſtris liquidis alienam naturam habet, nondum a viribus vitæ ſubactum: dum autem viſcera debilitantur, illorum vires ſingulares pereant, quibus conſpirant ad mutanda ingeſta in noſtram naturam: ut enim bona ſit chylopoieſis, requiritur imprimis ut omnia viſcera chylopoietica ſua fabrica conſectos aſſiſtant humiores: requiritur ergo ut tales conſecerint: ſi ergo debilitata fuerint, degeneres a nativæ indole humores aſſiſcant: unde totum turbabitur chyliſtationis opus. Sic debile virginis, Chloroſi laborantis, corpus ex aſſumtis vel optimis alimentis non facit bonum ſanguinem; ſed pallidum quemdam humorem, ac ſi multum lactis pauco ſanguini miſceres: & inde ſunt mirabiles degeneraciones, & morborum, inde pendentium, naturæ & variæ ſpecies. Ut ingeſta mutantur in noſtram naturam, omnia viſcera conferunt ſuam ſymbolam: ſi nunc unum vel plura debilitentur, hæc aſſimilatio deficit, & ſit aliud longe.

Hinc pulchre monuit Galenus (*Method. Medendi Lib. VII. cap. 6. Tom. X. pag. 163.*) quod conſiderandum ſit in debilibus reficiendis, *nutrimentum ſe ipſum non conſequere nec in partes diſtribuire, nec alendi partibus aſſimilare &c.*

**SPONTANEA CORRUPTIO.** Ingeſta in corpus humanum mutantur per omnes actiones omnium vaſorum & viſcerum, & aſſimilantur naturæ noſtræ; hæc mutatio vocatur (παρασκευα) coctio: ſed ſi ingeſta tam tenuis indolis fuerint, vel vires corporis adeo imminutæ, ut non poſſint ſubigere ingeſta; tunc hæc mutantur quidem in corpore, non autem aſſimilantur naturæ noſtræ: ſed ſequuntur ſuam naturam, qua in calido & humido loco ſota degenerant in corruptelam acidam, putridam, rancidam &c. hæc vocatur corruptio ſpontanea. In exemplo res patebit: dura meſſorum ilia ex pane fecalino faciunt bonum ſanguinem; ſed panis ille calore, ſimili calore noſtri corporis, ſi ſoveantur in vaſe chemico, addita aqua, in acidum peſſimum mutantur: robuſta viſcera ſuperant illam aceſcentiam: ſed debili puellæ ſi ingeratur, ibi ſuam ſequetur naturam panis ille, & aceſcens cardilias, tormina &c. faciet.

Non fit hæc degeneratio quidem in corpore debili eodem penitus modo ac extra corpus; ſed tamen aſſumta, ſi non prævalet vis corporis humani aſſimilans, ſemper tendunt in ſpontaneam mutationem.

**INEPTITUDO AD ACTIONES VITALES, ANIMALES &c.** Omnes actiones noſtri corporis quodam ſenſu dependent a miſculari motu; uniſeriales enim cauſæ mortices omnium humorum, cor nempe & arteriæ, miſculofæ ſunt; ſed hæ actiones tantum fieri poſſunt, dum aſſiſtunt boni ſpiritus: ſed ſpirituum conſectio ultimam & perfectiſſimam requirit aſſimilationem.

Itaque dum debilia nimis viſcera non poſſunt ingeſta ad ultimam elaborationem uſque perſicere, ſubtiliſſimum illud, a quo omnia fere pendunt in corpore, incipit deficere. Hinc dum incipit languere Chloroſi debilis puella, ſenſum ſubrepat inſolitus torpor, a minimo motu ingens laſtitudo, vertigo, heberudo omnium ſenſuum; quæ omnia animale ſacularem leſum ſignificant. Cor palpitans a minimo motu, pulſus mollis & debilis, reſpiratio anhelofa, vitales actiones imbecilles monſtrant; languens vel & miris modis depravatus appetitus, moleſtia ingens ab aſſumtis, tarda ſepe alvus, urina pallida, cruda, naturales functiones depravatas indicant.

Hinc apparet facile, ex hoc fonte infinitos numero poſſe oriri morbos, dum omnes functionis corporis ſic lædi poſſunt. Facile etiam inde patet curationis difficultas: debet enim reſtitui omnium partium deficientis robur; ſed hoc non poteſt fieri, niſi tantum adhuc ſuperſit de natura creata corporis, ut illud, ab impedimentis levatum, & deficientibus inſtructum, valeat bonum ſanguinem facere ex non ſanguine, id eſt, ex ingeſtis. Hinc dum v. g. pulmo vel hepar tabe perit, fruſtra promittitur medicina.

Maxime autem omnium inde ſunt

Καχεξία Malus habitus (de quo poſtea peculiari capitulo dicetur) talis eſt debilitas, ut nutritio læſa & depravata ſit per totum corporis habitum ſimul. Fit hæc cachexia, quando omnia liquida & ſolida deſciſcunt ab his conditionibus, quæ requiruntur, ut fiat aſſimilatio: ſed omni cachexiæ neceſſario adeſt καχεξια, quæ eſt degeneratio omnium humorum ab his conditionibus, quæ requiruntur in ſanitate:

sed humores nostri suas dores accipiunt per vim vasorum & viscerum; hæc ergo si sunt nimis debilia, necessario degenerant humores.

2. FACILIS VASORUM DISSOLUTIO. Requiritur talis cohesio partium solidarum constituentium canales nostri corporis, ut possint sustinere impetum liquidi, vi cordis impulsivi, sine solutione continuitatis: dum jam debilitata est cohesio hæc, merus rupturæ est a majori impetu impulsivi liquidi: sic toties occurrunt tristes illi casus, ubi ad incrementi sui apicem pervenerunt tenelli homines, quibus vel a nativitate, vel non firmato per motus musculares corpore, debilia nimis sunt vasa, quod clamore, cantu, cursu &c. rumpatur in pulmone arteria, sicque una cum sanguine animam vomant: vel postea lenta phthisi marcescant. Quibus debiliora sunt remota vascula, in carpo per strata lapidea rudius veli sanguinem mingunt roties.

Sed præterea dictum fuit, debilitatis visceribus degenerare humores in spontaneam corruptelam; hinc semper fieri aciores: blanda enim est humorum nostrorum in sanitate indoles, sic ut sanguis sanus oculis instillatus nullum dolorem faciat: cum ergo liquida aciora debilitatos canales persequuntur, facilis fit solutio horum: docet hoc scorbutus, in quo sæpe laxitas totius corporis cum acrimonia humorum concurrunt, unde fractis vasis effusus sub cute sanguis maculas illas scorbuticas efficit.

Sed erosio fit ab acri liquido, vel fractis nimio impetu moti liquidi vasis, effunduntur humores contenti; effusi stagnant, quia movens causa deficit; stagnantes corrumpuntur: dum nullus datur aeri accessus, serius quidem hoc fit, corrumpuntur tamen. Effunduntur liquida ex vasis fractis; abruptum continuo circuitus humorum, dum vasa fracta hiant; omnes functiones, quæ a motu liquorum per integra hæc vasa pendebant, abolentur. Hinc dum in variis corporis locis hæc fieri possunt, infiniti numero possunt oriri morbi, non facile recensendi, sed ad classes quasdam revocandi, quarum precipuæ sunt sequentes.

*Obiter*, a corrumpendo dicta; sed obtinuit apud Medicos, ut hoc vocabulum non sumatur pro qualibet corruptione, sed pro totius corporis in suo habitu consumptione, nata ex cacochymia purulenta prædominante, ubicunque demum fomes ille hæserit in corpore. Debilibus nimis vasis effusus, vel fractis, effusi humores corrumpuntur, vicina omnia inflammant sua acrimonia: sic sanguis in cavum thoracis effusus purrefcit, pulmonem alluens inflammatur, post hanc inflammationem suppuratio secuta vera phthisi pulmonali hominem perdit: sic & intelligitur, quomodo ab eadem causa nasci possit *juvæna*, quod latiori significatione omnem suppurationem denotat, plerumque tamen designat puris collectionem in cavo thoracis.

*Tempus*. Omnes illi, quibus sensim subrepat hoc malum, laborant debilitate vasorum & viscerum; & omnis hydrops, non natus ex alio morbo valido prægresso, hanc sere causam agnoscit. In omnibus enim cavis majoribus & minoribus corporis exhalantes arteriæ suos effundunt humores; sed observatum fuit, illum vim, qua minima orificia venosa imbibunt ex cavis corporis locis effusos humores, crescere & de crescere proportionaliter ad circulationis vires: hinc in morbis acutis, ubi circulatio nimia est, exsiccantur omnia: in languidis chronicis morbis sensim accumulato humore tument omnia. Accedit & hoc, quod in summis languoribus diutius videatur persistere vis evacuantis arteriæ, quam vis resorbens venæ: hinc in omni corporis diathesi, in qua vitalis vigor imminuitur, aquosa incipiunt accumulari.

*Asiops*. Priori videtur prima fronte oppositum malum; sed dum ascite turget immantiter abdomen, videmus gracilefcere omnia superiora; nec mirum, quia nimis debilia viscera non possunt conferre singula suam symbolam, ut fiat ultima elaboratio ingestorum, qua mutantur in nostram naturam, & perdita restituantur: vita enim nostra destruet corpus, nisi reficiatur ex ingestis. Deficere potest ergo ex hac sola causa nutritio: & hic defectus atrophæ dicitur.

§. 45. Quid (41. 42. 43. 44.) si quis accurate observat, ille, non hujusmodi (45.), sed infinitorum & obscurissimorum morborum originem, præsentiam, eventum, internoscet, & solus auxilia impetrandæ sanationi valida & tuta inveniet.

Quia

# §.45.46.47. MORBI VISCERUM DEBILITUM, ET LAXORUM. 41

Qui omnia ante dicta attenta mente consideret concludit facile, debilitata actione valorum in contenta fluida, posse ladi omnes functiones corporis: quia omnium functionum integritas ab actione solidorum in fluida, & fluidorum in solida pendet; hinc veram hanc esse lernam malorum, unde infiniti morbi pullulant. Ubi vero morborum a debilitate ortorum effectus sensibus obvii sunt, nulla in cognitione causae nancit difficultas; sed saepe latentissimi morbi huic tantum causae suam debent originem. Dum nimis debilia pulmonum vasa rupta & floridum coccineum eructant sanguinem, facile praegressa debilitas, ut mali causa, cognoscitur; sed si similes arteriole in cerebro ruptae lethalem fecerint effusio sanguine apoplexiam, latens tanti mali causa eadem est. Dum fracta in hepate vasa suos effuderunt humores, qui corrupti stagnando vicina inflammant, tandemque post multas

miserias toto hepate confusito certam mortem inferunt: prima huius mali origo ab eadem causa pendet. Idem in omnibus aliis visceribus verum est.

Nullus videtur melior canon esse in Medicina, quam ille, quod in curandis morbis semper ad causam primam, unde omnia reliqua fluxerunt, sit respiciendum: ex hoc fundamento enim solo certa & valida auxilia deduci possunt. Qui ex debilitate natum hydropem, purgantibus emungendo corpus, curant, post paucos dies mirantur aequo tridere omnia, dum omnia ruunt in flaccida haec vasa, nihil fere de ingesto potu per sudorem vel diaphoresim, parum admodum per urinam, excernatur. Qui primam mali causam investigaverunt prudentiores, distendendo saburra educta, fasciis laxum corpus stringunt, victu seco, roborantibus remediis, corporis exercitiis, primam morbi causam, unde omnia fluxerunt, debellant.

## §. 46. IN applicatione vero horum, praesens debilitas tarditatem jubet; nec enim alibi perniciosior mutatio subita.

Subitam mutationem inducere in omnibus morbis sapiens damnavit Hippocrates (*Aphor. 51. Sect. 2. Tom. IX. pag. 88.*) dicens, *quod paulatim fit, tutum est, tum alias, tum maxime si quis ab altero ad alterum transit.* Sed generalis haec regula imprimis in cura debilitum vasorum & viscerum observanda est. Si quis in hoc casu vel medicamentis stimulantibus, vel motu musculari humorum per vasa motum imprudenter nimis accelerat, debilia

nimis viscera & vasa, impetus augmentant dum sustinere non possunt, franguntur sepiissime, & turpi errore pro remedio mortem inferit Medicus.

Qui haemoptoe laborantem ex pulmonis debilitate validis exercitiis statim vellet curare, hoc efficeret, ut accelerato sanguinis impetu nondum consolidatum vulnus rumpebatur de novo: hinc requiritur summa hic cautela, & prudens tarditas.

## §. 47. E Rgo remedia (28.) lente, caute, a primo in ultimum gradum, adhibenda sunt. Quorum usu roboratis vasis, motus validus musculorum adhibeatur, donec omni effectu constet, satis compacta, solidata, & callosa evasisse Vasa & Viscera.

Omnia jam quae de curatione fibrae nimis debilis dicta sunt, hic totent repetenda. Notandum maxime, per gradus omnia haec augenda esse, donec redeat sanitas. Si per motum muscularem volumus curare hos morbos, incipiendum est a lenissimo; dein sensim & caute augemus, continuo respiciendo ad effectum observatum in corpore aegri ex hoc motu. Qui hydropicum factum ex sola debilitate valorum validissimis vellet statim exercere motibus, suffocaret; sed prius imminuta copia aquarum distendentium, laxae partes fasciis firmanantur, dantur remedia le-

viter calefacientia, postea validiora, lenis imperatur motus, sensum augendo ad validissima exercitia usque: sic certo firmanantur illa corpora, & morbus superabitur.

Sed non sufficit morbum superasse, debent etiam tolli causae, unde necessario rediturum praevidemus. Dum enim hydropici aquas evacuasti, reddidisti tantum corpus tale, quale erat: anrequam hydropicum fieret sponte: hinc debent laxae tunc roborari partes.

Sed undenam novimus fasces firmam jam esse viscerum, prius nimis debilitum, compagem? Si calor per totum corpus sit aequalis,

bilis,

## 42 MORBI VISCERUM DEBILIUM, ET LAXORUM. §47-48.

bilis, & tunc; in debilibus enim calor deficit: si a potu ingesto non tunc corpus in parte vel in toto; sed omnium maxime si calor sit vivus & ruber in partibus illis, ubi vasa nuda, nulla cute tecta, conspicua sunt, in labiis, lingua, faucibus, gingivis, oculorum angulis: ex his enim tuto concludimus debi-um jam adesse viscerum & vasorum omnium robur.

Ubi jam eo usque cura deducta est, tunc non requiritur ulterior roboratio; nam induceretur oppositum vitium nimis rigidi-

tatis: sed servandum est corpus in illo gradu acquisiti roboris: sollicite evitanda sunt omnia ista, quae recentita fuerunt inter causas nimis debilitatis: nisi enim hoc fiat, cito redibit morbus. Hoc toties dolemus fieri in puellis a chlorosi curatis; dum nolunt abstinere tepidis illis forbitiunculis, & inerti otio corporis robur restauratum perdere malunt, quam exercitio sanitatem tueri: sicque summum Medicis tedium, sibi ipsis tandem insanabilem morbum parant.

§.48. **H**inc patet, omnia, quae de facultate nutrimentorum traduntur, alias vera, alias falsa esse; Exercitia musculorum roborare fibras; Exercitia unctionis resolvere coacta, roborare laxa, nec dispergere vires; ipsum sanguinem & cruorem in robustissimis esse maxime densum, lentum, blandum; in tenerimis dissolutum, levem, acrem; infinitos morbos, facie diversissimos, una saepe radice haerere posse, eaque succisa tolli.

**QUE DE FACULTATE NUTRIMENTORUM &c.** Qui absolute de his scriperunt, nunquam potuerunt vera dicere in omni casu, quia alimentorum facultas non pender ab alimentis solis, sed omnium maxime a corpore, in quod ingeruntur (vide §. 25. num. 1.) Integre rationes solis vegetabilibus & aqua vixerunt incole; solis fere piscibus & aqua aliae gentes; omnibus fere simul militis, quae terra sponte vel arte protulit, quae animalium partes exhibere potuerunt, uti erudita gula docuit alios; & tamen satis sani adhuc vixerunt omnes, vel saltem plurimi ex illis, nec nutrimentis varietas tam magnam differentiam attulit. Est enim in corpore humano sano talis facultas, ut, conspirantibus viscerum & vasorum actionibus omnibus, ex diversis indole ingestis fiat idem omni fere docte sanguis humanus. Pro vario tamen vasorum & viscerum robore nutrimenta ejusdem indolis nocere vel prodesse possunt: fumo & sale conditae carnes, cum pane atro duris aratoris visceribus convenient: si carnum iuscula darentur tali homini, deficeret praeter languore: sed haec debilibus adeo profuit, & contra duri tales cibi nocerent summopere. *Qui copiosus cibos conficere quomodo, illis fortioribus non dederis, cibum enim excluditur; qui vero non possunt, his dato.* (Hippocr. de affect. c. 2. Tom. VIII. p. 633.)

Nihil ergo alimentum universali titulo salubre dici potest: & qui rogat, quodnam sit salubre alimentum, idem facit, ac

si quæreretur, quisnam sit ventus secundus, non cognito itinere.

**EXERCITIA MUSCULORUM &c.** De his vide §. 25. num. 2. & §. 28. num. 2. Solo motu enim musculari, nimis exercitato, oppositus morbus nimis rigiditatis fieri potest. Quantum differunt carnes in stabulis saginati bovis a carnibus ejusdem animalis, quod aratrum dicens duro labore effucca fere omnia habet?

**EXERCITIA VECTIONIS &c.** Motus musculares firmant corpus, sed fatigant; & quantum spirituum faciunt renasci, tantum perdunt: unde debilissimos his curare est impossibile. Hinc in debilibus substituantur motibus muscularibus vectiones, & primo quidem lenissimae, dum funi insidentes aegri motu oscillatorio leni agitantur (Mosevialis de arte Gymnastica p. 217.): his succedunt gestationes in leclis; dein vectiones in carpentis molle; postea in curribus per strata viarum motis: tandem aegri tales equos conscendant, & per varios gradus velocitatis quadrupedante cursu corpus firmant. Sic difficillimi curatu morbi sanantur, & omnes fere motus muscularis fructus habent aegri sine virium dispendio. Omnia autem haec imprimis triplici de causa profunt: 1. quia pendula viscera illis concussionibus agitata roborantur, & concreta partim his concussionibus partim aëlis vasorum & viscerum viribus, resolvuntur. 2. Quia feces ex ultima digestionis residuae sic ex primis viis eliminantur in istis, quibus vis horum.

# §. 49. MORBI VISCERUM DEBILIU ET LAXORUM. 43

horum viscerum deficit: hinc profunt imprimis una vel altera hora ante cibum ingestum. 3. Quatenus impetus & efficacia aeris in pulmonum vasa sic augetur, & ambientis atmosphaera, & calore corporis statim tepescens, renovatur assiduo, quod imprimis equitando obtinetur.

SANGUINEM ET CRUOREM IN ROBUSTISSIMIS &c. Denique vocamus sanguinem, quando est maximi ponderis in data mensura: hoc autem pendet a pressione vasorum. Omnia fere quae assumimus, ut & inde paratus chylus & lac sanguine sunt leviora. Sanguis extravasatus, a vasorum compressione liber, fit se ipso levior. Sanguis ergo compactio & soliditas eo majores sunt, quo vasa fortiora plus consolidaverint: hinc in morbis acutis, in quibus nimia actio vasorum est in contentos humores, sanguis fit ponderosior, fit densior. In fortissimis viris sanguis de vena secta, vel vulnere, exsiliens densus & niger est: hinc Homerus; (*Iliad. Lib. VII. p. 124. μέλαν δ' αἷρεται δίκα*.) ubi Ajax vulnerabat Hectorem, dicit: *ater exsiliobat sanguis*: & alibi (*Ibid. p. 26. τὸν αἷμα τιλάειν*) &c.) heroum *Sanguinem atrum* dixit. Sed & simul adest tali sanguini *lentor*, quo concrevit statim in unam massam solidam. In sanguine arterioso in robustis hoc semper verum est: & post validos labores, vel in morbis acutis inflammatoris, sanguis venosus etiam sic concrevit illico fere. In tali sanguine simul obtinet haec conditio, ut oculo sano immixtus nullum dolorem faciat: adeo *blandus* est sanguis sanus, aliquid lenissimi subfalsi habens, sed dilutum valde; sic ut nulla acrimonia laedat partes acutissimi sensus: omnia enim, quae nimis acris fierent in sanguine, eliminantur de corpore, per vesicam, alvum, sudorem &c.

IN TENERRIMIS DISSOLUTUM &c. Sanguis sani hominis difficile examinetur hydrostatice, cum statim concrevat, & liber a pressione vasorum rarefiat illico. Ut aliquam tamen, licet non omnino accuratam (ut ipse fateatur) huius rei notitiam haberet Boyleus (*Hist. Sang. Humani p. 11.*)

exceptit phiala oblonga sani hominis sanguine: cum jam quietus stagnaret, & bullulae evanissent, adamante notavit altitudinem: postea eandem phialam, eloto prius sanguine, replevit aqua ad eandem altitudinem; tuncque invenit, sanguinem sani hominis superare aquae gravitatem specificam circiter una vigesima quinta parte: sed ex paulo ante dictis constat, ex ingestis vi vasorum & viscerum sanguinem fieri solidiorem, ergo & ponderosorem, ingestis ipsis: hinc ubi in tenerrimis hominibus illa vis languet, minus consolidatur sanguis; hinc dissolutus magis, & levis, tandem in aquosam tenuitatem, degenerat. Docet id ex sola inertia & debilitate natus hydrops.

Sed plerumque nimis sanguinis tenuitatis comes est maior acrimonia: unde tenerrimis illis faciles erosiones debilius vasorum: unde haemoptoe, & similia mala. Hinc illis tam frequentes acres illi & falsi catarrhi.

INFINITOS MORBOS &c. Dum liquida humana per canale: proportionalis diametri fluunt, & singulae series decrecentium liquidorum per sua vasa feruntur, omnes omnium vasorum & viscerum functiones libenter suat. Dum debilitata vasa, ab impulsu liquidis nimis, disenta, alienos humores admiserunt, turbantur omnia: hinc infinitorum morborum origo a simplici hac causa pendere potest: omnesque inde orti morbi, restituito naturali vasorum robore, tolli possunt. Unicum sufficit ex innumeris, quae adduci possent, exemplum. Naturaliter adnata oculorum tunica sanguinis rubri in suis vasibus nihil habet: hacce vero laxata a quacunque causa sanguis ruber ingreditur, & ibi haeret; facitque ophthalmiam, initio sapissime aquae frigidae applicatione sanabilem, dum hoc frigore stricta vasa repellunt ingressum sanguinem rubrum: cum in hoc casu emollientia & laxantia applicantur, augetur saepe malum.

Hinc apparet, quantum usum habeat consideratio simplicis talis morbi, cum viam parat, ut intricatissimi alii, ab eadem origine pendentes, cognosci & curari possint.

## §. 49. EX iisdem cognitio & curatio laxitatis Vasorum & Viscerum habetur.

Cum laxitas sit debilitatis species, uti antea dictum est, omnia prius enarrata continentur.

MOR.

# MORBI VISCERUM FORTIUM, ET RIGIDORUM.

§. 50. **R**igiditas nimia Vasorum & Viscerum nominatur illa partium [ 23. 38. 39. ] hæc componentium cohesio, quæ non cedat illi motui, qui illa mutare & movere debebat, ut fierent ea, quæ Sanitatis & Vitæ tempore ab hac mutabilitate fluebant.

Omni vitæ nostræ tempore corpus mutatur in suis vasis, dum hæc nunquam binis momentis maneant in eadem amplitudine, sed nunc distendantur vi impulsæ a corde liquidi, nunc contrahantur in minorem diametrum suo robore. Requiritur ergo talis cohesio partium, constituentium hæc vasa, ut eedere possint: ubi hæc cohesio tanta est, ut non cedant omnino, vel non satis, morbus est minime rigiditatis in visceribus & vasis.

Quid viscera sint, dictum jam fuit §. 41. & notatum fuit ibi, quod omnia viscera omnes suos effectus singulares faciant per vasorum, quibus constant, fabricam: sed omnia vasa tantum agunt in fluida contenta, quantum reprimunt, & nituntur minuere suas diametros: & ubi semel contracta fuerunt ad minimam suam diametrum, tunc vis hæc quiescit, nec agit iterum, nisi

§. 51. **O**ritur 1. ab omni causa fibræ valida vi propulsi liquidi vitalis admodum compactis ad se mutuo. 3. ab adunatione canalium minorum orbatorum suo liquido per violentam pressionem, qua vitale liquidum arteriosum canalium majorum latera premit, cujus maxima effectrix causa est valde exercitatus muscularis motus. 4. ab concreto vase in unum solidum cum proprio liquido stagnante, exsiccato, coagulato.

1. De his dictum fuit §. 42.

2. Licet in liquidis forent partes, restituendis elementis, per sanitatis actiones detritis & deperditis, aptæ: requirebatur tamen ( ut in cura fibræ debilis dictum ) applicatio harum per propulsum liquidi vitalis ad loca debita, & quasi appressio ad alia elementa, quæ quo validior erat, eo firmior fibræ inde natæ vel restitutæ fabrica. Eadem jam hæc vis, quæ elementa fibrarum inter se compingit, fibras, ex his adunatis factas, fortius ad se invicem apprimat, & plus coherere facit.

3. De hac re §. 39. num. 1. dictum fuit. Maximi enim canales habent suas membranas contextas ex minoribus: sed mini-

si ab impulso liquido distendantur rursus vasa. Requiritur ergo in vasis talis flexibilitas, ut cedere possint & expandi ab impulso liquido; dein, cessante vi impellente, rursus se contrahere.

Sed præterea requiritur, ut in singulis visceribus, quæ sua fabrica preparatos liquores fecerunt per emissaria, ultimi canales secretorii babeant certam & determinatam amplitudinem, ne dimittant illa, quæ retineri debent; aut retineant seculum: a iusto hoc moderamine tota vita & sanitas pendet.

In variis jam corporis visceribus varia requiritur vasorum flexibilitas longe major certe in corticis cerebri arteriis, quam in renum secretoriis vasculis: hinc iterum nihil hic generaliter definiti potest, sed tantum cum limitatione ad varios usus, quos vita sana requirit.

mi canales per cordis vini longe minus distendantur, quam maiores, in quos primo quasi impetu, & integris suis viribus cor agit: hinc majoribus canalibus distentis, minora vascula, majorum canalium membranas constituenta, complanantur & impervia fiunt; unde concrelescunt, & inde augetur robur. Motus jam muscularis valde exercitatus, velocius movendo sanguinem venosum versus cor, illius motum augeat: hinc major impetus imprimis in maxima vasa, & hinc omnia illa dicta sequuntur. Hæc imprimis ratio est, quare debilia corpora motus muscularis tam pulchre roboret.

4. Dictum fuit de hoc §. 39. num. 2.

§. 52. **U**bi obtinet in vasis, producit effectus: 1. similes, vel eosdem iis, qui a fibra nimis rigida ( 33. ) 2. facit in vasis validum nixum, quo fibræ conantur se applicare ad axim sui canalis; arcere cava sua; premere, comprimere, repellere, expellere sua liquida; hinc eorum motui a corde, adque & cordi resistere; vix dilatari, hinc interrompere æquabilem sanguinis motum adeo-

# §. 53. MORBI VISCER. FORTIUM, ET RIGIDORUM. 45

adeoque omnium secretionum: minuere copiam sanguinis aliter uno iclu ex corde expellendi; impedire cordis evacuationem perfectam, polypos sanguinis producere; fluidum comprimendo, & a fluidissimis spoliando, id condensare, suffocationes, mortem creare. 3. vulneratis vasis magnos hiatus creat per vim magnam, qua trahuntur in sua sustentacula partes vasorum; discissis integre cavitates minuit extremas, vel claudit.

1. De his actum est.

2. In canali conico linea ducta ab apice ad centrum basis dicitur axis. Dum canales nostri flexiles distenduntur ab impulso liquido, sunt in statu violento, & fibræ longitudinales, in arcum distentæ, nituntur redire in pristinam longitudinem: fibræ orbiculares distractæ nituntur redire ad minores diametros. Utraque hac actione latera canalis propius accedunt ad axim: hæcque est sola actio canalium nostrorum, quatenus nempe fibræ distentæ nituntur se restituere. Quo jam firmior fabrica, & major elasticitas est horum laterum, eo validior hinc nixus est, ut evidenter patet.

Sed dum latera canalis ad axim propius accedunt, necessario minuitur Cavitas: ergo premitur liquidum contentum; & cum liquidum non possit tam cito exprimi per convergentes arteriarum fines, nec retro pelli in cor (obstant enim aortæ valvulae) hinc comprimitur, reprimitur, & condensatur: omne enim porosum, & simul flexile, corpus in tanto minus spatium redigitur, quanto major est vis comprimens. Hæc videtur esse ratio, quare chylus & lac, leviora semper sanguine, reperitis vasorum nostrorum actionibus compressa, mutantur in sanguinem solidum & compactum.

Sed omnia, quæ ingrediuntur corpus nostrum, nova liquida, sive ex cibo & potu, sive per bibula vasa in tota corporis superficie, semper per venas ingrediuntur: hæc dilatabiles facile admittunt omnia. Postquam autem hæc ingreßa sunt arterias, si in his robur supra sanitatis vires increverit, statim distillantur de corpore: hinc intelligimus, unde homines macilentis & fortes comedant duplo plus sæpe quam obesi & otiosi, nec tamen pingueſcant, licet parca copia tantum alvum deponant. Ingesta quidem in his ingrediuntur venas lacteas, dein cavam venam, & corque dextrum; sed in pulmonis arteriis, & postea per totum systema arteriosum reliqui corporis sic attenuantur, ut per ultima exhalantia corporis vasa distillari possint, sicque evanescant.

HINC EORUM MOTUS A CORDE &c. Maxime notandum, quod, licet majus robur accedat arteriis, ideo non statim debeat oriri cordis nimia resistentia; nam aucto arteriarum robore, cordis vires augentur: influxus enim venosi sanguinis in cava cordis, trajectio sanguinis arteriosi per cordis substantiam, influxus spirituum in villos musculolos cordis, sunt causæ a quibus motus muscularis cordis pender. Sed dum aorta validiori vi se contrahit, sanguinem majori celeritate pellit per arterias coronarias in cordis substantiam; simul validiori vi per carotiles & vertebrales sanguinea cerebro & cerebello applicat; unde major spirituum secretio: deinde ex arteriis in venas sanguinem velocius promoveret, sicque sanguinem venosum celerius movendo cor irritat: omnes ergo causæ motus muscularis cordis augentur, aucto robore arteriarum.

Quandiu hoc manet æquilibrium, summa permutatio & celerissima conversio ingressorum in naturam nostram fit; magna conciliatur sanguinis soliditas; sed nondum inde sanitatis detrimentum. Ubi vero robur arteriarum eo usque increvit, ut vix patiantur se dilatare; tunc omnia illa mala hinc recensita sunt. Dum enim non dilatantur arteriæ, non contrahuntur postea: sed contractio arteriarum præcipua causa est, quæ sanguinis motum per vasa facit; cordis enim actio tantum fere dilatat arterias, & in illis dilatatis locat contentum in cavis suis sanguinem: momento post contractæ arteriæ contentum sanguinem propellant. Hoc evidenter apparet, dum austeria major vulnerata sanguinem fundit: nunquam enim uno impetu profuit, sed per subsultus: longe minori celeritate exit, quando cor contractum arterias dilatat; longe majori impetu; dum arteriæ contrahuntur & cor est in diastole.

Ubi ergo a quacumque causa tanta fit rigiditas vasorum, ut non patiantur se dilatare, vel saltem non satis, tunc cordis vires non valent expellere contentum in cavis suis sanguinem, tunc cor mirabili quafi

quasi tenesmo irritatum nititur pluribus ictibus facere, quod unica contractione non potuit; hinc palpitatus cordis & interruptus pulsus in summo fenio toties observata: nam in valde longævis vasa majora circa cor cartilaginea, imo ossæ, aliquando inventa fuerunt: ut testantur observationes Medicæ. Cordis jam motu turbato omnia turbantur in corpore: illud enim fons & origo motus est. Hinc nulla secretio, nulla excretio manet talis, qualis antea fuerat: sed dum in cordis cavis, & in sinibus & auriculis, incipit hæere sanguis, nascuntur.

**POLYPI**, a Polypo pisce sic dicti, qui plurimis cirris se vicinis attingit: morbus frequentissimus, latens admodum & rebellis. Malignus in tractu de Polypo cordis primus fere obscuræ hæcæus Polypi historia lacem affudit, & demonstravit, unde polypi in corde & majoribus vasibus origo deducatur.

Sanguis enim sanæ hominis vena missus lentescit statim, & incipit facere crustam concretam, quæ repellit a se liquorem flavum fluidum. Massa hæc magis & magis crescit, & innatat liquidiori parti: expressæ, concreta deinde aqua pura lota albescit, fibrosa præparet, discissa exhibet cellulas, ichore rubello plenas.

**Experimentum Ruyschii** (§. 39.) ante memoratum docet, quomodo semel incipiens nasci talis concretio, ex reliquo sanguine trahat similes partes; & ex illis adnatis fiat membranæ quasi species.

Sanguis ergo sanæ hominis, ut constat ex his experimentis Maligni & Ruyschii, constat binis talibus partibus, quæ se mutuo repellunt, sed motus vitalis hæc miscet inter se: hinc simul ac sanguis in homine vel sanissimus in vasibus magnis aliquamdiu quiescit, aut tardius motus copia nimia aggregatur in vasibus distensis, disponitur ad coagulationem flocculentam: flocculi sic nati concreverunt inter se, sibi quæ assimilant & quasi attrahunt similes partes, & faciunt sic polypos massulas, quæ continuatione ejusdem causæ crescunt sæpe in immanem magnitudinem; & vasibus ipsi, cordis columnis, auriculis &c. accrescunt: ut docuerunt in cadaveribus hæcæ observations.

(*Abridgment Tom. III. pag. 70. Maligni de Polypo & passim apud observatores.*)

In jugularibus animalibus omni sanguine emisso, circa solum cor dextrum pauculum adhuc sanguinis hæret, in massulas oblongas

polyposas concretæ: hincque apparet ratio, quare post ingentes sanguinis jacturas polypi sæpe circa majora vasa concreverunt, polypæa miserrimos inducentes morbos. Vidi sic feminam, cui per abortum tanta facta fuerat sanguinis jactura, ut pro mortua deponeretur; revixit postea, satis commodè se habens dum quiesceret; si vero minimum moveret corpus, mox anxietas intolerabilis, & subitanea omnium virium prostratio, anhelatio miserrima, donec quiesce sensim rediret pacatior status: sic jam per decem annos hæret lætulo affixa. Videtur in hac femina idem factum fuisse ac in jugularibus animalibus, factas nempe polyposas concretiones lente motu sanguinem transmittere, & viam præcludere celerius moto.

Apparet hoc evidentiissime in syncope: quando enim in syncope lapsis vita redit, suspirant, anhelant; concreverunt sanguinis polyposi flocculi in arteria pulmonali, ex ingenti capacitate in tam minutas angustias statim abeunt, sistuntur; contractione cordis & arteriæ pulmonalis, respirationis molimine tunc semper aucto, eunt, redeunt; & aliquando solvantur: qui autem sæpius syncopen patiuntur, nato jam polypo tota vita cordis palpitacionibus obnoxii manent.

Malum hoc frequentissimum foret mollissimis puellis, quæ ab animi affectu validiore statim animo deficiunt, nisi illarum sanguis virium oppositum polypose concretioni haberet: in illis enim, quibus valide vires sunt, & actiosa vita, sanguis majorem vim concreverendi habet; hinc requirit motum perpetuum & æquabilem, ne concreverat.

A polyposis autem illis concretionibus, vel in cordis ipsius cavis, vel circa vasa majora natis, oriuntur tam anomala, tam terrena symptomata; ut causis majoribus adscripta fuerint sæpius. Concretio talis polyposa ovi columbinæ magnitudine, nullibi accreta, sed libere hærens in sinistri cordis cavo, horrenda mala produxit. (*Act. Physic. Med. vol. 2. pag. 5.*)

Angusta spes curæ est in polypo confirmato: jactantur plurima remedia; profant fere nunquam. Totum autem, quod sperari potest, est, ut reddatur sanguis dilutissimus, ab omni concretionem maxime alienus; id est, inducatur per artem cacochymia nimis diluti sanguinis, ne augeri possit polypus novæ materiæ appositione; sed

tritum.



§. 53. 54. MORBI VISCERUM FORTIUM ET RIGIDOR. 47

tritu omni momento vitæ præterlabens sanguinis deteratur sensim.

3. Si nulla foret in partibus nostris solidis contractilitas, vulnus inflictum non haberet majorem hiatus, quam est crassities instrumenti lædentes; sed videmus vulnera, vel acutissima novacula inflicta, paulo post hiare: vis enim illa, quæ coheret partes firmæ inter se, facit retrahi utraque

extrema. Quo ergo hæc vis est maior, eo plus recedent partes discissæ a se invicem. Cum vero integre discissæ sunt vasa, eadem hæc vis extrema vasorum retrahet & occultabit sub aliis partibus; sicque in hoc casu hæmorrhagiæ facilius sistuntur in robustis quam in debilibus, quia & vis contractilis orbicularum fibrarum in arteriis robustiorum fortior.

§. 53. EX his ( 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 50. 51. 52. ) accurate perspectis clara habetur doctrina, quæ noscitur præterita, præsens, futura, agens, & actura vasorum rigiditas, elasticitas, vis, curatio.

In præcedentibus Capitulis explicata fuit methodus, quomodo diagnosi morbi præsentis, anamnesis morbi præteriti, prognos.

§. 54. EAm enim efficiunt 1. remedia curandæ rigiditatis fibræ propria ( 35. ) 2. illa maxime, quæ liquidi vitalis copiam, densitatem, pressionem minuunt. 3. quæ motum muscularem suspendunt. 4. ea, quæ humectant, leniunt, emolliunt, diluunt, resolvunt, abstergunt.

1. De his dictum fuit.

2. QUÆ MINUUNT LIQUIDI VITALIS COPIAM.

In fibra nimis rigida curanda solum considerabatur solidum: in visceribus & vasis nimis rigidis curandis ratio haberi debet & solidorum & fluidorum simul. Inter causas nimis rigidorum viscerum §. 51. recensita fuit valida vis propulsi liquidi vitalis, compingens ad se invicem fibras. Liquidum autem vitale vocatur, quod corde expellitur, & in cor refluit. Sed quo plus hujus liquidi vitalis, manente vita, aufertur, eo minor fit solidarum partium actio & attritus ad fluida contenta; id est, minuitur vitalis circuitus humorum vehementia: minuta enim copia vitalis liquidi, non redit ad eandem quantitatem. Sed sanguinis per venas allati, in cava cordis influxus inter causas motum cordis excitantes merito numeratur, ut ante dictum fuit ( §. 28. ) & alibi jam sæpius: ergo minuitur cordis contractio muscularis, in suo robore & velocitate. Docet hoc: evidenter venæ sectio: quæ furentem in morbis acutis nimio impetu vitam sic potest compescere, ut incipiant omnia remittere, languere; imo ad animi deliquium deducta hæc evacuatione in acutis continuis, ubi validæ agrotantis vires sunt, sæpe illico tollitur febris: ut Galeno, sic febrem curanti, adstantium quis dixerit: o homo jugulasti febrem. ( Method. Medendi Lib. IX. cap. 4. Tom. X. pag. 206. )

sis futuri & effectum inde sequentium; tandemque indicatio curatoria inveniri possint, vide §. 27. & 34.

curandæ rigiditatis fibræ propria ( 35. ) 2. illa maxime, quæ liquidi vitalis copiam, densitatem, pressionem minuunt. 3. quæ motum muscularem suspendunt. 4. ea, quæ humectant, leniunt, emolliunt, diluunt, resolvunt, abstergunt. Sed jam antiquis temporibus disputaverunt Medici, quomodo deberet in morbis tolli illa copia nimia vitalis liquidi: simplicissimus, & naturæ, toties hæmorrhagiis excitatis morbos sanantis, familiaris modus videbatur aperto vase per venæ sectionem minuere copiam: sed Erasistrati sectores damnabant venæ sectionem, & exsuperantem sanguinem tolli posse volebant inedia, quam triduam imperabant ægris suis, famosa illa *Sarpiræ aëria* ab Hippocrate in libro de victu acutorum morborum fuit proscripta. Integram librum Galenus ( *De venæ sectione adversus Erasistratos, Tom. X. pag. 406. &c.* ) scripsit, ubi & argumentis, & rerum experimentis, hanc sententiam resutavit: licet postea a Chemicis quibusdam infeliciter resuscitatum.

Dum enim per inediam humorum copiam minuere volunt, diffillantur subtilissima; crassissimi humores in vasis maximis eo plus condensantur; & simul omnia in putridam acrimoniam disponuntur: venæ sectio vero crassissimam humorum nostrorum partem, sanguinem rubrum nempe, educit, viamque facit diluentibus ingestis.

DENSITATEM. In homine sano sanguis semper densitate aquam superat, & dum in aquosam tenuitatem incipit degenerare sanguis, perit omne robur: docent hydrofici. Ubi ergo nimium robur in vasis & visceribus peccat, depletis per venæ sectionem vasis, &educta densissima sanguinis parte,

parte, ingeruntur aquosa; serum lactis, praeferant hordeaceae &c. in quibus aqua praedominatur; ut his repleta vasa debilitentur, & quasi dispositio ad hydropem inducatur. In morbis acutis Hippocrates solis fere aquosis in victu egrorum usus est.

**PRESSIONEM.** Omnia ingesta alimenta & potentia sanguine sunt leviora: vis ergo vasorum hac continuata actione compingit & consolidat in bonum sanguinem. Quo hac vis vasorum minor est, eo minus compactus ex ingestis nascitur sanguis: docent debiles praeclae, quibus subrubellus ichor quasi per vasa fluit, non solidus sanguis. Quo jam vasa pleniora sunt, eo maior compressio liquidorum vasorum contentorum: cordis enim vis, proiciens sanguinem in arterias, jam valde distentas, debet comprimere plus sanguinem in arteriis, ut locare ibi possit contentum in suis cavis sanguinem: hinc dum minuitur hac vasorum plenitudo, minuitur & hac pressionis causa. Quo jam densiora sunt liquida nostra, eo majori impetu in vasa nostra agunt; cui actioni in sanitate aequalis est vasorum reactio in liquida. Dum ergo minuitur liquidorum nostrorum densitas, minuitur etiam pressio, ut patet. Quod jam celerior est propulsio sanguinis per vasa, eo saepius, eodem dato tempore, applicantur causae condensantes nostris liquidis: hinc in omnibus morbis, in quibus nimis vitae impetus peccat, summam quietem imperavit sapiens aniquitas. Minuta ergo copia, minori conciliata densitate liquidis, minori motu fluidorum per vasa, minuitur pressio; & quod inde necessario sequitur, nimium robur vasorum & viscerum praesens tollitur, vel futurum praevetur.

3. Quid motus muscularum valeat efficere dictum fuit §. 28. num. 2. §. 37. §. 43. num. 3. §. 48.

4. **QUAE HUMECLANT.** Quidnam vocatur humectare in Medicina? Corpus humanum replere pluribus, quam haecenus habebat, liquidis; & simul sic disponere, ut plus, quam solebat antea, retineat: hac duo simul faciunt humectationem. Dum enim ingeritur aqua, non mansura in corpore, perluitur corpus, non humectatur. Aqua tepida pota laxat omnia vasa, sed cum farinosis cocta longe plus emollit & humectat, sicque efficit, ut repletioni minus resistent vasa. Hoc totum jam verum est res-

pectu solidarum corporis partium; sed ratione fluidorum difficultas magna manet: sanguis enim humanus per viam nimiam vasorum in fluida incipit coire in spissitudinem inflammatoriam; tuncque non facile miscetur aquae ingestae: sic saepe in morbis acutissimis observatur, largam copiam aquae epotam per urinas & sudores statim dilabi, & post paucas horas urinam esse aequae rubram ac ante, nec levare symptomata. Videtur tunc aqua fluxisse quidem cum sanguine per vasa, non autem cohesisse sanguini intima miscela, sed mox secessisse. Tunc saponis blandissimi, aquae misti, ut sunt omnes succi fructuum horarum, oleum mollissimum, mel, manna, saccharum &c. sic dividunt nimis primum in concretionem sanguinem, ut aequae facilius fiat, & magis durabilis, miscela cum sanguine.

Remedia jam humectantia in materia medica descripta sunt; in quibus omnibus semper praedominatur aqua. Adfunt simul talia, quae aliquid glutinosi lentoris addunt aquae, nimis cito praeterlapsurae; ut sunt omnia farinosa, omnes herbae emollientes. Adduntur & saponaceae, quae dividunt nimium sanguinis lentorem: sed imprimis laudabantur pro hoc scopo decocta cancerum fluviatiliu in Graecia, ad siccos illos marasmos ab Hippocratis temporibus jam adeo laudata. In Italia viperinarum carnum decocta tantum fiunt. Forte hic decocta anguillarum substitui possent: in his enim omnibus est subviscosus, humectans, blandus succus, qui plus facit in exsuccis illis corporibus, quam ferre sperari posset. Si his decoctis, ex se factis, gratis oleribus additis concilietur saporis gratia, summum habetur remedium.

**LENIUNT.** Quae lenientia dicuntur sunt talia vel respectu solidorum, vel respectu fluidorum: respectu solidorum lenientia dicuntur, quae nimiam rigiditatem tollunt; respectu fluidorum, quae omne acre stimulant obvolvunt & inviscant: qualia sunt omnia recensita statim.

**EMOLLIUNT.** Quae lenientia dicuntur ad emollientium classem pertinent, hac tamen cum diversitate, quod emollientia respiciant tantum solidas partes, lenientia & fluidas & solidas partes simul.

**DILUUNT.** Diluere tantum de liquidis dicitur: his vero dilutis solida laxantur. Sed quid diluit? certe aqua unicum proprie diluens est respectu nostri sanguinis;

& reliqua omnia, quæ diluentia dicuntur, tantum ratione aquæ agunt. Salia quidem attenuant & resolvunt, non diluunt tamen. Spirituosa omnia potius coagulant nostros humores. Aqua autem frigidissima, æque ac fervida, sanguinem coagulat: hinc sola tepida dat optimum diluens. Hæc jam aqua tepida potest omni modo applicari corpori nostro, per balnea, vapores, clysmata, somenta &c.

**RESOLVUNT.** Nimum robur fieri dictum fuit, concretis multis vasis, antea perviis: hinc resolutia, respectu solidarum partium, deberent habere talem potestatem, ut vasa concreta redderent iterum aperta: hoc vix videtur fieri posse, vel saltem non facile. Sed resolutia respectu fluidorum sunt omnia illa, quæ partes olim fluidas, nunc concretas, iterum solvunt in illas moleculas, ex quibus constabant ante concretionem. Hæc autem dividunt concreta vel insinuatione suæ molis inter partes coherentes, vel stimulorum instar vasorum vim agent, unde major attritus, & sæpe divisio concreti: aliquando utrisque his viribus simul conspirantibus agunt.

Sanguis ruber, cum fluit per totum corpus, debet transire per vasa, quorum diameter decimam partem crassitie capilli non superat: sed sanguis ille, extra corpus dimissus, sic concretis, ut per maximos canales transire non posset: jam resolvens diceretur illud, quod sanguinem concretum posset iterum dividere in particulas adeo parvas, ut per vasa illa minima posset transire.

Prout jam sunt varia genera concrecentium humorum, diversa etiam requiruntur resolutia: quorum præcipua in Materie Medica ad hunc numerum sunt recensita.

Diluentia aquosa enim solvunt omnia mucosa, glutinosa, gummosa, saponacea &c. plurima autem sunt per aquam non resolvenda: sanguis enim noster in aquam tepidam dimissus a concretione non impeditur.

Salina solventia pleraque, recensita in Materia Medica optime hoc munus absolvent:

inflammatoriis concretionibus resolvendis sales neutri optime conveniunt; maxime nitrum & ejus præparata pleraque, quod sale marino levius, faciliusque superandum a natura humana, tam pulchro usu in omnibus fere morbis acutis adhibetur. Sales alcalini ad glutinosas lentas concretiones magis laudantur &c.

Saponacea, mitissima imprimis illa ex saccharo, melle, succis &c., sine ullo fere molimine, sine ullis turbis, plurima concreta solvunt: fortiora illa, & chemica aciora, simul excitato majori motu agunt.

Hæc omnia autem maxime adjuvantur frictionibus, dum alterna pressione & relaxatione vasorum resolutia, sanguini mista, teruntur quasi cum concretis fluidis. Sic certe post balneum vaporis moderata frictio, simul interne solventissimis remediis adhibitis, sæpe duos glandularum tumores dissipavit, qui resolvi posse vix credebantur.

**ASTERGUNT.** Dum viscosum vel glutinosum aliquod tenacitate sua apprehendit superficiem vasis, & meatus naturales obstruit, si hoc auferatur, dicitur deterfa esse illa pars corporis. Hinc abstergentia sunt resolutia concreti, imprimis saponacea omnia. In illis autem vasis, per quæ rapidissimus est humorum motus, non facile inveniuntur talia viscosa vasis adhaerentia, sed in ultimis vasis, vel in receptaculis, ubi colliguntur humores in proprios usus, occurrunt talia. Magnus tamen error foret credere, omnia talia viscosa esse semper morbosa: certe totum os intetnum, œsophagus, ventriculus &c. tali obducuntur muco, quo deficiente pessimi oriuntur morbi: Ad classem abstergentium pertinent omnia quæ diluunt, quæ resolvunt; omnium maxime saponacea. Illa autem nimis rigiditati vasorum & viscerum curandæ prorsum, quatenus, obstruuntur remotis, per vasa parula liberrimus fit humorum transitus: unde æquabilissima facta circulatio non compingit adeo ad se invicem solidas partes, non condensat tanta vi humores.

§. 55. **EX** hisce omnibus (ab ætate ad 55.) morbis Partium Solidarum propriè intelliguntur, curantur; & ex iisdem clarescit, quid respondendum his questionibus: Quæ diversitas structuræ partium solidarum in ætate diversa? Cur homo crescit, perstat, decrevit? Cur in utero materno omnium ocissime augeatur? Cur laxus, fortis, rigidus sit? Cur humidus, plenus, siccus? Cur morte naturali, vel sæpe senili, moritur? & quorum morbo? quinam morbi plerumque singulæ ætati proprii? qui victus, quæ vita, quæ medicamenta, cuique temporis vitæ

Ex hæcenus dictis omnes morbi solidarum partium intelligi possunt, & explicari: pendunt enim omnes a mala cohesione partium, & ex hac doctrina plurima sequuntur, & maximi usus, in Medicina; facili enim sequitur responsio ex prædictis ad sequentes quæstiones.

QUÆ DIVERSITAS STRUCTURÆ &c. Quo propius origini suæ est corpus humanum, eo pluribus vasis, fibris & membranis simplicibus, constat; & eo facilius cedunt vasa liquidorum impulsui; eo major proportio encephali & nervorum inde productorum ad reliquas partes. Si recens nati corpusculum lustratur undique. omnia pulpofa, mollia, humida sunt; volæ manuum, pedum plantæ, ubique in omni punto per minima vascula exhalantia humido madent: nihil siccū, nihil callosi invenitur; sensim factis ætatis augmento plurima ex minimis vasculis incipiunt consolidari: sic vasorum numerus minuitur, solidiorum augetur robur; donec tandem in ultima senectute dura accedat exsiccio corpori callositas, & minimorum vasorum pluriusculi abolitio: tunc omnes actiones, quæ pendunt a subtilissimi humoris per minima vasa motu, fin senibus incipiunt deficere; & solida omnia nimis rigida facta resistunt magna vi fluidis impulsis.

CUR HOMO CRESCIT? Dixerat Hippocrates (*De victus ratione sanorum Lib. I. cap. 9. Tom. 6. p. 457.*). Partes autem simul omnes discernuntur, & augentur, neque una prior altera, neque posterior: majores tamen natura minoribus priores conspiciuntur, quoniam priores non existant. Dum enim generationes animalium, mirabilem historiam, quantum per fidelissimas observationes hodie cognoscitur, consideramus, videntur in embryone partes præexistentes explicari in maiorem molem. Idem & in plantarum propagatione constat, ubi in foculo semine integra plantula convoluta latet, sensim explicanda. Dum ergo in tenello embryone pleraque vasa intorta & convoluta jacent, oritur resistens liquidis per hæc vasa propellens: sed liquida pulsa per canales, cum renixu quodam contra hunc motum facto, conantur distendere hos canales, & simul producere latera canalium juxta longitudi-

nem: hinc elongantur omnia, & fit incrementum. Ubi vero, explicatis omnibus vasis, minor fit resistentia liquidis propulsis, fit liberrima circulatio per omnes canales; tuncque cessat illa productio canalium secundum suam longitudinem, quia jam liberrime perfluunt liquida, & vitali motu (ut ante demonstratum est) consolidari canalium latera non patiuntur se distrahi ulterius ab eadem vi: tunc corpus

PERSTAT. Dum copia & impetus humorum ex corde pulforum æquilibrantur viribus solidorum resistentium: corpus enim humanum non definit crescere, quia solida extendi non possunt; sed quia explicatis vasis omnibus liberrima circulatio efficitur, ut minus urgeant liquida suos canales: quicumque enim de causa nato obstaculo circa quædam vasa (eriam in corpore jam adulto) velocitate & copia humorum manentibus iisdem, videmus partes incrementum accipere. Docet hoc uterus gravidarum in tantam molem expansus; hepar & lien obstructi in immanem magnitudinem excrecentia; cutanea vascula invisibilia a comprimente atheromate vicino insigniter aucta. (*Simson the system of the Womb. pag. 24. 25. &c.*)

Fortè a tali latente causa mirabile sæpe quarundam partium augmentum. Puellam novi, cui lingua, immaniter aucta, extra os infra mentum pendula est, deglutitione, loquela, gustu integerrimis.

DESCRESCIT. Inevitabili vitæ sanæ effectus sensim nascitur tale robur in vasis omnibus, ut incipiant nimis resistere liquidis impulsis. Hinc sensim contrahuntur omnia; totum corpus atidum & exsuccum fit; omnis sere pinguedo consumitur; quæ tantam magnam partem corporeæ molis humanæ facit: hinc in senum manibus, omni sere pinguedine evanida, nudas quasi tendinum chordas videmus; mirabilia ista ligamenta, inter corpora vertebrarum media, evanescent sæpe sic, ut fiant nulla, & vertebrae vertebrae tangant: unde minuitur corpori procritas, incurvatur spina dorsus antrostrum, gibbosi fiunt senes, & vera silicernia, tandem senili marasmo pereant.

CUR IN UTERO MATERNO &c. Rem se sic habere certi sumus: ex invisibili enim mo-

molecula intra novem menses crevit infans, ut sexdecim librarum pondus sæpe aquet, imo exsuperet aliquando. Ratio videtur hæc esse: tenerima sunt vasa, corculo valido motu valde propinqua, convoluta plurima magis resiliunt liquidis impulsis, hinc plus elongantur & distenduntur: totus embryo fovetur assidue tepenti calore liquoris amnii: hinc omnia servantur laxissima; nutrimentum materni corporis viribus præparatum affunditur continuo, distribuitur æquabilissime.

**CUR LAXUS.** Si otio ignavus torpeat homo, somno indulget, mollissimis simul utatur cibis, tumebit inerti mole corpus, vires tamen non aleo insurgunt, vasa non satis consolidantur: hinc facili distendenda cedunt liquidis repletibus.

**FORTIS.** Dum liquidorum vis prævalet vasorum firmitati, corpus tumet & laxum est: dum corporis exercitiis roborata vasa liquidorum impetum sustinent sine dilata-tione nimia, & vasorum robur fluidorum copie & motui æquilibrata vi resistit, tunc fortis dicitur homo; in quo firma cohesio solidarum partium, & debita humorum densitas.

**RIGIDUS.** Si eadem causæ pergant agere, quæ corpus reddiderunt forte, tandem illud facient rigidum: ætas sensim tenellum recens nati hominis corpus firmat, corporis exercitia robur addunt vel debilissimis; provehitur ætas omnia callosa rigida facit; nimii labores præproperam senectutem faciunt.

**CUR HUMIDUS.** Omnes venæ nostræ facillime dilatabiles replentur ab ingestis novis liquidis; sed artiarum firmus robur expellit iterum ingestos liquores: homo enim sanus & fortis incredibilem copiam aquæ potare potest, quæ omnis recepta venis cordi traditur, per arterias dein distributa expellitur de corpore; sequenti enim die pristinum pondus recuperat. Ubi ergo talis in arteriosis vasis est debilitas, ut venis receptos humores nec moveant satis, nec expellant superfluos; tunc accumulatur liquida, & prævalent solidis, humidamque distam temperiem inducunt.

**PLENUS** dicitur homo, quando vasa ejus plus repleta sunt bonis humoribus; quam requiritur ad stabilem sanitatem. In illis talis laxitas est in vasis, ut impleantur ad illam terminum, in quo nondum morbus

sit; sed si augeantur plus humores, aut rarefiant a calore vel alia quacunque causa, sanitas manere non potest.

**SICCUS.** Hoc fit simpliciter ab incremente vasorum robore: quando arteriæ majore contrahuntur vi, quam requiritur ad perfectam sanitatem, liquida expelluntur, siccum fit corpus: hinc ætas & labores solida roborando corpus siccant.

**CUR MORTE NATURALI &c.** Mors naturalis dicitur illa, quæ inevitabili lege ex creati corporis constitutione sequitur: hæc autem fit, quoniam elementa fibrarum ad elementa, fibræ ad fibras, membranz ad membranas, parietes vasorum ad invicem applicantur, & vasa complanata cum aliis similibus concrevant; sicque tandem, minimis vasis fere omnibus concretis, per sola majora adhuc absolvitur humorum circulus: donec & hæc arida, callosa, imo tandem cartilaginea & ossia facta (ut docuerunt observata) impendant liberam sanguinis expulsionem ex corde: sicque vita desinit in placidam, maximeque oprabilem, mortem. Ita defecit centenarius major Ludovicus Cornaro. (*Reading om gefond en lang te leven pag. 78.*)

Hinc inanis Chemicorum jactantia pater, qui magno hiatu fere immortalitatem promittebant; saltem pro lubitu se vitam posse producere clamabant inepti: vide §. 39. num. 1.

**ET QUO TUM MORBO.** Simplici quiete repleti cordis, non potens fere evacuare in arterias plenas, & tam rigidas, ut a vi cordis distendi non possint.

**QUINAM MORBI &c.** Pulcherrima est hujus rei consideratio, & maxime necessaria, cum varia ætate variis malis homo obnoxius vivat.

In prima ætate omnibus morbis generis nervosi magis obnoxius vivit homo, quia docent observata, encephalon, ejusque producta, medullam spinalem & nervos, eo majorem habere proportionem ad reliquas partes corporis, quo origini suæ est propior: accedit, quod ut cerebrum minus firmum in hac ætate, ita & nervi, cerebri producta, molliores sint, hinc facilius afficiendi, & præterea tenuioribus involucri tegantur: hinc tam facile convelluntur; vix enim laborat infans minima febricula, quin convellatur: Ab acido primarum viarum nata ventris tormina, susceptum con-

tagium variolosum vel morbillorum, omnia quæ sensus organa afficiunt vividissima actione, ut fragor magnus, lux fulgidissima &c. toties convulsiones excitant: imo Sydenhamus, dentitione defunctos dum convulsione correptos videbat, præfagebat variolas & quidem boni moris. ( pag. 162. ) Hinc cum a tam levibus causis in hac tenera ætate convulsiones oriantur, non adeo illas timuit ante septimum annum Hippocrates; post hanc ætatem, maioribus causis dum excitantur tantum, periculosas pronunciat. ( In Prognostico & Causis. )

Altera origo morborum in prima ætate est, quod humorum copia solidorum robori prævaleat; omnes enim in prima ætate turgiduli, & humidissimi, sunt: hinc tam faciles & tam miræ mutationes humorum, qui tam sæpe per cutim modo nondum bene intellecto mutatam exeunt; docent hoc achores, herpes, excoriationes pone aures, sub axillis &c. siquæ sæpe incredibilis copia humidi quotidie excernitur, quod, imprudenter dum cohibebatur, molestissimis morbis toties originem dedit.

Postea circa pubertatis tempus miræ mutationes accidunt toti corpori in utroque sexu; in masculis testium tumores, varicosæ vasorum feminalium inflationes, leni frictione supra vapores accensis succini, si- mulque purgante levi dato, facile curabiles: in femellis miri sæpe morbi primam menstruorum eruptionem præcedunt & comitantur.

Dum postea ulteriori incremento incipit resistere corpus, nec vasa patiuntur se tam facile extendi, nascitur æquilibrium inter fluidorum impetum copiamque, & vasorum resistantiam. Pergunt interim bona viscera novos quotidie generare humores: unde facilis vasorum ruptura, hinc hæmorrhagiarum, sputa sanguinis &c.

Adulto dein homini maxima actio vasorum in fluida: hinc densus & compactus sanguis; unde frequentes tunc morbi acuti inflammationum.

Ingravescente demum ætate solida magis compacta fiunt, minima vascula sensum concrevissent, & callosa fiunt, omnia, quæ a subtilissimis humoribus per minima vasa moris pendunt, incipiunt aboleri sensim: hinc omnes actiones cerebri & nervorum incipiunt debilitari; humores in frigidam & pituitosam indolem degenerant; per sola

majora vasa humorum circuitus adhuc absolvitur; tandemque inevitabili necessitate mors sequitur. Quia natura propositum, qui est ad facilitatem, effugere non licet, idcirco senesimus & curramus ( Galen. de sanitate tuenda Lib. VI. cap. 3. Tom. VI. pag. 169. )

Ætatum varios morbos follicite notavit Hippocrates ( Sect. 2. Aphorismi. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. )

Quis victus. Quamdiu in utero materno hæsit fetus, a matre preparatos recipit humores. In licem editus infans mox materna novit ducere ubera. Lac ergo maternum solum fere infantibus convincit. Dum dentes anteriores prodierunt, solidiora parum, sed prius commansa, exhibenda, & persicandi sæpe, sed non nisi vacuo ventriculo ( Galen. de sanitate tuenda Lib. I. cap. X. Tom. VI. pag. 55. ) : panis bene fermentatus, lacte vel carniū iusculis assitis, in pulmentum mollem convertitur, tunc exhibitus prodest. Quando dentes molares jam prodierunt, durioribus sensum uti licet: omnia autem calida, vinosa, irritantia &c. nocent infantibus, quia totum genus nervosum adeo mobile habent.

Sæpius autem cibandos esse juniores, & puerorum voracitas fundat, & monitum est Hippocratis ( Aphor. 13. & 14. Sect. 1. Tom. IX. pag. 23. 24. ) dicentis, pueros omnium minime jejunium ferre: qui crescent, plurimum habent calidi innati, hinc plurimum alimento indigent, aliter corpus absumitur.

Adultis & sanis fere sufficit regula Hippocratica ( Epidem. Lib. VI. Tom. IX. pag. 500. ) valetudinem excolunt, circa satietatem cibis vesci, & impigritum esse ad labores. Cumque hæc ætas morbis acutissimis obnoxia sit, patet calefacientia evitanda esse. Labori autem semper proportionatus sit cibus: longe alio enim & copiosiori indiget durus arator, quam meditationibus solis incumbens Philosophus.

Senibus autem, ( cum & facillime jejunium ferant, & parvum habeant calorem, hinc paucis egent somnitibus, a copiosis namque extinguuntur ) ( Hippocr. Aphor. 12. & 14. Sect. 1. Tom. IX. pag. 23. 24. ) : mollium ciborum sæpe reperita exhibitio prodest: cumque jam edentuli facti fuerint, solo fero lacte, iusculis, ovis, bis pueri facti senes vitam sustineant;

# 455. MORBI VISCER. FORTIUM ET RIGIDOR. 53

stineant : imprimis illis prodest moderatus vini usus, quod ideo lac fenum dicitur : Nascentur enim in fermentantibus liquidis aliquid miri spirituosum, quod momentanea actione in cerebrum & omnes nervos agit efficacissime ; imprudenter autem & nimia copia applicatum corpori humano, ipsam mortem, & subitissimam, facere potest : vel & minori violentia agens tristem magis ipsa morte conditionem adfert, amentiam nempe, & alia niala ( *H. B. Chem. Tom. I. pag. 306. 807.* ). Illud spirituosum in novis illis & petulcis venis hærens summum dat restaurans finis. Cornaro singulis annis mensè Julio & Augusto abhorrebat ab omni vino : hinc mox languebat appetitus, & circa medium Augusti debilis penitus factus erat : simulac vero per tres quatuorve dies Septembris mensis initio novum vinum sumserat, mox redibant vires, & crude in hoc viro senectutis vigor ( *Cornaro raadgeving om gezond en lange te komen leven pag. 54. 55.* ).

QUÆ VITA. Tenella ætate, cum agilissimum sit corpus, vix quiescere possunt, & pessime se habent, si a severis nimis parentibus vel custodibus a ludis pueri cohibeantur penitus. Cum autem nimis cito duris laboribus adhibentur, corpus redditur robustum quidem, sed cito periturum senili callositate ante ætatem. Sic videntur rusticos, a teneris annis jam nimis laboribus exercitatos, fenum instar rigidos & callosos factos quadragesimo ætatis anno.

Nec minus peccatur, dum severioribus disciplinis nimis cito adhibentur : sic sæpe præcoces & admirandos ingenii fructus exhibent ; sed fere semper brevi pereunt, vel postea stupidi & ad omnia fere inepti vivunt. Qualia exempla passim obvia occurrunt.

Adulris salubri corporis motu vires sustinere & firmare convenit, ne torpeat corpus, randenque opima pinguedine sepulti ( ut de Ptolomæo Ægypti Rege dixit Justinus ) ( *Lib. XXXIV. cap. 2.* ) sensus hominis nimia sagina careant. Quantum boni corpori humano præstent corporis exercitia, dictum §. 28. num. 2.

Senibus autem frictionem cum oleo mane post somnum commendat Galenus ( *De Sanitate tuenda Lib. V. cap. 3. Tom. VI. pag. 144.* ) jubetque, ut consuetis exerceantur laboribus, vehementia tamen laborum remissa : cumque minima diæta vitia senes sentiant, juvenes autem vix maximos errores, repetitis

Tom. I,

vibibus cibos molles ut sumant, jubet ( *ibid. cap. 4. Tom. VI. pag. 146.* ).

QUÆ MEDICAMENTA. Infantibus fere tantum videntur conducere illa, quæ humorum copiam aliquantum minuunt : Hinc tam bene ferunt lenissima impemis ex rhabarbaro purgantia. Profunt plerumque & illa, quæ acidæ acrimoniæ temperandæ conducunt, ut absorbentes ex lapidibus cancorum &c. pulvisculi : deinde quæ nimis facilem irritabilitatem generis nervosi aliquantum compefcunt, & simul solidas partes moderate roborant : hinc rhabarbarum, cum lapidibus cancorum & paxillo cinamomi, adeo prodest.

Increfcente demum ætate nunquam dentur talia, quæ stimulo suo motum humorum nimis incitant : metus enim tunc est, ne tenella rumpantur vasa.

Adultæ ætate profunt imprimis illa, quæ nimiam propensionem humorum in spissitudinem inflammatoriam tollunt.

Senectus autem, cum sit nihil aliud, quam ficcum & frigidum corporis temperamentum : annorum multitudinem proveniens ( *Galen. de Sanitate tuenda Lib. V. c. 9. Tom. 6. pag. 154.* ) requirit humectantia, & leviter nutritientia, additis gratissimis stimulis spirituosus ; sed semper humectantibus mistis.

QUENAM FIDES, QUÆ UTILITAS &c. Postquam Medicina in duas partes secta erat, quæ singulæ suos habebant sectatores, quorum quidam solis experimentis artem natam esse contendentes, evidentes quidem causas ut necessarias amplectebantur, obscurarum vero causarum & naturalium actionum quæstionem supervacuum esse credebant, dicebantque, Medicinam non esse inventam post rationem, sed post inventam Medicinam rationem esse quæsitam ; hinc experimentorum notitiam tantum necessariam esse contendebant ; vocabantur Empyrici. Alii, qui Rationales dicebantur, non negabant experimenta quoque esse necessaria, sed ne ad hæc quidem aditum fieri possiit, nisi ab aliqua ratione contendebant : sed præterea abditarum & morborum continentium causarum notitiam, deinde & evidentiū, post hæc etiam naturalium actionum, ideoque & partium interiorum notitiam necessariam esse volebant.

Inter rationales vero Medicos unus ex Asclepiadis sectatoribus Themison, & illo

D 3

auctore postea alii, artis difficilis compendium parabant, asserentes nullius causæ notitiam quidquam ad curationes pertinere, satisque esse quædam communia morborum intueri: & quidem horum tria esse genera, unum adstrictum, alterum fluens, tertium mixtum; nam modo parum excernere ægros, modo nimium, modo alia parte parum, alia nimium. (*Vide Celsi præfat. Lib. I.*)

Hæc fuit prima origo doctrinæ de stricto & laxo, de quo postea Prosper Alpinus in Medicina Methodica tam operose egit: & plurima circa hanc rem apud Cælium Aurelium, Methodicorum sectæ pariter addictum, habentur.

Sed proprie strictum & laxum in solidis tantum partibus obtinet: nec humorum morbi ex hac doctrina facile explicari poterunt; ut postea patebit. Magnum ergo usum habet in Medicina consideratio mutaræ cohesionis in partibus firmis: nec tamen omnes morbi inde deduci poterunt, ut voluerunt Methodici.

§. 56. **V**ulnus hinc (16) jam primo pertractandum, post morbos solidi simplicissimos. Sed, quum vitia liquorum spontanea semper trahat secum, de hisce ante vulnera agendum erit, quæ nosci debent ante historiam vulnerum absolvendam:

Post explicatos morbos, qui a nimio robore, vel nimia debilitate, solidarum partium pendent, videretur agendum esse de cohesione nulla partium antea coherentium, sive de soluta unitate (ut vocant): sed inter solutæ unitatis morbos omnium simplicissimus est vulnus, sive solutio recens facta a corpore duro, acuto, & moto. Constat autem certissime, ne minimum

UNDE DESUMENDA NOTA CERTISSIMA &c. Queritur hic, quænam sint signa, quæ doceant, talem obtinere cohesionem in solidis, ut nec nimis resistant, nec nimis facile cedant, distendentibus liquidis: deinde quænam sint signa, quæ nimis validam, vel nimis parvam cohesionem designant? Quando a pleniore victu, potu copiosiore assumto, aere humidiusculo, non statim tumet, vel saltem non diu tumidum corpus manet; novimus debitum robur inesse vasibus & visceribus, per quod distendentium liquidorum nimia copia brevi de corpore expellitur. Si simul non decrescat sensim adulti hominis corpus, arctatis nimia contractilitate vasibus, sicque expulsi liquidis, sed in eadem nec aucta multum tamen torositate perferat, novimus illud obtinere æquilibrium: si ab ingestis copiosioribus &c. statim tumeat corpus, novimus nimis debilem nimis facile dilatabilem esse vasorum compagem: si macilentia, exsucca, arida sint omnia, facile nimium robur vasorum adesse videmus.

pertractandum, post morbos solidi simplicissimos. Sed, quum vitia liquorum spontanea semper trahat secum, de hisce ante vulnera agendum erit, quæ nosci debent ante historiam vulnerum absolvendam:

posse infligi vulnusculum, quin laxis vasibus effundantur humores. Humores vero effusi, non amplius propriis vasibus coerciti, flagrant, nec nostri corporis leges sequuntur, sed spontanea corruptela mutantur in alienam insolem. Prius ergo debet explicari, quid humoribus extravasatis accidat, antequam de vulneribus aliquid bonæ frugis dici possit.

§. 57. **U**nde agetur primo de his humorum morbis, qui in illis nascuntur sponte; dum vel sibi ipsis permittuntur, nulla habita ratione vasorum, vel vitio incitati, torpenti sive nimium, vitalis motus.

Primo ergo considerandum est, quænam fiat mutatio liquidorum a causis communibus, quæ in omnia corpora agunt. Hæc autem mutatio vocatur spontanea. Quamdiu autem in vasibus nostris hærent liquida, vim corporis nostri experiuntur, & per hanc mutantur. Hinc nunquam sola spontanea mutatio in hæc agere potest, sed vasorum & viscerum efficacia longe aliam mutationem inducit: ergo, nulla habita ratione efficacie vasorum in liquida, sola mutatio per communes causas expendi debet: sic

lac humanum extra corpus in serum, caseum, & pinguem cremorem abit, quod nunquam in corpore fit.

Sed vitalis motus humorum per vasa nostra facit insignem mutationem in humoribus, imo aliani prorsus naturam inducit. Prout jam ille motus nimis incitatus surlibundo quasi impetu agit in acutissimis, vel torpens in languidis morbis silet sere, longe alia, imo opposita, sæpe mutationes inducuntur: quæ ergo necessario etiam debent examinari.



## § 58. 59. 60. MORBI VISCER. FORTIUM, ET RIGIDOR. 55

Tria ergo hic consideranda sunt, 1. quid fiat humoribus extra vasa positis a causis communibus, 2. quanam fiat mutatio in his ab aucto motu. 3. quanam oriuntur a moris defectu.

## DE SIMPLICISSIMIS HUMORUM VITIIS, ET SPONTANEIS.

§. 58. **H**umores in homine vivo reperiundi, vel crudi assumptorum naturam retinent hactenus, vel vi actionum naturalium, & miscella fluidorum humanorum, indolem acquisiverunt nostris liquoribus similem.

Omnes, qui fluunt per vasa nostra, humores vel ingestorum naturam adhuc retinent, vel per miscelam liquidorum humanorum, & valorum viscerumque vires, propria indole deposita, in nostram jam transiverunt naturam.

Quamdju autem ingesta adhuc aliquid de sua indole retinent, tamdiu cruda dicuntur. Crudus ergo est cibus & potus, dum degluuntur. Chylus inde factus, in ventriculo & intestinis, in vasis lacteis, cisterna lumbari, ductu chylofero, in vena magna, in corde dextro, crudus adhuc est, licet tot

coctis humoribus jam mistus. Cum per pulmones pellitur, incipit coctio secunda, quæ ex chylo lac facit: tandemque per aliquot horas chylus crædus expertus vim vasorum & viscerum, imprimis pulmonis, ingestorum natura deposita, assimilatur nostris humoribus, & coctio absoluta est.

Cumque hæc coctio satis longam requirat vel in sano corpore moram, hinc fere semper aliquid crudi, nondum penitus mutati, cum coctis humoribus per vasa fluit, nisi diu a cibo & potu abstinuerit homo.

§. 59. **P**riotes (§ 58.) vel ex plantis, vel ex aliis sunt hausti animalibus.

Ex regno enim vegetabili, & animali nutrimenta nostra sumuntur; ex fossilibus vix, nisi forte condimenta quedam:

ut sal marinus, gemmæ &c. vel si aquam quis inter fossilia numerare vellet.

## MORBI SPONTANEI EX ACIDO HUMORE.

§. 60. **L**iquida nostra, confecta ex plantis farinosis, vel ex horæis fructibus, crudis, fermentative, si vires vitæ nostræ vincant, eam in nobis indolem acquirunt, quam suæ naturæ per calorem lotæ debent. Acrimonia acida, & glutinosum pingue hinc oriuntur maxime. Prior ex fermentatis imprimis & non fermentatis: posterius ex farinosis cerealibus, vel leguminosis, non fermentatis, neque coctis nascitur; quo spectant etiam illa, quæ austeri adstrictu tenacitatem humorum creant.

Acidum dicitur, quod linguae applicatum excitat saporem illum, quem communi consensu acidum omnes vocant (sapor enim verbis describi non potest) quod naribus suppositum, imprimis si calefactum fuerit, odorem spirat, quem omnes vocant acidum: Omne acidum cum testaceis pulveribus, exustis animalium ossibus, creta &c. effervescit, uti & cum salibus alcalinis. Syrupus florum violarum a levissimis etiam acidis in rubrum calorem convertitur.

Omne jam illud, in quo recensitæ dotes observantur, acidum vocabitur.

Magna jam æitur quæstio, an tale acidum ingestis solis originem debeat, posteaque per vim humani corporis mutetur in non acidum; an vero in liquidis humanis sanis, vel aliorum animalium, acidum prius definitum existere possit naturaliter, sic ut arte inde educi possit?

Si lac exceperis, (& forte quedam pinguis) quod nondum penitus animale naturam

D 4 acqui-

acquirit, sed in quo ingefforum adhuc indoles prævalet, omnes humores reliqui, sibi relicti, in aere aperto putrefcunt. Omnia animalia sibi relicta, nisi magno calore efficeantur, putrefcunt. Chemica analysis sales volatiles alcalinos inde educit: plurimique & celeberrimi chemici inde acidum educi posse negant. Sani hominis de vena saliens sanguis nullam aciditatem habet: urina sana, sanguinis sales ablens, nullum signum acidi dat, etiam in illis, qui acidorum copiam magnam ingesserunt. Contrariam opinionem & specioso ratiocinio, & experimentis, defenderunt celeberrimi in arte viri.

Licet enim ingesta mutantur in corpore humano, antequam nutrant, forte tamen non semper omnes suas dotes deponunt. Volucrum, folis piscibus viventium, carnes ingratum piscium foetorem retinent; turdorum, thamni cathartici baccis vescientium, carnes purgant. Hinc cum tota acida ingerantur & acefcant, quædam posse aliquid pristina indolis fervare, probabile videtur.

Homburgius se ex variorum animalium sanguine, imo & ex ipso sanguine humano, acidum eduxisse destillando affirmat; & quod mirum videret, inde produxit liquorem, in quo & alcali & acidum simul aderant separatim hærentia, nec concreta in salem neutrum. (*Academ. des Sciences* 1712. *Mem. pag. 10. ad 19.*)

Ex viperis, limacibus, mulcis, formicis, acidum destillando eduxit idem Homburgius; phosphorus urinæ acidum acre habet. (*Academ. des Sciences* 1712. *Mem. pag. 352. ad 362.*)

Illud deinde Lemery confirmavit: (*Academ. des Sciences* 1719. *pag. 227. 246.*) imo salibus volatilibus animalium, distillatione inde ductis, acidum adhuc adherere voluit. (*ibid.* 1720. 218. &c.)

Acidum autem ex animalium partibus facile educi asserit, si prius macerentur, ut volatilis sal pro magna parte abeat; si addatur sal alcali fixus acida trahens, ac impediens, ne una cum sale volatili eleventur; si in initio adhibeatur ignis modicus, ut volatilissima prius eleventur; si postea valido igne torquantur, ut exprimatur acidum terrestri parti adhærens &c. (*ibid.* 1721. *Mem. 51. 52.*)

Liquidorum humanorum sales nulla arte

mutari ad sales ammoniaci naturam accedunt proxime: sed ex acido fixante & volatili alcalino sale simul unitis videtur constare sal ammoniacus: hinc & tale quid in salibus humanis forte obtinet: hinc expulso sale volatili, non mirum foret, in residuo hæere acidum, antea unitum cum sale volatili.

Sed efficacia vasorum & viscerum in corpore humano sales illi nascuntur. An ergo bina illa principia constituentia aliquando seorsim fluxerunt in humoribus nostris, unita postea? An acida ingesta per vim nostri corporis mutantur sic, ut suam naturam amittant penitus? An vero, non deposita sua natura, cum alcalino volatili concrefcunt in sales ammoniaci quasi speciem? interim sanguis hominis sani, & urina, nullam notam acidi præsentis exhibent.

Saltem hoc certo constat, plurima vegetabilia, & inter illa imprimis farinosa, cerealia, legumina, uti & horreos fere omnes fructus, in calore tali, qualem habet corpus nostrum, acquirere acidum acrimoniam, vel in glutinosum pingue mutari; eadem vero, ingesta robusto sano corpori, per vim vasorum & viscerum, & liquidorum humanorum miscelam, sic immutari, ut deposita sua indole in nostram convertantur naturam; dum vero a quacunque causa debile factum corpus minus assimilare valet ingesta, tunc salus sequuntur indolem, & in spontaneam degenerant corruptionem.

Acidi ergo in corpore humano origo videtur debere ingestis non satis mutatis per corporis vires. Peregrinum ergo corpori acidum est: nullus enim humor, vere animalis dicendus, nunquam sua sponte acefcit.

Omnia jam vegetabilia, sive fermentata sive non, quæ sibi relicta acefcunt, in corpore debili possunt & in acidum mutari: farinosa autem illa omnia cum aqua lenescunt prius, & glutinosas pastas formant; postea autem acida fiunt, ubi fermentatio tenacitatem illam glutinosam attenuavit.

Acidum autem ex ingestis sic in corpore natum vel mire & excoctum est, ut acidi plerique horæorum fructuum maturorum succi, ut in ribesibus &c. & in fermentatione paratis acidis; vel simul junctum habet austerum acerbum, ut immaturus fructus, & acida quædam fossilia, qua coagulo indurcti humorum augment tenacitatem.

Acti

§. 61. **A** Cida hæc acrimonia ( 60 ) causas habet antecedentes 1. alimenta ex farinosis, fuculentis acidis, recentibus, crudis, ferventibus jam, vel fermentatis, vegetabilium partibus. 2. Inopiam boni sanguinis in corpore hæc alimenta assumentes. 3. debilitatem fibrosæ compagis [ 24. 29. 41. ] vasorum & viscerum. 4. defectum animalis motus.

Recentur hic causæ, quæ acidum in humano corpore producere valent. Hæc commodè ad duas classes revocari possunt: sunt enim vel ingesta, ex propria sua indole in acrimoniam acidam degenerantia; vel talia quæcumque, quæ debilitant illam virtutem, quæ corpus sanum ingesta in suam naturam assimilant.

1. Enumerantur illa, quæ materialem causam acido generando præbent.

**FARINOSA.** Omnes farinæ sere satium & mitem saporem habent; cum aqua subactæ glutinescent; post fermentationem in liquores spirituosos mutantur; ulterius protrahæ fermentatione in acre degenerant acetum.

**SUCCULENTIS &c.** Quales sunt omnes succi fructuum horum bene maturorum, in immaturis enim austerum inest fermentationi non ita obnoxio ( *H. Boerhaave Chem. Tom. II. pag. 132.* ) hi succi jam vel sunt acidi, ut succus ribesiorum &c. vel facile post fermentationem in acidum degenerant; dulcis uvarum succus fit acidulum vinum, iterata fermentatione acerrimum acetum.

Quum autem fermentatio ultimo suo effectui acidum producat; hinc quo magis hi succi in fermentationem proni sunt, vel dum jam fermentationem abolverunt, eo citius inde in debilibus corporibus acidum nascitur: minus ergo succus recens pressus uvarum saccharinæ dulcedinis fere, plus dum incipit motu intestino agitari, & cum sibilo assidue crepitantes bullas habere, ( *fervere tunc dicitur* ) maxime, dum peracta fermentatione in vinum mutatus est, in acidum vergit. Debiles homines vinum potantes mox acidum eructant, nisi fuerit vinum oleosum meracissimum & non tam cito mutabile.

Sequuntur jam causæ efficientes:

2. Omnes actiones vasorum, & viscerum conspirantes ingesta mutant in naturam nostram: hoc autem fit partim vasorum actione, partim miscela fluidorum jam assimilatorum; sanguis autem bonus recondit mate-

rialiter in se omnes reliquos humores, bilem, salivam &c. & illi humores a sanguine secreti sequuntur sanguinis naturam: qui bonus est, quando ex assimilatis humoribus constat: crudus vero, dum ingesta adhuc quid retinent de sua natura. Dum ergo boni sanguinis inopia est, deficit primaria vis immutans ingesta in naturam nostram, vide de his, & §. 25. num. 1.

3. De his dictum fuit paragraphis citatis; & ibi apparuit, quantum solidorum robur faceret ad coctionem ingestorum. Hinc corpora laxa ab acidis & ascensibus ( id est nondum acidis, sed admodum dispositis, ut acefiant ) pessime se habent: in calidis vero regionibus, ubi strictissima corpora sunt, acidis maxime delectantur, & inde optime se habent. Romanis militibus in fervidis regionibus, bella gerentibus, familiaris potus erat acetum aquæ mistum, poscam vocabant. ( *Nonnius de re cibaria Lib. IV. cap. 15. pag. 479.* )

4. Chylus ex ingestis per viscera chylopoetica paratus sanguini parca copia simul miscetur, dumque sic cum sanguine fluit, vasorum & viscerum efficacia mutatur in lac: tandem post aliquot horas in sanguinem nostrum, deposita priori indole, transit. Totum autem hoc opus circulationis efficacia, & imprimis pulmonis actione perficitur. Quo autem quis motu musculari corpus plus exercet, eo celerior humorum per vasa motus, eo respiratio fortior & celerior: ergo tanto citior & faciliior ingestorum assimilatio. Durus arator atrum, & jam acidum, panem vorans, inde optime se habet; debili homini ingestus talis panis in rodens acidum convertitur, & molestissima cardialgia afficit. Hinc recens natis, qui debile corpusculum vix multum movere possunt, interim solo fere lac ste vivunt, toties ab acido morbi: procedente ætate dum alacriter currunt, nunquam fere quieti, minus his morbis obnoxii vivunt.

§. 62. **S** Edem habet jam nata maximæ primæ digestionis officinas, inde tardius sanguinem, denique omnes humores inficit.

PAT.

PRIMÆ DIGESTIONIS OFFICINAS. Omnis illa mutatio, quæ ingestis alimentis accidit per mandicationem, ventriculi, intestinorum, vasorum lacteorum, glandularum mesenterii, ductus chyliiferi actionem, donec venæ subclaviæ infunditur chylus, vocatur digestio prima. Omnia vasa & viscera, quæ suos liquores in toto hoc itinere affundunt, ad primæ digestionis officinam pertinent. Hujus primæ digestionis effectus est chyli productio: sed chylus semper aliquid de ingestorum indole retinet. In secunda vero digestionem (cujus effectus est sanguificatio) totum illud peregrinum deletur, & in nostram naturam tandem convertuntur ingesta. Cum ergo acidum peregrinum sit corpori, & ingestis suam debeat originem; facilius nascetur in illis locis, in quibus crudi humores ingestorum naturam adhuc aliquatenus retinent: longe difficilius autem ubi ingesta mutata nostris jam assimilata humoribus sanis fluunt.

TARDIUS SANGUINEM. Nec videretur hoc fieri posse, nisi tota digestionis primæ officina acido repleta fuerit. Minima lacteorum, & venarum mesentericarum oscula nihilo facile admittunt, quod acre est: contraherentur enim statim tenerissima horum vasorum orificia. Deinde chylus in ductu thoracico ingenti copia lymphæ diluitur: & talis chyli, tot jam humoribus diluti, minima copia subclaviam ingreditur: ibique mox torrente sanguinis abripitur, & dissipatur. Hinc licet aliquid levis acidi in chylis foret, illud sic dilutum evanesceret. Sed

chylus brevi temporis spatio cum sanguine fluens, mammarum fabrica inde separatus, lac dat: quod ductum de uberibus recens acidum invenitur forte nunquam; sibi relictum extra corpus, in calore aeris communis, acidum fieri novimus. An autem, ex mammis dum ducebatur, acidum unquam lac inventum sit vel in debilissimis feminis? nemo credo hoc facile affirmabit.

Cum ergo lac, adhuc remotum a sanguinis humani perfectione, vel nunquam vel rarissime inveniatur acidum; multo difficilius sanguis ipse acida inficietur labe: infici tamen posse, suadet quædam in morbis observata.

In morbis languidis aliquando sudor acidum spirans observatur, imo & aliquando in fine acutorum.

Acidulorum vinorum abusus podagram fecit, alcalinorum parco & repetito sæpius usu sanatum.

Atra sanguinis fax hypochondria occupans, soluta, mota, vomitu excreta, aliquando acidissima inventa fuit; sic ut lapides arderet, & cum terrestribus corporibus effervesceret fortissime.

Ossa acidis immerfa mollescent, flexilia fiunt; pleraque alimenta sunt aciescentia, quorum indoles mutatur in sano corpore: quando vero hæc vis immutans nimis debilis est, non superatur illa aciescentia ingestorum: tunc aliquando ossa, cartilaginea &c. flexilia redduntur, ut in Rachitidis. (H. Boerhaave Chem. Tom. I. pag. 373.)

§. 63. **P**RODUCIT RUCTUS ACIDOS, FAMEM, MORFUM VENTRICULI, DOLORES ILIACOS, FIATUS, SPASMOS, INERTIAM BILIS, MUTATIONEM EJUS VARIAM, CHYLUM ACIDUM, FÆCES ALVI ACIDUM SPIRANTES. HÆC EJUS EFFECTA IN STOMACHO, & INTESTINIS.

RUCTUS ACIDOS. Ructus est explosio materię elasticę, convulsivę constrictione fibrarum œsophagi & ventriculi compressę, mox liberatę: cumque in ventriculo & intestinis prædominetur acidum, sequitur hos ructus acidus esse debere.

FAMEM. A plurimis causis pendet famēs; inter quas, & stimuli recensentur, & inter illos imprimis acidi. Minime autem verum est, quod sola acida appetitum excitent, ut voluit Helmontius. (pag. 164. 24.)

BILIS, absinthii succus &c. appetitum languentem excitant: ab acido sæpe famēs ori-

tur; non tamen semper ubi famēs, ibi acidum adest. Docent hoc rapacissima animalia, quæ solis animalibus vivunt, in quorum ventriculis nunquam acidum; interim voracissima sunt. Infantes acido laborantes sæpe appetitu valido fruuntur, miranturque nutrices, quod avide comedentes nihil proficiant tamen.

MORSUM VENTRICULI. Sentitur tunc dolor satius acutus sub cartilagine ensiformi in illo loco, quem cæcibulum cordis vocant: dixerunt καρδιαγία, καρδισγία, quia ventriculi os καρδία (cor) dixerunt, uti ex Nicandro, Thucydide, Hippocrate probat.

bat Galenus ( *De Hippocr. & Platon. placitis Lib. II. cap. 8. Tom. V. pag. 108. & Comment. in Lib. II. Epidem. Tom. IX. pag. 124.* ) qui & alibi monuit ( *De Symptom. causis Lib. I. cap. 7. Tom. VII. pag. 57. 60.* ) quod nulla pars tam accuratum habeat sensum, nec utrumque principium una secum afficiat, ut et ventriculi, & vulgo & Medicis stomachus dictus; dum per nervos adeo magnos cerebrum, situs vicinia cor, afficit.

Ventriculus enim ipse non videtur adeo sensibilis esse, sed illud officium superius; dum enim acidum hæret in ventriculo quietum, non inde dolor oritur: sed simulac vel ructus expellens sursum, vel motus, vel mutatus situs corporis illud applicat officio superiori ventriculi; statim molestissimus doloris sensus adest. Ille ventriculi morbus non semper ab acido, sed & ab alia quacunque acrimonia, irritante cardiam, oriri potest.

**DOLORES TLIACOS.** Acidum sic in ventriculo ex ingestis natum, nisi bilis efficacia mutetur, in fistula intestinali mora & calore acrius factum, rodendo, vellicando, enormes dolores facere potest: hinc ventris tormina infantibus adeo frequentia.

**FLATUS, SPASMOS.** Aer, libere in cavo ventriculo & intestinis hærens, nihil mali facit: sed docuerunt experimenta, in vivis animalibus capta, quod si intestinum tangatur, verbis gratia, spiritu vitrioli, in quodam loco, stringatur illico valido spasmus: si in alio loco parum distante hoc iterum fiat, stringitur & ibi: mox intermedia pars intestini inflatur ab incluso aere rarefacto. Ubi ergo acidum in intestinis hærens irritando spasmos producit, quibus ardeatur in diversis locis intestinum, inclusus aer rarefactus illud dislindit, & solutus his spasmis, cum impetu exit vel sursum, ructus faciens, vel deorsum, flatus producens; vel, mutato tantum loco, in intestinis oberrans cum murmure, borborygmus dicitur. Accedit præterea, quod omnia fermentantia copiosam generent elasticam materiam. Hinc duplici de causa flatulencia oritur ab acido: ab irritatione, qua intestinorum fibræ spasmis contractæ inclusum coercent aerem, & a genita materia elastica in omnibus ad fermentationem pronis liquidis: hinc acido laborantes adeo sunt flatulenti.

**INERTIA BILIS.** Simulac ex ventricu-

lo per pylorum exit chylus in duodenum, utraque bilis admiscetur, summum auxilium ad mutationem peregrini humoris in naturam inquilinam. Sed bilis inter omnes humores nostros non excrementitios acerrima est; & cito in putredinem prona: hinc circa hepar cadavera citissime putrescunt. Hujus admistio nimiam sæpe chyli acefcentiam tollit, omnia dividit, solvit, & ad æquabilissimam miscelam disponit. Hinc cerevisias, ne nimis cito acefcant, amarissimis plantis, bilis fere æmulis, lupulo, absinthio &c. condiunt. Ubi ergo prædominatur acidum, bilis natura quasi invertitur, & ejus efficacia iners redditur. Patet hoc in infantibus acido laborantibus: in illorum enim ventriculo colostrum caseosum lactis fecedit, quod a bile, quamdiu bona est, solvitur; & tunc fæces alvinæ flavæ & æquabiles apparent: sed ubi prædominante acido bilis iners fedditur, integra fragmenta caseosa alba per alvum exeunt.

Si bilis aliorum animalium inspissata parum, in minima carapopia redacta, parca copia ingeratur quotidie, sæpe fatis cito superatur hoc malum. Quamdiu enim bilis iusta temperies adest, illibata fere obtinetur sanitas: dum enim abundat, vel nimis acris est, putridi morbi sunt; dum vero deficit, vel iners reddita est, morbi sunt chronici: quorum plurimi a mala digestionis primæ officinæ orti, sensum natis humorum vitiis, sanitatem opprimunt.

**MUTATIONEM EJUS VARIAM.** Quamdiu infantes bene se habent, fæces alvinæ flavæ & æquabiles sunt: dum incipit in his acidum prædominari, fæces excretæ flavescunt quidem, sed post dimidiam horam in aere aperto viridescunt: si augetur malum, jam virides fæces excernuntur: & quidem aliquando tam saturati coloris, ut æruginis instar maculis vix delendis lineæ tingant. Hinc ex colore fecum alvinarum in infantibus acidi copia & acrimonia fere determinari potest.

Verum quidem est, & ab aliis causis æruginosam illam bilem nasci posse, uti alia occasione diceretur; sed in tenera illa ætate fere semper ab acido prædominante fit.

**CHYLUM ACIDUM, FÆCES ALVI ACIDUM SPIRANTES.** Si ventriculus & intestina acido sic repleta sunt, tunc & chylus poterit acidus esse, ut facile patet: sed non

non facile oscula minima lacteorum intrabit, quia ab omni acri constringuntur. Tandem & ipse faeces alvine acidum spiant, quod in infantibus acido laboranti-

bus observatur sæpe; tuncque designat totam primæ digestionis officinam acido plenam esse; simulque indicat magnum periculum.

§. 64. **I**N sanguine pallorem, serum chylosum acidum; hic foeminae lac acidum, aut potius nimium accefcens, sudorem acidum; salivam acidam, producit; inde pruritus, obstructions, pustulae, ulcera, lactis prompta nimis, quin & forte ipsius quoque sanguinis coagula, & ad circuitum ineptitudo exsurgunt, tum irritamenta cerebri nervorumque; unde convulsio, turbata circulatio, mors.

**PALLOREM.** Omnes, in quibus acidum prædominatur, pallent: patet in infantibus, teneris pueris, & viris laxæ temperiei. Sed pallor ille designat defectum solidissime rubræ partis in sanguine. Ubi autem hæc deficit, minor fit assimilatio crudorum in naturam nostram: hinc facilius degeneratio in spontaneam corruptelam. Ergo, & pallor ille non tantum ut effectus acidi in corpore geniti considerari debet; sed & ut præfagium acidi futuri, ob debiliores vires assimilantes. Videntur præterea acida corpori ingesta pallorem illum facere: acrum labiis applicatum illa pallescere facit. Illi, qui acetum ex vino vel cerevisia parant, quotidie in aërè, acidis vaporibus pleno, versantes & pallent sæpe.

**SERUM CHYLOSUM ACIDUM.** Quod maxime distinguendum a sero cocto sanguinis, quod flavum ad ignem concrevit, & nunquam nec acidum, nec accefcens, invenitur; sed spontanea corruptela in putredinem pronum est. Per serum chylosum autem hic intelligitur chylus cum sanguine fluens, nec satis subactus viribus corporis; hinc nimis diu suam naturam servans, quam in acidum vergit: ex chylis enim cum sanguine circumducto fit lac; ex hoc lacte porro serum sanguinis, & sanguis ruber, continuata per horas viginti quatuor circulationis efficacia; sed si debilius hæc vis fuerit, non mutabit, vel saltem non tam cito, lactis naturam: hinc lactis accefcencia nanebit, & forte in debilissimis acidum fieri poterit in sanguine ipso.

**HINC FOEMINIS LAC ACIDUM AUT POTIUS NIMIUM ACCEFCENS.** Lac raro, si unquam, observatur acidum in mammis: sed potest fieri facile tale, ut citissime accefcet. Fœmina sana, si per viginti quatuor horas nihil assumerit cibi vel potus, non habebit lac in manibus, sed serum flavescens

falsum, a quo abhorrent infantes: ratio est, quia omne lac per vires circulationis jam in serum mutatum est, & ingestorum indole deposita in naturam humoris iniqui transivit. Si jam debiliores fuerint hæc vires immutantes; lac diutius retinebit illam dotem, quam in acidum vergit: hinc eo citius accefcet, quo minus subactum est. Sed hæc subactio pendet a robore sani corporis, & a nova lactis in vasis, in quibus cum sanguine fluit: hincque ratio apparet, quare statim post partum, vel ex debilis nutricis uberibus ductum lac, accefcet citius.

**SUDOREM ACIDUM, ET SALIVAM ACIDAM.** Rarius forte, nec nisi in debilissimis: facile patet, si sanguis acidum in se habeat, quod & secreti inde humores illud habere possint.

**PRURITUS &c.** Videmus, quod omnia acriora ad cutem delata pruritus, obstructions circa subcutaneos imprimis folliculos, pustulas &c. excitant. In ictericis bilis ad corporis superficiem delata intolerabilem sæpe pruritus excitat. Si acida acrimonia infecti humores huc transeant, idem fiet. Rusticorum pueri, immaturos fructus, penitus austeros, dum comedunt, malis sæpe cutis morbis cum summo pruritu laborant. In prima ætate miris illis cutis erosionibus infantes laborant sæpe.

**LACTIS PROMPTA NIMIS COAGULA.** Lac nimis jam vergens in aciditatem, in receptaculis galactophoris mammarum flagrans, collectum, ibi forte potest acidum fieri: separabitur tenuis a parte caseosa serum; effluet per papillas; relictum crassamentum hærens duros tumores, inflammationes &c. facere potest. Longe tamen frequentius mammarum a coagulato lacte inflammationes fiunt, febre prius valida prægressa: tuncque alcalcescens potius degeneratio est: forte centies Medici observant, lac coagulatum

# §. 64. 65. 66. MORBI SPONTANEI EX ACIDO HUMORE. 61

*fic a febris, ubi nec semel id vident factum ab acido (H. Boerhaave Chem. part. 2. p. 303.)*

IPSIVS quoque SANGUINIS COAGULA. Acida fortissima fossilia sanguinem coagulant: vegetabilia mitiora longe potius illud diluant: hinc rarius videtur acidum, in corpore ex ingestis natum, posse sanguini inducere coagulum: tamen si attrahilis, quæ, ut Veteres jam observaverunt, aliquando jam acida est, ut terram fermentet, lapides rodant instar aquæ stygiæ, sanguini miscetur, lethale certo inducet sanguini coagulum.

IRRITAMENTA CEREBRI NERVORUMQUE &c. Certum est, si acre quoddamque tenebram cerebri, & nervorum fabricam attingere possit, quod turbarentur omnes, quæ independent, functiones. Rarius tamen acrida ad minima illa vasa pertingere possunt. Cavit sollicita natura, dum ubique fidelis custodia impedit, ne admittantur talia. Acerrima quævis impune in ventriculum demittunt homines, quæ si ad cerebrum deferri possent, illud destruerent. Si oculum tangat levissimus fumus, clauditur illico: si nares, quantal oritur sterutatio! si pulmonem, tussis orta averrit hoc noxium: si quid acris insueti ingrediatur ventriculum & intestina, quanti vomitus, diarrhoeæ &c.

Omnes fere homines totius corporis ex locis propriis deducuntur ad hæc loca, ut illud abluant: sed ubi in maioribus omnibus organis lex quædam admittitur, vide-

§. 65. **E**X his (60. 61. 62. 63. 64. 65.) scitur acida temperies: hinc præ-

PRÆSENS acida temperies nascitur, si color in angulis oculorum, ore interno, faucibus, labiis pallidus sit: ructus sint acidi: sitis fere nulla, frigus & laxitas in toto corpore: fœces alvinæ acidum spirant: urina aquosa alba: appetitus satis magnus plerumque.

FUTURA. Si temperiem debilem, & laxam, sanguinem dissolutum, vitam otiosam, ruagnam iacturam sanguinis prægressamuisse noverit Medicus, & interini talia alimenta assumpta esse, quæ spontanea mutatione in acidam acrimoniam degenerant: tuto præfigiet futuram brevi in tali corpore acidi

tur & eadem obtinere in minimis. Certe cortex cerebri, omnibus vasibus sanguineis separatis, satum valde saporem habet, & oculo applicatus dolorem nullum facit. Hinc non tam facilis ingressus acrum in minima vasa, ac crediderunt multi: sed alia videtur esse ratio, quare irritamenta cerebri, nervorum, & infinira, quæ inde sequuntur, mala oriuntur ab acido hærente in primis viis: nervi enim, per ventriculum & intestina dispersi, mirum imperium habent in omnes partes corporis, ulli certissima docent exempla. Vermis, repletu suo irritans nervosas has partes, convulsiones toties facit: hœrnia suffocata toties subitam mortem, & ante mortem sæpe omnia turbati cerebri signa. Attra bilis hæc viscera occupans quam miras mentis alienationes facit! Venena ingesta, in ventriculo adhuc hærentia, totum corpus turbant ad mortem usque: opium deglutitum, in ventriculo adhuc contentum, solum vix, omnes dolores pacat, nimias evacuationes sistit &c. hinc videtur acidum natum in primæ digestionis officina sola irritatione nervorum, per hæc viscera dispersum, posse mirabiles morbos, imo mortem ipsam, facere: neque ad hæc producenda requiri, ut acidum sanguini mistum, ad cerebri & nervorum intima perveniat. Imprimis autem hoc fiet in illa ætate, in qua totum nervorum systema maxime mobile est: hinc toties infantibus acido laborantibus convulsiones accidunt.

recitatis præsens, futura, præterita cognitionis ejus effecta: hinc curatio scitur. generationem, dum bina hæc juncta videt, acescentia ingesta, & vires nimis debiles, ut hoc corrigant.

PRÆTERITA autem ex modo dictis facile cognoscitur.

EFFECTA, quæ varia erant, antea jam commemorata, prout vel primas vias solas, vel & ipsum sanguinem, jam inseuerit acida labes: iterumque ex observatis acidi prædominantis effectibus illud adesse cognoscitur.

Ex omnibus autem his curationis requisita patent facile.

§. 66. **Q**Uæ perficitur 1. alimentis acido oppositis ex animalibus, vegetabilibusque. 2. succis bono sanguini similibus ex avibus rapacibus. 3. roborantibus. 4. motu valido. 5. medicamentis acidum absorbentibus, diluentibus, obundantibus, immutantibus.

Si omnes forent ab acido morbi, ut voluit quædam Medicorum secta, ars medica longa minime foret, sed brevi compendio tradi posset. Si enim homo acido pessime laboret, viscera tamen omnia adhuc integra habeat, videtur intra paucos dies posse curari; & quidem solo victu, sine medicamentis: si sola aqua pro potu utatur, pro cibo solis carnibus vel piscibus, vel illorum iusculis.

1. Nullum animal sponte sua in acidum vergit, in putredinem semper: hinc omnia quæ ex animalibus petuntur alimenta, acido opposita sunt: imprimis carnes animalium assatæ; tunc enim magis ad oppositam indolem dispositæ sunt: pisces autem imprimis hic conveniunt, qui longe citius putrescunt quam carnes: imprimis pisces illi, qui alios pisces vorant, uti lucius piscis &c. huc spectant & carniun iuscula, & gelatinæ inde factæ: sic gelatina, ex cornu cervi rasura facta, intra biduum æstivo tempore jam putrescit.

VEGETABILIBUS. Pleraque vegetabilia æscunt, non omnia tamen. Amara fere omnia acido resistunt; hinc cerevisias his condiunt, ne æscant. Brassicarum fere omnia genera sibi relicta putrescunt; decoctum certe brassicarum jam aliquid subputridi foetoris habet: plantæ illæ antiscorbuticæ acres ut cochleariæ, raphani, sinapi &c. putrescunt, non fermentantur; imo & recentes destillatæ sale volatilem alcalinum exhibent: hinc in morbis illis scorbuticis frigidis tantum usum habent, dum, & acido resistunt, & efficaci stimulo languentes functiones excitant.

Pro potu sola aqua; omnes enim cerevisiæ æscunt. Si debilitas vini usum suadeat, sumatur oleosum, ineratam; quale Hispanicum, Hungaricum, Canarinum &c. vel detur post vinum assumtum absorbens aliquod, quod acidum vini corrigat.

2. In Materia Medica recensitæ sunt tales aves, quæ aliis animalibus vivunt: hinc illarum carnes in alcalinam putredinem magis pronæ sunt. Bos solo gramine vivit, & gramine, per corporis efficaciam mutato, constat: ideoque huius animalis carnes magis quasi ad vegetabilis naturam accedunt, sed dum aliis animalibus pascuntur aves, materia nutritivæ ingesti jam animalis naturam habet, & ulterius adhuc in corpore assumptis perficitur, hinc hæ-

rum avium carnes libidinosam illam dictam saporem habent; & nemo illis diu, sine acidis condimentis vel sale, vivere posset; adeo in putredinem pronæ sunt.

Ut autem curetur acidum prædominans in corpore humano, tria requiruntur: 1. ingestio talium alimentorum, quæ spontanea mutatione numquam in acidum, sed in acido oppositam indolem, vergunt: de his actum fuit binis prioribus numeris huius paragraphi. 2. Corporis actiones, quæ cruda ingesta assimilant in naturam nostram, excitandæ & roborandæ sunt: de his agitur numero tertio & quarto huius paragraphi. 3. Acidum præsens nociturum debet tolli vel iners reddi: hoc docet ultimus huius paragraphi numerus.

3. De his jam dictum fuit num. 4. §. 28. & ob hanc rationem ipsa acida austera, corpori ingesta, sæpe acidum tollunt non admisione suæ substantiæ, sed ratione effectus ultimi, per quem actionem vasorum & viscerum in ingesta augent. Plerumque tamen eliguntur illa, in quibus vis roborans sine acido simul præsentem adest: Omnibus fere palmam præripit Momma Brunswicensis, quæ Cereris quasi syrupus in Indias delata summis illis caloribus sine ulla mutatione resistit, & in morbis omnibus languidis plus prodest fere, quam sperari posset: sic & vina omnia, imprimis oleo illa meracissima, quatenus roborant & motum augent, sunt antacida; imprimis si aromata stimulantia addantur.

5. Quid motus, & exercitia corporis valeant in roborando corpore nimis laxo in solidis partibus, dictum fuit num. 2. §. 28. sed per motum auctum actio vasorum & viscerum augetur, per quam ingesta mutantur in naturam humoris inquilini, qui semper in putredinem, numquam in acidum, vergit: dum valido labore corpus exercetur, urina fit longe acrior, & jam aliquid subputridi quasi spirat: sudor flavescens olidus exprimitur; imo nimis laboribus corpus ad morbos acutos putridos disponitur. Mirantur sæpe Medici, debilia illa corpora, debellato optima quamvis methodo acido, paulo post iisdem languere morbis. Fit hoc tantum fere, quia negligunt corporis exercitiis firmare corpus: certo enim semper redit morbus, nisi augeatur muscularis motus, vel ejus defectus validis frictionibus suppleatur. Hinc rustici, pane secalino jam



§. 66. MORBI SPONTANEI EX ACIDO HUMORE. 63

acido, lacte ebulliato &c. quamvis utantur, duro labore hæc omnia superant, nec acido inde laborant.

5. **ACIDUM ABSORBENTIVM.** Principia in Materia Medica enumerata sunt. Sunt autem talia medicamenta, quæ habent hæc peculiarem dotem, quod acidum in liquidis latens ad se trahant, illud a reliquis liquidis partibus separent, & cum illo concrecant quasi.

Spiritus aceti purissimo sensim immisi lapides cancrorum in pollinem tritos, oriebatur sibilus, effervescentiæ motus, & videbantur dissolvi: sic tamen ut quiescente liquido, flocculenta plurima secederent, sensimque fundum pererent. Moto vase hi flocculi æquabilissime miscebantur liquido supernatanti. Perrexi addendo lapidum cancrorum pulverem, donec in fundo non dissolutus maneret, & nulla fierent amplius effervescentiæ signa. Filtro dein depuratum liquorem gustaus inveni saporem acidum utcumque, miscens tamen syrupo florum violarum, nulla fiebat coloris mutatio. Parum hunc liquorem ex alta ecurbita superimposito alembico, lenissimo igne destillavi: prodit notabilis copia spiritus ardentis, in quo nulla apparebat acidi nota. Hoc spiritu expulso, aucto parum igne prodit aqua, quam ex odore, & sapore acidi quid habere suspicabar; tamen hæc aqua nec mutabat syrupum florum violarum in rubrum colorem; nec effervecebat cum oleo tartari per deliquium; nec mutabat solutionem mercurii sublimati corrosivi aqua pura factam. Perrexi inspissare residuum liquorem fere ad siccitatem: erat tunc sapore salis, subamaricans: conclusi inde in hoc residuo hætere acidum aceti, unitum cancrorum lapidum pulveri: addidi dein hæc residuo potentius acidum, vitrioli nempe oleum, ut illud exciteret cancrorum lapidibus adhaerens aceti acidum: dein lenissimo igne ex vasis purissimis destillavi: habuitque spiritum acidum valde fugacissimum, naves ferientem penetrabilissimum odore.

Cum ergo aceti generatio videatur pendere a combinatione ardentis spiritus cum acido paulo fixiore, quod in vino hæbat (*H. Boerhaave Chem. part. 2. pag. 214.*) apparet clare ex experimento narrato, quod lapides cancrorum habeant hanc vim, ut acidum aceti separent a reliquis aceti par-

tibus, quibus coherere; & deinde ut illud acidum sibi uniant sic, ut quædam hæc unio manet, non agat ut acidum.

Hinc apparet absorbentium pulverum utilitas: ex se enim inertes fere videntur, efficaces tantum, ubi acido occurrant: interrim nulla acrimonia corpori nocet.

Unicum restat monendum de horum absorbentium usu: solent in officinis supra porphyritem terere hos pulveres in subtilitatem pollinis impalpabilis, ut æquabilis dilui possint in mixturis, nec ingrato sub dentibus stridore displicerent: sed tunc acquirit hanc proprietatem, ut vel cum aqua pura concrecant, & longe magis adhuc, si in primis viis occurrant glutinosos humores; tunc si non adsit sufficiens copia acidi, quod solvere possit, in massas difficulter postea resolubiles, mole & pondere gravescentes, concrecant.

Nulla docuit observatio, pretiosas margaritas ad hos usus præferti debere vitibus cancrorum lapidibus.

Omnium autem absorbentium actio, quæ acidum domant, videtur tantum in primæ digestionis officina obtinere.

**DILUENTIVM.** Quæ sunt aqua; & deinde omnia talia, in quibus aqua prædominetur. Oleum vitrioli comburit omnes partes corporis, quas tangit: idem illud vitrioli oleum, dilutum maxima copia aquæ, non nocet amplius: sed quia acidum plerumque in debilibus corporibus prædominatur, aquosa autem diluentia, dum acidi vires enervant, simul solidarum partium robur debilitant (vide §. 35. num. 1. 3.) fibrosæ autem compagis debilitas infer causas acrimoniæ acidi in corpore natæ reuferetur: (vide §. 61. num. 3.) ob hæc ergo causam absorbentia præferuntur diluentibus.

**OSTUNDENTIVM.** Vocantur obtundentia, quæ molibus suis, & imprimis oleosis, partibus sic involvunt omnia acria, ut illa inertia reddant: simul omnes partes corporis, quæ oleosis imprimis illis obtundentibus reguntur, ab omni rosione defenduntur. Dum lapide infernali, mercurio sublimato corrosivo &c. in quibus concentratissimum acidum metallo solito adhaeret, Chirurgi erodere volunt corporis partes, pinguis applicatis vicina loca defendunt: dum venena acria ingesta sunt, nil plus proficit, quam olei ingens copia posita.

Accertissimum vitrioli acidum, oleo unitum,

tum, concoctis in blandum sulphur : quod, insipidum tunc, tollens illud acidum continet. Hinc insipientibus acido laborantibus molissima illa olea adeo profunt. Hanc tamen noxam habent, quod simul solidarum partium compagem laxent & debilitent (vide §. 25. num. 7.)

Huc etiam referuntur juscula ex animalium partibus inspissata in gelatinas : quæ & glutine suo acidum inviscant, & simul profunt, dum ex propria sua natura in putredinem semper, nunquam in acidum verunt.

IMMUTANTIA. Vocantur hæc immutantia, quæ acido occurrentia cum illo uniantur in novam salis speciem ; in quo sale

nec acidum nec alcali prævalet, sed vocatur Chemicis sal neuter vel sal compositus, optimas resolvendi vires obtinens. Dum oleo vitrioli acidissimo miscetur acris liquor salis tartari per deliquium soluti, ex binis acerrimis nascitur sal blandus compositus, quem tartarum vitriolatum in officinis vocant ; optimum deobstruens remedium.

Talia jam sunt omnes sales alcalini fixi, ex vegetabilium combustorum cineribus elixivando parati : præterea omnes sales volatiles ex animalibus & vegetabilibus confecti. Huc & referuntur omnes saponēs, ex sale alcalino, sive fixo, sive volatili & oleo parati.

§. 67. **Q**UORUM electio, præparatio, dosis, applicatio tempestiva, innotescunt Medico ex cognito malo, ejus sede, ægrotante, &c.

ELECTIO. Ex recensitis præcedenti paragrapho eliguntur jam illa, quæ maxime conveniunt pro varia indole & sede mali, & varia ægrotantis natura. Tenerrimis infantibus raro damus sales alcalinos vel fixos vel volatiles ; vel saltem exigua tantum quantitate ; quia, nisi statim occurrat acido, sua acrimonia æque ledere possent ac acidum ipsum. Sed his damus absorbentia, in quibus nulla lædens acrimonia est ; vel saponēs, in quibus alcalini salis acrimonia oleo sic obvoluta est, ut non noceat. Interim acido potentissime resistunt. Si acidi rosione excoriata sint intestina vel ventriculus, ad oleosa confugimus, & gelatinas ex animalium partibus confectas. Si una cum acido lentum glutinosum addit in primis viis, quod absorbentes pulveres inviscando inutiles redderet ; sales alcalinos fixos albibemus, qui & omne glutinosum lentum dividunt, & acidum mutant in salem neutrum. Si jam ipsum sanguinem infecerit acidi labes, simulque frigus & inertia adsint, ut fit plerumque ; alcalini volatiles sales mobilissimi profunt, qui simul efficaci stimulo languentem vitam excitant. Profunt tunc & sales alcalini fixi, quatenus in chylo diluti videntur sanguinem ingredi posse. Absorbentium non adeo tunc laudatur usus, quia non facile videntur vasa lactea posse ingredi. Si simul roborandum est corpus, limatura ferri præfertur reliquis.

PRÆPARATIO. Sales alcalini volatiles, vel fixi, diluti in aqua pura dantur opti-

me. Ubi metuitur, ne effervescentia facta in concursu acidi, & alcali molesta oriantur flatulencia, alcali cum oleo coctum in saponem exhibemus. Absorbentia non in nimiam tenuitatem trita damus, ut jam monitum fuit in paragrapho præcedenti. Est præterea alia præparatio absorbentium in quibusdam officinis, non multi usus, ut videtur : absorbentes pulveres solvunt in aceto stillatorio, solutos præcipitant, affundendo oleum tartari per deliquium : dein subsidentem pulverem ablutum servant : vocant magisteria. Tractavi hac methodo lapides cancerorum, & inveni magisterium inde factum nil aliud esse, nisi tenerrimum pulvisculum lapidum cancerorum, qui aque effervescebat, & solvebatur in aceto stillatorio, ac ante. Hinc satis inutilis videtur hic labor : nec tamen verum est, ut dixerunt quidam, hæc magisteria cum acidis non amplius effervescere.

DOSES. In absorbentibus non facile peccatur ; tuto enim larga dosi dantur, cum ex se ipsis non adeo actiosa sint, ut nocere possint. Nec in diluentibus, aut obtundentibus, anxia cautela requiritur : sed immutantia, semper acria cum sint, limitatam magis dosim requirunt : uti in Materia Medica notatur.

APPLICATIO TEMPESTIVA. Dum in primis viis hæret acidum, maxime convenit, leni stimulo purgante addito, remedia antacidia per totum intestinorum tractum deducere, dum in sanguine hæret, volatiles alcalini sales, disposito simul

## §. 67. 68. 69. MORBI SPONTANEI EX ACIDO HUMORE. 65

mul ad sudorem corpore, imprimis profuit.

Dum infans ubera matris ducens acido laborat, possimus acidum præcens tollere & enervare; sed victum ex alcalescentibus tali infanti exhibere nequimus; cum præter lac

omnia fere reliqua fastidiat. Hinc tempestiva applicatio tunc requiritur, ut matri præscribatur victus talis, qui chylum & lac reddat quam maxime alienum ab acida acrimonia. De his dictum in §. 65. n. 1. 2. 3. 4.

§. 68. **H**inc patet car pueris, pigris, virginibus, pauperibus, & certis artificibus, hic morbus familiaris sit.

**CUR PUERIS.** Solo fere lacte materno vivunt, vel pulticulis ex farinosis, pane, lacte animalium: solida omnia habent tenerima: carent animali motu fere.

**PIGRIS.** Dum inerti otio torpent, corpus vix moventes; omnium vasorum & viscerum actiones debilitantur, ingesta non assimilantur, sed spontanea corruptela degenerant: cumque pleraque, quæ assumimus, acescere possint, ut panis, cerevisia, vinum, cetera pleraque &c. hinc non mirum, acido repleti talia corpora.

**VIRGINIBUS.** Quia laxiorem corporis compaginem habent; otiose vitæ nimis deditæ sunt, diutiores si fuerint, sedentario autem labore victum sæpissime querunt illic, quibus angusta res est, & aquis tepidis poribus, saltem in his regionibus, nimis delectantur.

**PAUPERIBUS.** Qui in his locis raro car-

nibus uti possunt; lacticinis, imprimis lacte ebutyrato: hordeo, avena, sagopyro, oryza &c. oleis, cerevisia tenui vivunt; plurimi ex illis sedentario labore victum querere debent; vel saltem tales artes exercent, quæ non adeo validos motus requirunt.

**CUR CERTIS ARTIFICIBUS.** Omnes illi, qui tales artes exercent, quæ requirunt ut tota die in aere, acidis halitibus repleto, versentur, frequenter acido laborant. Bibula enim in tota superficie corporis venæ ex aere miltum resorbent, aer talibus plenus inspiratur; per ventriculæ & intestinalis oberrat: hinc totum corpus tandem acido quasi repletur. Hinc videmus pallidos languidos, tumentes tam sæpe illos, qui cerevisias, aceta conficiunt, aquas fortes parant &c. tanta enim copia acidæ corporis quotidie ingreditur, ut motu & robore corporis superari nequeat.

## MORBI A GLUTINOSO SPONTANEO.

§. 69. **G**lutinosum pingue ex vegetabilibus habet causas antecedentes. 1. farinosa cruda, austera immatura. 2. inopiam boni sanguinis. 3. debilitatem vasorum, viscerum, bilis. 4. imminutam motum animale. 5. dissipationem liquidioris per laxata vasa secernentia. 6. retentionem crassioris debilitate instrumentorum exercentiam.

Uti multi a solo acido plerosque morbos deducebant; sic alii a pituita derivare illos conati sunt. Ubique hanc damnabant, semper de corpore eliminandam volebant, licet multis in locis corporis naturalis sit, & ab huius pituitæ defectu plurimi, & difficillimi morbi, oriuntur sæpissime.

Glutinosum jam dicitur omne corpus, quod ad fluidi naturam utcumque accedens tale est, ut ejus partes tanta tenacitate cohaereant, ut in filamenta se duci patiantur. Hinc glutinosum quasi semiliquide naturæ est, sed cum tali partium lentore, ut motu coherendo quasi inter se teneant.

In omnibus liquidis humanis, si subtilissima forte, & quædam excrementitia, excipiantur, lentor adest: sanguis & ejus se-

rum, bilis, saliva &c. aliquam tenacitatem habent, quæ ad sanitatem requiritur: simul ac enim sanguis plasticum illum lentorem amisit, & in nimiam reauitatem degeneravit; nascitur hydrops.

Sed & observantur in corpore sano a sanguine secreta liquida, quæ optimo jure glutinosa dicenda sunt: v. g. liquor unctuosus articularis lubricandis inserviens; mucus naturalis partes membranaceas corporis plurimas defendens & lubricans; ut in ventriculo, œsophago, intestinis &c. arteriarum interni parietes quoque mucoso tali sinestate obducuntur &c.

Hinc non semper glutinosum damnandum est, tanquam morbosum; cum pituita ex lege corporis nascatur in sanita-

to illibata, & tam pulchros usus habeat.

In hoc capitulo autem de pituita morboſa agetur, quæ vel ingeſtis, glutinoſa nimis tenacitate præditis; vel abundantis nimis aut ſpiſſiori redditæ pituitæ naturali originem debet.

Duplicem pituitam Veteres agnoverunt, illud, quod uſum & velut ſupra modum in ſuccis coſtum erat, vocabant Phlegma (*αἷρε τῆ πλεγματικῆς*, quod uſum eſſe ſignificat) illud autem albi coloris, quod omnes pituitam vocant, *λευκῆς* (mucum) dixit Prodicus in opere de hominis natura (*Genera de natural. facult. Lib. II. cap. 9. Tom. V. pag. 50.*)

Prius illud erat phlegma calidum, & phlegma phlegmonodes dictum: poſterius erat frigidus lentus humor, qui ſimpliciter pituita, vel & phlegma frigidum dicebatur.

Phlegma illud calidum in ſanguine venis educto, in morbis inflammatoriis, apparet ſæpe; ubi inſulæ ſuperficies coriacea tenaci alba lamella tegitur: phlegma frigidum in catarrhoſis morbis tanta copia ſecernitur.

Cauſæ jam nimis pituitæ recenſende, quatenus ex his prægreſſis in corpore ſano naſci & accumulari poſſit.

1. Omnes farinæ plus minusve, cum aqua ſubactæ, lentſcunt. Amylum, farina ſubtiliſſima, gluten dat adeo notum: farina ſeminum lini cum aqua in paſtam tenaciſſimam abit, indomabilem corpori, ſi aſſumitur, uti dictum §. 25. n. 1. Sed hoc faciunt farinæ crudæ imprimis: ſi enim fermentatio acceſſerit, licet levis & incepta tantum, frangitur illa tenacitas; ut in pane fit. Hinc multiplices pauperum morbi, dum farinofis crudis utuntur ſere quotidie, & interim plurimi ex illis ſedentario labore victum quaerunt.

AUSTERA IMMATURA. Hæc talem vim habent, ut & ſolidarum parrium elementa ad ſe invicem propius accodere faciant, & fluidis lentorem concilient majorem. Dani quis meſpili immaturum fructum guſtat, ſentiet totum os ſiccari & contrahi, & ſalivam inſpiſſatam plus lentſcere: hæc auſtera deglutita in ventriculo & in teſtibus eadem efficiunt. Dum ruſticorum pueri immaturos fructus avido devorant, tumido abdomine, pallido vulſu, languore totius corporis, penas toties lunt.

2. Inter illas cauſas, quæ ingeſta alimenta mutant in noſtros humores, recenſebatur

merito ſanguinis boni copia præſens; ut de-  
moſtratum eſt §. 25. n. 1. & §. 43. n. 3. ubi ergo deficit boni ſanguinis idonea copia, glutinoſa ingeſta ſuavi retinentur indolem, nec ſubiguntur. Magnam jaſturam ſanguinis paſſim toto corpore tumidi frigido lentore languent; ſanguis enim bonus ſuo motu & calore omnia hæc lenta attenuat. Hippocrates (*De Mulierum morbis Lib. 1. cap. 32. Tom. VII. pa. 748.*) memorabilem locum habet, qui hoc confirmat; dicit enim: *cum in utero gerat mulier, tota fit cum virore pallida, (χλωρα) quod parvus ipſius ſanguis quotidie ex corpore deſillat, & ad ſærum ſeratur, illique incrementum ſua, & pauciori in corpore ſanguine exiſtente, nam ex viridi pallidam eſſe necesse eſt.*

3. Valorum & viſcerum debitam robur cruda ingeſta mutat in naturam humoris inquilini. Illud robur auctum lentorem quidem ſanguini conciliat, ſed calidum diſtium, ſive phlogiſticam diatheſim ſanguini inducit, penitus oppoſitam frigido pituitoſo lentori, de quo hic agitur: effectus enim ſortium valorum & viſcerum eſt lentorem glutinoſum ingeſtorum attenuare, & dividere: hinc robuſti & duro labore corpus exercentes farinoſa alia aſſumunt ſine ulla noxa; debiles, otioſi, ſui atentes, abdominalia viſcera inſarctæ habent ſani ſubito.

BILIS. Ex viſcerum abdominalium ſanguine venoſo per hepatis fabricam ſecernitur bilis; chylo, ex ventriculo egreſſo, aſſunditur; ſaponacea indole ſundit omnia; æquabiliſſimæ miſcelæ apta reddit; glutinoſa lenta omnia dividit, & attenuat. Dum vituli ſolo adhuc utuntur lacte, illud in primo ventriculo horum animalium jam in caſeum & ſerum dividitur: caſeus ille in ſecundum & tertium ventriculum delatus ſenſim fit lentior & craſſior; in quarto ventriculo exſuccus ſere: ſed dum hinc caſeo in duodenum delato miſceatur bilis, totus reſolvitur; tantam habet efficaciam bilis. Hinc bile utuntur ſaponis inſtar, ut ſericæ veſtes a ſordibus repurgent: tenaciſſima pigmenta bile diluunt pictores, ut æquabiliſſime poſſent diſcunt. Ubi ergo inertior facta bilis minus bene ſuo munere fungitur, ingeſta glutinoſa, & pituita naturalis ventriculum & inteſtina obducens, accumulatur, in majorem tenacitatem degenerant, & peſſimos morbos producant, bile acriori reddita, vel medicamentis amaris.

nis faponaceis, bilis vicem supplantibus, curabiles. Accidit sæpe in autumnalibus imprimis febribus acriorem factam, & putridam fere bilem, vel sponte vel arte evacuari: nisi tunc curati ab his febribus amaris illis, bilis defectum compensantibus, utantur, pituitosis frigidis morbus diu languent.

4. Naturale gluten lubricandis & defendendis partibus inserviens in quiescentibus hominibus accumulatur semper: hinc laxa, tomidula, glutinosis humoribus plena, horum corpora fiunt. Dum enim salubri motu corpus exercetur, liquidorum per vasa propulsio augetur: sic avertitur omne, quod inciperet hærere. Quiescentibus membris, linimentum illud mucosum articulis lubricandis inserviens, incipit sensim accumulari; sicque sæpe anchyloses facit, postea vix curabiles. Ventrículo & intestina, lento glutine in interna sua superficie obducuntur: valido motu dum corpus exercetur, respiratio aucta diaphragmaris & musculorum abdominalium actione reciproca omnia hæc viscera movet, premit, ad se mutuo quasi affricat; & sic deterguntur omnia. Lentum oleosum, quod in quiescentibus bene pascis animalibus tanta accumulatur copia, motu musculari attenuatum dissipatur iterum.

5. Frequens satis causa nati lentoris in liquidis nostris, licet de illa non tam sæpe cogitur: plerique enim humores nostri hanc habent insolentiam, ut ablato paulo liquidiori concrecant: lentæ tales mucosæ concretiones ex lymphâ tenuissima perspirantes inspissata nasci possunt tam cito, ut incredibile videretur omnibus, nisi certissima observata docerent.

Nares hominis fani, in aere moderate calido degentes, tota die ne unicam liquoris guttam pluant: totum ergo, quod de naribus exhalat, perspirabile est tenuissimum. Sed si vespertino corripitur frigore tota die in aere calido versatus, seniet narium pruritum, sternutationem, incipit exire liquor limpidissimus, vocatur coryza: dormiens de nocte incipit a tumente membrana interna, narium clausis naribus per os solum posse respirare, sequenti die sæpe jam emungit maximam copiam muci spissi; durat hoc per plurimos dies, imo

aliquando per menses: dum in somno quæ sentit homo gravidine laborans irritamenta muci in naribus collecta, matutino tempore evigilans invenit fragmenta tenacia penitus coriacea, ex inspissato mucosâ nata. Idem jam circa laryngem, asperam arteriam, pulmonem fit: unde post somnium fragmenta densa adeo muci concreti rejiciuntur, ut mirum videatur, suffocationem inde non accidisse: hinc catarrho laborantibus illæ luctæ, & jactationes, & infomnia laboriosa, dum dormiunt; quæ videntur difficiliorem trajecit vitalis sanguinis per pulmonem indicare.

Quantum ergo peccant sæpe, qui sudoriferis, diureticis &c. sanguinem volunt attenuare? Dum, liquidissimis subductis, reliqua facilius in concretionem tendunt.

6. Sanum corpus pituitam generat; quæ functa suo munere debet eliminari de corpore: aliter remanens colligitur, & fit pituita morbosa. Tota superficies interna asperæ arteriæ, & bronchiorum pulmonis tenerissimo obducitur mucosâ, qui nervos hic dispersos, tam facili irritabilitate præditos, tegit & defendit: sed in juvene sano optime respirante, agili, omnis ille mucus suo munere functus dissipatur, vel post somnum paulo majori copia aliquando collectus, levi tussicula excrescendo educitur facillime. In senili vero ætate mucus ille iners, lentus, sensim aggeritur, debiliores pulmo, & minus firma latera, hunc educere nequeunt: hinc collectus stertore facit & sibilum in parte aerea pulmonis; tandemque russi repetita, non sine molestia, educitur. Assidue renatus mucus, ob pulmonis vires coquentes imminutas, dilatata plus vasa, & cryptulas mucosâ diffluentes, senile illud tussiculosum asthma facit, de quo dixit Hippocrates. (*Aphorism. 40. sect. 2.*) *saucedines & gravedines in valde senibus non coquuntur.* Hinc omnia illa, quæ lentum illud mucosum attenuant, & simul languentes vires incitant, adeo profunt senibus: nam non tantum in pulmone, sed & in ventriculo & intestinis &c. muci aggestio fit; imo & in ipsa vesica; unde toties senes urinam pituitosam reddunt.

§. 70. **N**ascitur primo in prima officina digestionis, hinc in sanguine, dein in reliquis, inde derivandis, liquidus.

Lentum illud gluten, ex insectis tali indole præditis natum, semper primo apparebit in ventriculo, & intestinis. Sed non videtur facile glutinosum tale posse ingredi subtilissima lacteorum vasorum & venarum mesentericarum oscula: sed tales partem, quæ unitæ lentum illud mucosum consistunt, separant, & dilute tenuioribus liquidis, possunt se futurum quasi per hæc oscula subducere, sicque sanguini misceri, deinde possunt in maxis cavis cordis & sinu venoso iterum uniti & lentorem

præternaturalem facere, qui se primo sere semper manifestabit in pulmone, dum recens chylus sarrim per pulmonis angustias transire debet. Hinc ubi debiliores imprimis homines farinosa non bene fermentata in prandio assumerunt, paucis horis postea dyspnoeam sentiunt, lentiori chylo difficilius per pulmonem pulso.

Sed sanguinis indolem sequuntur inde secreta liquida. Hinc ubi semel sanguis tali lentore gravatur, reliqui humores inde secreti plus lenescunt, quam in sanitate requiruntur.

§. 71. **I**n primis viis facit prostratum appetitum, repletionis sensum, nauseam, vomitum; ingesti cruditatem; bilis inertiam, ejus inviscationem & con summationem; pituitæ stomachicæ & intestinalis ortum; alvum tardam & tumentem, impedimenta chyli parandi, perficiendi, secretendi.

**PROSTRATUM APPETITUM.** Quando in ventriculo non sunt vires ad digerendum cibos, deficit appetitus; qui redit, simulac ventriculi vires insurgunt: sed nisi debilis fuerit ventriculus, raro lentum illud accumulatur. Cognoscitur huic causæ adscribendam esse appetitus delationem, si sine morbo prægresso, sine signis corruptorum humorum circa ventriculum hærentium, lente & sensum renuat appetitus, tandemque penitus deficiat. Miseri illi, qui fermentatione paratis spiritibus ardentibus abutuntur, tandem destructo omni ventriculi robore penitus appetitu carent: omnibus illis mane surgentibus nausea molestissima & tenacis pituitæ vomitus.

**REPLETIONIS SENSUM.** Semper se plenos, semper saturos dicunt, & de molesto pondere hic hærente conqueruntur. Sic enim factus est ventriculus, ut, dum aliquod contineat non facile digerendum, gravitatem & anxietatem homines sentiant. Spissius carniū jusculem debiles ex morbo homines quantum gravat?

**NAUSEAM, VOMITUM.** Lenta hæc pituita faucibus adharens, vel in ventriculo fluctuans, & hinc inde mora, irritat sic, ut continua sere nausea fiat, & sæpe vomitus molestus; nec facile tamen adhærens pituita ventriculi lateribus vomitu excutitur: hinc diuturna affligit ab hac causa nausea. Norum est, levem irritationem faucium & ventriculi, simplici motu mechanico factam, nauseam & vomitum producere posse. Dum lumbrici in ventriculo repant, quanta nausea! dum plumula in faucibus movetur,

mox nausea & vomitus. Malum hoc sæpe molestum Literatis provechioris ætatis, in quibus aliquando faucium, œsophagi, ventriculi interior tunica sic disponitur, ut membranæ narium accidet in caiarthosis hominibus, ex qua sæpe per integros menses maxima copia muci depluit.

**INGESTI CRUDITATEM.** Cibi ingesti pituita tenaci hic hærente obvolvuntur sic, ut humorum, per fabricam viscerum secretorum, huic assumentium efficacia reddatur iners penitus: sed horum humorum, & imprimis bilis actio, præcipuum est chylipoiesis instrumentum. Cum ergo illæ causæ, quæ in homine sano aliterantur & dividunt omne viscosum in his locis, non poterunt impedire hujus viscosi agglomerationem, multo minus poterunt illud gluten jam hic accumulatum dividere & attenuare: hinc sæpe cibi, imprimis duriore, post multos dies, pituita undique obvoluit, evomuntur.

**BILIS INERTIAM.** Præcedenti paragrapho dictum fuit, glutinosa in primis viis hærentia, non posse ingredi sanguinem, nisi diluta: sed illas partes, quæ unitæ viscosum illud lentum faciebant, separatas, & aliis tenuioribus mistas, posse intrare biantia in cavum intestinorum oscula venosa. Hæc autem sunt vel vasa lactea, vel vena mesentericæ. Sed omne, quod per venas mesentericas ingreditur, directe per venam portarum tendit in hepar. In hepate vero tardissimus circuitus humorum; hinc facilior unio partium glutinosarum in sanguine hepatico: sed ex hoc sanguine secretatur utraque bilis: & bilis cystica, in suo solli-

folliculo collecta & stagnans, dat magnam opportunitatem adnotationi particularum viscularum. In porcis inactatis laniores aliquando deprehendunt vesiculam sellis immantenter diffusam, & bile tam glutinosa plenam, ut in filamenta coherenta se distrahant pariat.

**EVASIVATIONEM ET CONSUMPTIONEM.** Videtur admodum probabile, bilem, chylo intestinelorum mistam, pro parte iterum resorberi per venas mesentericas; sic redire in hepar; & postquam efficaciam huius visceris rursus passa est, de novo secerni. Hinc elaboratissima bilis portio iter & rediret sapienter hanc viam: sed dum bilis tenaciter glutine inviscatur, impeditur hec resorptio per venas mesentericas: ideo hinc viscofo permixta manet, & cum illo, motu peristaltico intestinelorum, ad crassam intestina deducitur: patet ergo, multum bilis tenuissimæ se consumi frustra.

**PITUITÆ STOMACHICÆ ET INTESTINALIS ORTUM.** Morbose nempe ex causis explicatis hic nasci, & collectæ. An & absque causis deduci potest origo pituitæ, vitreæ Veritibus dictæ? Observatum fuit, sæpius per alvum externi splendentes, gelatinæ instar tremulas, & purissimi vitri instar pellucidæ massas; quæ ob tenacitatem glutinosam huc referri posse videntur. Sed plerumque acerrimos abdominis dolores prius toleratos sequitur hæc pituita vitrea.

De se ipso narrat Galenus sequentia. (*De locis affectis Lib. II. cap. 5. Tom. VII. pag. 405.*) Memini mihi ipsi accidisse dolorem vehementissimum, ut mihi videretur in intimo ventre cerebrum perforari, in illo possimum spatio, per quod a renibus ad vesicam ureteres scimus extendi: infesto deinde oleo rutaceo, quum id paulo post excernere tentarem, excrevit simul cum gravissimo dolore huiusmodi vitreum a Præparatore appellatum, qui vitreo fuso, non colore, tum consistentiâ confimilis fuit, atque id aliis quoque accidere conspexi &c. frigidissimus autem percipitur

sensu tactus non ipsorum, qui excernunt, tum siquis confestim ipsum tangere voluerit &c. evacuato hoc humor dolor sedabatur: tunc autem se deceptum fuisse, dum crederet, calculum alicuius ureterum impactum causam doloris fuisse. Acerbus ille dolor inertis pituitæ non videtur ascribi posse: hinc videtur pituita illa vitrea disterre a pituita naturali accumulata.

**ALVUM TARDAM ET TUMENTEM.** Bilis præcipuum stimulum alvi exonerandæ facere videtur: hinc testidita acrior choleras & dysenterias validissimas facit: si impediatur fluere in intestina, ut in Ictericis, alvus tarda fit. Sed antea iamdictum est, bilem inertem fieri, inviscari, consumi, dum glutinosum illud in primæ digestionis officina accumulatum hæret. Naturaliter intestina sunt contradistincta: sed dum pituita spissa intestinale fistulam obstruat variis in locis, accumulatur ingesta, tenuissima sola transiunt, crassiora hærent: his aggestis, & intercepto elastico aere, distenditur miram in modum sæpe abdomen; ut toties in pueris, pituita tali aggesta laborantibus, apparet: in quibus prominulum abdomen turget, & omnia reliqua corporis adeo decreverunt, ut sceletorum instar appareant, defectu nutritionis. Purgantibus deturbata per alvum hac saburra; dein roborantibus exhibitis pulchre curantur, simul perficitur abdomine aromaticis unguentis.

**IMPEDIMENTA CHYLI PARANDI &c.** Ut enim bonus chylus fiat ex ingesto cibo & potu, ventriculi & intestinelorum actio requiritur: affusio bilis utriusque, lymphæ pancreatice, succi gastrici, intestinelorum &c. sed omnia hæc impediuntur a glutine hic hærente: hinc ad debitam perfectionem non elaboratur chylus. Præterea & glutinosum illud tenuissima venarum mesentericarum & vasorum lacteorum oscula obstruitur: & hinc secretio chyli in intestinis facti impeditur: ac corpus, defectu nutrimenti, vero marasmo consumitur.

§. 72. **I**N sanguine visciditatem, pallorem, immeabilitatem, in vasis obliuactiones, concrectiones, urinam pallidam vix olentem; salivam lentam, tumorem alvum; impeditas secretiones; defectum subtiliorum; sic minimorum canalium coactum facit.

Si jam talis iners pituita ex ingestis glutinosis, vel ex naturali lubricante mucus

non satis deterfo, sed accumulato, nata sanguinem infecerit, sicut quædam phanomena

menia mutata sanitatis; quæ observata vocantur effectus glutinosi spontanei in sanguine hærentis.

**VISCIDITATEM.** Distinctissimam ab inflammatorio viscido, uti jam monitum fuit §. 69. sed hic intelligitur tale viscidum mucosum, quod in aqua solubile est, cum concreciones inflammatoriz sanguinis in aqua non solvantur: tale viscidum visum fuit sæpius, dum imprudenti consilio frigidis & piquitosis illis hominibus vena secabatur; pauculum enim rubri concreti sanguinis innatabat magnæ copiz feri viscidum glutinosum.

**PALLOREM.** In omnibus illis locis, ubi cutis abest, sanguinis colorem, per vasa tenuissima translucens, observare possumus; uti in lingua, gurgis, ore interno, naso, oculorum angulis, adnata, palpebrarum interiori superficie &c. quando tunc in his locis omnia pallida apparent, tunc novimus, viscidum in sanguine hærens non esse inflammatoriz naturæ, sed lentæ pituitosæ indolis. Ubi enim inflammatoria sanguinis tenacitas adest, omnia rubent, calent; ubi lenta pituita prædominatur, pallor & frigus adsunt. Chylus enim omnis albus est, quando sanguinem ingreditur; debetque per circulationis efficaciam mutari in sanguinem rubrum: debilita autem illa corpora, dum hanc chyli mutationem perficere nequeunt, pallent semper. Cum chlorosi, seu pallido morbo, incipiunt laborare toties circa primam menstruum eruptionem virgines, res hæc evidenter patet: dum enim ad incrementi apicem pervenit muliebri corpus, incipit æquilibrium inter solidam & fluidam nasci: viscera interim chylipoietica agunt ut augeant; hinc gignitur plus boni liquidi: quod non augeat vim corporis, sed molam movendorum, manente eadem causa mortice: hinc totum corpus iners fit, tumet, pallent; non ob jacturam sanguinis rubri, sed quia quotidie chylus albus sanguini affunditur, quem vires corporis non valent mutare in sanguinem rubrum. In hoc morbo semper illud glutinosum lentum nascitur: ut docet pastacea totius corporis mollities, pallor, inertia.

**IMMABILITATEM.** Tandem enim nimis lentescens sanguis non potest pelli amplius per vasa; imprimis cum semper debilius circulatorio adsit in illis, qui viscoso illo lento abundant. Hæc autem immobilitas imprimis obserbabitur in vasis minimis, in pul-

mone & cerebro: hinc horum viscerum actiones tunc turbantur quam maxime: & tandem fere lethargici pereunt, vel oppresso pulmone suffocantur.

**IN VASIS OBSTRUCTIONES.** Quæ longe frequentius a tenacitate inflammatoria nascuntur, quam a pituita frigida. Tamen & inde nasci possunt, dum fluidorum moleculæ, lenta viscositate nimis coherentes, non patiuntur se dividi per vasorum actionem in illam tenuitatem, quæ requiritur, ut transire possint per ultimas vasorum angustias.

**CONCRETIONES.** Ubi stagnat pituita, in massas coriaceas densas concrefcere potest; imprimis liquidiori parte dissipata. Docet id narium mucus, in tales concreciones abiens. Similia concreta in faucibus nata sæpe excrescant. Idem & in pulmone aliquando fieri, docent quotidiana observata.

**URINAM PALLIDAM VIX OLENTEM.** Hæc semper designat languentes corporis vires: hinc pueris, laxis mulieribus, debilibus senibus, semper talis urina. Quo fortior enim homo est, eo cæteris paribus magis colorata urina est, magisque olida. Sed in robustis glutinosum illud spontaneum raro nascitur; nam acrior in his bilis, validaque viscerum actio, omne lentum dividunt, solis vero debilibus hic morbus familiaris est.

**SALIVAM LENTAM.** Saliva vel in homine sanissimo lentescit; iniprimis quia mucus oris & vicinarum partium huic miscetur. Sed cum sanguinis naturam sequantur inde secreta liquida, non mirum est, ex sanguine viscidiori secerni lentiorē salivam: quæ deglutita, & inter manducandum cibis mista, in primæ digestionis officina viscidum auget.

**TUMOREM ALBUM.** Vocaverunt λευκον ὄγκον Veteres; unde, & λευκοῦ ὄγκου λέγουσι dixerunt hunc morbum. Dicitur adesse, quando sanguis degenerat in talem caco-chymiam, ut rubedinem, & densitatem amittat; & levior factus magis laxam, & mucoso frigori accedentem, naturam acquirit: ubi vero sanguis dissolutus in aquosam tenuitatem loca subcutanea hydropico tumore distendit, vocaverunt & simili nomine aliquando Medici, sed melius Veteres vocaverunt tunc hydropem ἀνὰ σάρκα. Apparet facile distinctos esse hos morbos, licet sæpe confundantur: in leucophlegmaticis



neis enim frigida pituitosa humorum indoles est; in hydropse in tenuitatem aquosant degenerant omnia. Hydrops *dis eaque* plerumque ab inferioribus orta, sensim ascendente tumor pergit; leucoembegmatia, pituita in habitum corporis diffusa, magis æquabiliter per totum dispergitur; hinc laxitas & passacea mollities totius corporis: & hoc morbo laborantes homines bombycum instar pellucunt fere. Hinc Hippocrates hæc distinguens dixit (*De affectionibus cap. 5. Tom. VII. pag. 625.*) *quoniam pituita alba corpi detinuerit, totum corpus tumore albo intumescit &c. si curatus fuerit inchoante morbo, convalescit; si minus, in hydropem transiit morbus, & hominem perimit: & alibi (*Aphor. 74. Sect. 7.*) *alba pituita hydropem supervenit.**

**IMPEDITAS SECRETIONES.** Omnes secretiones a sanguine fiunt. Ut ergo illæ fiant debito modo, requiritur, ut sanguis bonus addit. Sed debilia hæc corpora chylum, & lac album conficiunt; sanguinem solidum rubrum difficillime: hinc albus ille color. Si vires paulo plus valeant, magis mutantur; non tamen integre perficiuntur humores: tunc color oritur flavescens vel viridescens; ut patet in chlorosi. Ideo vix perspirant, arum mingunt, parcius & inertior bilis Pecernitur &c. accumulatum illud pituitosum obstruit minora vasa secernentia, vel distendendo partes comprimit, sicque secretiones impedit.

**DEFECTUM SUBSILTORUM.** Videnus evidenter in leucophlegmaticis, omnes illas functiones deficere, vel languere, quæ a sub-

tilissimo liquido, per minima vasa moto, pendent. Hinc illa tarditas ad omnes motus musculares, torpor, heretudo sensuum, oblivio, somnolentia: videtur enim naturæ prudentis institutio sanguis ad cerebrum tendens liberari a lentiori minus mobili parte, dum carotis externa ad nares, linguam, os internum &c. desert sanguinem, unde tanta copia lenti nuci feceruntur: & sic solidissimus & purissimus sanguis ad cerebrum & cerebellum defertur, ut inde fiat spirituum secretio. Dum ergo sanguis in pituitosam inertem cacochymiam degenerat, debita spirituum secretio deficit; & omnes, quæ ab his pendent, actiones.

**MINIMORUM CANALIU COALITUM.** Certo novimus, magna etiam vasa, orbata liquido transfluente, collapsa concrevisse. Canalis arteriosus, medius inter aortam & pulmonalem arteriam, tam parulus in fectum, postea concrevit; dum respiratione explicatus pulmo liberam viam facit sanguini, ex corde dextro per arteriam pulmonalem pulso: unde per hunc canalium non amplius fuit sanguis; contigua fascia collapsi canalis latera concreverunt, & satis cito quidem. Sed si hoc fiat in tam magno vase, quid fiet in minimis illis, quæ sua parvitate omnem imaginationis vim fugiunt, si obstruent subtilissimo suo liquido? Ex antedictis autem patuit, in hoc morbo deficere illud subtilissimum, quod suo transfluxu minima illa vasa aperta fervare potest: & ex hac causa toties, post apoplexiam vel paralysem ex hac cacochymia glutinosa nata, supersunt immedicabilia mala.

§ 73. **H**inc coctiones, circuitus, secretiones, excretiones, motus vitales, naturales, animales, omnes perturbantur, unde suffocatio, mors.

Omnia, quæ in hoc paragrapho recensentur, a debito motu liquidiorum sanorum per vasa, requisitum robur habentia, pendent: ubi ergo nimia sanguis glutinositas difficiliorem tractum per minora vasa facit, vel & tandem omnino impedit, necessario sequuntur omnia hic recensita mala. Dum consideramus illa symptomata, quæ in chlorosi laborantibus observantur, hæc omnia patebunt evidenter.

In hoc enim morbo, nulla fit coctio ingestorum, vel depravata penitus; & omnia in spontaneam abeunt corruptionem. Hinc illi ructus acidi, nidorosi &c. Circuitus humorum penitus turbatur: docet

hoc pulsus, inordinatus toties in hoc morbo, & frigus, immixta circulationis sequela: secretiones omnes fere a naturali lege declinant. Viscida saliva, inertis bilis, spirituum defectus hoc docent. Excretiones mutantur omnino: urina pallida, spumosa, vix olens: alvus plerumque tardior: perspiratio vix ulla. Vitales motus perturbantur omnino: respiratio difficilis, ad minimum motum corporis anhelosa: cordis palpitaciones enormes sæpe: animi deliqua a levissimis causis: pulsus tardus, parvus, dum quiescant; velox & inæqualis, dum corpus movent. Naturales functiones depravata penitus sunt.

Appetitus vel nullus, vel inordinatus abfurda quævis desiderat; dum arenas, calcem, cretam &c. clanculum toties vorant hoc morbo laborantes puellæ; unde calamitosissimi sæpe morbi. Ab assumtis cibis gravantur, nec inde reficitur corpus; ANIMALES functiones languent omnino. Languida mem-

bra vix trahunt, a minimo corporis motu defassatæ illico: sensuum omnium hebetudo, stupor, vertigines molestissime adfunt. Tandem, immeabili propter nimiam viscositatem hærente in pulmonibus sanguine, suffocantur, vel subtristissimorum spirituum defectu lethargo pereunt.

§. 74. **E**X his ( 69. 70. 71. 72. 73. ) diagnosi, prognosi, anamnesi mali hujus patet, nec vero, sanatio quid indicet, obicurum est.

**DIAGNOSIS.** docens descriptum morbum adesse, ex dictis facile habetur. Si sit solidorum debilitas, boni sanguinis inopia, talia assumta sint alimenta, in quibus glutinosum illud prædominatur, sedentaria vita fueris, tunque sine febre, sine siti, sine ulla nota putredinis, incipit sensum appetitus deleri, totum corpus tumere, pulsus fit debilis, frigus adit; certo licet concludere, pituitosum illud, frigidum prædominari.

**PROGNOSIS.** Omnia illa mala recensenda forent in prognosi, quæ §. 71. 72. 73. enumerantur. Et ex iisdem prægressi mali ANAMNESIS habetur.

**SANATIO.** Quomodo obtineri possit, ex iisdem certissime deducitur: hæc enim obtinebitur evitacione causarum §. 69. sic enim prohibebitur viscidæ generatio: deinde viscidum jam præsens in corpore debet attenuari idoneis remediis, ut non amplius functiones lacerare possit.

§. 75. **Q**Uæ obtinebitur. 1. Ufu cibi potusque bene fermentati, sale, & aromate conditi. 2. Jusculis volatilium animalium. 3. Roboratione vasorum & viscerum. 4. Austro motu. 5. Medicamentis diluentibus, resolventibus, stimulantibus, biliosis, saponaceis. 6. Frictu, calore, balneo, vesicatoriis. Cæterum interiora corporis obsidentur glutinosis, vel spissis, caseosis, mucosis, mucilaginosi, lemosi, ceracei, pultacei, amureosis, calculis, tartareis, ferrosi inflammatis, polyposis, meliceratis, steatomatosis, atheromatosis densis, scirrhis concretis. Cavendum religiose, ne perturbetur glutinosum beneficium, naturale, lubricans, inungens, defendens; quod oculis, palpebris, naso, ori, faucibus, gulæ, ventriculo, intestinis, pelvi, ureteribus, vesicæ, urethra, vaginis mucilaginosi tendipum, articulorum commissuris, laryngi, arteriæ asperæ, bronchiis, datum in usus necessarios, cum glutinoso morbofo. Quod fatali idiotarum, & medicalitrorum, errore nimis crebrum.

1. Dum farina cum aqua subigitur, fit lenta & ductilis pasta, glutinosa penitus: si fermentatio concilietur huic massæ, omne illud renax dividitur, & quidem eo plus, quo fermentatio fortius, & diutius egit in hanc tenacem massam. Optime ergo fermentatus panis requiritur, imprimis biscotus; tunc enim sponte inter manducandum deliquescit: imprimis si pauculo salis, & aromatibus gratissimis, in Materia Medica recensitis, condiatur.

Pro potu vinum; vel cerevisia optima, meracior, vino forte præferenda ad hos usus. Ubi inflammatorum gluten adest, molliissimum hordei decoctum datur; quod frigidum glutinosum, de quo hic agitur, auget: cerevisia vero ex hordeo facta et-

iam, sed diversa præparatione, nobile remedium dat in glutinosa frigida sanguinis, & humorum inde secretorum, degeneratione. Hordeum enim in cerevisiæ præparatione aqua perfunditur & maceratur, donec intumescat, & incipiat germinare; tunc in areâ spargitur, & bis de die vertitur, donec humidum pro maxima parte perdat; deiu supra fornacem siccat; vocatur tunc Maltum: illud deinde, mola tritum, aquæ ferventi infunditur, & in illa relinquatur per aliquot horas: aqua hæc soluta hordei tota fere substantia dives, decoquitur in alio vase; deinde fermentata dat cerevisiam, quæ suos spiritus tenaciori quasi vinculo ligatos retinet, quam vinum; & hinc magis durabiles effectus in corpore facit.

Hæc

Hæc cerevisia, imprimis meracior, nobilissimum remedium exhibet: & Monima Brunsvicensis, cum pane biscocto, sæpe sine aliis remediis tales morbos superavit.

2. Illa enim jufcula non adeo habent tenax illud gelatinosum, sed ingesta calore corporis humani illico disponuntur ad incipientem putredinem quasi, quia imprimis landantur hæc jufcula facta ex carnibus avicularum, quæ inscissis vivunt; hinc illa dispositio major est, quam in carnibus animalium vegetabilibus viventium. Adduntur simul pro condimento aromata aciora: putredo enim vel incipiens tantum omnem lentum attenuat; gelatina spississima scissilis ex cornu cervi raura longa coctionis in aqua facta, sinuac levissimum putredinis initium erit, diffinit inflat aque.

3. Quomodo roborari possint vasa & viscera nimis debilia, dictum est §. 47. & quotidie videmus, rusticos robustos validissima edulia commode digerere, quæ debilius viscera infarcirent pessime: solani esculenti tubera, farinosa non fermentata, durissimas fumo & sale carnes, impune ferunt.

4. Frustra Medicus tentat sanare hominem, pituitosa humorum cacochymia laborantem, per pharmaceutica & victum, si non possit impetrare, ut ager superet pigritiam, in quem ducit morbi indoles, & laboribus fere ultra potestatem exerceat corpus. Non tamen statim quidem corpus, glutinosum plenum, in summos motus ducendum est; nam subito mota hæc mucosa materie, pulmo obrueretur summo cum periculo: ut toties fit, dum hyemali tempore aggestum glutinosum, verno calore subito sulum, & sanguini mistum, in pulmonis angustis hæret; & suffocat inopinato hominem: sed motus sensum & per gradus augendus est. Quamdiu debilitas corporis exercitia non permittit, frictions illorum defectum suppleant.

5. MEDICAMENTIS DILUENTIBUS. Sola aqua proprie diluit, & omnia reliqua, quæ diluentia dicuntur, tantum agunt ratione aque. Iners illa frigida pituita, de qua hic agitur, potest aqua dilui, imprimis repida, & sic resolvi: sed momentaneum tantum levamen adfert hæc pituita: per aquosa diluentia resolutio: aquæ enim repide usu omnes partes solidæ debilitantur, unde augeatur causa pituitam producent in corpore. Hinc adeo salax hæc medela, dum sæpe homi-

nes sapientia studijs dediti, accumulata quotidie meriti pituita laborantes, repidis aquosis potibus levamen sentiunt; dein his indulgentes tandem corpus misere perdunt. Ubi vero subita diluita pituita, v. gr. in ventriculo fluctuantis, requiritur, tunc profuit.

RESOLVENTIBUS. De his actum fuit §. 54. n. 4. ubi & de diluentibus dictum fuit.

STIMULANTIBUS. Omne, quod applicatum corpori facit augeri motum in toto vel in parte, posset vocari stimulans: ille enim communis omnium medicamentorum stimulantium effectus est, quocumque demum modo in corpus agant. Inter stimulantia quædam sunt, quæ videntur rigiditate & figura suam partium agere, dum acuta superficie lateribus vasorum, per quæ cum humoribus nostris fluunt, impacta, irritatione hæc celeriores contractiones vasorum faciunt. Plurimorum stimulantium effectum videmus evidenter; modum vero, quo agunt in corpus nostrum, intelligimus non facile.

Verbi gratia: Cinnamomum gratissimo, nec minus efficaci, stimulo languentes corporis vires excitat: illud autem, quod in cinnamomo has vires habet, incredibiliter parvum mole, dum liberum est a tenaci vinculo oleoso, quo irretitur, omnem fugit sensum. Oleum ex cinnamomo destillatione productum totum aroma stimulant cinnamomi possidet: illud oleum per aliquot dies expositum aeri libero sine sensibili ponderis jactura fere omnem vim amittit. Quis poterit determinare figuram illius subtilissimi, quod in cinnamomo hærens stimuli vice fungitur? Sed & veniati stimuli quomodo corpus totum turbant, quantos excitant motus? Venenum variololum, morbillosum, pestis &c. quam enormi vi agunt? In illis tamen eadem subtilitas omnem indagationem eludit: solis effectus tantum detegitur efficacia.

Sed numquid & animi effectus, mutata solum cogitatione, tam miris modis corpus mutant, validissimas excitant febres, omnes secretiones, omnes excretiones, augent, minuunt, turbant?

Hinc stimulantium effectus non semper a figura, pondere, rigiditate partium pendent: sufficit Medico novisse italia, quæ applicata corpori motum augent; licet ignoret, quomodo agant.

Omnia autem hæc, majori motu & calore.

lore excitatis, videntur agere, sicque ultimo effectu dividere glutinosum iners: illudque sic mutare, ut proprietates sanorum humorum acquirat.

Posse autem sanguinem, qui glutinosa inertii cacochymia gravabatur, sine evacuatione illius viscosi, aucto motu & efficacia vaforum in liquida contenta, iterum acquirere omnes dotes ad sanitatem requiritas, certissima docent observata.

Chlorosi laborat debilis puella, totum corpus laxo oedemare tumet; pallent & frigent omnia. Dato prius leni vomitorio, vel purgante ex pilulis Ruffi v.g., vel similibus, saburra viscosa in primis viis hærens educitur, ne aliorum medicamentorum efficaciam impediat: dein datur vinum medicatum ex optimis aromatibus & ferri limatura. Dum his utitur, incipit oriri major calor, levis quasi febricula; quotidie incipit subsidere latus partium omnium tumor; redit amoenus rubor in cure, labiis, gingivis &c. nulla evacuatione facta prædominantis viscosi, renascitur solidus ruber sanguis; redit omnium functionum integritas.

Prudensissimum certe erat Galeni monitum, dicentis: (*In Librum Hippocr. de alimento Comment. III. Tom. VI. pag. 255.*) *pituita autem frigida & humida est, & veluti quoddam senectilem alimentum: quare non est evacuanda, sed debet in corpore manere atque alterari (ἀλλὰ ἀσθῆναι).*

Stimulantia in Materie Medica, variis classibus distributa, recensentur.

**PITUITIS.** Adeo oppositam inter se habent indolem bilis & lenia pituita, ut nunquam simul prædominentur: summum enim detergens pituita est ipsa bilis, omnia solvens & attenuans. Simulac bilis, impedita fluere in duodenum, regurgitat in sanguinem, totus sanguis sic dissolvitur, ut tandem diuturnum iterum sequatur hydrops. In illis hominibus, in quibus lentum illud pituitosum accumulatur, semper bilis copia deficit, vel peccat inertia. Nihil ergo videtur plus convenire, quam ut bilis defectus supplatur: hoc autem fit, bilem, ex alio animali desumptam, ingerendo corpori, in quo deficit bilis; vel usu plantarum amararum, abstinui, centauri &c. Prius maxime naturale videbatur: hinc selegerunt imprimis bilem illorum animalium, quæ voracia satis, manducatione tamen, & pluribus aliis digestionis adiuviculis, catebant: in illis enim

acerrima bilis horum defectum supplere videbatur. Hinc fel lucii piscis, integros pisces vorantis, fel anguillarum, adeo laudatum ad hos usus. Sed & observaverunt Zoographi, ferocissimis animalibus acriorem bilem inesse; hinc fel taurinum inspissatum, ne putresceret, in officinis servant: ex hac bile inspissata facta catapota tantum usus sunt. Forte periosissimus lapis porcinus, *Pedra del Porco* dictus, bili suam efficaciam æque ac originem debet.

**SAPONACEIS.** Imprimis sapo Venetus, blandissima actione omne glutinosum, omne pingue solvens, hic laudabatur. Addebant Medici saponi Veneto vigesimam bilis inspissatæ circiter partem, inde facta catapotia exhibebant in hoc casu aegris: & sic utriusque bilis defectum supplere conabantur. Bilis enim hepatica amara nunquam, saponacea penitus, saponi Veneto conveniebat utcumque: bilis cystica parca tantum copia videtur effluere, ob colli vesicæ sellex angustiam, intorcionem, situm: sic naturam ars constatur imitari.

**6. FRICTU.** Quid possint efficere frictiones, dictum §. 28. num. 2. Dum glutinosis infarctum puerorum abdomen tumet, frictiones pannis laneis asperis factæ plurimum profunt; sed debent perscrificari mane post somnum, vacuo ventriculo: illo enim distento, non facile illud serunt. Imo in frictionibus ventrem omnino non contingendum esse voluit Galeus (*De sanitate tuenda Lib. III. cap. ult. in fine Tom. VI. pag. 114.*) *quam aliquando periculum sit, ne & cibum deterius concoquat, & succus quispiam ex eo Semicrudus in corpus digeratur, & caput turbetur, & stomachus subvertatur.* Vacuo autem ventriculo dum insistantur frictiones, non est huius rei periculum.

**CALORE.** Omnia fere, quæ laudantur ad glutinosos morbos sanandos, Medicamenta, sunt talia, quæ majorem calorem corpori conciliant. Imprimis hic prodest calor per motum muscularem corporis excitatus, qui semper simul roborat; cum calor soci debilitet potius. Nec nocebit humidi dissipatio per calorem majorem corporis facta, cum in his morbis plerumque simul humidi nimia copia addit.

**BALNEO.** Balnea sunt vel humida, vel sicca. Humida laxando & diluendo agunt: hinc in hoc casu aromaticæ herbe adduntur, quæ, simul roborant & attenuant, & post

post balneum frictions. Balnea sicca calore majori excitato profunt. Cum autem rota corporis externa superficies bibulas venas habeat; hinc balnea, ex heibis aromaticis facta, possunt laxatis venis bibulis insinuare simul harum herbarum vires.

**VESICATORIIS.** Sic vocantur illa remedia, quæ cuti sanæ applicata epidermidem in vesicam, tenui ichore plenam, attollunt. Talia fiunt ex acerrimis plantis, raplano, sinapi, ranunculis &c. vel frequentissime ex cantharidibus. Omnia hæc calorem excitant illo in loco, cui applicantur; & cæni toti corpori caloris augmentum faciunt. Imprudenter applicata corpori, febri, sitim, calorem urentem, halitum cadaverosum, molestissimam stranguriam, faciunt, imprimis cantharides: quæ ideo a Dioscoride inter venena recensentur. Omnia hæc agunt ratione stimuli, quo languentem motum sanguinis excitant, & vi fundente, qua pituitosum iners dividunt & attenuant: hinc in omnibus morbis languidis & frigidis tanti usus. Ubi vero humores dissoluti, acres, in putredinem vergeantes, & magnus motus adest, non adeo tuto adhiberi posse videntur.

**CATERUM INTERIORA CORPORIS OBSERVANTUR &c.** Observata Medica docuerunt, posse ex humoribus nostris nasci variis in locis corporis miras concretiones, & penitus diversæ indolis; quæ partium, quas occupant, actiones impediunt: unde mirabilium & latentissimorum morborum origo sæpe pender. Præcipue talium concretionum classes hic recensentur.

**GLUTINOSIS VEL SPISSIS.** Talia oriri posse in corpore, partim ex ingestis, tali indole præditis, partim ex naturali glutine accumulato, toto hoc Capitulum demonstratum est.

**CASEOSIS.** Lactis solius productum caseus est; chylus enim non exhibet caseum: sed lac, coagulo addito, separatur in binas partes; serum nempe tenue, & spissum colestum, quod omni sero expresso caseum exhibet: qui exsiccatu corneam duritiem sæpe habet; imo, ut cornua animalium, ductilibrem ab igne acquirit, & distillatione saleni volatiliem alcalinum exhibet. Sed lac illud continue caseum, qui in tantam duritiem concrecere potest, fluxit cum sanguine per minimas vasorum pulmonalium angustias: si ergo lacti cum sanguine fluenti accideret talis mutatio, qua fieret separatio

seri & colostri; quanta fierent mala? Dum in mammarum ductibus galactophoris collectum lac stagnat, & corrumpitur, per papillam stillat tenue serum: colostrum retentum, inflammationes, suppuraciones, scirrhum, imo Cancrum toties produxit. In cadavere nobilis juvenis tumor inventus in abdomine (*Academ. des Sciences Par. 1729. Hist. pag. 17. 18.*) 7½ librarum materia alba plenus, quæ partim lactis instar fluida, partim caseosa apparebat.

**Mucosis.** In omnibus illis locis, quæ membrana Schneideriana, vera muciflamma, investit; nasci mucum, accumulari, concrecere in moles sæpe non facile postea resolvendis, docent quotidiana observata. Sed magis mirabile videtur in talibus locis corporis mucum nasci, in quibus subtilissimi tantum naturali fabrica partium fecerunt humores: in ipsis enim cerebri ventriculis mucum verum, frigide apoplexiæ causam, invenerunt Observatores (*Theoph. Boneti, Sepulchr. Lib. I. pag. 103. 104. 105. 108. 138. &c.*)

**MUCILAGINOSIS.** In articulis majoribus imprimis, manifeste apparent glandulæ illæ, Haversianæ a primo descriptore dictæ, quæ smegma mucilaginosum fundunt, inserviens lubricationi ossis excepti & excipientis, & internæ superficiei ligamenti articularionem ambientis. Hæc mucilago, vel nimia pistitutine degenerans, vel nimis quiescente articulo accumulata, a miros sæpe tumores circa articulos facit, & aliquando immedicabilem anchylosim producit.

**LEMOSIS.** In homine sano oculi, tenuissima lympa irrorati, splendent: minime hic orto vitio, copia majori secretum hoc liquidum depluit: postea apparet ibi mucus crassus, viscositate sua hære is, & derupans oculi pulchritudinem: hic incipit concrecere in lemas, quæ paucas post horas friabiles penitus colliguntur circa angulum majorem oculi. Sic ab humore limpidissimo, a sanguine purissimo secreto, intra paucas horas, dura friabilis nascitur massa.

**CERACEIS.** Mirabilis casus docuit, oculi humore omnes, adeo limpidos, adeo siccos in sanitate, degenerasse in sebaceam materiam: dum enim prominens oculus extra palpebras, metu majorum malorum extirpabatur, & felici quidem successu; postea oculo extirpato & discisso parvi, omnes humores oculi sic degenerasse. (*Theoph. Boneti*)

*meti Sepulchr. Lib. I. pag. 427. 428. )* Sed si in oculis fieri possit, ut in tam alienam inuicem deberent humores, quid non possibile erit in aliis corporis locis? in rugis anni ceracea talis materies naturaliter in suis loculis haeret, quae inspissata & accumulata tales tumores producere potest. ( *H. Boerhaave Epist. Annot. ad Fried. Ruyfch. pag. 11. )*

**PULTACIUS.** In abscessibus finem materiam invenit Severinus. ( *De Recondita Abscess. Natura pag. 182.* ) Admodum videntur probabile, & in partibus internis similia observata fuisse.

**AMURCOSUS.** Inflammatum hepar, ut reliquae corporis partes, in suppurationem aliquando tendit, & saepe consumto friabili visceri non bonum per se fit, sed corrupti visceris tabis, amurcae similes, per alvum deponitur: inio abscessu ad exteriora verso, talis materia, discissis vel sponte ruptis integumentis, exit: unde Hippocrates ( *Concord. n. 451. & Aphor. 45. Sect. 7. )* monet, quod qui hepate suppurato uruntur, si effluat velut amurca, pereant.

In abdomine sub peritonaeo tumor invenitur, plenus sanie, facibus vini rubri tam colore quam consistentia simili, quantitate pinas circiter duodecim aquans. ( *Peyr. Patolog. Anatom. pag. 191. )*

In tumore, genu sinistru occupante, discisso, similem invenit materiem Severinus. ( *De Recond. Abscessuum Natura pag. 152. )*

**CALCULOSUS.** Nasci in corpore humano calculos, nullus dubitat; imprimis circa urinae vias, renos, utereros, vesicam, & circa hepar: sed in his locis humores effusi in cavo maioribus flammant, vel tardius moventur, saltem in hepate: hinc facilius videntur hic posse nasci extensae concretiones. Sed magis mirabile videtur, in ipsa substantia coctis, nunquam quiescentis, reperiri calculos: ( *Philos. Transact. abridged Tom. III. p. 168. )* Ut & quod in cavo abdominalis nulli parti adhaerens calculus repertus fuerit. ( *Acad. des Sciences l'an 1702. Hist. pag. 46. )* Idem quod bovis tobulisimi, qui quater se subduerat lanionibus, antequam mactaretur, cerebrum invenimus totum luteum ( *Acad. des Sciences l'an 1705. Hist. pag. 215. )* fuerit.

**TARTAREUS.** Sic vocantur concretiones calculi se, quae totam superficiem loci, quem occupant, tartari instar crusta calcuosa tegunt. Placenta mœnia tali crusta calcuosa

aliquando undique icta observatur: dura mater cerebri lapidea tali materia incrustata fuit inventa. ( *Theoph. Boneti Sepulchr. Lib. I. pag. 59. )*

**SEROSUS INFLAMMATIS.** Docet hoc sanguis pleuriticorum: in quo densa, coriacea, vix cedens novacula pellis, ex sero condensata nata, insulse pertinaciter adhæret: naturaliter enim inest sanguini in concretione proclivitas: quæ in morbis acutis inflammationis augeatur.

**POLYPOSIS.** De his vide §. 52. n. 2.

**MELICERATIS, STEATOMATOSIS, ARTERIOMATOSIS.** Hæc tantum differunt imprimis inter se ratione diversæ consistentiæ, quam habet materia contenta. Sic enim Galenus de tumoribus præter naturam, cap. 5. dicit, quod pulcritudine aliquid simile in arteriatis invenitur; molli vero in ipsis meliceridibus; sero autem in ipsis steatomatibus: ut plurimum vero tunica quædam membranosa hæc omnia coercent ( *Diægn. Medic. ex Hippocr. Aretæ etc. pag. 465. )* In cute externa folliculi, emissarii obstruendo, tumentes, nova aggesta materie, nec evacuata, toties in hos tumores degenerant. In internis & nasci posse similia, docuerunt observationes Medice. Inter cerebrum & cerebellum natum steatoma pueri magnitudine, cæcitatem primo, post & necem intulit. ( *Theoph. Bonet. Sepulchr. pag. 422. )* Verum steatoma ultra sex libras pendens in cavo pectoris repertum, quod post enormes calamitates tandem suffocavit ægrum. ( *H. Boerhaave atrocis & rarissimi Morbi Historia altera. )*

**SCIRRHOUS CONCRETIS.** Scirrhum exquisitum vocavit Galenus ( *Method. Med. ad Glaucon. Lib. II. cap. 6. Tom. X. pag. 378. )* tumorem præter naturam, sensu carentem, & durum. Talis autem tumor post male curatas inflammationes toties relinquatur; imprimis circa loca dicta glandulosa. Innumeræ possent citari observationes Practicorum, quibus constat, omnia viscera per morbos scirrhusa facta fuisse aliquando.

**CAVENDUM RELIGIOSE, NE PERTURBE-  
TUR GLUTINOSUM BENEFICUM, NATURA-  
LE &c.** Maximi momenti monitum est, quod neglectum turpibus erroribus toties amissum dedit. Multi enim fuerunt in illa opinionione, cum vita & sanitas in liberrimo motu fluidorum per vasa consistere tantum ipsis videretur, quod vix posset unquam peccare nimia

nimia liquidorum tennitas; omne crassum, omne tenax, dicebatur morbosum. Qui partium humani corporis fabricam & usum examinaverunt, viderunt evidenter, lentum mucum in plurimis corporis locis præparari naturali lege per organa huic scopo inventientia, & maxime necessarios usus habere. Palpebrarum limbi toties attriti ad se invicem, nisi molli smegmate defenderentur, inflammarentur brevi & excoiati dolerent: docent hoc molestissimæ lippitudines toties ab hujus defectu oriri. Nervi per narium ingentia cava dispersi, nisi mucu recti farent, ab aere exsiccarentur brevi, & periret olfactus: omnes partes oris interni, faucium oesophagi, simili obducuntur linimento, ut deglutienda facile per lubricata loca transirent: Ventriculi & intestinorum interna superficies, vel in sanissimis animalibus mali siccio, ut tenerrimæ valorum & nervorum extremitates hic parulæ & prominentes defenderentur ab acrimonia vel asperitate assumptorum; unde in dysenteria, defæco hoc mucu, tam enormes dolores, non sedandi, nisi ingestis talibus remediis, quæ suo glutine defectum hunc suppleant. Omnes viæ, quas acris urina transit, tali mucu inunctæ sunt: dum deest in urethræ quodam loco talis mucus, molestissima strangu-

ria oritur, quæ mucilaginoso althææ decocto tam pulchre curatur. Tendines mucilaginosi vaginis ambiuntur, ut facillima fiat mobilitas: dum per validas suppurationes, vel gangrænas, destruantur hæc vaginæ, rigescunt omnia.

In articulis ossium extrema tenuissimo smegmate obliniuntur: dum post summos & diuturnos motus, vel per morbos, aut senium, deficit, crepius & dolor articulorum oritur. Laryngis, asperæ arteriæ, interna superficies, torum cavum aereum pulmonis, adeo irritabiles nervos habet, ut nisi mucu regerentur, ab ipso aeris attractu continuo fieret tussis.

Cum omnibus illis locis naturalis sit mucus, male culpatur tanquam morbosus; & pessimo successu de corpore expellitur. Cantharides assumptæ cum sæva stranguria muci sanguinolenti pauculum faciunt exprimi, derales virulenta horum infectorum acrimonia urinæ viis: acriora purgantia toties, post sæpius evacuatam alvum, expriment flavescentis glutinis pauculum cum stris sanguineis, summo cum tenebrosi & dolore; est tantum beneficium illud gluten abrasum, unde postea sæpe molestissima tormina manent, excoiatis & dolentibus intestinis. Idem & in aliis locis verum est.

## MORBI EX ALCALINO SPONTANEO.

§. 76. **N**onnullæ plantæ scæpent materia, quæ sponte corrupta non acescit, nec coit, sed resolvitur in foetidum volatile, pingue Alkali: tales omnes fere Aromaticæ valde acres. Has vero raro assumunt tanta copia, ut morbum creent ex suo ingenio. Sin autem id contigerit, pertinebit ad acre alcali oleosum.

Alkali, receptum jam in arte nomen, a falsissima herbula Kali dictum videtur, quæ vivis flammis usita relinquit cineres acri sale divites. Pleræque plantæ, igne aperto combustæ, relinquunt cineres plus minusve falsos; cineres illi in aqua cocti, filtrati, dant lixivium falsum, quod inspissatum relinquit salem, alcalinum dictum; qui certas habet notas, quibus cognosci potest: (*H. Boerhaave Chem. Tom. I. pag. 765.*) fixus in igne satis diu; in aere humido deliquescent penitus; saporem habens acrem igneum, urinosum; odorem nullum; acidis nixtus ebullit; syrupi violarum coloræ cæruleum in viridem mutat &c.

Sal ille, ex vegetabilibus valido igne & aperto productus, in corpore nostro nasci nequit; ingeri quidem.

Dum vegetabilia aperto igne comburantur, exit fumus; qui, lateribus camini adhaerens, pinguem nigram massam exhibet, fuliginem nempe; hæc fuligo destillata vasis chemicis dat magnam copiam salis, concrefcentis ad latera excipuli; qui sal linguam urit cura sapore urinoso, ut sal fixus alcalinus; similiter cum acidis effervescent, colorem syrupi florum violarum mutat &c. hinc sal alcalinus ob has dotes merito dicitur, sed volatilis, & minimo igne mobilis.

Animalium partes, igne examinatæ, prima destillatione dederunt talem salem volatilem alcalinum.

Putredo hæctenus explorata animalium & vegetabilium corpora eo redigit certissime, ut salinum eorundem principium evadat al-

78 MORBI EX ALCALINO SPONTANEO. §. 77-78.  
 alinum volatile . ( *Borhaave Chem. Tun.*  
*I. pag. 803.* )

In quibusdam plantis haeret jam alcalinus volatilis sal, nativa plantae fabrica paratus; nullam artem requirens, ut se manifestet. Sinapi femina fracta mox spitant halitum illum volatilem alcalinum; cum aceto trita effervescentiae signa dant; & prima destillatione statim salem volatilem alcalinum exhibent.

Aliae plantae sunt, in quibus non adeo manifesta quidem indicia sunt praesentis alcalini volatilis; quae tamen sibi relicta spontanea corruptela degenerant in foetidum volatile pinuae alcali: harum Catalogus habetur in Materia Medica.

Alcalini ergo origo in corpore nostro pendet vel ab humoribus nostris, corruptis pu-

trida degeneratione spontanea, vel ab ingestis, quae talem indolem habent, ut sponte sua in putredinem vergant, vel denique ab assumtis salibus alcalinis.

Sales autem alcalini tanta copia vix unquam exhibentur, ut multum nocere possint.

Nec acres illae aromaticae herbae, de quibus in hac paragrapho agitur, facile tanta usurpantur copia, ut inde origo alcalini spontanei in corpore deduci posset. Aliquando tamen accidit, cum fere omnes antiscorbuticae vocentur, imprudenti ad hunc morbum usu sic dissolutum fuisse sanguinem, adeo exesa vasa, ut lethales haemorrhagiae, halitus putridissimus, urina foetidissima, faeces alvine cadaveroso odore, testarentur putredinem inde natam.

§. 77. **E**X animalium partibus confecta nostra liquida varia sunt: 1. pro varietate alimentis, quo se sustinent. 2. pro varietate partis, quae as-

sumitur.

Ut ex ingestis per omnium viscerum conspirantes actiones restituatur illud, quod invariabili sanitatis effectu perditum erat de solidorum & fluidorum substantia; requiritur, ut, deposita sua indole, nostram induant naturam ingesta alimenta: hinc quando ad ultimam illam perfectionem pervenerunt, tunc omnia, quantumvis varia, ejusdem sunt naturae. Sed haec transmutatio non nisi continuata per multas horas actione omnium vasorum & viscerum perficitur: hinc ingesta satis diu saepe suam naturam retinent; & tunc varia sunt liquida inde confecta ratione diversorum ingessorum: illa autem liquida, quae ex animalium partibus comestis fiunt, differunt inter se imprimis ob duas causas.

§. 78. **A** Nimalia enim, quae herbis & aqua aluntur, chylum acidum, vel facile acefcentem, adeoque & tale lac, habent; quod in nobis suam sequens indolem vegetabili nutrimento simillima patrat. Vid. ( 61. ad 76. ) & lentam materiem caseo pressio similem in primis viis creat; quae singularis hic viscidis species.

Chylus ex ingestis alimentis confectus, imo & lac ipsum, magis adhuc sequuntur naturam assumti quam assumentis. Hinc dum vacca solo gramine & aqua in pratis vivit, chylus ejus & lac assumti graminis naturam retinent, & acefcentem indolem: hoc satis patet.

ET LENTAM MATERIEM CASEO PRESSIO

1. Omnia enim animalia hoc respectu in tres classes possunt dividi: vel enim vivunt solis vegetabilibus, ut equi, boves, oves &c. vel solis animalibus, ut vanelli, hirundines &c. vel utrisque, ut passeris &c.

2. Dum lac bovium in calore aeris cessivi relinquitur, acefcit brevi; carnes ejusdem animalis putrescunt: qui ergo lac ingerit, alimentum sumit sponte sua acefcens; qui carnes ejusdem animalis comedit, nutrimentum sumit sponte in putredinem vergens; si medullam ejusdem animalis qui assumit, haec poterit in debiliore ventriculo imprimis in rancidam corruptelam abire. Apparet ergo varias ejusdem animalis partes penitus diversam spontaneam mutationem habere posse.

SIMILEM &c. Sanguis humanus & serum sanguinis vim satis magnam concrefcendi habent: & hoc videtur proprium esse liquidis humanis: serum sanguinis coagulatur majore calore; lac non ita: sed lac, per 24. horas fluens cum sanguine, mutatur in serum, & tunc hanc vim concrefcendi acquirit. Torum hoc debetur efficaciae vasorum



# §. 78. 79. 80. MORBI EX ALCALINO SPONTANEO. 79

in liquida ; imprimis autem pulmonis actioni . Quo plus ergo liquida , ex alimentis facta , abfunt ab illa ultima perfectione , eo minorem vim concrefcendi habent . Hinc chylus examinatus vix quid coaguli dat : fed lac , quod tantum eft chylus , qui aliquo tempore fluxit cum fanguine per vafa , jam feperari potefit in tres partes : cremorem nempe , ferum , & coloftrum fubfidens ; quod omni fero expreffo cafeum dat : hinc in lacte jam incipit nafci plaftica feri fanguinis indoles . A lacte affumto illud colo-

strum feperatur in ventriculo & inteftinis ; quod , nifi bile affufa dividatur iterum , peffimo lentore inteftina obftruit : unde fape adeo tumet infantum abdomen . Poftea calore loci & mora corruptum putridiffimum alvi fluxum facit : cafeus enim , licet ex lacte acefcens feperetur , videtur partem lactis maxime animale in fe habere ; nam cafeus , omni cremore ablato & fero expreffo , induratus , acer fit , alcalinus , & chemico examine fimilia fere exhibet ac partes animalium .

§. 79. **Q**Uæ aliis nutriuntur animalibus , omnes fuccos facile alcalcfcentes habent .

In illis enim chylus ipfe , ingefforum naturam retinens , in alcalinam putridam potius indolem vergit : hinc plerumque pifces , fine fale vel acieis condimentis , aut aliis acefcentibus fimul affumtis , diu ferri nequeunt : hinc animalia rapacia fere omnia foetidum halitum fpirant . Dum magnus humor Aphorifmorum Auctor leviffimis rheu-

matiffimi doloribus excruciabatur , propofuit fole carnis vitulinae jufculo , fine ullo fale , vivere , ut leniret dolorem , & fimul fuflineret vitam : fed ultra quinque dies fere non potuit , coactus poftea ad ferum lactis confugere ; quo fole per multos dies vixit cum magno doloris levamine .

§. 80. **S**I alimenta , vi noftri corporis , ( §. 8. ) eo funt redacta , ut jam liquores fecerint , quales in corpore fano & robufto inveniuntur , poft abftinentiam a cibo potiusque per viginti horas ; tum , fi fibi relinquantur in quiete , & calore , vel etiam fi moventur valide , naturam adipifcuntur ubique eandem putredinis incipientis .

In præcedentibus paragraphis dictum eft de illis mutationibus , quæ funt in humoribus natis ex alimentis ingeffis , antequam per vires corporis naturam noftrorum liquorum acquifiverint ; in hac paragrapho explicatur , quomodo mutantur iidem , poftquam , depofita ingefforum natura , in noftros humores converfi fuerint . Obfervaverat Lowerus , ( *De Corde pag. 238.* ) quatuor vel quinque horis poft largiorem paffum , fanguini , e quacumque vena vel arteria detracto , magnam chyli lactefcentis copiam innatare : & in animalibus æque ac hominibus : poftquam vero chylus diutius circumductus fuit cum fanguine , albedine prorfus depofita , in ferum attenuatur : hinc longo poft paffum intervallo fi fiat venæ fectionis , nulla lactis fpecies fupererit , fed ferum folummodo cruori coagulato innatahit .

Hinc lac emalefcent longæ alias dotes habet , prout vario poft paffum tempore colligitur . Dum enim omni lacte cruidiori prius educto , fecunda vice poft aliquot horas emulgentur animalium majorum ubera ,

lac colligitur vix acefcens amplius : cuius lactis cafeus fubputridus , foetidus , qualis eft Leodienfium , multis adeo placet .

Ubi ergo per viginti vel plures horas nihil cibi potiusve ingeffum fuit , tunc nil amplius de natura crudi ingeffi fupereft , & omnia humorum inquilinorum indolem acquifiverunt : fed omnia noftra liquida , fibi relicta in calore aeris communis , putrefcunt ; licet folis acidis & acefcentibus vixerit homo : hinc in omnibus his eft proxima difpofitio ad putredinem . Nihil autem in fanitate unquam in corpore perfecte putridum fit : antequam enim eo ufque pervenerit , per excretorias vias de corpore exit .

Longè autem citius in putredinem abeunt humores animalium , fi valide moveantur . Si valido curfu , vel alio labore , quis corpus exercuerit ; quam olidus fudor , quam acris foetida redditur urina ? Dum febris acuta lactanrem prehendit mulierem , nifi plurimum pover , intra paucas horas lac fiet tenue , fubflavefcens , falium , odoris fuburinofo .

In.

§. 81. **I**n alimentis vero ex aliis animalibus, jam statim, antemutationem corpori nostro adscribendam, illa in putredinem vergens indoles sponte adest.

Mulier sana & fortis ex solo pane, lacte, cerevisia, fructibus horarum, paucisque carnis vivens, inde conficit lac suum; quod intra 24. horas, si potu & cibo abstinere, potest penitus degenerare in alcaliscentem indolem. Hoc longe citius fiet, quando ali-

menta assumpta jam ex propria natura in alcalinam indolem vergunt. Hinc dum in Principum aulis sepe solis carnium iusculis vivere debent nutrices, languent, & lac falsum subcalescens habent; simulacrescentia exhibentur, resciantur statim.

§. 82. **P**utredo hæc (§. 80. 81.) significat eam conditionem humorum, cujus præsentia aqua multum exhalat; Salina materies attenuata, acido orbatæ, vel & mutata, a terra, oleoque suo, separata, fit acris volatilis, alcalina; Oleosa pariter, una parte tenuior, terra orba, salii illi acri permixta, acris, volatilis, fretens evadit; altera autem olei pars, terræ aqua, sale, & oleo priori orbatæ permixta tenacissime, abit in atram, densam, immeabilem, fæcetem.

Describuntur jam illæ mutationes, quæ accidunt humoribus animalium dum putrescunt.

**AQUA MULTUM EXHALAT.** Putrefactio potuit paucarum septimanarum spatio vastum balneæ, in litus eiectione, cadaver dissipare in auras, ut nuda tantum relinquere ossa: habuit ergo vim talem, qua volatilia redderet hæc omnia. Sed mobilissima humorum pars aqua est, in omni examine chemico humorum animalium primo prodrens; hæc ergo citissime dissipabitur.

**SALINAS MATERIES &c.** Sanguis recens educus de animali sano nullam notam alcalini salis exhibet; oculo instillatus nullum dolorem facit: si tepore simili, ac habet corpus sanum, idem sanguis foveatur per triduum, jam corruptus foret, acer fit, & leni destillatione salem volatilem alcalinum dat. Sed sal nativus sanguinis neuter erat, longe fixior: hinc ejus indoles penitus putrefactione mutatur. Quod autem putrefactio possit & acidos sales mutare in alcali-

nos, docet acidissima acerosa, quæ putrefacta salem volatilem alcalinum præbet.

**OLEOSA PARITER &c.** Ex putrefactis animalium partibus sal volatilis alcalinus, destillatione educus, nunquam purus apparet; sed flavescens, & oleo subtilissimo, acri, foetido, inquinatus: ergo per putrefactionem oleum sanguinis, adeo fixum naturaliter, fit tam volatile, ut una cum mobilissimo sale volatili alcalino sursum ascendat leni calore.

**ALTERA AUTEM OLEI PARS &c.** Non enim omne oleum volatile redditur per putrefactionem, sed quædam pars tantum: reliquum, terræ unitum, pertinacissime coheret. Ex urina putrefacta una cum sale volatili prodit oleum tenue; sed in residua fæce hæret ingens olei copia; quod summo resistit igni. Sic & in morbis atrabiliaris videmus, mobilissimis sanguinis partibus dissipatis, residuum tenax, piceum, pertinacissime hærens, amurcæ instar, viscera abdominalia gravare, & maxime chronica producere mala.

§. 83. **I**nfecta, pisces, amphibia, animalia volatilia, repentina, gradientia, natantia, homines denique, ex propria sua natura, in hanc putredinem (§. 82.) sponte vergunt semper; accedunt nunquam.

Omnia huc usque cognita animalia, demitis quibusdam exficcis infectis, (ad putredinem enim humiditas requiritur, siccatæ enim animalium partes nunquam putrescunt) in calore aeris intra 32. & 92. gradum thermometri Fahrenheitiani, sponte putrescunt: eo citius plerumque, quo calor major est intra definitum hunc terminum (majore enim calore fit potius exsiccatio putre-

dinem impediens) eo lentius, quo descendens calor magis appropinquat ad glaciale frigus. In piscibus plerumque hæc putrefactio citissime obtinet; in aliis lentius: nec hæcenus constat ullo experimento, animalium partes spontanea degeneratione nunquam in acidum degenerasse. Hinc hoc videri merito pro generali regula posse assumi.

Hujus

9. 84. **H**ujus putredinis ( 82 ) antecedentes cause sunt : 1. cibi ex aliis animalibus comestis, excepto lacte herbaceo ( 78 ), maxime ex insectis, piscibus, avibus rapacibus, ex vegetabilibus alcaliscentibus. 2. Abundantia boni sanguinis, vel si jam putredini ille proximus. 3. Virtus magna vasorum, viscerum, ( 50. ad 54. ) bilis. 4. Stagnatio, vel nimia agitatio, torpente, vel incitato animali motu. 5. Calor ingens diu & multum conciliatus corpori.

1. Potest sani corporis actio in ingesta alimenta, quæ in acidum sua natura vergunt non in purridum alcalinum, illa sic mutare, ut, similia facta humoribus sanis, jam incipientis putredinis naturam adipiscantur ( §. 80. ) Si ergo ingesta alimenta ex sua indole jam in putredinem vergant, conspirabunt simul ingestorum indoles & corporis actio in hæc ingesta : longe ergo promptior erit dispositio ad putredinem. Hinc solis carnibus, solis piscibus sine ullo sale, sine acido, sine vegetabilibus aciscentibus simul assumtis, homo diu vivere nequit ; langueret brevi, & abhorreret hos cibos. Sunt tamen animalia quæ solis vivunt carnibus, nec bibunt tamen : hoc de aquilis Gesnerus affirmavit ; & certa observata docuerunt hujus reveritatem : in hominibus tamen capta experimenta docuerunt, quod solis alcaliscentibus vivere sani nequeant diu.

2. Quantum possit boni sanguinis copia in assimilatione ingestorum, dictum fuit §. 25. n. 1. præcipuum enim auxilium est quod immutat cruda ingesta in naturam nostrorum humorum. Hinc sanissimi & plethorici in morbos putridos maxime proni, dum talis constitutio epidemica regnat ; debiles, cacochymici, mucosis, lentis, humoribus pleni, vix afficiuntur : & ideo athletice valentium periculosus status est. Si plethoricus homo, valido labore corpus exerceat, sudor exit obdissimus ; urina rubra, acris, jam subputrida fere. Calor major, qui semper his corporibus, boni sanguinis copia abundantibus, adest, multum auger hanc dispositionem ad putredinem.

3. Bina sunt auxilia præcipua, per quæ fit conversio crudi ingesti in naturam humoris inquilini : miscela nempe pauci crudi cum magna copia humorum coelorum ; & actio vasorum & viscerum in hoc crudo. De priori dictum fuit numero præcedenti, de posteriori nunc agitur. Chylus, sanguini mistus, cum illo per multas horas fluit, antequam in serum mutetur ; sed continua vasorum actio & viscerum tandem chylum mutant in serum & sangui-

nem : quo fortior ergo hæc actio vasorum & viscerum est, eo citius perficitur hæc mutatio. Hinc robusti homines, duro labore corpus exercentes, panem durum acidum, lac eburatum acidum, fumo & sale induratas carnes, vasorum & viscerum robore digerunt & convertunt in bonum sanguinem : cujus semper hæc proprietas est, ut in alcalinum putredinem vergat, aciescat nunquam. Si talibus hominibus darentur juscula, teneræ carnes &c. langueret illico, nisi acidis fumis domarent nimiam ingestorum proclivitatem in putredinem.

**BILIS.** Inter liquida corporis sani, si excnemetitia excipiantur, nullum acrius est, nullum magis vergens in putredinem, quam bilis. Hinc circa illa loca, ubi bilis hæret, cadavera omnium citissime corumpuntur. Hinc in morbis acutis cito in putredinem degenerans bilis tanta sepe facit mala. Chylo, per pylorum ex ventriculo in duodenum intestinum egresso, mox bilis utraque affunditur ; sicque ingestis alimentis per bilem primus quasi humanitatis character imprimitur : aciescentia, vel acida, per bilem incipiunt mutari in oppositam naturam. Præcipuum itaque est chylopoiesis instrumentum. Ob hanc causam frigidi pisces, & dentibus carentes, acerrimam bilem habent : si vero bilis vel copia aucta, vel incipiente putredine peccet, corrumpit omnia, & morbos acutissimos omnia putrefaciens excitat.

4. Motus nullus, & motus nimis liquidorum nostrorum, producant putredinem ; sicque binæ causæ penitus oppositæ producant eandem effectum.

Homo per octoginta & plures annos vivit sine ulla putredine humorum ; post mortem, cessante omni motu, flagrantibus omnibus liquidis, intra triduum, & aliquando citius, putrescit cadaver. Idem in sanissimo homine, aquis submerso, fit : ubi omnes humores adsunt : nil deest, nisi solus motus, brevi putredo nascitur.

**NIMIA AGITATIO.** Longe adhuc celerius putredinem inducit. Acutissima febris in-

tra 24. horas sic potest corrumpere omnia, ut urina fetida, feces alvine, cadaverose penitus, halitus oris putridissimus, interna omnia jam corrupta testentur.

Inerti otio torpentes toties scorbutus putridissimus, tabe factis visceribus, necat: validissimo motu musculari ardentissima potest excitari febris, omnia putrefaciens.

§. Ubi calor tantus est, ut humidum omne dissipare possit, tunc fit exsiccatio, putrefactionem semper impediens: aliter major calor semper putredinem auget. Carnes animalium hyemali tempore per plurimos dies servari possunt; æstivis caloribus brevi putrido dissolvantur: imprimis si cum magno calore simul adsit aeris humiditas. Hippocrates inter æstivos morbos

recenset plures, in quibus humores in putredinem degenerant: febres nempe continuas, ardentes, oris exulcerationes, genitalium putredines (*Aphor. 21. Sect. 3.*). Dum in calidissimis regionibus, silente vento, diu coguntur manere classiciarii, putridissimis morbis corripuntur. Hinc apparet, quam necessarium sit aeris refrigerium morbis acutis putridis decumbentibus. Galenus (*Method. Med. Lib. XI. cap. 8. Tom. X. pag. 254.*) putredinis naturam describens dicit: *putredo est mutatio totius substantie corporis putrescentis ad corruptelam ab externo calore; non enim a proprio calore corrumpitur quidquam &c. docent animalia sana per multos annos sine putredine vivere, si serventur eorum proprius calor &c.*

§.85. IN primis viis facit sitim, prostratum appetitum, ructus-nidrosos, graveolentiam tabidi, corruptique, sordes oris, linguæ, palato, faucibus, amarescentes putridas, nauseam, vomitum, putrefactæ biliosæ materiei, horrorem adversus omnia, nisi aquosa, vel acida, cruditatem putridam, diarrhoeam biliosam, dolores iliacos inflammatorios, caloris molesti sensum.

Sequuntur jam effectus putredinis natæ in corpore humano; in primo quidem illi, qui observantur nasci, quando putridi quid in primis viis hæret.

SITIM. Quæ est individua comes putridi hic hærentis: conatur enim natura plurimo potu ingestio abluere hoc putridum. Hoc apparet evidenter in hydropicis, qui in initio raro siticulosi sunt; sed ubi moræ & stagnatione incipiunt corrumpi aquæ, sitis oritur indomabilis. Hinc inter bona signa numeravit Hippocrates, si hydropici siti arcant. Quibus tabe factum hepar est, immaniter sitiunt, a fomite putrido hic hærente.

PROSTRATUM APPETITUM. Potest & a plurimis aliis causis appetitus tolli; sed ubi simul cum prostrato appetitu sitis adest, fere semper ab hac causa fit.

Si quis, quamvis sanissimus, occurrat putrido animalis cadaveri, illo momento, quo crepar dissentium abdomen, in syncope fere labitur, & satis diu ab omni cibo abhorrebit. Qui ovi, leviter tantum putrefacti, particulam deglutivit, mox omnia fastidit. Quid fiet miseris illis quibus circa ventriculum putridus talis fomes hæret, per interna corporis putrida hæc miasma disspersens? Hinc in mortis a putrida bile, hic hærente, insuperabile ciborum fastidium.

RUCTUS-NIDROSOS. Quomodo ructus

fiat, dictum fuit §. 63. dum eructat homo, odor contentorum ventriculi imprimis nares ferit: ubi putridi quid hic hæret, putridus cum ructu exit odor, qui tunc vel ab alimentis ingestis putrescentibus pender, vel a fomite corrupto in visceribus hærente.

SORDES ORIS, LINGUÆ &c. Medici prudentes nunquam ab ægris discedunt, nisi prius inspexerint oris interna, & linguam, quæ viscerum chylopoieticorum & pulmonis conditionem tam pulchre sæpe demonstrant. Ex ore hominis sani nil nisi limpidissimus ros exhalat: sed in morbis, immeabilibus humoribus obstruentibus, extrema hæc oscula exhalantium valorum, incipit linguæ dorsum imprimis scabrum fieri, sicum; color mutatur in pallidum, flavescens, fuscum, nigrum tandem; imo aliquando totæ gingivæ & dentes ipsi crusta tali obducuntur: distinctum omnino ab apertis hoc malum, cum quibus sæpe confunditur; sordes vocantur melius: quæ, postquam redit debita perspiratio per aperta vasa, ab impetu vitalis liquidi a tergo urgentis abstergantur, reditque linguæ solita nitiditas. Quando sordes illæ ab inflammatoria immeabilitate nascuntur, plerumque simul magna adest siccatas; si vero a viscoso putrido obstruente, plerumque major humiditas est: nisi bene hæc causæ simul

# §85. MORBI EX ALCALINO SPONTANEO. 83

mul concurrant, inflammatoria nempe densitas & putredo, ut in morbis acutis sæpius fit; sed ut linguae superficies apparet, sic & se habet interior superficies œsophagi, ventriculi &c.

**GRAVEOLENTIAM TABIDI CORRUPTIVEQUE.** Quando in primis viis, & imprimis circa ventriculum; putridus fomes hæret, mirabiles sæpe oriuntur morbi, totum genus nervosum turbantes, omnes cerebri actiones pervertentes; non adeo, ut videtur, putrido liquore venis reorpro, dein communi humorum circulo ad cerebrum delato; sed potius venenatæ quasi auræ afflatione turbantur omnia: dum putrida bilis hic collecta, vel per morbi vim nata, statulatur; immanes capitis dolores, vertigines, deliria, furores &c. in capite causam & sedem mali esse, sere persuaderent: sed excussa per lenè vomitorium hæc saburra, uno momento cessant omnia hæc mala: unde Hippocrates in prognostico; tenebrosam vertiginem; & oris ventriculi morsum; tanquam signum vomitus bilioli brevi futuri recensuit: & uti putridi cadaveris horridus factor hominem vel fanissimum potest in syncope usque deducere, uno momento ablaris omnibus viribus, sic & in internis litens putridam graveolentia sua & spirituoso quasi afflata, omnia turbare potest.

**NAUSEAM ET VOMITUM &c.** Omnium humorum acerrima bilis omnium citissime in putredinem vergit: hinc simulac quid putridi in primis viis nascitur, mox bilis mutatur. Sed præterea putridum hic hærens omnem tollit appetitum; sola sere aquosa acida ferunt; quæ facile transeunt; hinc ventriculus vix distenditur: sed ventriculo non dissentio pylorus semper patet: hinc commercium immediatum ventriculi cum intestino duodeno; in quo omnis humor secretus ex ingenti hepate, pancreate, vesica fellea colligitur, quem intestinum jejunum, tot rugis clausum, non adeo facile transmittit: hinc hæc in vacuum ventriculorum regurgitant, ubi liber datur aer accessus: hinc citissima putrefactio; unde nausea & vomitus: materiz biliolæ putrefactæ in febribus autumnalibus epidemice grassantibus post magnos calores æstivos toties occurrunt; & nisi illud biliolum corruptum sponte vel arte excutiat; in fine morbi putridissima diarrhoea oborta; prostratis indubitanter viribus; sæpe percutit ægri.

**HORROREM ADVERSUS OMNIA NISI AQUOSA VEL ACIDA.** Sæcula observatio docuit, & in hominibus & in animalibus morbum naturæ sæpe incitare ad applicationem auxilii; cæterum ignoti; & nasci sæpe insuperabile desiderium assumendi quædam; & contra, horrorem versus alia quædam, quæ offeruntur. Modum, quo hæc sunt, non assequimur; veritatem facti certa demonstrant experimenta. Dum summis æstibus exsiccat corpus, sitis vel invitum coget, ut remedium querat. Simulac quid putridi in corpore hæret, mox nascitur omnium facile putrescentium fastidium summum: si acuta febre putrida laboranti carne offerantur assæ, ne quidem aspectum feret æger vel nidorem carni: si vero citrea, aurantia mala, fructus horros &c. offers, avidissime arripit. Sive jam peritissimus Medicus tali decumbat morbo, sive innocuus infans, hæc sunt eodem modo: summe prudentiæ Medicæ est in morbis nata hæc desideria observare: Qui ex præconcepia hypothesis in morbis calidissimis omnem negabant porum, omnia acida dargnabant, quam infelices fuerunt in morborum curatione! Sibi soli ad omnia sufficiens natura aquam appetit & aquosa omnia; ut abluatur putridum; & per urinam vel sudores eliminetur de corpore; acida; ut corrigatur.

**CRUDITATEM PUTRIDAM.** Quamvis alimenta vi corporis nostri sic nuntentur, ut in quiete & calore, vel & dum valide moventur, incipientis putredinis naturam adipiscantur, ut dictum §. 80. tamen nulla putredo in humoribus sani corporis observatur naturaliter. Hinc omne putridum crudum est: cocti enim humores nostri blandi sunt, nec alcalini, nec acidi: hinc si ingesta alimenta in primis viis, vel & liquida corporis nostri his locis effusa in putredinem abierint, cruditas hic nascitur putrida; quæ omni momento augetur, ob aeris liberum accessum, calorem & humiditatem primarum viarum; & quia tota vis corporis in ingesta agens hac conspirat: hac enim vi alimenta ab omni putredine alienissima convertuntur in naturam liquidorum nostrorum, quæ omnia putrescere possunt; quanto magis eadem hæc vis agens in putrida vel putredini proxima augere corruptelam?

**DIARRHOEAM BILIOSAM;** Dum aliquid putridi hæret in primis viis, bilis facilissime

me putrescens cito corrumpi incipit : corrupta venenato fere stimulo continuas alvi excretiones putridissimas facit : tunc liquorem quasi oleosum putridissimum alvo excernitur . In acutis morbis sepe accidit , ut jam in initio per vim morbi corrupta bilis perpetuum faciat nauseam : nisi tunc excitatur vomitorio illud corruptum biliosum , vel corrigatur acidis , circa finem morbi diarrhoea putridissima biliosa nascitur , fractis jam a progressu morbo viribus , adeo periculosa . Vinellum ovi putrefactum ad pauca grana datum , validissimam hypercatharsin posse facere , observavit Bellinus .

**DOLORES ILTACOS INFLAMMATORIOS .** Omnis acrimonia potest irritare nervos per intestina dispersos , unde spasmodica contractio , & ab hac inflammatio intestinorum oriri potest : maxime quia ab acri bi-

§. 86. **I**n sanguine producit dissolutionem ejus putridam ; acrimoniam alcalinam oleosam volatilem ; ineptitudinem ad nutriendum ; aptitudinem ad consumendum ; minimorum vasculorum destructionem ; hinc omnes actiones solidarum & liquidarum partium turbat , depravat , destruit ; unde circulatio , secretio , excretio variat ; tum febres ardentes , urinæ & omnia secreta putrida , inflammationes , suppurationes , gangrænae , sphaceli , mors .

**DISSOLUTIONEM EJUS PUTRIDAM .** Sanguis sani hominis missus de vena post pauca minuta coagulat in massam homogeneam rubram ; de qua postea secedit serum tenuius , remanente parte rubra crassa concreta : sed sanguis talis tepore simili , ac in sano corpore observatur , foras aliquamdiu , incipit putrescere , & simul attenuari ; nec amplius concrefcit postea . Dum in Ictericis bilis retropremitur in sanguinem , totus sanguis , si diu durat morbus , a bile dissolvitur , & in putredinem disponitur : unde a nimis soluto sanguine hydrops postea icterum sequitur . In scorbuto putrido sic solvitur sanguis , ut propriis vasis coerceri renuat , sed ecchymoses , maculas , & validissimas hæmorrhagias faciat . In obsidione Bredana dum pestis grassabatur in urbe , sanguis insectorum apparebat lividus , fetidus , non concrefcens ( *Idem. ibid. pag. 14 .* ) .

**ACRIMONIAM ALCALINAM OLEOSAM VOLATILEM .** Non videtur in vivente penitus putrescere posse sanguis , ( destructis enim minimis in cerebro & cerebello vasis , mors prius fieret , ) sed tamen proxime eo disponitur ; sic ut , ubi acri libero exponitur ,

lioso imprimis saponacea vi abraditur mucosus , descendens tenerrimas papillas nerveas , per internam tunicam intestinorum dispersas , hinc longe magis sensibilis fuit .

**CALORIS MOLESTI SENSUM .** Quantum Caloris per putrefactionem generetur , docet scænum magnis acervis collectum per solam putrefactionem in vivas flammæ erumpens . In febribus illis continuus , quas ab effectu putridas vocaverunt , mordax calor diagnosticum signum præcipuum dat : in ardentissimis febribus , dum extrema frigent , ignis urentis vim circa præcordia ægri sentiunt : sed quam subita omnium putrefactio in his febribus adest ? Hydropici crura , matris instar frigida , dum incipit putrescere stagnans lymphæ , calent inflammantur . Infans peste mortuus secundum post obitum die adhuc calebat ( *Van der Mye de Morbis Bredanis pag. 8 .* )

statim in putridam saniem diffuat . Appareret hoc in gengivis scorbuto putrido alveolorum , exit enim erosus vasis sanguinolenta sanies cadaver olens .

**INEPTITUDINEM AD NUTRIENDUM .** Albumen ovi , ex quo certo scimus pullum nutrirî , tenacitatem habet satis notabilem in fero sanguinis , quod per experimenta demonstratur satis simile esse ovi albumini , similis plastica cohesio inest . In lacte jam incipit tale quid nasci ; docet hoc caseus . Hinc videtur ad nutritionem corporis requiri , ut talis cohesio adsit in nostris humoribus : sed putredo nata hanc tenacitatem tollit . Albumen ovi putrescens instar aqueæ tenuæ fit ; serum sanguinis putridum ad ignem non coagulatur amplius ; & in illis morbis , ubi putridus sors in corpore hæret , dissolvuntur omnes humores , nutritio deficit , lento marasmo omnia pereunt : docent id phthici , in quibus a dissoluto nimis sanguine sudores illi nocturni , colliquativus & putridus omnino alvi fluxus , atrophia , mors .

**APTITUDINEM AD CONSUMENDUM .** Hoc imprimis patet in illa specie tabis , quæ consumptio Anglis dicitur : in quo morbo , sine

sine notabili fere pulmonis labe, sensim consumuntur corpora. Videtur fere morbus ille originem ducere a nimio usu carniū, unde humores in nimiam alalescentiam prout plastica illa tenacitate carent, unde sudoribus diffiunt, & sensim contabescunt.

**MINIMORUM VASCULORUM DESTRUCTIO-  
NEM.** Urina sales sanguinis nimis acres factos eliminat de corpore: ubi ergo a quantumque causa urinae secretio vel excretio impeditur, non fit hæc sanguinis depuratio. Hæc acrimonia ipsi vitæ actionibus omni momento augetur: hinc in teneris vasīs, cerebri nempe & cerebelli imprimis, læsio apparet; & ideo post ichthuriæ diuturnam, sopor, delirium, mors. An ideo subtilissimum pestis venenum putrefaciens omnia, destructis minimis vasīs, tam subitam mortem infert?

**HINC OMNES ACTIONES &c.** Ut fiant actiones in sanitare requiritur, in solidis partibus requiritur debita cohesio, in fluidis proportionalis ad vasa, per quæ fluere debent, crassities. Putrida dissolutione attenuati humores aliena vasa intrant, & blanda indoles in acrem mutatur; hinc necessario in omnibus functionibus corpus a sanitatis legibus recedit. In acutissimis febribus, in quibus tam subita putrefactio fit, statim læsio omnium functionum apparet, illico degenerant omnes humores. In ipso enim tali morborum initio respiratio anhelosa & difficilis, pulsusque celerrimus & sæpe inæqualis, vitales functiones læsas demonstrant. Debilitas summa, deliria, sopores &c. animalium functionum lesionem indicant: prostratus appetitus, sitis, nausea, vomitus &c. naturales functiones perturbatas probant; saliva, bilis, sudor, urina, mox degenerant: unde, cum nihil fere de sanitate superfit, tam funestes plerumque eventus.

**FEBRIS ARDENTES.** Hippocrates (*Epid. 3. Tom. IX. p. 259. 260.*) monuit post statum austrium humidum & mollem (*υαλδανος Galenus in Commentariis dicit significare ἀννν καὶ δῖπρος tranquillum, sine ventis, & calidum*) febres ardentes phreniticas oriri: sed talis aeris constitutio

omnia ad putredinem disponit, sic ut carnes mactatorum animalium in tali aere humido & calido intra paucos dies in tabum putridum diffiunt. Ubi exusta atra bilis, fixitate sua pertinaciter adeo hærens, per quamcumque causam fusa, corrupta, sanguini miscetur, ardentissima oritur febris subito destruens omnia.

**URINÆ ET OMNIA SECRETA PUTRIDA.** Omnia hæc sequuntur indolem sanguinis unde feceruntur: sed urina naturali lege sales & olea sanguinis acriora, & putredini proxima, abluit & expellit de corpore; hinc, sanguine putridis inquinato, urina similem habebit labem; uti & sudor &c.

**INFLAMMATIONES, SUPPURATIONES &c.** Omnes acre irritans stimulo suo inflammationem in toto corpore, vel in parte quadam, facere posse, docent certissima observata. Hinc & putridum natum in corpore sua acrimonia inflammationem facere potest. Sed & præterea dissoluti per putredinem humores aliena vasa intrant, & sæpe per illorum angustias ultimas transire non possunt: hinc alia ratio inflammationis a putredine natæ deducitur. Ophthalmiz laborantis nuchæ applicuerant lienem recens mactati vituli, reliquerant per 24. horas, torus lien tepore corporis & humiditate resolutus fuerat in olidissimam putrilaginem; & locus, cui applicatus fuerat, validæ inflammationis omnia signa habebat. Sed inflammatione nata, sequuntur necessario inflammationis exitus varii, suppuratio nempe, gangræna, sphacelus; ut postea in inflammationis historia dicitur. Hæc non adeo in externis partibus timetur, sed si in minimis teneri morum viscerum vasīs hæc fiant, summum periculum. Sic in febribus acutissimis observatur, per abscessum versus extrema corporis deponi malignos adeo humores, ut fiat subitissima mors partis, & sphacelus ad ossa usque: ut monuit Hippocrates in prognosticis, quod partes tales penitus nigre factæ decident, superstitæ ægro, si malum leviter ferre videatur, & signum aliquod salubre præterea addit (*Tom. VII. pag. 614.*)

§. 87. **EX** his (76. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.) denuo diagnosi & prognosis, æque ac Curatio morbi liquide conficitur.

Quomodo diagnosi, prognosis & indicatio curatoria deducantur ex cognita prius Morbi historia, dictū fuit §. 27. pro exæplo generali. Sic

in hoc morbo causæ prægressæ §. 84. & effectus morbi nat. §. 85. & 86. demonstrat adeste alcalinū spontaneū: ubi vero ex his noscitur illud adeste.

## 86 MORBI EX ALCALINO SPONTANEO. §. 87-88.

se, pro Prognosi facile concluditur, metuenda esse illa omnia, fidelis observatio docuit sequi hunc morbum natum; & quæ omnia recensentur §. 85. & 86. deinde ex his bene intellectis curationis requisita facile deducuntur.

§. 88. **Q**Uæ perficitur 1. alimentis, potibusque, cito acescentibus, vel jam acidis, quo farinosa in aqua cocta, vel ad initium corruptionis digesta, lac ejusque producta herbacea, fructus horzi, horum acidi crudi, vel fermentati vinosi, acetosive, succi. 2. Acidis medicamentis ex vegetabilibus crudis, vel fermentatis, aut salibus & sulphure vi ignis in acida conversis. 3. Salinis alcali absorbentibus, ut est sal gemmæ, marinus, & nitrosus. 4. Aquosis diluentibus. 5. Lenibus obtundentibus, qualia farinosa vegetabilia emulcta, vel decocta, sunt; & laudatissimæ boli, acidulo balsamico testæ, & demulcentissimo viscido, constantes. 6. Saponaceis abstergentibus acidis, suboleosis, oxymelle, sapidis acetosis. 7. Quæte, somno, balneo vaporis, fomentisve.

1. Facile apparet totam curam consistere in binis his, ut nempe putridum alcalinum vel expellatur de corpore, vel sic mutetur, ut non noceat amplius: deinde, ut talia pro cibo & potu ingerantur, quæ ex sua indole putrescere nunquam possunt, sed in oppositam acrimoniam, acidam nempe, vergunt: talia jam habentur omnia dicta FARINOSA: cerealia nempe omnia & matura femina, quæ trita in farinam a beunt. Hæc enim aqua diluta in calore modico acescunt, quædam citius, quædam serius. Avenæ & secalis decocta citissime acescunt, deinde hordeum &c. secale autem imprimis satis cito in acidum satis acre degenerat, si in aqua coquitur vel maceratur. Artifices, qui ferri lamellas stanno obducunt, noverunt requiri ad hanc rem, ut ferri tota superficies teratissima sit, tunc enim stannum facile adhæret: ideo ferri lamellas macerant in aqua acida reddita per secalis grana addita. (*Acad. des Sciences l'an. 1725. Mem. 152.*) Hordei trifana, cremore, succo, in omnibus acutis morbis utebatur Hippocrates, ut passim in ejus operibus habetur.

LAC EJUSQUE PRODUCTA HERBACEA. Lac ipsum purum non satis tuto in putridis morbis datur, acescit quidem omne lac herbaceum, sed habet cremorem pinguem, qui rancescere potest, habet caseum, qui plus jam de animali natura participans, quam reliquæ lactis partes, putrescere potest: hinc in acutissimis morbis non nisi plurima aqua dilutum lac conceditur, vel lactis serum; imprimis illud, quod a lacte ebutyrato jam acido per manicam Hippocratis separatur: hoc tenue serum acidulo sapore adeo placens saluberrimum auxilium dat in omni morbo putrido.

FRUCTUS HORZI. Egri similibus morbis decumbentes spontaneo appetitu maxime versus hos gratissimos fructus feruntur. Ante multos annos omnes fere oblectabantur Medici, ne sumerent: dum Celeberrimus horum Aphorismorum Auctor Nobili Viro, morbo acuto decumbenti, cerasæ, mora, ribesia dabat, publica auctoritate puniendum scelus putabatur: interim, qui hanc methodum adeo calumniabantur, succos horum fructuum cum saccharo in syrupum coctos præscribebant quotidie. Maturorum fructuum succus nulla preparatione indiget, sitim exstinguit, calorem temperat, urinæ & alvi vias laxat, summum solamen languenti ventriculo a putrida bile præbet. Calidissimis in regionibus solis fere his fructibus vivunt sani: æstivis caloribus incensa bilis saponaceis & blandis fructuum horzorum succis felicissime demulcetur. Galenus, qui ubique fere fugacium fructuum usum damnabat, tanquam pravi penitus succi forent, illis solis prodesse dixit, qui æstu vehementiori & longiore itinere sese consecerint: tunc enim juvant corporis squalorem humectantia, & si frigida sumantur, moderate refrigerantia. (*De Aliment. Facult. Lib. II. cap. 2. Tom. VI. p. 336.*) Sic invitus pulchros fructuum, quos damnaverat, usus recenset. Succus illi jam sæpe sunt acidi naturaliter, ut in ribesibus, cerasibus quibusdam &c. vel cito satis acescunt, facile fermentabiles; tuncque in vini vel aceri indolem mutantur. Vinum autem ipsum in his morbis prodest, imprimis acidulum, & in morbis ipsis acutissimis; sed multa tunc aqua dilutum. Aprorum carnes vino Rhenano conditæ ab omni putredine servantur in Germania.

2. Ex



2. EX VEGETABILIBUS. Plurima habentur vegetabilia, in quibus acidum naturaliter invenitur, ut omnes acetosæ species, acetosellæ<sup>1</sup>, tamarindorum pulpa &c. quæ ubique in officinis obvia prostant; unde efficacissima & gratissima simul parari possunt remedia. Huc imprimis refertur fermentatione paratum acidum, tartarus nempe, & acetum omnibus fere palmam præcipiens: unde oxycratum, oxymel, poscam adeo laudaverunt veteres Medici. Acetum quidem ex omnibus liquidis fermentatis parari potest, melius tamen nunquam fit, quam ex vino: omnes enim vini partes constituentes in aceto videntur adesse, sed alio modo dispositæ. Acetum inter præcipua prophylactica ad pestem ipsam ab omnibus recensetur, solo odore putridis morbis decumbentes adeo reficiens.

AUT SALIBUS ET SULPHURE &c. Omnia fere acida vegetabilia, & imprimis acetum, talem vim habent, ut simul sanguinem plus dissolvant, ipsa putredo nimiam dissolutionem omnium humorum facit; hinc ubi putridum adest una cum nimia dissolutione humorum jam præsentem, vel si brevis futura metuitur, tunc acidi spiritus vi ignis ex sale marino, nitro, vitriolo, expressi summum usum habent; efficacissime enim omni resistunt putredini, dum simul non dissolvunt humores nostros, sed coagulant potius. Huic scopo pulchre inservit spiritus sulphuris per campanam dictus, qui purissimum acidum fossile nihil metallici in se habens præbet.

Quantum autem habeant efficaciam hæc acida fossilia, docuit Sydenhamus, qui in variolis pestifimis confluentibus spiritum vitrioli potui ordinario mistum pulcherrimum cum successu exhibuit, dum incassum alia retraverat remedia. (Sydenham. p. 299.) Sed in his variolis putridissimo tabo omnia diffuunt: hinc apparet, quanta vi putredini resistent hæc acida fossilia.

3. SALINIS ALCALI &c. Sales illi animalium carnisbus aspersi omnem putredinem arcent, ut docent quotidiana experimenta. Optimi hinc semper usus, nisi validus simul motus humorum addit; tunc enim metus est, ut sanguis magna copia horum. Alium gravatus, acrior redditus, & velocius motus, destruat terribia vasa. Nitrum tamen inter hos sales levissimum, falsissimum, superabile viribus corporis nostri,

tunc præfertur reliquis. Externo usu sales illi soluti in aqua, applicati parvibus gangrenæ corruptis, omnem arcent putredinem.

4. Sales sanguinis nimis acres facti, & olea nimis attenuata, & jam subputrida, naturali corporis lege per urinam eliminantur; aliquando & per sudores: maxime ergo convenit aquosis diluentibus magna copia ingentis hæc abluere: copia enim urinæ inde augetur, & materie per sudorem eliminandæ suppeditatur vehiculum; sed & in omnibus morbis putridis, quamdiu mens constat, sitis ingens aquosa petit, natura sic monstrante viam.

5. FARINOSA EMULSA VEL DECOCTA. Hæc ratione aque diluunt; molli vero glutine suboleoso inviscant omne acre, & iners reddunt: hinc tanti usus. Omnia illa farinosa semina, confusa, pressa magnam copiam olei mollissimi dant: sed hoc oleum, cito rancescens, noceret sapius, dum autem cum aqua teruntur, dant liquidum lacteum mollissimum, emulsum vocant in officinis, in quo idem hoc oleum est, sed sic mutatum, ut non rancescat, sed acescat citissime. Olei virtus, quæ inviscat & obtundit omnem acrimoniam, in emulsis manet, & futura ranciditatis metus abest.

LAUDATISSIMÆ SOLI. Galeni tempore magna jam laude essebantur terræ illæ medicatæ dictæ; imprimis Terra Lemnia, quæ in Lemno insula effodiebatur.

Dioscorides (Lib. V. cap. 113.) terræ caprinum sanguinem misceri credidit, & in pastillos dein formari, quos capræ signarent imagine. Galenus (De Simplic. Med. Facultat. Lib. IX. cap. 1. num. 2. Tom. XIII. pag. 247.) his laboriosum iter in Lemnum insulam suscepit, ut indagaret hujus terræ indolem, & invenit, nunquam ei misceri hircinum vel caprinum sanguinem, pingue vero lutum, & omnibus crassioribus elotione inde separatis ad ceræ consistentiam siccatum servari, & in minus particulis divisio luto sacrum Dianæ sigillum imprimi deinde, sicque postea vendi.

Varie tales terræ hodie habentur in officinis; omnium forte optima illa, quæ Bolus Armena hodie dicitur. Ad attactum pinguis apparet & saponacea, coloris pallide rubri, levem nec ingratum odorem habens, facile in mollissimum pollinem teritur: in ore deliquescit fere instar butyri, & saliva integre diluitur; in sapore inve-

nitar levissimum aroma, & simul aliquid exsiccantis adest. In his terris latet acidum, miro modo obvolutum, ut docent Chemicæ observationes. Acidum enim illud vagum, fossile dictum, in terræ visceribus hærens, varia constituit concreta, prout diversis unitur corporibus: sic enim vitriola, alumen, sulphur, idem fere omni dote acidum exhibent. Quia autem omnium facillime, & maxima quidem copia, ex vitriolo educi potest, hinc acidum vitriolicum dicitur. Hoc acidum sali marino, gemmæ, nitro, mistum expellit acidus horum salium spiritus, unitur parti residuo post expulsum spiritus, & novam salis speciem constituit: sed iidem illi sales, cum magna copia boli armenæ misti, igne valido dant similes spiritus, nec hoc fit, quia bolus admista florem horum salium impedit, creta enim v. g. admista vel arena non succedit hoc experimentum; inde concluditur, latere in pinguibus his terris acidum vitriolicum, quod igne actuosum redditum excutit acidus horum salium spiritus: nec obstat, quod blandus sapor nullam acrimoniam indicet, sulphur enim insipidum magnam copiam illius acidum recondit.

Hinc pulcherrimas harum terrarum medicatarum usus patet; latente acido omni putredini resistunt, & innocua lenitate demulcent omnia: unde in dysenteris putridis tantum usum habent, modo satis magna dosi exhibeantur: uncia una emulendo quasi in libra aquæ diluta, dein cochleatim sumta, pulcherrimos effectus præstat: ubi ad pauca grana dantur, nihil efficiunt.

§. 89. **U**nde patet, ubi, & cur, acidus ructus nidorosus sequens bonus? cur, & quibus convalescentibus salis ammoniaci sapor molestus? cur sudor acidum spirans acutus salutaris, quæ acrimonia acida, alcalina, biliola, oleosa sit? Qui morbi propria significatione putridi dici queant? Cur illi fortissimis, plethoricis, præcipue? an unquam in homine vivente ulli humores jam vere alcalini reperi sint? rarissime; expertus loquor. Urina in vesica, diu retenta, aut in calculo rariore absorpta, forte, aliquando, eo pervenire queat. Aliter mors ante fit, tabefactis per acria, necdum alcalina, pulpofis vitalium extremis.

**CUR ACIDUS RUCTUS & Non semper acidus ructus bonus est;** nam in infantibus & debilibus hominibus, acido laborantibus, sæpe molestissimi illi acidi ructus sunt, sævam cardialgiam inducentes; sed ubi prius a putridis, circa ventriculum & vicinas partes hærentibus, ructus rancidi nidorosi sunt, tunc acidus ructus sequens bonus est, quia

6. In morbis acutis majore motu & calore pinguedo sua sanguini miscetur, sicque plethoram quasi oleosam facit: aqua, & aquosa omnia potata, non possunt facile eluere de sanguine hoc oleolum, omni momento acrius jam factum; hinc adduntur talia quæ saponacea vi omne pingue reddunt aquæ miscibile. Veteres mel cum aceto coctum sumebant: hodie & melle & saccharo utimur, & imprimis inspissatis illis sapis acidalis ex succo sambuci, ribesiorum, berberis &c. quæ saponacea vi omne concretum resolvunt, & aciditate sua omni putredini resistunt efficacissime.

7. **QUIETÆ.** Motus muscularis circulationem auget & attritum: sed hæc aucta disponunt omnes humores ad putredinem. Dum validissimo cursu quæ corpus fatigavit, acris, rubra, fetida redditur urina; idem in morbis acutis observatur. Ideo Veteres Medici talibus ægrotis summam imperabant quietem, omnem strepitum, omnem lucem arcebant sollicitissime, ut placidus subreperet sopitis omnibus sensibus somnus.

**BALNEO VAPORIS.** Sic laxatis vasibus infuabatur aquosa diluentia; minuebatur attritus, omnes meatus cutanei aperiebantur, ut facilis fieret exhalatio illorum, quæ jam nimis acria facta nocerent, si manerent in corpore.

**FOMENTIS.** Tota cutis bibula resorbet sic applicata remedia, imprimis dum spongiæ madidæ applicantur ad parotides, axillas, inguina, &c. illis enim in locis maxime bibula cutis est, & venæ majores prope decurrentes resorptos humores cito sanguini miscunt.

denotat, putredinem superatam esse, & oppositum omni putredini prævalere in primis viis acidum: In diuturnis Lienteriis ructus acidus superveniens, qui prius non erat signum bonum: sic Hippocrates in Aphorismis (Sect. VI. Aphor. 1. Tom. IX. pag. 245.) monuit. Ratio facile patet: quia in Lienteria assumpta omnia statim demittuntur.

tuntur, nec tamdiu moram patiuntur, ut acida possint fieri; ideo ructus acidi designant, intestina & ventriculum eo utque roborata esse, ut ingesta possint retineri diutius, donec acefant.

CUR ET QUIBUS CONVALESCENTIBUS &c. Hoc omnes fere experiuntur, qui a morbis acutissimis refurgunt, quod nempe omnia, quæ assumunt, apparent salissima: jus carniæ parum meracius salissimæ muræ saporem habere videtur. Idem & in illis, qui a peste convalescebant, observatum dicitur. Fit autem ille sapor, quia per ingesta acefcientia vel acida alcalinum putridum prædominantia correctum est, & mutatum in speciem quamdam falsi compositi blandi. Multum etiam huc facere videtur, quod lingua, in morbis acutis semper sordida & scabra, deciduis illis crustis nitidissima fiat, & simul tenerrimi sensus.

CUR SUDOR ACIDUM SPIRANS &c. In morbis languidis chronicis sudor acidum spirans malum signum dat, efficitur penitus corporis vires demonstrans; in acutis vero designat, subactam esse illam diathesim, quæ humores in alcalinam putridam vergebant naturam.

QUÆ ACRIMONIA ACIDA. Quæ ex assumtis acefcientibus, non bene subactis per vires valorum & viscerum, nascitur: omnes enim humores vere animales dicendi sponte sua in putredinem vergunt, nunquam in acidum: acida ergo acrimonia solis ingestis debetur.

ALCALINA. Quæ & ab ingestis in putredinem pronis oritur, & ab humoribus nostris stagnantibus: quamdiu enim per vasa moventur humores nostri, vix possibile videtur ut putrescant penitus, & alcalinam naturam induant: tenerrima enim vasa cerebri & cerebelli tam acres humores ferre non possent sine destructione. Omnis acrimonia alcalina imprimis in excrementis hæret, si adsit: in stercore enim sæpe vera putredo adest: urina in morbis putridissimis proxime illuc disponitur.

BILIOSA. Inter humores nostros, exceptis excrementitiis, nullus est, qui plus vergit in putredinem, quam bilis; unde citissime in morbis acutis corrumpitur; hinc biliosa acrimonia acerrima, maxime noxia. Cum enim in morbis acutis aucta sit circulatorum, major copia bilis fecernitur, quæ blando chylo non obtunditur, at in

sanis fit: sed acris facta, attenuata, sanguini mista, turbat omnia.

OLEOSA. Omnium pessima olei cajuvis, blandissimi etiam, corruptela. Pressum ex amygdalis oleum suavissimum intra paucos dies æstivo tempore sic corrumpitur, ut ex miti acerrimum fiat, & deglutitum fauces exurat. Medulla ossium adeo blanda, dum corrumpitur, sœtore intolerabili, & acrimonia pessima ossa densissima in cariosum pulvisculum dilabi facit. Tenacitas, quæ adhæret corruptum oleum, partibus quas tangit, auget malignitatem.

QUI MORBI &c. Omnes illi, qui aucto motu & calore subtilissime faciunt sic degenerare omnes humores, ut in putredinem quam maxime vergant. Tales sent imprimis omnes febres acutæ continuæ, & potissimum illæ, quas ab hoc effectu putridas dixerunt Vereres Medici: in quibus, sæpe in ipso morbi initio, linguz sordes, urina acris, rubra, fortida, feces alvine olidissimæ, sudor graveolens, certas putredinis notas exhibent.

CUR ILLI FORTISSIMIS &c. In his enim boni sanguinis abundantia, calor magnus, robusta vasa & viscera, efficiunt, ut omnia ingesta citissime in animale naturam degenerent, id est in putredinem sponte inclinent: unde & observatum sæpius fuit, febres putridas epidemice grassantes, imo & ipsam pestim, fortissimos quosque invasisse: debiles, senes, chronicis morbis laborantes, mansisse immunes.

AN UNQUAM IN HOMINE VIVENTE &c. Effusus humoribus extra vasa sua, collectos in cavis naturalibus vel morbois, posse putrescere, in homine vivente, imprimis si liber aeri accessus detur, nullum dubium est; sed in ipso sanguine, & humoribus inde secretis per sua vasa motis, veram putredinem obtinere posse vitæ tempore, rarissime, si unquam, docuerunt observata. Imo in ipsa urina, quæ acriores de sanguine sales abluir, vel in morbis putridissimis, an unquam observatum fuit verum alcali? unicum vidi casum, qui fere faceret, ut crederem aliquando, quamvis rarissime, hoc fieri posse. Decumbebat syncho putrida adulta virgo: vocabar decima die morbi; inveni pulsum parvum, celebrem, inæqualem; tremulos omnium musculorum motus; respirationem sublimem, difficilem; mens constabat tamen; urina

fate-

foetorem habebat pessimum : emissâ fuerat ante trihorium ; necum abstuli urinam illico, affudi nitri spiritum, effervescentia fiebat validissima : post octo horas periit ægra. Hæc ergo urina vere alcalina erat, sed per tres horas in libero aere steterat ; forte & diu in vesica hæserat, antequam excerneretur. Sanguis fœminæ febre maligna quasi Erysipelatosa laborantis, per phlebotomiam extractus adeo foetebat, ut ex ejus tetto odore tam Chirurgus, quam adstantes, in animi plane deliquium incidere : hoc se vidisse asserit Morton (*Apparat. Curat. Morbor. Univ. pag. 11.*).

URINA IN VESICA DIU RETENTA &c. Senex in hac urbe rei frumentariæ mercator ischuria laborabat : Chirurgus, in simili casu huic ægro levamen per catheterem immisissum asserere solitus, aberat : noluit alteri curam committere æger : sic mansit usque in diem sequentem, donec rediret in

§.90. **H**INC tandem scitur, quid mali lantium motus, & quantum ejus effectus variet pro varietate loci, ubi hærent, & humorum, in quos agit? quæ a stagnante, vel ab extravasato, nocumenta? imo neque obscura hinc ratio ortus viscosi glutinis, quo lentescunt humores nostri; dum spissa decocta ex animalibus diuturna elixatione parata, nimia ingeruntur copia; aut etiam, dum tegumenta animalium, horumque lentæ, tenacesque, partes extremæ, avidius assumuntur, aut diutius : etenim alia hinc pituitosi indoles; & distincta ab illa, quæ jam exposita in fine (75) -

QUID MALI FACIAT NIMIUS VEL MINOR &c. Ambo faciunt putredinem nasci : sic a validissima inflammatione gangræna, putrefaciens omnia, oritur. Simile malum a defectu circulationis fit, sed lentiori passu incedit; prius malum celerissime destruit omnia.

QUANTUM EJUS EFFECTUS VARIET &c. Circulatio aucta eo plus agit in corporis partibus, quo minus distant a corde : hinc in febribus ardentibus inviolabilis ardor circa præcordia : & maximum ab aucto motu humorum per vasa periculum in illis locis, ubi vasa omnium, tenerrima sunt; in cerebro nempe & cerebello. Sed & ingens discrimen est ratione humorum, in quos agit nimia vel minor circulatio : bilis per febres citissime corrumpitur; urina statim fit acris & rubicundior, quia per hanc sales in putredinem vergentes naturaliter abhincuntur, reliqui humores corporis non tam cito mutantur.

QUENAM A STAGNANTE ET EXTRAVASATO, NOCUMENTA. Quamdiu vitalis motus

urbem Chirargus, qui, cathetere immisso, eduxit urinam, tam putridam, ut argeæ catheterem Iridis coloribus tingeret, & Chirurgum ipsum, qui incautus hausserat putridissimæ urinae halitum, levi peripneumonia afficeret per aliquot dies. In fungoso calculo in vesica vel ronibus hærente resorptam urinam, mora & calore putridissimam fieri posse, certissimæ docent observationes.

ALITER MORS ANTE FIT &c. Tam tenera enim sunt hæc vasa, ut omnem sensum, omnem fere imaginationem fugiant : hinc illico destruerentur, si acris fluida aluerent hæc vascula. Qui urinae suppressione pereunt, ante mortem cerebri functiones lasas habent omnes; tandem lethali sopore placide moriuntur, aliquando & convulsi ante mortem. Videtur tunc acre retentum, in sanitate per urinam excerni solitum, destruere tenerrima hæc vascula.

humorum per vasa pergit, omnia manent integra, & ad summum senium homo sine ulla putredine pervenit. Si sanissimus homo sub aquis suffocatur, omnia sunt ut ante; abest solus motus; intra paucos dies putrescit totus : hinc stagnatio & extravasatio humorum ad putredinem disponunt : sed ubi nullus datur aeri accessus ad humores stagnantes vel extravasatos, lentius hoc fit. Patet in contusionibus, ubi sub cute integra fractis vasibus effusus sanguis stagnat, nec corrumpitur facile, quia nullus datur aeri accessus, & vasa bibula venosa tenuiorem partem continuo resorbent.

IMO NEQUE OBSCURA HINC RATIO &c. Meracissima carniū juscula penitus glutinosa sunt, & debilem ventriculum gravant, non resciant vires : diluoriora autem pulchre nutriunt. Quia autem quod in carniū jusculis nutrit, est illud quod coquendo solvitur in aqua de animalium partibus : hinc concluderunt multi, eo magis nutrire hæc juscula, quo spissiora forent ; sed!

## §. 90. ad 93. MORBI EX ALCALINO SPONTANEO. 91

sed tandem fortissimi glutinis instar indomabilem tenacitatem acquirunt, sic ut corporis viribus superari minime possint. Longe peior adhuc tenacitas oritur, dum partes extremæ animalium tendinosæ, & mucilaginosæ sic decoquantur; unde gluten validissimum in Mechanicis paratur. Dum ptihicis decocta pedum vitulinorum exhibentur, hac spe ut nutriant plus miseros; tenaci nimis chylo gravatur debilis pulmo, & maximæ sunt anxietates.

ETENIM ALIA HINC PITUITOSI INDOLES  
 &c. Glutinofum spontaneum §. 69. & se-

§. 91. **P**ertraçatis morbis Solidi, & Fluidi simplicissimis seorsum, agendum sequitur de iis, qui in Solido & Fluido conjunctim occurrunt simplices quam maxime.

Firma nunc posita sunt fundamenta, quibus, simplicissimis quamvis, compositorum, & sæpe intricatissimorum morborum, cognitio & cura innititur: post simplicissimos morbos solidarum partium, & spontaneas degeneraciones humorum, ordo §. 16. dicat, ut

quantibus descriptum debebat ortum suum vegetabilibus, imprimis lentis farinosis: hoc vel lentorem suum retinebat, & faciebat tunc pessimas obstructions, vel dilutum ingestis vel affluentibus liquidis poterat fermentari & aclescere. Sed illud glutinosum, quod ex animalium partibus diu in aqua decoctis nascitur, primo tenacitate nocet, & postea corruptum teterima putredine insicit. Gluten vulgare ex animalium partibus coactum, tenacissimum, si diluatur aqua, putrescit citissime, & horrendum fetorem spargit.

sem ad magis compositos morbos procedatur. Cur jam, quamdiu vita manet, liquidorum adsit per vasa solida motus, proxime indagandum sequitur, quid fiat in corpore, si motus humorum per vasa fiat nimius, vel minor, quam requiritur ad sanitatem.

### DE MORBIS ORIUNDIS AB EXCESSU MOTUS CIRCULATORII SOLO.

§. 92. **O**mnia fluida, quæ in ullo vase, ab Arteria magna orto, continentur, ex solo sanguine sunt secreta, qui paulo ante in corde dextro & sinistro mixtus erat, & referebat speciem unius liquidi.

Primus hic morbus est, in quo & fluida & solida simul considerantur; & in hoc capitulo agitur de sola velocitate aucta motus fluidorum per vasa: merito ergo prius agendum de indole & attributis illius liquidi, quod per vasa fluit.

Sanguis vocatur universale illud liquidum, quod in cor dextrum influit, & quod ex corde sinistro expellitur. Cor omnem sanguinem per venas recipit ab universo corpore, receptum vero reddit per arterias singulis partibus. Ex hoc sanguine omnes partes corporis, omnia viscera faciunt suos humores, varios pro varia singulorum structura. Ergo in sanguine sunt omnia liquida corporis humani, non quoad singulare ingenium, sed quoad materiam, ex qua in

singulis partibus per propriam earundem fabricam fit illud, quod in infinita sua idea expresserat Adorandus corporis humani Creator. Quando nunc hoc factum est, hæc materies in singulis partibus & visceribus mutata, demta quadam parte, quæ extra corpus excernitur, redit ad cor. Sanguis vocatur, dum emittitur ex corde; dum redit ad cor, sanguis dicitur. Hæc sunt tamdiu, quamdiu manet vita.

Hinc fas est dicere, quod ex sanguine humores omnes, quod in sanguine humores omnes sint.

Sanguis constans ex tot diversis, sed intima miscela simul unitis, apparet homogeneum liquidum rubri coloris: sibi tamen relictus sanguis secedit in distinctas partes.

§. 93. **H**abet tamen & ibi, & tunc, globos majores, determinatæ molis, figuræ mutabilis, coloris rubri; sphaeras flavas, rubris sextuplo minores, serofas; tum laticem pellucidum in igne concrefcentem; & aquam pellucidam, levioiorem, tenuiorem, partibus minoribus, sed ob pelluciditatem non cernendis, constantem. Priorum congeries sanguis ruber, posterior Serum appellatur. Microscopia utrumque demonstrant.

Leeu-

Leeuwenhoeckianis observatis hæc omnia innituntur : sanguis enim humanus, per microscopia visus, partibus sphaericis plurimis simul congestis constat, iunantibus liquido tenuiori pellucido, hinc microscopii aciem eludente. Dum in animalium viventium partibus pellucidis per microscopia conspicitur sanguinis per vasa motus, apparet evidentissime, moleculas sanguinis per vasorum angustias pressas, aliis occurrentes, mutari omni momento in sua figura, hinc flexiles esse. Ex ejusdem Leeuwenhoeckii sententia maximæ sanguinis moleculæ sunt globi rubri, sex minoribus ad se mutuo appressis constantes; atque hi globuli minores sua adunatione globum rubrum constituentem, flavescerent, & forent globi serofi. Si eadem jam analogia obti-

neret ad ultima usque, tunc globi serofi ex sex minoribus iterum conflarent, hæcque divisio pergeret ad subtilissima a sanguine secreta liquida usque : sed experimenta hic deficient : nam quæ in sanguine habentur subtiliora, quam est pars rubra & serofa, pellucet omnino. Cum vero inter maximum vas in corpore, aortam nempe, & subtilissimum nervum numerosissimæ vasorum decrecentium series intercurrent; videntur per singulas vasorum series proportionales fluere humores. Maximarum sanguinis molecularum congeries vocatur sanguis ruber; reliqua omnia tenuiora liquida simul fusa (serum sanguinis sic dictum constituent) in binas enim tales partes distinctissimas sanguis humanus, vasis emissus, secedit sponte.

§. 94. **R** Ubrum concretum, & a sero seorsum collectum, sola quiete, & laxitate suarum partium cito resolvitur in serum ita, ut in id omnis fereatur abeat.

Dum sanissimo homini vena pertunditur, pleno rivo exiens sanguis post pauca minuta concrevit in unam massam rubram; sensim incipit illud rubrum contrahi; exprimitur pars tenuior, omni momento aucta, cui rubra concreta massa plerumque innatat: si effundatur serum sanguinis, post aliquot horas rubra illa massa minor apparet, & feri nova copia adest; sic tandem fere totum illud rubrum convertitur in se-

rum: & hinc apparet, rubram partem sanguinis sensim quasi deliquesce & in serum abire: ex sententia Leeuwenhoeckii hoc fieret, quia globuli rubri ex sex minoribus constantes, pressione vasorum jam liberati, sensim dissiliunt in globulos serofos, ex quorum adunatione facti fuerant. Hinc apparet, difficillime posse determinari proportionem inter partem rubram & serofam sanguinis, cum pars rubra sensim in serum deliquecat.

§. 95. **S** ERUM diu retentum in aere moderate calido & humido sola quiete & laxitate partium resolvitur in tenuius, pellucidius, levius liquidum, quod putrescit sensim, totumque fere avolat volatile. Quæ crescunt pro ratione temporis.

Uti pars rubra sanguinis sensim defluabat in serum tenuius, sic & serum sibi relictum sensim attenuatur, incipit putrescere, avolat, paucula tantum sepe residua. Dum autem sic in aere moderate calido & humido hæret serum sanguinis, quo tenuius fit, eo acrius simul; nec tunc amplius a

calore ebullientis aquæ, vel ab alcohole, coagulatur. In albumine ovi omnia hæc eodem modo obtinent: vix enim invenitur duo liquida magis similia in omnibus fere phenomenon, quam albumen ovi & serum sanguinis.

§. 96. **S** ANGNIS omnis (92) recens, levis cum pauco exhalantis dispendio, necnec, non solubilem per aquam, salem, oleum, spiritus. Atque idem fit calore per humidam conciliatio, singulari concretionis, & simili prioris, genere.

In sanguine hominis etiam sanissimi maxima proclivitas est in concretionem. Dum rupta nasi arteriola exilit sanguis, statim concrevit in solidam placentulam. Hæc autem vis concrevendi aucto calore increvit plurimum; imo simul calor, supe-

calore, parum superante salubrem, & coit in massam solidam, scissilem, tenacem, spiritus. Atque idem fit calore per humidam conciliatio, singulari concretionis, & simili prioris, genere.

rans forte decem vel duodecim gradibus thermometri Fahrenheitiani calorem maximum sani hominis, conciliatur sanguini, concrevit totus. Ideo in morbis acutis ab augmento caloris tantum periculum. Sed sanguis senex sic concretus difficillime solvit.

resolvitur. Plurima sunt, quæ sanguini mista præcavere possunt, nec tam facile concresecat; sed semel concretus si fuerit, vix resolvitur amplius; nec sales, nec spiritus, nec olea, imo nec saponis ipsi, tunc multum profunt. Sanguis calore sic inspissatus postea sensim iterum deliquescit in aere aperto; sed tunc putrescit simul: neque vi-

detur hæc concretio fieri ideo, quia: per calorem dissilantur subtilissima, nam in aquam fervidam dimissis de vena exsiliens sanguis coagulatur illico in massam scissilem. Eadem jam proprietates in ovi albumine iterum obinet, quod in aqua ebulliente, interea quamvis ovi testa reclusa induratur illico.

§. 97. **O** Rigo rubedinis (93. 94.), feri concresecantis, lymphæ concresecantis, (95. 96.) debetur vasorum actioni, circulationis efficacie; ut chyli, lactis, cruoris, & sanguinis, mutata indoles docet, atque microscopia confirmant.

Sed maxima fuit questio, unde nam orientur mirabiles illæ hæcenus recensitæ sanguinis proprietates, rubedo illa, feri flavedo, concretio adeo facilis &c. Philosophi quam mira dixerunt! quam vana protulerunt nimis sæpe in similibus imprudentes Chemic! nullus interim potuit ulla arte vel ex optimis cibis facere nequidem unicam sanguinis guttulam: solum corpus humanum suum sibi sanguinem facit ex materia, quæ non est sanguis. Nec refert, an corpus humanum parvulum sit, & in initio sere suæ existentie, an vero adultum jam & firmum, adeo inseparabilis a posita natura corporis humani est præsentia sanguinis, ut in debilissimo infante adsit æque ac in robustissimo viro. Imo in Embryone humano, simulac oculis lustrari potest, jam adest sanguis ruber, & quidem illo tempore, quando nec in placenta nec in ovi humani membranis, nec in liquido contento his membranarum, vel vestigiis sanguinis rubri apparet. Hinc videmus, quod opifex sanguinis sit corpus humanum in ipso illo tenello mucoso principio.

Quandonam autem in primo hominis rudimento incipiat nasci sanguis ruber, per experimenta non facile potest determinari, sed in ovo incubato rem demonstravit Immortalis Malpighius. Ovum Gallinæ secandum, nulla incubatione forum, in sua testa, membranis, albumine, chalazis, vitello, sacculo colligamentis, nihil omnino exhibet rubri sanguinis, licet optimis lustraretur microscopis.

In ovo incubato apparebat omni hora mutatio sere, & ad ambitum cicatriculæ circa vitellum apparebant per microscopia vasa quædam visibilia jam; post paucas horas vasa incipiebant distingui a liquore contento: circa horam trigessimam hæc va-

sa habebant colorem subviridescentem; quadragesima hora jam aderat color ferrugineus, (Xerampelinum vocant, quia autumnali tempore folia vitis emarcescit hunc colorem habent) simul apparebat, quod omnium horum vasorum congeries colligeretur in unum vas, quod ad cicatriculam tendens finiebatur in sinu quodam nunc primo apparente; qui sinus erat auricula dextra cordis, ut postea apparuit; & in hoc sinu a carina pendulo apparebat pulsus manifestus; & paulo post punctulum rubrum in illo pulsante corpufculo. Idem illud rubrum dein in corde dextro, corde sinistro, & paulo post in canali secundum longitudinem carinæ decurrente, qui erat aorta, apparuit. Hinc novimus ex materia non rubra sanguinem rubrum fieri posse, & quidem sine admisione sanguinis rubri præexistentis. Illud rubrum ducit originem in illo pulsante punctulo, ibi enim primo apparet, ubi pulsatio est, & sanguis rubec jam adest, antequam in rudimentis hepatis pulli appareret ullus color sanguineus: unde Veterum Medicorum cadit opinio, hepatis sanguificationis munus adscribentium.

Forte & aer, sine quo nulla planta, nullum animal vivit, huc facit. Post decimam enim octavam horam incubatus observavit Malpighius (*Vide de omnibus his tractatum de ovo incubato*) cicatriculam adscendere versus obtusum ovi angulum, ubi aer hæret. In adultis chylus in sanguinem mutandus statim per pulmonem fluit, ubi latissima superficie in tenuissimis vasis nudo sere aeri exponitur. Ex sententiâ Veterum Alchemistarum occultum vitæ pabulum in aere latebat.

Sed & in homine adulto satis simili modo ex alimentis ingestis sanguis nascitur: venæ enim lactis præparatum in iustissimum chy-

chylum sic hauriunt, uti vasa illa vitelli hauriebant attenuatam incubatus calore albumen; omnis chylus in unum ductum thoracicum. concurrit; sic & in pullo omnia hæc vasa in unum confluebant intra amnion. Calore incubatus, motu humorum per vasa, & vi cordis, aeris conspirante actione in pullo non habente sanguinem rubrum, nascebatur sanguis ruber intra quadraginta octo horas: in homine adulto sano ex chylo fit sanguis viginti quatuor horarum spatio, ut docuerunt Loweri & Walzei observata: & ad chyli transmutationem in sanguinem in adulto concurrunt calor corporis, actio vasorum & cordis, aeris vis in pulmone applicata transfluenti cum sanguine chylo: quod autem breviori temporis spatio fiat hoc in adulto homine, quam in nascente pullo, videtur deberi longe. validiori actioni vasorum in liquida contenta, respirationi, copie sanguinis rubri præexistens.

Dum autem cause illæ sanguinem producentes in adulto vel deficiunt pro parte, vel sepius agunt, non nascitur sanguis ruber, sed degenerans liquor; patet hoc in pallido virginum morbo: tunc enim non fit sanguis ruber, sed talis color oritur subviridescens in toto corpore, qualis apparebat in vasis vitelli, antequam sanguis ruber fieret.

Hinc sanguis se non propagat vi feminali, ut voluerunt quidam, sed fit ex materia non sanguinea in corpore non habente adhuc sanguinem: & uti hoc fiebat in prima origine hominis, sic pergit ad finem vitæ usque.

Dum in homine ex chylo sanguis nascitur, observantur varii & successivi mutationum gradus: chylus semina paulo post pastum deprehenditur sanguini affusus non-

§. 98. **A**uctus sanguinis per vasa motus oritur Corde sæpius, & fortius, contracto.

Post intellectam sanguinis humani indolem debebat indagari causa, quæ sanguinem moveret. Celeberrimi in arte Viri crediderunt illam in ipso sanguine hærrere: viderant enim miscela liquorum inter se posse excitari subito validissimos motus, & hinc crediderunt, in sanguine simile quid obtinere. Sed dum in ardentissima febre, rupta nasi arteriola, summo cum impetu exiit sanguis, exceptus vase purissimo, ca-

dum subactus; hinc, dum post largum pastum mittebatur sanguis, inveniebatur, præter serum & partem rubram, in sanguine fluctuans materies alba dulcis chylosa.

Post aliquot horas chylus cum sanguine circumactus per vasa, mammarum fabrica separatus a sanguine, exhibet lac, quod naturam & a sanguine & a chylo diversam habet: incipit enim in lacte jam nasci illud concretescens, quod in sero sanguinis adest; cascum enim dat qui in chylo nunquam adest; hinc per artem possimus chyli confectionem imitari in Emulsis, lactis autem indeolens nunquam.

Dum per duodecim horas ab omni cibo & potu abstinuit sana mulier, incipit lac fieri salsum & flavescens: si diutius adhuc expectatur, in sanguine nihil habetur, nisi quod ad ignem concrefcit instar albuminis ovi, quod in lacte & chylo nunquam fit.

Hinc licet concludere, quod corpus sani hominis sit faber sui sanguinis, perfecte uti quælibet planta ex succo fertilis terræ, & toto aere ambiente, suum sibi succum conficit peculiari sua creata fabrica.

In corpore autem humano sanguinis confectio pendet imprimis a circulationis efficacia, per quam vasa agunt in contenta fluida: hinc in robustissimis hominibus sanguis ruberrimus; imo præ saturata robidine ater fere, illico concretescens, dum quiescit: & in morbis acutis aucta circulatio omnia quam maxime rubent; & ipsum serum sanguinis in scissilem massam abit: in debilibus autem, in quibus longe minor est circulationis efficacia, omnia languent, pallent; & sanguis tenuis vix concretescens adest: dum vero in his per corporis exercitia; & apta remedia augetur circulationis impetus, redit rubor, & debita cohesio sanguini.

Post intellectam sanguinis humani indolem licet quiescit illico, & nullum finem intestini motus exhibet: hinc in sanguine non hæret causæ proprii motus. Sed cordis actio musculosa contentum sanguinem in cavis suis validissima vi expellit per arterias, quæ momento post, cessante cordis actione, sua elasticitate & vi muscolari sanguinem ulterius promouunt: hæc sunt veræ & solæ causæ, quæ sanguinem movent: sed in corde huius motus prim-



principium hæret, nam arteriæ, ubi pervenerunt ad minimum diametrum sua contractione, quiescerent, nisi a sanguine corde expulso dilatarentur iterum: cordis ergo actio musculosa sanguini motum conciliat, quiescente corde, stagnant omnia.

Si ergo cordis actio, idest, ejus contractio (in diastole enim cor non agit sed patitur) fiat frequentior & simul validior, causa motus sanguinis augebitur: non enim sufficit, ut cor frequentius se contrahat,

nam circa mortem tam numerosæ sunt cordis contractiones, ut nullo modo possint numerari, interim circulatio deficere incipit, quia nihil expellitur fere ex corde, sed requiritur ut & simul se fortius contrahat, ut omne contentum in cavis cordis expellatur: fortis enim contractio cordis est, quæ totum cor evacuat, debilissima contractio quæ nihil expellit: intermedii gradus sunt debiliores cordis contractiones.

§. 99. **C**or sapientius & fortius contrahitur: 1. Cerebro & cerebello in nimiam expressionem liquidi nervosi agente, ut in affectibus animi, & dolore: 2. irritato Corde per accelerationem motus sanguinis venosi, frictione, vel musculis agentibus, pulsus aut per acre sanguini inhærens aromaticum, salinum, acidum, alcalinum, purulentum, ichorosum, putrefactum, & quandoque specie contagii, pestis, veneni, novum definiendum mali genus.

In hac paragrapho considerantur illa, quæ docuit certa observatio motum cordis excitare & augere posse.

1. Cor omnes dotes veri muscoli habet, & instructum est illis partibus, quæ in aliis musculis motui absolviendo inserviunt. Destructo nervo ad musculum tendente, tollitur illius musculi actio; compresso cerebro ab effuso humore quocumque omnium musculorum voluntariorum actio cessat; si a quacunque causa fiat celerior influxus spirituum per nervos in musculum, augeatur ejus actio in summum spasmus usque. Nervi autem magni & numerosissimi cordi tribuuntur, nec tamen per hos nervos acutus in corde exercetur sensus: reliqui corporis musculi nimio motu fatigati dolent; cor in acutis febribus, per plurimos dies celerrime motum, nullum dolorem sentit: hinc videntur illi nervi cordis motui inservire. Omnes jam causæ, quæ possunt efficere, ut fiat celerior motus spirituum per nervos cordis, augent cordis motum.

Animi autem affectus hoc faciunt potissimum. Rem certissimam esse agnoscunt omnes, quomodo fiat, explicuit nemo. Patetissimo homini atrox dicitur contumelia: mutata tantum cogitatione, mutantur omnia: mox cor celerius & fortius contrahitur, pulsus fit magnus, vehemens: calor augetur, tumet facies, scintillant oculi, ino ardens febris excitatur aliquando, pergens ad mortem usque.

Dolor autem totum encephalon sic mutare potest, ut fiat delirium, & non amplius sentiat dolor; vel & syncope pæ-

fecta: nec ultra possunt tormenta acerbissima procedere. Cum ergo dolor possit sic mutare sensorium commune, poterit & inde prodeuntes nervos afficere. Raro dolor diu cruciat, quin fiat febris (id est cordis contractio celerior) etiam in morbis a febre alienissimis; ut v. g. in podagra. Hinc monuit Galenus (*De pulsibus ad cyrones cap. 12. Tom. VIII. pag. 8.*). Dolor dum parvus est, atque initio, pulsus est majorum, vehementiorem, celeritorem, crebriorem: auctus vero jam & admodum validus, ut etiam vitale robur offendas, minorem, languidiorem, celeritorem, crebriorem.

2. **IRRITATO CORDE.** Præter causas motus, quas cor cum aliis corporis musculis communes habet, adeit in corde singularis proprietas, quam cordis irritabilitatem vocare possemus: dum enim influxus spirituum per nervos in villos cordis, & arteriosi sanguinis motus per cordis substantiam cessat post mortem, potest statu per venas adafto, vel & aqua tepida cordis motus resuscitari; imo cor rescissum ab omnibus vasis, quibus coheret, motum suum per aliquod tempus conservat; & post multas horas quiescens jam, dum pungitur acicula & fovetur calore, incipit iterum moveri. Physiologi subtiliter explicuerunt, quare alternis vicibus cor paralyticum fiat, & fulmineo quasi spasma iterum convellatur: quomodo causa faciens systolen cordis omni momento pereat, mox iterum renata; illudque ex fabrica & situ partium deduxerunt: cor tamen de corpore exemptum, nullis amplius partibus coherens, eun-

eundem motum continant, & sæpe fatis diu, videatur de his §. 1.

**SANGUINIS VENOSI.** Dum ab animi afflicto, vel a re horrida visa, in syncopen labitur tenera puella, cordis fit absoluta quies: aspergitur aqua frigida corpori madato, contractæ frigore partes sanguinem venosum versus cor derivant, & resuscitant cordis motus. «Dum Sarpedonem vulneratum anima reliquit, aspirans aura Boreæ reviviscere fecit, (*Homer. Iliad. Lib. V. pag. 95.*) contractis frigore venis: hinc omnia illa, quæ accelerant motum venosi sanguinis versus cor, motum cordis augent; imò sic ardentissima febris excitari potest motu musculari nimio, & frictionibus validissimis. Vide de his §. 28. n. 2.

**AUT PER ACRE SANGUINI INHÆRENS &c.** Omnes nostri humores, sani si fuerint, blandi sunt; (sanguis enim sani hominis, oculo instillatus, nullum dolorem facit) sanque sit æquabilissima circulatio: Genulac vero acriora sanguini permiscuntur, augetur irritato corde sanguis per vasa motus, & nascitur febris; quæ vel expellit de corpore hæc acria, vel sic subigit, ut non amplius nocere possit. Nec refert sepe, qualis hæc acrimonia fuerit: omnium fere similis effectus est: differunt tantum majori vel minori gradu, & magis vel minus durabili actione. In aromatibus, renaci oleo inclusum hærens acre non tam facile excuti potest. Sic dum piperis triti magna copia imprudenti consilio sumitur, ad curandam febrem intermittentem, sæpe mitis tertiana in ardentem febrem mutatur. Qui nimiam copiam salis marini in prandio sumit, pomeridiano tempore febricitabit, sitiet, donec copioso potu ingesto prædominans illud salsum abluatur. Ipsum acetum, in putridis febribus tanti usus, majori copia sumtum, febrem excitat. Dum vomica in interioribus corporis lærens pus colligit, illud resorptum, & sanguini mistum, quotidie febrem incendit, quæ sensim corpus depalescens hecica dicitur; dum pus retentum diu in tenuem ichorem mutatur, acris fit, & resorptum majora mala facit.

Corrupta bilis circa præcordia hærens, vel consumati hepatis putridus tabes enormes febres accendit, nunquam curabiles, nisi putridus ille fomes tolli possit.

Sed in omnibus his acrimonia sensibus

detegere potest; sed alii sunt stimuli maxime mirabiles, qui ad nullam cognitam acrimoniæ speciem reduci possunt, totum tamen corpus in omnibus suis functionibus turbant.

Contagium Variolarum subtilissimo miasmate, omnes sensus fugiente, afflat vel fanissimum hominem: oritur validissima febris quæ intra paucos dies totum corpus externum & internum pure varioloso replet: & in hoc pure, ex fanissimis humoribus per morbum nato, hæret eadem vis contagium variolosum propagandi in infinitum; uti docet methodus variolas propagandi per infectionem, dum crudo & recenti vulnuscule puris variolosi guttulam insillant. Quis jam explicabit naturam hujus stimuli? quis demonstrabit methodum, qua sani humores, contagio varioloso murati, venenatam naturam induunt, & infinitam ferè vim multiplicandi contagium acquirunt?

Pestis, sineulis animalium speciebus propria & peculiaris, raro pluribus animalium speciebus simul accidit. Dum bovina pestis per Europam grassabatur, homines immunes erant ab omni labe, etiam illi, qui insectorum animalium carnibus usi fuerant. Peritissimi Medici sedula observatione dum inagiabant naturam atrocis mali, ingenue fassi sunt, se nihil hic intelligere quoad copricionem causæ, tantum patere mali effectus. Vestibus laneis, pelliceis, lineis, lignis rarioribus & porosis adhærens pestilentialis virus iners ibi hærebat, donec corpori humano applicatum fieret actuosum, & quaquaversum se dispergeret multiplicato contagio; quam multis modis tum omnia turbentur in corpore, quam validæ accendantur febres &c. apud *Dietmeisbroekium* & alios, qui de peste scripserunt, auctores videre licet.

Venenorum mirabilis historia confirmat, dari tales stimulos in liquoribus quibusdam venenatorum animalium, qui nullam acrimoniæ sensibus ullo modo observabilem habeant, interim tamen celerissima actione omnes functiones fere lædunt, validissimæque febres incendant. Vipere venenum pro exemplo sufficet: Nobilissimi Redi observatis & candore fretus Charas gustavit succum flavum gingivis viperæ adjacentem; invenit saporem similem oleo amygdalarum dulcium (*Maffei Charas Oper. T. 3. p. 183.*): dum morsu infecto vulnuscule pauculi quid ejusdem succi adhæserat,

rat in Nobili viro imprudenter viperam tra-

muta oborta sunt ( *ibidem* pag. 156. ),  
vixque ille post multa artis molimina evasit.

**A**Uctus motus sanguinis per vasa efficit majorem vim pulsus sanguinis in vasa excipientia ; majorem renixum vasorum in sanguinem ; sanguinis fortem compressionem ; vasorum sanguinisque attritum validum ad se mutuo ; partium Sanguinis attritum validum inter se ; calorem majorem totius ; sanguinis exsiccationem distenso aquoso ; ejusdem viscositatem inflammatoriam facile concrementem ; sanguinis resolutionem in sales, oleaque volatiliora & acrida , vasorum auctam ad iniuria amplitudinem ; liquidorum crassiorum in tenuiora vasa impulsu , horum obstructions destructionesque , inflammationes , suppurationes , gangrenas , sphacelos , scirrhus ; & quæ ex his infinita sequi possunt .

Recensentur jam effectus in solidis & fluidis partibus corporis humani observari , qui pendunt a sanguinis motu aucto .

**MAJOREM VIM PULSUS SANGUINIS IN VASA RECIPIENTIA .** Arteriz semper plene sunt : dum ergo cor contractum expellit contentum in suis cavis sanguinem in arterias , debent arteriz dilatari ; vel debet tanta copia sanguinis expelli per arteriarum fines , quanta ex corde in arterias pellitur : sed arteriz omnes corporis ( exceptis arteriis coronariis ) dilatantur illo momento , quo cor contrahitur : hinc cordis tota fere actio dilatandis arteriis impenditur , & hac vi urgentur arteriarum latera , ut recedant ab axi , & distrahuntur omnes fibræ arteriarum latera constituentes . Cum vero in §. 98. demonstratum sit , auctum sanguinis motum fieri a frequentiori & validiori simul cordis contractione , patet vim illam , qua latera arteriarum coguntur recedere ab axi , tunc augeri in ratione composita ex auctis robore & frequentia contractionum cordis .

**MAJOREM RENIXUM VASORUM IN SANGUINEM .** Arteriz distente sunt in statu violento ; hinc elasticitate & vi musculari suarum fibrarum nituntur latera propius accedere ad axim ; sicque reprimunt sanguinem distendentem : nisi enim arteriz sua vi arctate expellerent distendentem sanguinem , non posset cor sequenti systole contentum omnem in suis cavis sanguinem expellere in arterias adhuc distensas ; accumularetur sensim in cavis cordis sanguis , & suffocaretur circulatio . Quo validior ergo fuerit cordis actio distendens arterias , eo fortiusaget vis illa , qua arteriz nituntur arctare proprium cavum ; quo sæpius eodem temporis spatio cor contrahitur , eo frequentius

arteriz contractæ reagent in sanguinem distendentem .

**SANGUINIS FORTEM COMPRESSIONEM .** Sanguis in arteriis contentus semper quasi inter duo prælia hæret : dum arteriz dilatantur , urget cordis embolus sanguinem a basi arteriz versus apicem : summam interrim resistantiam faciunt arteriarum extremi fines adeo angusti : dum arteriz contrahuntur , valvulæ resistunt circa basim arteriarum in corde , eadem resistantia manet circa arteriarum fines , hinc utroque in casu sanguis arteriis contentus comprimitur . Cum autem sanguinis partes constituentes flexiles & compressiles sint , ut dictum in §. 92. & causæ comprimentes , nempe cordis & arteriarum actio , augeantur ; necessario sequitur , debere fieri validiorem sanguinis compressionem .

**VASORUM SANGUINISQUE ATTRITUM VALIDUM AD SE MUTUO ; PARTIUM SANGUINIS VALIDUM ATTRITUM INTER SE .** Dum sanguis ex corde pellitur , impingit in latera aortæ incurvatæ , resistunt huic sanguinis directioni aortæ laterum firmum robur , sanguisque in aortæ cavo contentus : hinc nulla particula sanguinis , ex corde in aortam expulsa , per bina momenta servat illam directionem motus , quam habebat , dum corde expellebatur ; accedit quod aorta , conica cum sit , latissima circa basim in decursu angustetur : cum autem directio sanguinis , corde expulsi in aortam , sit secundum perpendiculares lineas ad aortæ basim , necessario brevi post sanguinis particulæ in latera incurrent cornici huius canalis , inde resiliens occurrent aliis partibus diversa directione motis : hinc perpetuus attritus partium sanguinis inter se , & ad latera vasorum : hinc

flexiles sanguinis partes cum sint, decussis eminentibus angulis perpetuo hoc attritu, & acquirunt sphericam figuram: aucto vero sanguinis per vasa motu, ille attritus augebitur pari proportionem.

CALOREM MAIOREM TOTIUS. Ab hoc attritu partium inter se, & ad latera vasorum, calor oritur. Demonstratur evidenter, quia simulac sanguis quiescit, perit omnis calor, & redit sensim corpus ad frigus communis atmospheræ: dum augetur sanguinis motus per valida exercitia, vel febrem, calor augetur: in debilibus, ubi sanguinis circulatio languet, frius semper adest.

Verissimum hinc Hippocratis effectum, *sanguis non est natura calidus, sed calefit.* (In fine libelli de corde Tom. IV, pag. 271.)

SANGUINIS EXSICCATIONEM DIFFLATO AQUOSO. Calor auctus semper mobilissima dissipat: sed, ut ante demonstratum est, calor major nascitur, aucto sanguinis per vasa motu. Totum corpus in omni sua superficie interna & externa habet vasa exhalantia, quæ ex sanguine secerunt & diffiant tenuissimum liquidum: aucta ergo sanguinis applicatione ad hæc organa, orietur major secretio. Hinc in omnibus morbis, in quibus calor auctus est, corpus exsiccat. Dixit ideo Hippocrates (In fine libri primi de morbis Tom. VII, pag. 549.): *quicumque vero ex febre ardente moriuntur, omnes ex siccitate pereunt.*

EJUSDEM VISCOSITATEM INFLAMMATO-RIAM &c. In sanguine hominis, etiam sanissimi, est naturalis proclivitas in cohesionem, per quam concrevit sponte, dum vasis effusus quiescit. Hæc cohesio augetur majori calore, ablata aquosa parte diluente, & auctis viribus comprimentis sanguinem. Statim demonstratum est, aquosam partem diffilari aucto motu, pariterque augeri calorem: sed actio vasorum in sanguinem est vera compressio sanguinis contenti, hinc cum celeriori motu sanguinis augeatur & vasorum actio in sanguinem, parit omnes illas causas concurrere, quæ sanguinis concretionem faciunt. Tunc nascitur illud phlegma phlegmonodes Veterum, distinctissimum ab inerti frigida mucosa concretionem: vocatur tunc inflammatoria spissitudo, ex validiori compressione elementorum sanguinis ad se invicem nata. Elementa sanguinis spherica esse observantur, vel saltem sphericis proxima: hinc in paucis punctis se invicem tangunt: nimis valida pressione mutata figura, ex-

presso tenuissimo aquoso interposito, pluribus in punctis contigua fiunt, & concrevunt: inde coriaceus ille lentor in sanguine pleuriticozum nascitur.

SANGUINIS RESOLUTIONEM IN SALES ET OLEA VOLATILIORA ET ACRIA. Quomodo sales & olea sanguinis se habeant, omnium optime docet urina, quæ verum sanguinis lixivium cum sit, eluit sales & olea nimis acria jam facta, hincque nocitura. Apparet evidenter, urinam eo acriorem esse, eo magis fortidam, quo validior est circulatio: in debilibus hominibus urina pallida, vix olens, non adeo falsa: ita robustis & valide exercitatis hominibus urina rubicundior, foetidiore, falsa admodum. Motus ergo sanguinis per vasa auctus sales sanguinis reddit acriores magisque volatiles: olea magis attenuata, sed simul minus blanda: hinc novi iterum nascuntur stimuli augentes circulationem, ex cujus augmento facti erant; sicque morbi effectus morbum auget.

VASORUM AUCTAM AD INITIA AMPLI-TUDINEM. Cordis vis expellens sanguinem in arterias plenas est causa sola, quæ dilatat has arterias: cum ergo cordis hæc actio increvit, pari modo augebitur arteriarum dilatatio. Sed hæc dilatatio eo major erit, quo arteria cordi magis vicina est: ergo arteriarum omnium initia magis amplianduntur, dum ad ultimos fines arteriarum vis hæc dilatans tanto cum effectu pervenire non possit.

LIQUIDORUM CRASSIORUM IN TENUIORA VASA IMPULSUM. Crassissima sanguinis pars observatur globus ruber; qui naturaliter in maximis vasis tantum hæret potest: proxime sequens magnitudine sanguinis pars poterit ingredi minus vas; quod sua parvitate globum rubrum excludit, & admittit omnia tenuiora. Idem in reliquis decreverunt vasorum seriebus obtinet: & videtur sanitas in eo præcipue consistere, quod in singulis vasis maneant liquida proportionalia. Dum ergo aucto sanguinis per vasa motu distendantur plus initia arteriarum proximæ seriei, ingredi poterunt partes crassiores, quæ naturaliter in illis vasis non debebant contineri. V. g. dum augetur sic initium arteriæ serosæ, ex arteria rubrum sanguinem vehente oræ, ingredietur hanc serosam arteriam sanguis ruber. Quod autem revera hoc sic obtineat, docent

cent certissima observata. Homo sanissimus valido cursu corpus moveat, incipiet tota facies tendi, rubere quam maxime in illis locis, ubi naturaliter rubedo non aderat; adnata tunica oculorum tota incipiet in suis vasis rubro sanguine repleti, cum hæc vasa naturaliter nunquam sanguinem rubrum habeant. Post validos motus, aut vectiones in cætra rudiores per strata viarum, per dilatatas fistulas renales sanguis transit, & fit miclus cruentus; sola quiete facile curabilis.

**HÖRUM OBSTRUCTIONES ET DESTRUCTIONES.** Arteria, in suo decursu sensim arctior facta, tandem adeo angustatur, ut unam tantum fere sanguinis moleculam transmittat. Dum microscopis sanguinis circuitus in pellucidis animalium vivorum partibus examinatur, hoc evidenter apparet; pulcherrime imprimis, dum vivæ lacertæ pulmo per vulnus factum erumpens microscopio lustratur: tunc enim evidenter apparet, circa ultimas arteriarum angustias singulas moleculas liquidis transluentis in oblongam cylindricam figuram mutari, & sic transpirari. Dum ergo v. g. arteria serosa dilatata in suo initio accepit sanguinem rubrum, ille non poterit transire per ultimas illas arteriarum angustias: hinc fiet obstructio hujus canalıs, & dum liquidum vitali motu pulsus urgeat locum obstructum, tenerimum tale vas destruetur facile.

**INFLAMMATIONES &c.** Dum enim sanguis ruber in minimis canalibus stagnans comprimitur, & arteritur impetu sanguinis

a tergo prementis, & per sebrim, pleurumque comitem, fortius moti, dicitur inflammatio: quæ ergo a liquidis crassioribus, in minora vasa dilatata pulsus, frequentissime omnes inflammationis effectus: dum enim vascula infarcta, una cum impactu & immeabili humore, vi vitæ atteruntur, & soluta abeunt in pinguem album æquabilem humorem, pus dictum; suppuratio fit. Si subito ruptis vasis destruat omnis circuitus humorum vitalium per partem affectam, fit gangræna, sive mors partis: quod malum, si ad ossa usque omnia corruerit, sphacelus vocatur. Si circa loca glandulosa inflammatio fiat, sæpe tumor durus, indolens, difficillime postea resolvendus oritur, qui scirrhus vocatur.

Quando jam omnia in hac paragrapho dicta considerantur, apparet evidenter, motum sanguinis circulatorii auctum infinita numero posse producere mala: omnes humores corporis per auctum motum, & calorem majorem inde natum, possunt mutari penitus in morbosam indolentem, validiori pressione, distillatione aqusi, coagulo per majorem calorem inducto, acrimonia majori nata: solide partes plus atteruntur, imo rumpuntur sæpe: dilatata vasa ingrediuntur crassiores humores, qui per ultimas vasorum angustias penetrare nequeunt. Dum jam simul consideratur, omnia hæc mala obtinere posse in omnibus & singulis corporis partibus, patet, innumeros morbos nasci posse ex simplici hac causa.

§. 101. **C**ognoscitur ergo aucta circulatio notis ejus causis (99.), & effectus (100.); sed inprimis pulsus celeri, duroque; respiratione veloca & laboriosa; calore ingenti.

Summæ utilitatis est in Medicina cognoscere; an in morbo peccet nimia circulationis velocitas, vel non. Causæ circulationis auctæ si adsuerint, si videantur effectus nimii motus, nullum manet dubium: interim quædam habentur signa nunquam fallacia, quæ demonstrant excessum motus circulatorii.

**PULSUS CELERI ET DURO:** Pulsus celeritas designat, cor intra idem temporis spatium sæpius contrahi; durities autem pulsus arteriarum plenitudinem, & sanguinem valide compactum & densum significat; & inflammatoria viscositate per ultimas vasorum angustias difficiliter permeabilis. Sola celeri-

tas sine duritie pulsus cor sæpius contractum, sed non fortius, denotat: circa mortem enim pulsus celerissimus sed parvus simul. Sola durities pulsus sine celeritate potius denotat suffocationem motus circulatorii, ut in summe plethoricis fit.

**RESPIRATIONE VELOCE ET LABORIOSA.** Omnis sanguis corde dextro expulsus debet transire per pulmonem, antequam redeat in cor sinistrum: sed cor dextrum sua visculosa sola non valeret propellere sanguinem per arterias pulmonalis angustias, requiritur etiam pulmonis per inspirationem dilatatio, ut expeditum fiat iter sanguini.

ex corde dextro expulso : quo ergo sapies & fortius se contrahit intra idem temporis spatium cor dextrum, eo frequentior & validior requiritur respiratio. Hinc simulac cursa vel alio quocunque exercitio sanguinis per vasa motus augetur, increfcit respiratio proportionaliter, & fit majori cum molimine. Augetur sic respiratio ob solam velocitatem auctam sanguinis per pulmonem transeuntis : sed dum per maiorem motum incipit nasci inflammatoria illa spissitudo, longe magis laboriosa erit & velox simul respiratio ; primum enim vitium incipientis immeabilitatis se manifestat in pul-

mone ; unde in morbis acutis inflammatoriis velox illa & laboriosa simul respiratio tam mali est ominis.

**CALORE INGENTI.** Quamdiu enim liber adhuc transitus est per omnia vasa, austa celeritate motus, augetur calor, ut demonstratum est in paragrapho precedenti : ubi vero immeabilis sanguis redditus ad extremas corporis partes usque non valet pertinere, fit frigus extremorum ; sed circa vitalia viscera calor urens adest tunc, ut in pessimis febribus ardentibus contingit ; tuncque sere inter lethalia signa numeratur ab Hippocrate in Prognosticis & alibi.

§. 102. **R**emedia ergo nimio motui compescendo valida sunt, quæ frequentiam, & vim contractionis Cordis imminuunt.

In abstracto simplices hi morbi debent prius considerari : hinc supponitur hic, nihil mutatum esse in corpore, & morum solum circulatorium auctum esse. Remedium ergo erit omne illud, quod causam proximam motus aucti tollere poterit. Causa autem proxima motus circulatorii aucti erat nimis celer & fortis simul cordis contractio;

remedium erit ergo omne illud, quod facere potest, ut cor tardius & debilius moveatur. Tale autem remedium vel agat in spiritalia motores cordis, vel in sanguinem venosum & arteriosum delatum in cordis fabricam, vel denique in stimulos illos, qui sua irritatione faciunt, ut cor celerius & fortius contrahatur.

§. 103. **Q**uorum illa Mentem, hæc Corpus, spectant :

Id §. 99. dictum fuit, quod sola cogitationis mutatio, in sanissimo etiam corpore, possit sic augere cordis motum, ut fiat violentissima febris : nisi tunc possit Medicus illud mutatum in cogitatione tollere, reliqua auxilia nihil agent. Omne autem, quod hoc

efficit, non mutato corpore, in mentem agit. Dum iratissimo homini maximus incutitur metus, compescitur ira, non mutato corpore, sed mutata mente in cogitatione sua. Reliqua auxilia, tollentia causas corporeas aucti motus, in solum corpus agunt.

§. 104. **P**riora sunt, quæ magnos affectus, ratiocinio, excitemento contrarii affectus, vel divertendo, sopiunt.

**QUÆ MAGNOS AFFECTUS RATIOCINIO.** In nobis deprehendimus, quod cogitemus, & quod cogitemus res a cogitatione diversas, quæ, si tantum intelliguntur illa mentis nostræ perspicacia, tunc nos parum attigunt, sed in simplici contemplatione nos retinent : docent hoc summi Mathematici, qui sæpe vitam sic cogitando consumunt, nec multum afficiuntur ab aliis rebus : sed & contingit nobis perceptio quædam, quam non possumus ita alteri communicare, tamen a nobis evidentiùs & fortius percipitur, quam ipsum verum : sic dum gustamus suavissimum vinum, oritur in nobis idea, quam non possumus explicare, nisi dicendo, quod placeat : sed illud placere

tam evidens est, tam valide afficit, ut nulla veritas validius afficere possit : sic si ovum putridum quis gustet, adeo abhorret, ut quævis pateretur potius, quam illud iterum assumeret : sic nati motus animi simulcum perceptione sua sere inevitabiliter necessitate rapiunt totam mentem, ut illud placens faciat perennare, ut illud displicens removeat vel destruat.

Illud autem gratum vel ingratum, quod comitatur ideam cogitatum, differt ab idea cogitata, differt a principio cogitante, turbat tamen omnes ideas, turbat ipsam voluntatem, & libertatem quasi tollit, cogens ad volendum vel nolendum ; quis nunc hoc adeo singulare est, vocaverunt animi affectus.

affectus, animi pathemata, & merito; quia non sumus illorum magistri, sed obsequiosi servi, dum læpissime meliora videmus & probamus, deteriora tamen vel inviti sequimur.

Dum gratum hoc & ingratum, quod ideas perceptas comitatur, delere conabantur superbi Philosophi, quantopere erraverunt! totum, quod patitur humana conditio, est ut animi affectus reganus ratione: sed hæc fæpe tam debilis est, ut hæc tenacia vincula rumpere nequeat, hinc insitendum diu, ut consuetudine oblectandi firmior facta ratio triumphet: certe summa & rationis & religionis lucta vix validissimis animi affectibus resistunt sapientissimi.

**EXCITAMENTO CONTRARIUM AFFECTUS.** Sapientissimi legesatores probe gnari, humanam societatem sola ratione regi non posse, proposuerunt præmia & pœnas. Supplicii merus furentem ira hominem compescere poterit, ubi pulcherrima Ethices præcepta frustra adhibebuntur. Summa ergo utilitatis est cognoscere oppositos animi affectus. Iram supprimit summus metus: meticulosissimus homo ira audax fit. Si observetur illa, quæ apparent mutata in Corpore in duobus his contrariis animi affectibus, patebit esse penitus opposita.

In irato homine statim nascitur validior & celerior cordis contractio, pulsus fir plenior, fortior, celerior, tument omnia & expanduntur etiam in macilentissimis: calor maior nascitur toto corpore. omnes fere tenduntur muscoli: truces prominent oculi, scintillantes, sanguine suffusi, validissime sunt exhalationes minarum, iurgiorum &c. apud Homerum, qui tam pulchre naturam ubique expressit, irati Agamemnonis oculi igni luceant similes erant (*Pag. 7. Lib. 1. Iliad.*); irato Achilli ob vi abduclam puellam terri-

----- furit accensus, & ira

*Terribilis: Tunc sine spoliis indute meorum*

*Exipere mihi! Pallas te hoc vulnere, Pallas*

*Inmadat, & pœnam scelerato ex sanguine sumit &c. (Virgil. Æneid. Lib. XII. in fine.)*

Dum ergo ideas, per hæc signa renovatas, comitatur illud gratum vel ingratum, animi affectus renascuntur acriores, sicque tandem possunt reddi perpetui: tunc illud infinite extensum in cogitatione, quod habebat mens humana, perit & relabitur in hunc unicum affectum, voluntas atque infinita non vult nisi hoc unicum, tunc vocatur delirium, si summa adit violentia,

Tom. I.

biles lucebant oculi (*Pag. 11. Iliad. Lib. 1.*) Ajaci suadenti, ut arma caperet, respondet Achilles, *sed mihi tamenis cor ira &c. (Iliad. Lib. IX. pag. 171.)* dum a Thetide allata arma conspiceret Achilles, *statim ira subit, & oculi terribiliter sub palpebris tanquam jubar apparebant. (Iliad. Lib. XIX. pag. 346.)*

Subito terrore percussus homo pallet, friget, contrahitur toto corpore, pulsus celer sed parvus & inæqualis, cor palpitatur, summa oppressio circa pulmonem & suspiria adfunt, omne robur membrorum solvitur, tremor fit totius corporis, vel & aliquando attoniti obrigescunt statuz instar, & vox faucibus hæret. Hinc frigidum timorem dixit Homerus (*Iliad. Lib. IX. pag. 149.*), & alibi (*Iliad. Lib. XIV. pag. 272.*) pallidum timorem vocavit; dum irruentem Menelaum fugit Alexander, *tremor occupavit membra, & retro secessit, & pector occupavit genus (Iliad. Lib. III. pag. 50.)* similia & in pluribus aliis locis habet.

Hinc apparet, oppositos effectus in corpore facere animi affectus contrarios; hincque unum animi affectum aliter posse esse medelam. Idem, percurrento alios oppositos sibi mutuo animi affectus, demonstrari posset, hoc pro exemplo sufficiat.

**VEL DIVERTENDO.** Mirabilis hoc obrinet in mente nostra proprietas, quod possimas ideas cogitatas alligare quibuscumque signis nire arbitrariis, inter quæ signa & ideas cogitatas nulla occurrit omnino similitudo, tamen postea visis his signis præsens redditur eadem idea nienti. Paucis literis varie adnatis excitantur in mente ideæ, quas ante annos habuimus, quarum idearum omnis periiisset memoria; nisi hæc signa arbitraria conservassent; idem in animi affectibus verum est: dum vidli Turni precibus incipiens flecti Æneas Pallantis a Turno occisi balteu spectat,

dicitur furor; si febres adfint & agitati humores, phrenitis; si hæc absint, mania; si simul adfit negligentia omnium rerum, stultitia.

Hinc prudentes Medici omnes illas novatas corporeas, quæ renovant has ideas, sive per sensus, sive per memoriam, tollunt inscio ægro; quæcumque alia ipsis offerunt, ut nascantur aliæ ideæ, quæ sensum

G 3

mi-

minuant vel & deleant nimis validam illam impressionem, hoc vocatur *divertere*. Sufficit ad hanc rem, ut quocumque modo mutetur cogitatio, ne eadem idea, diutissime hærens, tandem totam mentem occupet indelebilis posita.

Ubi vero validi animi affectus omnia turbant in corpore, & totum systema nervosum irritant, ut in hysterici tam sæpe fit, tunc confugimus ad illa, quæ spiritus sopiunt, & omnem cerebri actionem pro tem-

pore filere faciunt: tale imprimis auxilium dat Papaveris succus, qui parca copia sumtus lætissimum facit, qui cogitari potest, sensum, & inslar Nepenthes Helenæ omnium malorum oblivionem; aucta dosi somnum inducit, nimia copia tandem apoplexiam. Vini usus in homine non admodum affueto similia facit, magnam nempe hilaritatem, validos animi affectus lenit, tandem, optatam omnium malorum requiem, somnum inducit.

§. 105. **P**osteriora agunt quiete musculorum, laxatione venarum (§. 54.), mitigatione acris cujuscunque, diluendo, vel obtundendo (§. 66. 67. 88.), doloris causas tollendo.

Quæ paragrapho precedenti dicta sunt, impetuosis illos motus, mutatae cogitationis effectus, compecebant, agendo in mentem ipsam potius, quam in corpus: quæ nunc dicuntur, corporeas causas aucti motus tollunt.

**QUIETE MUSCULORUM.** Inter causas, quibus cordis motus efficitur, numeratur sanguinis venosi influxus in cordis cava, uti antea dictum fuit in §. 25. n. 2. & §. 28. n. 2. sed sanguinis venosi motus versus cor acceleratur musculis motis: pleraque enim venæ, in superficie corporis posita musculis accumbunt: hinc a musculis turgentibus, dum agunt, comprimuntur, sicque sanguis venis contentus cor versus ducitur, quia directio motus sanguinis per venas est ab apice versus basim. Præterea musculi, dum agunt, pallent, expresso omni sanguine, qui tunc per venas citius redit ad cor: hinc adeo augetur motus sanguinis per motum muscularem. Hoc probe norant Chirurghi, qui, dum aperta brachii vena tardius fuit sanguis, jubent moveri digitos, & statim celerius effluit sanguis. Hinc Veteres Medici, licet circulationis ignari, in omni morbo, in quo erat nimis motus, impe-  
rabant summam quietem, removebant omnia, quæ sensus valide afficere poterant, & in tenebris hinc jubebant ut decumbent ægri, ab omni strepitu remoti, in quiete summa.

**LAXATIONE VENARUM.** In morbis acutissimis, in quibus maxima circulationis velocitas, observatur semper, maximam copiam sanguinis hæere in vasculis arteriosis, venas vero depleri: contra in morbis languidis, in quibus circulatio deficit, venæ

& omnia corporis cava implentur, arteriæ vero deplentur: venarum ergo laxitas & impletio minutam circulationem comitantur. Sed præterea laxata venæ, facilius hinc distendendæ ab impulso ex arteriis sanguine, plus sanguinis continent; minor ergo redit copia sanguinis ad cor, & minuitur ergo una ex causis præcipuis motus cordis: sed & impetus sanguinis ex arteriis in venas pulsus magis retardatur, quia majori copie movendorum in venis occurrit; atramque ob causam minuitur circulationis velocitas.

Quomodo autem laxari possint quæcumque corporis partes, dictum fuit §. 54. omnium optimum est balneum vaporis externæ corporis superficiei applicatum: dum simul in interioribus per clysmata, emollientissima decocta epota, & victum similem idem fit. Hanc methodum Hippocrates in morbis acutis ubique adhibuit.

**MITIGATIONE ACRIÆ &c.** Acris illa coguita, & ad suas classes reducta, ars valet tollere, modo viscera adhuc sint integra. Acrimoniam alcalinam, acidam, aromaticam &c. curare non adeo difficile est: sed ubi mirabiles illi stimuli venenati, mixtissima illa contagiosa, nullis sensibus detegenda, sed solis effectibus cognita, sunt causæ velocioris motus, tunc ars deficit. Dum fanissimam puellam morder venenatissimus serpens, a crepitaculo, quod in apice caudæ gerit, nomen habens (*serpens a fomesce*) paulo post mors sequitur, Medico præsentem quidem, sed nullam opem ferente: dum volunt cadaver asserere, tabescentia secedebant carnes (*Journal des observ. physiques* niabemat. & *botaniques par le R. P. Louis Feuil-  
le Tom. I. p. 417.*), paucis tantum post  
mor.



mortem horis. Dum homo sanissimus vario-  
loso contagio afflatur, quod sua subtilitate  
omnem sensuum aciem eludit, turbantur  
omnia, validissima febris incenditur, quæ  
tam miro modo omnes totius corporis hu-  
mores mutat, ut intra quatuordecim dies  
gangrenoso tabo omnia exteriora & interna  
corporis diffuauit. Si ingruente morbo pos-  
set ille stimulus opposita antidoto iners red-  
di, nil sequeretur mali. Hoc est illud di-  
uinum (1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

quod toties nimium motum in morbis non  
possint compescere Medici. Totum quod  
habet ars, est ut vitam debilitet ipsam:  
per vitam enim aëtuosa sunt venena, in  
cadaver nihil agunt: deinde ut diluentibus,  
ingenti copia potatis, abluat; & emollien-  
tissimis simul exhibitis obrundet.

DOLORIS CAUSAS TOLLENDO. Luxato ar-  
ticulo, summus fit dolor; a dolore febris,  
non curanda, nisi restituta offe luxato, &  
sic sublati dolore. De cura doloris postea  
peculiari cagitulo agetur.

## DE MORBIS, EX DEFECTU CIRCULATIONIS, ET PLETHORA.

§. 106. **D**efectu motus circulatorii morbi fiant in humoribus illi, qui proxime  
accedunt ad hos, qui quiescentibus spontanei nascuntur. Modo bene  
consideretur aer, qui admissus corruptiones spontaneas accelerat, quæ aliter, eo se-  
clesio, lentiores; (§8. ad 80.) adeoque intellectus, & curatio horum inde peti  
debet. Atque ex his omnibus plethoræ indoles, causa, effectus, signa, remedia in-  
telliguntur, si ad sequentia animus advertitur.

Liquida in nobis vel sunt adhuc cruda,  
& ingestorum naturam pro parte saltem re-  
tinent; vel jam acquisiverunt per vim cor-  
poris illas dotes, quæ liquidis humanis pro-  
priae sunt. Si consideremus, quid crudis,  
vel assimilatis liquidis accidat, dum minui-  
tur circulatio, apparebit evidenter, tales  
quam proxime fieri mutationes, quæ quie-  
scentibus, & sibi relictis, acciderent. San-  
guis noster, per pauca momenta quiescens,  
separatur in serum & rubram partem con-  
cretescentem: dum multum minuitur circula-  
tio, incipit simile malum nasci, unde to-  
ties polyposæ concretiones post lentos mor-  
bos observantur. Cruxa vero omnia ingesta  
mutantur in nostram naturam circulationis  
efficacia: hæc ergo si minuitur, ingesta  
suam naturam diutius retinent, & sponta-  
nea mutatione corrumpuntur. Sed de his  
actum fuit in precedentibus capitulis, hinc  
jam non repetendis.

Unicum tantum monendum videbatur,  
quod nempe aeris liber accessus omnes hu-  
morum spontaneas degeneraciones acceleret.

Nulla enim fermentatio fit, nisi aer ac-  
cedat: & putrefactio longe tardius oritur,  
dum aer excluditur: stagnans in tumido ab-  
domine aqua per multos menses hæret, vix  
corrupta; simul ac aer accesserit, putrescit  
citissime.

Dum ultimo graviditatis tempore, in di-  
stentissimis uteri vasis, sanguis fere stagnat,  
nulla fit corruptio: excusso foris, aere libere  
accedente, lochiorum pessimus factor. Post  
validas contusiones, dum sub cute integra  
hæret effusus sanguis, vix putrescit: sed sen-  
sim attenuatus & resorptus evanescit quasi:  
si effusus sanguis aeri libero exponatur, put-  
rescit citissime. Hinc in interioribus corpo-  
ris dum stagnat, vel tardius moventur, hu-  
mores, cum non detur liber aeri accessus,  
non tam subita fit degeneratio in putredinem.

Quia vero aucta liquidi movendi moles  
circulationis velocitatem retardat, hinc  
huic capitulo subnectitur Plethoræ conside-  
ratio, in suis causis, indole, signis, & re-  
mediis; quæ omnia sex sequentibus nume-  
ris explicantur.

a. Plethora est copia boni sanguinis major, quam quæ ferre possit eas mutatio-  
nes, quæ vitæ inevitabiles accidunt, nisi inducantur morbi.

Sanguinis boni abundantia nimia vocatur  
plethora; hac ex se nunquam est morbus:  
supponit enim boni humoris auctam copiam;

omnia autem reliqua se bene habere. Ideo  
Holmontius credidit, plethoram male inter  
morbos recenseri, volens illud, quod bo-

num est, copia peccare non posse. Sed plethoricus homo dicitur, non qui jam egrotat, sed qui in tali statu plenitudinis est, ut si ulterius augeatur copia humorum, vel calore aut alia quacumque de causa plus rarefiant humores, lædantur functiones. Hinc plethoricus homo potest esse sanus, sed in maximo discrimine interim versatur. Calore enim aeris ambientis aucto, minio vitio rerum non naturalium, affectu animi validiore, summa illa sanitas potest mutari in periculosissimum morbum: sed impossibile est præcavere, quin sanissimo homini hæc aliquando accidant. Hinc dixit Hippocrates: (*Apor. 3. Sect. 1.*) *bene habita athletarum valetudo, si ad summum processerit, periculosa: non possunt enim in eodem statu permorari neque consistere: quam autem non consistant, nec in melius possint proficere, superest ut in deterius vergant.* Ob hæc ergo bonum illum habitum haud cunctanter solvere censeat &c.

Non ergo plethora significat omne humorum augmentum, sed tantum boni sanguinis auctam copiam: hinc Galenus (*Morb. Medendi Lib. III. cap. 6. Tom. X. pag. 300.*) dicit, ubi æqualiter inter se humores sunt adducti, illud plenitudinem & plethoram nominant: ubi vero vel flava bile, vel nigra, vel pituita, vel serosis humoribus repletum corpus fuerit, talem affectum cacochymiam, non plethoram, vocant.

β. Hanc generat omnis causa, quæ multum landabilis Chyli, & Sanguinis conficit, simulque horum attenuationem, consumptionem, perspirationem, impedit.

Per ipsius sanitatis actiones inevitabili necessitate dereruntur solida, & dissoluntur fluida: hinc per ingesta debebant restitui illa, quæ perierant. Si quotidie tantum restituitur corpori, quantum perditum erat, manet perfectissimum æquilibrium, sanitatis firmissimæ summum indicium: ut Sanctiorius suis experimentis demonstravit, quod tunc perfectissime valeret corpus, quando quotidie post integram subactionem ingestorum rediret ad solitum pondus. Restitutio deper-

γ. Quo spectat vix contractilis viscerum & arteriis; similique laxior venarum, & cæterorum vasculorum compages; tibi blandi facile in chylum resolvendi; somnus tranquillus, animus sedatus; quies musculosa, consuetudo mirandi sanguinis, naturalis, artificialis.

VIS CONTRACTILIS VISCERUM &c. Dum firma & valida sunt illa viscera, quæ in-

Plenitudinem illam nimiam Veteres distinxerunt in eam, quæ ad vasa (*πρὸς ἄγγεια*) esset, & alteram, quæ ad vires (*πρὸς τὰς δυνάμεις*) vocabatur. Quando vasa bonis quidem, sed copiosis adeo turgabant humoribus, ut ruptura forent proxima, vel & nimia distentione læderentur functiones, vocabatur simpliciter plenitudo, sive plethora; ad vasa: Quando autem vasa non nimis plena forent bonis humoribus, plus tamen continerent, quam debilis vitalis vis movere poterat, erat plenitudo sive plethora ad vires. Plethora ergo ad vasa poterat semper & absolute dici plenitudo, plethora ad vires non nisi respective. Sic Galenus (*De Plenitudine cap. 3. Tom. VII. pag. 326.*) dicit, duas esse plenitudinis species, vel ad virium robur & facultates corporis illam sustinentis; vel ad suscipientem capacitatem, & alibi (*De Curandi ratione per venæ sectionem cap. 6. Tom. X. pag. 434.*) Quanto enim gravior sibi videtur humo, tantum & plenitudinem quoad vires cecidisse constat: ad eundem modum, quantum auctus fuerit sensus, tantum & alteram auctam plenitudinem esse novimus, quam a quibusdam nara τὸ ἐγγύα vocari diximus.

Vulgari tamen sensu per plethoram intelligitur illa plenitudo, quæ ad vasa est: & hac significatione plethoræ vocabulum in hoc capitulo sumitur.

Chylopororum magna, ut & in Corde & arteriis; similique laxior venarum, & cæterorum vasculorum compages; tibi blandi facile in chylum resolvendi; somnus tranquillus, animus sedatus; quies musculosa, consuetudo mirandi sanguinis, naturalis, artificialis.

gesta debent mutare in bonum chylum, ex cibo & potu maxima chyli copia paratur.

Dum firma & valida sunt illa viscera, quæ in-

Dum in corde & arteriis simile robur obri-  
net, ex copioso illo chylus bonus sanguis na-  
scitur: venæ autem semper ex sua natura  
laxiorescum sunt, cedunt facile dissenden-  
ti liquido, & illud superfluum recipiunt,  
nisi per exercitia & motum maiorem de-  
pleantur: nam, uti demonstratum est §.  
105. quo minor est motus humorum per va-  
sa, eo plus aggregantur in venis humores;  
quo maior motus est, eo plus impleantur ar-  
teries, depleantur venæ. Dum immanem se-  
pe potentialium copiam ingurgitant hel-  
luones, nisi venæ cedere possent, & in se  
recipere illud superabundans, suffocarentur,  
& ideo inflatas tunc adeo venas habent.  
Dum ergo viscera chylopoietica maiorem co-  
piam chyli parant, & hzmatoipoietica vi-  
scera inde sanguinem faciunt, laxitasque si-  
mul malor in venis fit, necessario accumu-  
latur boni sanguinis copia.

CIBI BLANDI &c. Omnia actiora suo sti-  
mulo motum circulatorium augent, ut di-  
ctum §. 99. n. 2. sed auctus sanguinis mo-  
tus minuit liquorum copiam, ut demon-  
stratum est §. 105. blandi igitur & molles  
cibi ex cerealibus bene maturis, carni-  
iufculis, juniorum animalium teneris carni-

bus, oleribus mollissimis, ex quibus omni-  
bus blandi chyli magna copia conficitur,  
Plethoræ producendæ favent.

SOMNUS MULTUS. Quantum conducit  
laxandis fibris nimis rigidis plenior somnus,  
dictum fuit §. 35. n. 2. sed laxata vasa fa-  
cilis cedunt dissendenti liquido; hinc ma-  
ior imperio. Præterea somni tempore re-  
sistuntur illa in corpore, que sensuum &  
motuum voluntariorum actionibus perierant;  
dum vigilamus, consumuntur illa, quæ so-  
mini tempore accumulata fuerant; hinc so-  
fatigati diurnis laboribus post salubrem so-  
mnium refurgunt alacres: dum ergo lon-  
giori somno indulget homo, plus accipitur  
quotidie, minus dissipatur; hinc plenitudo  
nascitur: ideo morbis validissimis exhausta  
corpora longiori somno tam pulchre resti-  
tuuntur. Ursi tota hyeme dormientes sine  
pabulo vitam sustinent.

ANIMUS SEDATUS. Tranquilla mentis  
serenitas quantum conducit tuendæ sanita-  
ti, omnibus patet: sed summx sanitatis ef-  
fectus plethora est: validi animi affectus, &  
hujusmodi: curæ etiam corpus depauperant;  
hinc elegantissime cecinit Ovidius. ( *Me-  
tamorph. Lib. III.* )

*Attenuant vigilæ corpus miserabile cura;  
Adducitque cutim macies, & in æra succus  
Corporis omnis abit; vox tantum atque ossa supersunt.*

Galenus ( *Method. Medendi Lib. XIV.  
cap. 35. Tom. X. pag. 335.* ) ubi nimis  
obesitatis curam tradit, inter alia teme-  
dia recenset & animæ curas ( τῆς ψυχῆς  
ἐπιμερίαι. )

QUIES MUSCULOSA. Postquam divina  
sententia in peccati poenam homini iustum  
est, ut in sudore vultus sui panem man-  
ducaret, inventum fuit, corporea exercitia  
ad sanitatem tuendam necessaria esse. Dum  
in ro laura constituti homines inerti tor-  
pent otio, gravissimis morbis pressi desidiæ  
pœnas luunt: Hippocrates ( *De victus ra-  
tione sanorum Lib. I. cap. 2. Tom. VI. pag.  
448.* ) dixit, homo comedens sanus esse non  
potest, nisi etiam laboribus exerceatur. Cibi  
enim & labores adversus inter se potestates,  
mutuo tamen ad sanitatem conferentes, ha-  
bent. Labores namque ea, que adsunt, con-  
sumunt solent, cibi vero & potus vacuata re-  
plere. Et alibi ( *De victus ratione sanorum  
Lib. III. cap. 3. Tom. VI. pag. 481.* ) salu-

berriam sanitatis regulam tradit, quam  
se primum mortales docuisse gloriatur: ju-  
bet nempe confiderari, utrum cibi labores,  
an vero cibi labores superent; an moderate  
inter se habeant, quodcumque enim superet-  
tur, ex eo morbi contingunt; ex mutuo vero  
inter se equalitate sanitas adest.

Illud ergo æquilibrium inter cibos & la-  
bores requiritur, ut tantum dissipetur quo-  
tidie, quantum ingestum est: simulac in-  
gestorum copia manente eadem, minuantur  
labores, incipit plenitudo nasci. Dum  
in stabulis bene pasti quiescunt equi, pin-  
guescunt brevi; si per aliquot dies valido  
exerceantur cursu, dissipatur cito omne il-  
lud incrementum.

CONSUETUDO MITTENDI SANGUINIS, NA-  
TURALIS, ARTIFICIALIS. Certa observata  
docent, quod, quo sapius sanguinis iactu-  
ram pariat homo, modo non penitus in-  
de debilitetur, eo citius postea sanguine  
tureat. Fœminis singulis mēnibus natu-  
rali

rali lege superfluis evacuatur sanguis; eodem iterum temporis intervallo novo sanguine turgent. Viri sæpius repetitis venæ sectionibus affueri, circa solitum venæ sectionis tempus eadem patiuntur mala, quæ feminis a reteritis menstruis; sicque tandem virile robur in laxitatem sœmineam fore degenerat. Observavit DODARTIUS, (*Hist. des l'Academie des Sciences l'anno 1707. pag. 270.*) sedecim uncias sanguinis per venæ sectionem ductas intra quinque dierum spatium restitui in homine non debilitato. Hinc patet, venæ sectionem repetitam ad plethoram disponere, tam cito regenerato sanguine; sed forte minus firmo, & simul laxiore reddito corpore, hinc facilius implendo. Vidi feminam, cui ob validissimos, & sæpissime renatos animi afflatus, sexagesies & ultra vena fuerat secta intra anni spatium, quæ obelissimâ facta paucorum mensium spatio 150. librarum pondere aucta fuerat; & dum continuo tur-

geret renato sanguine, nova sanguinem mittendi necessitas urgebat magis quotidie; donec tandem soluto omni corporis robore in hydropem incideret. Non videretur ergo adeo laudabilis hæc consuetudo, qua sæpius in anno sanis hominibus cautele gratia sanguis mittitur: debilitatur enim inde corpus, & ad faciliorem repletionem disponitur. Galenus, qui & frequentes in morbis, & audacissimas venæ sectiones ad animi deliquium usque iussit institui, & Medicos a venæ sectione abhorrentes *ἀμαρῆσθαι* vocavit (*Metb. modendi Lib. IX. cap. 5. Tom. X. pag. 210.*) damnavit hanc consuetudinem, dicens: (*De Hirundinibus cunctis. Ecce. cap. ultimo circa finem. Tom. X. pag. 455.*) *Non per annum venam sæpius secare, laudare expedire arbitror; quod una cum sanguine vitalis excernatur spiritus. Atqui si hic copiosus absumatur, tota moles refrigeratur, & omnes naturales operationes deterius perficiuntur.*

1. Effectus Plethoræ omnes pendunt a rarefactione, quæ majori velocitati, atque inde nato color, aut causis aliis, per solam observationem cognoscendis, adscribenda: hinc arteriarum dilatatio tam Sanguiferarum, quam Lymphaticarum; mutata secretio; compressio generis venosi Sanguiferi & Lymphatici; suffocatio circulatorii; inflammatio; vasorum ruptura, suppuratio; gangræna; mors.

EFFECTUS PLETHORÆ OMNES PENDUNT A RAREFACTIONE. Quando nimia copia boni sanguinis repleta sunt vasa, potest adhuc esse sanitas; sed ubi a quacunque causa sanguis vasis contentus rarefcit, tunc incipiunt lædi functiones, & cum tunc appareant mutationes quædam in corpore, hæ vocantur effectus plethoræ; licet non ab unica hac causa pendeant, & plethora tantum sit causa prædisponens; rarefactio autem sit causa excitans, sive occasionalis dicta. Ex binis autem his causis, prædisponente nempe & excitante, unitis sit causa proxima illorum phenomenorum, quæ tunc apparent; & quia causa, excitans, nempe rarefactio, in actum deducit plethoram, quæ sola, nisi in summo gradu fuerit, non tam cito noceret; hinc illo sensu effectus plethoræ dicuntur pendere a rarefactione.

QUÆ MAIORI VELOCITATI &c. simul ac in tra idem tempus major copia sanguinis per vasa fluit, dicitur aucta esse velocitas: sed hoc non potest fieri nisi aucto attritu fluidorum ad vasa, unde calor, & a calore rarefactio. Omnes autem causæ, quas

docuit observatio rarefacere sanguinem, videntur hoc imprimis facere aucta celeritate, & calore inde nato. Sola autem sanguinis rarefactio potest efficere omnia illa, quæ a plethora oriuntur. Si enim sanguis fieret duplo rarior, esset respectu vasorum res eadem, ac si duplo fuisset factus copiosior; si ergo plethoræ accidit rarefactio, omnia, quæ a plethora nasci possunt, mala augentur. Hinc patet, quare omnia illa medicamenta, & omnes morbi, qui sanguinis velocitate aucta calore inducunt, rarefactio sanguinis, plethoræ dissidentis symptomata faciant. Pallida & frigida puella contagium variolosum recepit; mox oritur calor, rubor, inflammatoria tensio vasorum, dolor capitis immanis &c. non ab aucta copia sanguinis, sed a rarefactione per calorem maiorem ab accelerato sanguinis motu natum.

HINC ARTERIARUM DILATATIO &c. Sanguis auctus copia, vel per rarefactionem majus spatium occupans, necessario plus dilatabit vasa, quibus continetur, hinc æquæ arteriæ quam venæ distendentur. Sed sanguis.

guis ex arteriis non tam facile poterit propelli in distentas nimis venas; hinc major oriatur resistētia circa fines arteriarum. Ergo arteriæ plus debent distendi a sanguine ex corde in arterias pulso. Cum autem inter causas, quæ faciunt, ut ex eodem sanguine tam varii in variis locis secretantur humores, recensatur a Physiologis varia proportio ramorum fecernentium ad truncum, unde oriuntur; patet turbata hac proportionē per dilatationem arteriarum, turbari posse & omnes secretiones.

**COMPRESSIO GENERIS VENOSI &c.** Plethoræ in locis corporis arteriis comites incedunt venæ; tumentes nimis arteriæ adjacentes venas, debilioribus tunicis instructas, comprimunt; venæ compressæ contentum fluidum versus cor derivant; cor illud pellit in arterias, & venæ compressæ minus recipere valent: hinc necessario sequitur major adhuc arteriarum dilatatio, & tandem omnis sere sanguis accumulatur in arteriis, dum venæ magis comprimuntur & deplentur.

**SUFFOCATIO CIRCULATURI.** Sic enim omni momento augetur resistētia sanguini ex corde sinistro expellendo: hinc venæ pulmonales non poterunt tam facile suum sanguinem infundere in cor sinistrum: ergo sanguis accumulari incipiet in pulmonis vasis; augebitur resistētia cordi dextro,

tandemque suffocabitur circulatio. Sic videmus in summo gradu plethoricos rubere quam maxime, dilatatis arteriis minoribus, jam recipientibus sanguinem rubrum; & tandem incipiunt livescere suffocati sere, & nisi sponte vel arte solutis vasis tollatur copia, sicque minuatur calor, & rarefactio, subito sæpe pereunt.

**INFLAMMATIO.** Ob crassiores humores ingresses dilatata nimis vasorum minorum orificia, nec potentes tamen per ultimas horum angustias transire.

**VASORUM RUPTURA.** Imprimis in illis locis corporis, ubi tenerrima sunt: hinc tories in cerebro ruptæ arteriæ in plethoricis lethalem fecerunt Apoplexiam: fractis a distendente sanguine pulmonum vasis, tam frequens observata fuit in plethoricis Hæmoptoe.

**SUPPURATIO, GANGRÆNA.** Inflammationis factæ, nec resolutæ, communes exitus.

**MORS.** Quæ videtur fieri, quia distenta nimis vasa tantam faciunt resistētiam cordi, ut illud evacuare non possit; unde circulatio suffocatur: vel quia vasa majora,urgentia nimio sanguine, minima vascula in cerebro, cerebello, & nervis comprimunt: vel ubi fractis vasis humores ad vitam necessarii effluunt. Vel denique quando ruptis vasis extravasata liquida viscerum vitalium actiones tollunt.

¶ Itaque facile cognoscitur præsens; prævidentur futuri effectus.

Plethora præsens cognoscitur, si prægressæ sint causæ illæ, quæ nimiam boni sanguinis copiam generant, quæ recensitæ sunt (§. 8) & (§. 7) huius paragraphi: si magna rubedo adsit in toto corpore, maxime conspicua in illis locis, in quibus vasa nulla cute tecta apparent nuda, ut in oculorum angulis, palpebris internis, adnata oculorum tunica, naribus internis, ore, faucibus, labiis: si magnus calor ad extrema corporis usque inveniat: si venæ inflatæ sint, una cum pulsu forti pleno: si a motu majore, aeris calore aucto, vino vel aliis quibuscumque calefacientibus assumtis sentiant in omnibus musculis corporis mollem plenum distendentem tumorem, una cum

immobilitate quadam, sic ut manuum digitos vix claudere possint; incipiunt tunc legnes fieri, soporosi, oculos habere lacrymantes. Sicque habetur perfecta plethoræ diagnosi.

In Prognosi prævidentur futura illa mala quæ (§. 8) in hac paragrapho recensita sunt: & imprimis quod encephali totius functiones turbabuntur, quia in capite omnia plena sunt naturaliter: hinc distentis vasis majoribus, rubro sanguine plenis, minora reliqua comprimuntur, quia durum calvarie os cedere nequit: hinc a levissima vertigine ad lethalem apoplexiam usque omnes morbi cerebri a plethora nasci possunt.

¶ Curatio absolvitur missa sanguinis; labore; vigilis; cibo acriori post evacuationes; omissione evacuationum sensum introducta.

**MISSU SANGUINIS.** Nimia copia boni sanguinis erat causa omnium malorum enumeratorum: omne ergo quod hanc copiam minuit, proderit: sed omnium optime copia minuitur nullo sanguine, & statim inde oritur levamen omnium symptomatum. Nunquam rectius Medicina curat, quam ubi naturæ vias, quibus morbos levar, imitatur: sed videmus & in sanitate, & in morbis, nimiam plenitudinem, & sanguinis copia majori, vel & rarefactione nimia ortam, salutari hæmorrhagia, narium imprimis, rari feliciter tolli. Hinc juvenibus, perfecte valentibus, illo ætatis tempore, quo incipiunt vasa, jam fortiora reddita, plus resistere liquidis distendentibus, tam frequens salutaris hæc evacuatio est, imprimis increfcente verno calore. Eandem ob causam in servidissimis morbis narium hæmorrhagia toties salutem attulit. Ars postea, salutaria hæc naturæ conamina imitata, aperta vena sanguinem eduxit; & si senna docerent, arteriosum systema solum esse distensissimum, venas collapsas, ob immeabilem sanguinem, hærentem in arteriis & non potentem transire in venas, ut in morbis acutis inflammatoriis sæpe fit; tunc ausi fuerunt Medici ipsas perturbare arterias: & quia hoc in majoribus arteriis sæpe non sine periculo fieri poterat, discissis plurimis minoribus per scarificationem, eundem sere præstabant effectum. Unde in Ægypto, ubi acutissimi illi morbi frequentes erant, tanti fecerunt scarificationes, uti testatur *Prosper Alpinus in Medicina Ægyptiorum*.

Quidam, Helmontium secuti imprimis, damnabant sanguinis missionem, tanquam crudelem & inutilem; credebant abstinentia a cibo & potu plus minui posse nimiam copiam, cum per insensibilem perspirationem, & alias excretiones, quotidie plures libræ humorum expellantur ex corpore, quod totum cibo & potu iterum restituitur: hinc cum pergerent naturales hæc excretiones liquida nunquere, nec ingesta iterum redderent deperdita, magis minuebatur copia liquidorum abstinentia a cibo & potu per viginti quatuor horas, quam vel audacissima venæ sectio fieri posset: sed hac methodo subtilissimi tantum de corpore distillantur humores, ruber crassus sanguis majora vasa distendens, vix minuitur, quod imprimis requirebatur; & omnes humores

acriores fiunt, dum nihil novi chyli sanguini miscetur.

Sed sanguinis missio nimiam quidem copiam minuit, corpus tamen relinquit æque facile replendum iterum; imo plus disponit ad novam plethoram generandam, uti dictum (§) in hac paragrapho: hinc requiritur, ut corpus sic firmetur, ut non tam facile boni sanguinis copiam accumulet. Fit hoc imprimis

**LABORE:** qui & dissipat illa, quæ in otio retinentur; & firmat sic solida, ut non facile cessant liquidis implentibus. Quotidie duris laboribus exercitis, licet voracissimi simul fuerint, plethoricos tamen rarissime quis inveniet. Labores tamen non conveniunt, nisi prius sanguinis missione depleta fuerint vasa: aliter summum periculum foret rupturæ vasorum adeo distendentium.

**VIGILIS.** Inter causas nimic plenitudinis recensebatur & somnus multus (§): vigile ergo oppositum præstabant effectum.

**CIRCO ACRIORI POST EVACUATIONES.** Molles cibi, facile subigendi a visceribus chylopoieticis, magnam chyli copiam largiuntur: unde quotidie sanguinis augetur quantitas, nisi validiori motu humorum distilletur superfluum. Hinc recens natis molissimum lac, jam materno in corpore subactum, dedit natura, quia incrementum adeo velox in hac ætate requirebat quotidianum humorum augmentum: ubi vero contrarium requiritur, uti in plethoræ curatione, tunc duriores cibi, non tam facile subigendi, & acriora simul aromatica condimenta stimulantia profunt: quia sic & minus sanguinis conficietur; & aucto motu per acres stimulos, non fiet tam facilis aggestio humorum. Sed antequam evacuantibus minua fuit distendentis liquidi copia, acria assumpta nocerent summopere, ob magnum metum rupturæ vasorum nimis plenorum, si simul accederet per stimulantia factum motus augmentum.

**OMISSIONE EVACUATIONUM SENSIM INTRODUCTA.** Quantum disponant crebræ sanguinis missiones ad novam plethoram, dictum fuit L. 7. hujus §. Hinc evacuationes illæ omittendæ sunt; sed non potest simul & semel hoc fieri, quia omnis subitatio a consuetudine ad insolita semper mala est; & inprimis in hoc casu. Per frequentes enim sanguinis missiones assuescit corpus, ut majorem sanguinis copiam accumulet;

mulet; quæ nisi tollatur, omnes plethoræ effectus sequentur; & ideo sensim minuendæ sunt solitæ illæ evacuationes quoad quantitatem; maiusque temporis intervallum inter singulas interponendum; ut sic gradatim minuantur sine ullo periculo. Hoc dum sic fit, imitatur salutare naturæ institu-

tum in feminis circa illud tempus, quo menstrua incipiunt deficere: naturaliter enim sensim minuuntur copia, & maior temporis intervallo tantum prodeunt, donec penitus desinant: si vero subito cesser solitus menstruorum fluxus, pessima inde solent sequi mala.

## MORBI COMPOSITI SIMPLICISSIMI, OBSTRUCTIO, ET VULNUS.

### O B S T R U C T I O.

§. 107. **O**bstuctio est obturatio canalis, transitum tollens liquido, per eum transijciendo, vitali, sano, vel morbofo, orta ex excessu molis transituræ supra capacitatem vasis transmissuri.

Omnium simplicissimus morbus inter compositos foret Vulnus, supponens tantum separatam cohesionem partium solidarum: sed nullum potest fieri vulnus illius momenti, quin effundantur liquida vasis contenta; quæ tunc effusa suam sequuntur naturam: hinc spontaneæ degenerationes liquidorum prius debebant considerari. Præterea canales difcissi in vulnere primo emittunt contenta liquida; postea clauduntur & tenuiora liquida dimittant; tandem, illis obturatis fit obstructio, & cessat liquidi effluxus, ut in historia Vulneris in genere parebit. Hinc secundum dicta in §. 106. debebat præmitti obstructio, quæ in omni vulnere obinet.

**OBSTRUCTIO EST OBTURATIO CANALIS &c.** Hæc est generalissima obstructionis idea, supponens impedimentum qualecumque, quod tollit transitum liquidorum per canales. Intelligitur hic canalus nomine imprimis omne vas, per quod continuo liquidum fertur; uti fit in arteriis & venis: illa enim vasa, per quæ non semper sed tantum certo tempore fluit liquidum, potius emissaria vocantur: quamvis tamen & illis obstructio nasci possit; uti v.g. in ductibus biliosis, urethra &c. toties observatur.

Omnia corporis nostri liquida vel per vasa continuo motu feruntur vel in majoribus alveis collecta tantum aliquo tempore hærent. Viderur jam in vasis obstructio locum præcipue habere; in majoribus alveis vix vel rarissime: nam licet v.g. in vesica hæreat calculus, nisi maximus fuerit, & totum vesicæ cavum perfecte impleat, non faciet obstructi onem, nisi ubi ex vesica in urethram pellitur. Dum polyposæ concretiones in sinibus vasosis, vel & in cordis cavis hærent,

non faciunt obstructionem, nisi quando ex maioribus his receptaculis in canales pelluntur.

**VITALI, SANO.** Post datam generalem definitionem obstructionis, jam consideratur, quoruplex sit illud liquidum, quod impeditur fluere per canales obturatos. Hoc erit vel vitale, quod per venas allatum cordis vi per pulmones & aortam pellitur, rediturum iterum ad cor pro sustinenda vita: sed vita diu potest subsistere, licet sanitas deficiat, hæc est enim perfectio omnium functionum simul: sed ut omnes functiones integre sint, requiritur, ut omnes canales sint liberi: hinc plurimæ obstructiones sanitatis integritatem lædere possunt, vita salva adhuc. Sic si in minima renali fistula concretum bareat calculi rudimentum, obstructio erit nata, tollens transitum liquido sano per hunc canaliculum transijciendo; nec tamen inde nascitur ullum notabile impedimentum liquidorum vitæ motui: tamen impediri erit actio illius canaliculi, quæ ad integram sanitatem requiritur.

**VEL MORBOFO.** Liquida morbofa dicuntur, quando sic degeneraverunt a naturali conditione liquidorum sanorum, ut lædant functiones: nec refert, an hæc degeneratio fuerit morbi nati causa; an vero effectus. Sic v.g. inflammatoria sanguinis spissitudo, futuræ pleuritidis causa prædisponens, morbosum sanguinem facit, id est, aptum ad lædendum functiones: In variolis vero per vim morbi, purulenta labe inquinato toto sanguine, morbofa fit omnium humorum indoles, quæ non præstituerat ante morbum natum, sed per morbum facta fuit; sed jam liquida hæc morbofa per canales feruntur.

feruntur aliquando sola, aliquando cum reliquis fluidis noudum a sanitatis conditionibus aberrantibus: obstructio ergo nata in canalibus poterit & impedire liquidi transitum: sic sepiissime in morbis apparet, humores morbosos vi vite superfluit ex uno loco ad alium per metastasim deferri; parotides & purulenti crurum abscessus, in pleuritide & peripneumonia toties salutare, hoc evincunt. Dum in exquisita Podagra in subtilissimo liquido degenerans morbosum conatur natura deponere ad articulos pedum, si quacumque

de causa impediatur ad loca illa consueta adferri, quanta oriuntur mala!

ORTA. EX EXCESSU MOLIS TRANSITURÆ &c. Sic habetur accurata cognitio causæ proximæ omnis obstructionis. Compressio vasorum postea quidem numerabitur inter causas obstructionis; si tamen liquidum tam tenuis sit, ut per vas compressione angustatum adhuc transire possit, nondum erit obstructio: nam obstructio non designat tantum difficiliorem transitum, sed totalem obturationem canalis.

§. 108. **Q**Uæ oriuntur ex angustia vasis, magnitudine molis fluxuræ, vel utriusque concurrentibus.

Tria hæc omnes possibiles obstructionis causas comprehendunt: vel enim liquidum per canalē transmittendum fit ipsius, manente eadem canalis amplitudine; vel arctatur canal, manente eadem meabili-

tate liquidi; vel denique & canalis angustia, & liquidi aucta ipsistudo simul concurrunt. Inquirendum jam in causas, quæ vel singula hæc seorsim, vel utraque simul faciunt.

§. 109. **A**ngustia vasis fit compressu externo, contractione propria, vel augmento crassitie in ipsis canalium membranis.

Recensentur hic causæ, quæ canales reddunt angustiores, manente eadem tenuitate liquidi transmittendi.

COMPRESSU EXTERNO. Dicitur tunc vas per axiā angustari. In canalibus nostris sectio perpendicularis ad axim circularis semper est: sed circulus inter figuras Isoperimetricas maximam habet aream; hinc omnis compressio externa, mutando circulem figuram, minuet semper canalis capacitatem: si autem conciperetur vis externa comprimens æqualiter agens per totam vasis ambitum, tunc non muraretur quidem circularis figura, sed minueretur diameter; hinc pariter angustaretur cavum.

CONTRACTIONE PROPRIA. Tunc per proprium tonum dicuntur vasa contrahi. Naturalis autem est vasis nostris hæc contractio, qua nituntur latera vasorum propius accedere ad axim simulac causæ distendentes minuantur: hoc autem maxime necessarium

erat, ut liquidorum copia minuta posset tamen manere non interruptus humorum circuitus, per vasa plena quidem, sed contractione propria angustiora facta. Hinc ubi v. g. sanguinis iactura ingens tam subito fit, ut vasa se non possint contrahere tam cito, ut plena maneant, interrumpitur circuitus, & fit syncope, imo & mors ipsa subitissimas inanitiones secuta fuit sepius. Hæc ergo contractio propria vasis nostris si augeatur a causa quacumque, vel minuantur imperus vel copia liquidorum distendentium; effectus erit idem, nempe angustatio maior canalium.

VEL AUGMENTO CRASSITIE IN IPSIS CANALIUM MEMBRANIS. Patet evidenter, tunc minui canalis cavi capacitatem, tumetibus membranis. Ut distinguerent hanc causam obstructionis a  $\sigma\kappa\lambda\upsilon\sigma\iota$ , vocaverunt  $\sigma\iota\upsilon\chi\sigma\iota\sigma\iota$ , sive angustationem loci, quando latera canalium aucta propria substantia angustarent cavum.

§. 110. **M**olecularum moles augetur viscositate fluidi, vel errore loci.

In hac paragrapho considerantur illa vitia fluidorum; per quæ manente eadem canalis capacitatis nasci potest obstructio.

Elementa constituenta humores nostros

videntur habere determinatam magnitudinem, & quidem proportionalem ultimis angustis vasorum; per quæ fluere debent. Sic elementum rubrum sanguinis tam parvum debet.



debet esse, ut per ultimas angustias arterie minimæ rubre transire possit; idem in reliquis tenuiorum liquidorum seriebus verum est. Si ergo a quacunque causa augeatur volumen in singulis elementis: liquida constituentibus, hærebunt circa ultimos canalium fines; quia, ut docuerunt Læwenhoeckii observata, per ultimos fines v. g. arterie rubre unicum elementum sanguinis rubrum, & adhuc cum quadam molestita, transit; hinc si expanderentur in majus volumen, manente eadem massa corporea, hæc elementa, liber impediretur transitus: ideo & illa obstructionis causa concipi potest, licet forte rarius contingat.

Sed aliud considerandum præterea est in liquidis vitium, forte multo frequentius. Fluidorum omnium partes, ut demonstraverunt Physici, quadam vi inter se coherent: idem & in nostris humoribus obtinet: ut vero per ultimas vasorum angustias transseant fluida, requiritur, ut molecule singulæ, separatæ a cohesione cum vicinis, transseant solitarie: hinc debent potentie moventes, quibus humores pelluntur per vasa, posse superare hanc cohesionem. Si ergo a quacunque causa augeatur cohesio elementorum fluida constituentium eo usque, ut non possint se ab invicem separari actione cordis & vasorum, manebunt adunatæ molecule, quæ per ultimos vasorum fines tantum transire possent solitarie; hinc nascetur obstructio: ubi vero hoc vitium in

fluidis obtinet, vocatur AUCTA VISCOSITAS, quia non habetur aliud vocabulum magis generale: designat autem tantum illam conditionem physicam, quæ in fluido, elementis nimis cohererentibus, augeat immeabilitatem.

ERRORE LOCI. Dicitur hoc vitium obnere, quando humor bonus ingressus fuerit vasa minora, in quibus naturaliter esse non debet, & per quorum ultimas angustias transire non potest. Sic v. g. dum sanguis ruber arterias serosas vel lymphaticas, in suis initiis dilatatas, ingreditur, dicitur peccare Errore loci: hinc, licet omnia liquida corporis humani requisita ad sanitatem dotes obtineant, & omnia vasa integræ sint, modo hæc, parum dilatata in suis iunctis, admiserint crassiora fluida, possunt nasci obstructiones, & quidem perinacissimæ. Frequentissima autem hæc inter obstructionis causas: nam aucto circuitus humorum impetu & velocitate sanguis ruber statim ingreditur aliena vasa. Leviter tantum fricati oculi in tunica adnata rubent, cum naturaliter in his vasis sanguis ruber non adsit. Valido cursu exercitatus homo totam cutim externam habet ruberrimam, ob sanguinem rubrum in vasa minora adactum. Quamvis autem proprie loquendo per errorem loci non augeatur molecularum fluida constituentium moles, tamen ratione habitæ vasorum, in quibus per errorem lociherent, nimia illarum magnitudo causam obstructionis facit.

### §. 111. E X. utrisque vero a concursu causarum utriusque. (109. 110.)

Possunt enim causæ angustantes canalem, & causæ facientes immeabilitatem liquidi transiendi simul concurrere.

Hinc apparet, ad quantam simplicitatem totum hoc possit reduci, dum sola causa

proxima omnis obstructionis consideratur: tota difficultas est, quod causæ remotæ adeo multiplices & variz sint, quæ nunc ordine enumerabuntur.

### §. 112. V A s a externe comprimuntur.

1. A tumore vicino plethorico, inflammato, purulento, scirrhuso, cancroso, cedematoso, ampullosa, steatomatode, atheromatode, meliceride, hydatidico, aneurismatico, varicoso, topthoso, pituitoso, calculoso, calloso.

1. TUMORE. Medicis & Chirurgis tumor vocatur partis, vel totius corporis, in naturali magnitudine factum augmentum a quacunque demum causa contigerit. Dum ergo pars tumens majorem occupat locum,

quam in sanitate solebat, necessario adjacentia vasa comprimendo angustat. Tumores autem sunt, vel a fluidis repletibus distenta ultra naturalem magnitudinem vasa, vel a liquidis extra vasa effusis, vel a vasis

valis concretis cum fluidis contentis inspissatis. Recententur jam præcipue tumorum varietates.

**PLETHORICO.** Quando nempe vasa arteriosa & venosa, rubrum sanguinem vehentia, nimia copia distenduntur, & distenta comprimunt minora vasa vicina. Tumoris autem plethorici effectus imprimis in cerebri actionibus læsis apparet: cranium enim semper plenissimum est, sanguis ruber tantum in pia matre observatur, & in arteriis rubris majoribus per medullarem encephali substantiam disperis, & medullam oblongatam ambientibus, in cortice cerebri naturaliter nunquam sanguis ruber invenitur: hinc distentis vasis rubrum sanguinem vehentibus, cum dura cranii olla cedere nequeat, comprimuntur reliqua vasa corticis & medullæ; unde omnes functiones cerebri turbantur: cerebellum autem, cerebro longe firmitus, minus ab hac causa afficitur.

**INFLAMMATO.** Dum vis vitæ urget liquidum vitale in vas inflammatum, necessario illud vas distendit, quia liquidum impulsum non potest penetrare vas obstructum: hinc omnis impetus Equidi impulsus dilatat vasis latera ante locum obstructum, ergo vicina adjacentia vasa comprimuntur: unde humorum circuitus non tantum impeditur in vasis inflammatis, sed etiam in vasis vicinis: hinc tumoris augmentum, & imprimis dum membrana cellulosa inflammatur, maximi tumores fiunt, sic ut aliquando digitus inflammatus decupulam crassitatem habuerit.

**PURULENTO:** qui duplex est, vel enim pus, propriis membranis coercentibus clauditur, vomitum facit purulentum; vel ruptis his repagulis in vacua vicina loca effundit; utroque modo pressione vasa vicina angustat; hinc nunquam sere in partibus subcutaneis apostema est, quin cutis vasa a pure collecto pressa inflammentur.

**SCIRRHOSO, CANCROSO.** Qui fit a glandula tumente, dein indurata: hinc vasa per proprias glandularum membranas dispersa, uti & in locis vicinis, comprimuntur, ideoque varicosæ venæ majores scirrhus comitantur semper. Parotides scirrhusæ factæ & tumidæ, dum adjacentes jugulares venas comprimunt, impedito sanguinis a capite reditu, quanta sæpe fecerunt mala! sub axillis & in inguinibus scirrhusæ factæ glandu-

læ, comprimendo venas, arterias, nervos adjacentes, partes subjectas omni vitalium humorum influxu privabunt: qualia multa Exempla in observatis medicis habentur. Ubi vero scirrhus in cancri malignitatem degenerat, aucto tunc semper tumore, plus nocet.

**ŒDEMATOSO.** "Ossuæ ut testatur Galenus, (Comment. IV. Aphor. 31. Tom. IX. pag. 155.) Antiqui & tumorem idem appellabant; & alibi, (Comment. V. Aphor. 65. Tom. IX. pag. 239.) omnes tumores præter naturam ab Hippocrate *Œdēmata* vocatos fuisse, asserit; postea recentiores dicit ab antiquo usu recessisse, & tumores varios distinctis nominibus vocasse: si enim cum dolore essent, vocabant phlegmonas; si sine dolore essent & duri, scirrhus; si sine dolore & molles similes essent tumores, tunc proprie *Œdēmata* dicebantur. Tumores autem illi molles indolentes apud Hippocratem non vocabantur simpliciter *Œdēmata*, sed addebatur semper aliud vocabulum, ut distinguere ab aliis tumoribus. Sic in Prognostico & Coacis prænotionibus hi tumores vocantur *Œdēmata μαλακά, ἀσπληνα γὰρ σκλήρυα ὀνίματα; tumores molles indolentes, digito cedentes*. Hac ergo sub significatione tumores illi hodie perieruntque intelliguntur, & hærent in membrana cellulosa, quæ vera Œdēmatidis sedes est. Materia autem horum tumorum est plerumque aqua, ut in hydropse anasarca patet; vel & aliquando lentescentes magis pituitosum liquidum, ut in Leucophlegmaticis. Sed membrana cellulosa, horum tumorum sedes, omnia vasa ambit; hinc tumores ibi nati vasa angustare possunt, & mirabiles sæpe morbos ab hac tantum causa pendent producere.

**AMPULLOSO &c.** Numerosissimæ in variis locis corporis tales sunt ampullæ, vae folliculi; tota cutis externa, interior superficies oris, œsophagi, ventriculi, intestinorum &c. similibus folliculis obsidentur undique. In his folliculis ab arterioso sanguine secretus humor pinguis, vel mucilaginosus, per proprium emissarium exit, lubricandis & innungendis his partibus inferviens: si jam a quacunque causa obstructa emissarium talis folliculi, non poterit evacuari contentus in cavo folliculi liquor, augebitur copia liquidi retenti, & distenditur folliculus; sic ut ex invisibili parvi-

tate in molem aliquot librarum aliquando excrefcit: minime ille cryptulæ, quæ in capillata capitis cute unctuosum illud fimegma præbent, quod pilos inungit & lubricat, aliquando in maximas moles excrefcunt: talis folent vocari apud Chirurgos. Obſervatores plurima exempla fimilium tumorum in aliis corporis locis habent.

Hæc jam eſt communis idea ampuſtoſorum tumorum: ſed variant ratione materie contentæ, & inde varia nomina acceperunt, quando enim materiem pulſi ſimilem continebant, dicebantur **ATHEROMATA**: ſi materiam ambigui fluiditatis inter mel & ceram continerent, vocabantur **MELICERIDES**: ſi pinguedini ſimilem duriorem in ſe haberent materiam, vocabantur **STEATOMATA**. Sed de his jam alia occasione diſtinctum eſt, nempe §. 75.

**HYDATIDICO.** Hydatides communi hodie opinione ( *uſari* enim olim vocabatur pinguedinis ſuperiori palpebræ ſubſtrata extrema parte incrementum ) ( *Gorrei deſinit. Medic. pag. 646.* ) vocantur membranacei ſacculi variz magnitudinis in partibus corporis externis & internis ſæpe deprehenſi, aqueo humore turgidi. Valde autem dubium videtur, an ſemper ad tumores ampuſtoſos referendi ſint: hi enim tumores, ut diſtinctum fuit, erant tantum naturales folliculi dilatati, hinc magnitudine aucti; ſed hydatides obſervatæ fuerunt in talibus locis, ubi folliculi illi ab Anatomicis non adeo detecti erant: integram enim placentam uterinam in hydaides mutatam obſervavit Ruſſchius ( *Obſervat. Chirurg. pag. 33.* ) Imo obſervaverunt, hydatides tales, & ab omni nexu cum ſe invicem vel vicinis partibus liberæ, in majori ſacco membranaceo conclufas, fluctuare; & quod magis mirum eſt, majores hydatides continebant, in ſuo cavo minores alias, pariter ab omni nexu liberæ ( *Acta Petropol. Tom. I. pag. 379. 382. Acad. des Sciences P. an. 1722. Mem. pag. 222.* ) dum una cum ſuis folliculis coquebantur aquæ Hydropici mortui, viſum fuit ipſam folliculorum ſubſtantiam, quæ membranacea apparuerat, fuiſſe diſſolutam ( *Academ. de Sciences P. an. 1719. Hiſt. pag. 49.* ). Hinc conſecluerunt Celeberrimi Viri, hydatidum pelliculas non eſſe partes organicas, ſed ex liquido incræſcuto forte natas fuiſſe. Nihil tamen repugnat, quin & naturales folliculi a quo hu-

Tom. I.

more diſtincti expandi poſſint in magnam molem; tales hydatides in palpebrarum limbis obſervantur ſæpius, degenerantibus forte ſic glandulis ſebaceis hic poſitis: in ovario muliebri ſic in ſaris amplam magnitudinem ovum expanſum humore pleno inveniit Ruſſchius ( *Obſervat. Chirurg. 17.* ).

Tales autem tumores Hydatidicos paſſim in variis locis corporis inventos fuiſſe, & modo memorata Auctorum loca evincunt, & innumera alia apud Bonetum, & alios obſervatores, habentur Exempla.

**ANEURISMATICO.** Aneurisma, vel potius Aneurisma dicendum, *ἀνὰ τῇ ἀνωπύῃ*, designat arteriæ integræ dilatactionem præternaturalem in quadam parte, ſic ut arteria, quæ antea uniformem cauſalis conſiſtendi figuram habebat, nunc in quadam parte debilitata expandatur in ſinum, qui omnia vicina comprimens peſſima poteſt producere mala. Sic ab aneurismate, circa vitalia viſcera hærente, coſtas, clavicular, ſternum, elevata non tantum, ſed & fraſta, partem internam vertebrarum doſi ſere ad ſpinalem medullam uſque contritam, & conſumtam miratus fuit ſagaciſſimus Albertini ( *Inſtit. Bononiens. pag. 383.* ) coſtas penitus carioſas, imo cum offe ſterno in nihilum redactas ab aneurismate vidit Ruſſchius ( *Obſervat. Chirurg. 37. 38.* ).

**VARICOSO.** Quod Aneurisma dicitur in arteriis, illud, ſi in venis obineat, vocatur Varix, frequentius longe malum quam Aneurisma; quia & venæ facilius cedunt cauſæ diſtendenti, & ſanguis tardius movetur in venis quam in arteriis, hinc a levi ſatis obſtaculo, impediæ motu ſanguinis venoſi venæ ab accumulato ſanguine diſtenduntur, & varicoſæ fiunt: frequens imprimis malum gravidis mulieribus, dum diſtensus uterus venas iliacas præmens impedit, ne venæ per crura & femora diſperſæ ſe tam expedite poſſint evacuare; hinc tunc apparent in illis varicoſi illi tumores, crurum imprimis.

**TOPHO.** Tophi proprie dicuntur, quando per cauſas morboſas quascumque lamellæ os majus conſtituentes a ſe invicem remouentur, eleuantur, & tumorem conſtituunt, non omnino durum inſtar offis, ſed ſciſſilem atqueque, habentem firmitatem, qualem habent juniorum animalium cornua, dum primo protuberare incipiunt. Tumores illi in omnibus illis morbis, qui offa

H

impri.

imprimis afficiunt, satis frequentes sunt, ut in Rachitide, Scorbuto, & omnium maxime in Lue Venerea: in quo morbo tumores illi periossei vasa comprimendo, nervos hic tam sensiles distendendo, adeo molesti sunt. Hac & referri possunt exostoses, ubi ipsa ossis duri substantia in tumorem elevata comprimit vasa vicina.

**PIRUITOSO.** Ubi gluten naturale, vel morbosum, accumulatum cava, quibus continetur, distendit, & adjacentia vasa premit.

**CALCULOSO.** Quanta mala fiant a calculis in renibus, ureteribus, vesica hærentibus, mole sua & pondere vasa comprimentibus, quibus accumbunt, omnibus notum est.

**CALLOSO.** Callus vocatur partis membranaceæ increfcens moles, una cum duritie & insensibilitate, orta a vasis concretis inter se, imprimis per compressionem externam. Causa proxima calli est compressio vasorum, expressio liquidæ contenti, & concretio laterum vasorum inde nata. In recens natis nullibi callus apparet, sed postea dum incedere incipiunt, toto pondere corporis sustentato pedum plantis, incipiunt ibi vasa complanata expressio liquido concrefcere & callum facere. In fabris ferrariis ab attritu mallei sæpe manuum volæ cornu duritiem acquirunt. Callus autem omni virali influxu humorum destitutus ex sua natura multum mali facere nequit, sed mole sua & duritie premens vivas partes

subiectas inflammationem & alia molestissima mala facere potest: sic sæpe pedum omnem fere usum sustulit callus durissimus, circa prominentiam ossis metatarsi pollicem pedis sustentantis natus, dum totum pondus corporis sustentatum hac parte apprimerebat durum callum subiectis partibus inflammatis & dolentissimis. Quando a vi externa comprimente papillæ nervosæ per cutem disperisæ, una cum vasis suis sanguiferis lymphaticis &c. quibus coronantur, complanantur, nascitur inflammatio, postea consolidantur omnia in corneam duritiem, vocantur tunc clavi: familiari fatiis, nec minus molestum malum, in digitis pedum, & aliquando in aure externa occurrens, ubi plæcæ illæ cartilagineæ nimis premuntur capitis tegumentis; vel quando in unum tantum latus decumbere possunt ægri, ob vulnera, empyema &c. & tunc pulvinari aurem externam assidue apprimunt. Tales clavi sunt veri calli, sed durissimi, & in cute externa cum semper latiores sint, sensum convergant, descendendo infra cutem, hinc ab hac figura nomen habuerunt; & quia partibus vivis nervosis coherent, hinc pressus talis clavus tantum dolorem facit. Tales jam calli a compressionem etiam in internis nasci possunt. Vidi in cadavere puellæ lienem solito plus tumens, appressum ultimæ costæ, habuisse tunicam externam in illo præcise loco callosam & longe crassiorē.

2. A fractis, luxatis, distortis, distractisve partibus duris, comprimentibus vasa flexilia.

Recensentur hoc numero angustationes vasorum per compressionem externam factæ, quæ oritur ex eo, quod partes duræ corporis humani, ossa nempe & cartilagineæ, ex naturali suo situ dimotæ, vasa adjacentia presserint: simul & hic considerantur illæ obstructiones, quæ a ligamentis, ossa necentibus, distortis vel distractis fiunt in vasis, quæ horum ligamentorum substantiam constituunt.

2. **FRACTIS.** Quando os in magna fragmenta solvitur, dicitur fractura, quæ nunquam adesse potest, quin plurima vasa inter ossis lamellas decurrentia compressa, imo destructa sint: periossei vasa necessario ob eandem causam debent comprimi; imprimis si ossis fracti partes ex naturali situ

remotæ fuerint, tunc enim simul omnia vicina vasa comprimunt.

**LUXATIS.** Quando ossis articuli caput ex cavo, in quo movebatur, excidit, luxatio adesse dicitur: sed hoc nequit fieri, quin ligamenta articulationem ambientia ab elapso osse comprimantur, uti & vicina alia quævis adjacentia vasa. Dum caput ossis humeri luxatum in axillæ cavo hæret, sæpe ibi maxima vasa per axillam decurrentia comprimit; unde postea pessima mala, imprimis a magnis truncis nervorum hic decurrentibus compressis.

**DISTORTIS DISTRACISQUE.** Distorsio & distractio proprie in ossibus locum non habet, sed in ligamentis ossa imprimis articulata necentibus. Distorsio autem fit, quando, os

flexus

fibris articulatīs manentibus in suo situ; circumtorquendo quasi magna vis infertur ligamentis hac ossa inter se necientibus: distrahio vero, quando nimia vi, v. g. pondere

ultra vires elevato, elongantur ligamenta articulorum. Facile intelligitur, neutrum fieri posse, quin plurima vasa per ligamentadecurrentia comprimantur & angustentur.

3. Ab omni causa, quæ vasa nimis trahit, & elongat sive tumore, sive pressione partis extra debitum locum posita, sive vi externa trahente.

Non possunt canales flexiles elongari, quin minuat horum canalium cavitates. Hoc ad oculum apparet, dum tubi vitrei ad lampadem flexiles redditī elongantur. In canalibus maioribus, sic elongando angustioribus redditīs, non statim nascetur quidem obstructio, sed dum idem fit in canalibus minimis, qui per ultimas suas angustias singula tantum fluidorum elementa transmittunt, facile apparet obstructionem ab hac causa nasci debere. Dum in

torturis maleficorum ligamenta articulorum ponderibus appensis vel trochleis distrahantur, sequenti die dolor, inflammatio, rubor obstructionem ab hac elongatione vasorum natam satis testantur. Omnes jam tumores, distendendo circumpositas membranas, vasa harum partium elongant: ossa, muscoli, tendines naturali suo situ mota idem efficiunt: omnis vis externa trahendo partes elongans huc pariter referri potest.

4. Ab externis comprimentibus, quo vestes arctæ, fasciæ, pondus incumbentis corporis quieti in unam partem, ligaturæ &c. pertinent, motus attritus, amplexus partis ad alia corpora.

In prioribus numeris recensitæ sunt illæ causæ, quæ vasa angustando obstructionem faciunt quatenus nempe partes corporis mole auctæ, vel ex situ naturali remotæ, vicina vasa comprimunt: simul & recensitæ sunt illæ causæ, quæ elongando vasa illorum capacitatem minuunt. Hoc numero recensentur omnia illa, quæ externam superficiem corporis premendo vasa reddunt angustiora.

**VESTES ARCTÆ.** Per has enim omnia vasa in exterioribus corporis posita comprimuntur; omnium maxime venæ, quia & facilius comprimendæ, & in superficie corporis magis ponuntur: arteriæ vero & fortiores sunt & magis tuto reconduntur. Sed venis sic compressis tanto major copia sanguinis continetur in arteriis: hinc plethoræ effectus nascuntur. Ubi ergo in quadam corporis parte vasa tam debilia sunt, ut a minimo augmento impetus vel copię fluidi rumpantur, vel nimis distenta apertis oculis ultimis in cava corporis loca eruant liquida, quæ naturaliter retinere debuerant, a vestibus nimis arctæ corpori appressis oriuntur sæpe magna mala. Sic Hæmoptoe vel mīstū sanguinis laborantes, ab hac sola causa toties sanguinem apertis vel ruptis vasis effundunt.

In seminis hystericeis, viris Hypochondriacis, Asthmaticis &c. in quibus minima mutatio æquilibrii inter solida & fluida tam enormes effectus facit, tantum illico solamen apparet, dum vestes nimis arctæ solvantur.

**FASCIÆ, LIGATURÆ.** Pro vario adstrictionis gradu diversos habent effectus, leviter enim adstrictæ partes nimis laxas & distentas firmant, sicque fibrarum nimis debiliū defectum suppleunt: si fortius adducantur, vasa angustant, imprimis venas; si adhuc plus stringantur, etiam & arterias: unde sæpe inflammatio, imo ipsa gangræna nascitur. Dum ossa fracta, & reposita in situ, retinere volunt Chirurghi, inter alia auxilia, & fasciis circumductis partem firmant, quæ si arctius adstrictæ fuerint, cum post aliquot horas semper sollet nasci tumor major in parte affecta, inflammatio fit & magnus dolor: si tunc querelas ægri negligant sæpe in his casibus nimis crudeles Chirurghi, subito postea natam gangrænam turpi errore dolent.

**PONDUS INCUMBENTIS &c.** Dum in morbis oritur illa insensibilitas, qua molestias corporis & leves dolores non adeo sentiunt ægri, ut sæpe in morbis acutis fit; vel dum propter acerbissimos dolores podagri-

eos, rheumaticos &c. omnis fere corporis motus prohibetur, tunc totum pondus corporis jacentis premit partes, quibus incumbunt aegri; hinc vasa per has partes decurrant angustantur, imo penitus sic comprimuntur saepe, ut omnis vitalis influxus tollatur; unde gangraena & sphacelus nascuntur. Imprimis autem haec mala oriuntur illis in locis, ubi dura ossa, paucis integumentis tecta, prominent; ut circa scapulas, os sacrum, os coccygis, ossis illi eminentem marginem, trochanteres ossis femoris, calcem &c. omnium frequentissime circa os coccygis, quia dum homo horizontaliter dorso incumbit, lectus semper in medio deprimitur, superius & inferius assurgit, unde totum corporis pondus soli fere ossi coccygis innititur paucissima tecto pinguedine: hinc partes super-

impositae huic ossi hac compressione omni vitali influxu privatæ citissime moriuntur. Unicum remedium est, ut situs aegri saepe mutetur, & nudo corpore mollissimè alutè incumbant.

**MOTUS, ATTRITUS, AMPLEXUS** &c. Quando nempe pars corporis humani duro obstaculo occurrit, necessario comprimuntur vasa flexilia: nec refert, an pars mota occurrat duro resistenti corpori, an vero atteratur ad osclaculum; vel denique amplectendo durum corpus partibus mollioribus idem fiat. Qui non assueti longum iter pedibus faciunt, illos inflammatos habent; qui remis scapham movent insolito labore, manus ob validum amplexum habebunt inflammatas; imo si pergant pertinacius, veticulae fere gangraenosae attolluntur.

§. 113. **C**ontractio vasi propria aucta, maxime spiraliū fibrarum, tum quodque longatū, cavitatem arctat, oriturque. 1. ab omni causa augentem vim elasticam fibræ, canalis, visceris (31. 36. 40. 50. 51.) 2. ab tumore vasculorum minorum, quorum contextu majorum latera & cava fiunt, nimis impletorum. 3. ab imminuta causa vasa extendente, sive inanitio, sive inertia fuerit: unde dissecti canales liquida propria coercent brevi.

Causa proxima omnis obstructionis est tantum ergo, semper eadem & simplex, nempe excessus magnitudinis materię per canalem transmittendę supra capacitatem ejusdem canalis.

Hęc vero causa proxima omnis obstructionis habebat pro suis causis, arctationem canalis, vel incrementum molis in elementis fluidi transmittendi per canalem, vel utrumque simul. Prima causa, qua arctabatur canalis, erat compressio externa, cujus causę ad quatuor classes redactę præcedenti paragrapho enumeratę fuerunt. Sequitur jam illa angustatio canalium, quę fit a vi contractili vasorum aucta.

Vas autem nostris talem inesse vim, qua nituntur proprium augere cavum, extra omne dubium est: per hanc vim enim arterię, dilatatę a sanguine vi cordis impulsio, cessante cordis actione contrahuntur iterum in pristinam dimensionem. Hanc autem vim contractilem augeri posse, pariter certo constat. Dum ex morbis acutis refurgunt aegri, perditio saepe in obesis dimidio pondere corporis, omnia collapsa sunt; manet tamen æquabilis humorum circumductio, quę se-

ri non potest, nisi plena sint vasa: minuta ergo in tanta liquidorum copia, nisi vasa se plus contraxissent, quam antea solebant, non potuissent vasa plena manere. Sed etiam manente eadem liquidi copia videmus saepe in vasis quibusdam subitissime oriri majorem contractilitatem. Dum subitaneo timore homo percellitur, mox tota contrahitur facies, pallent labia, genę, oculi &c. sanguis ruber contractis vasis versus interiora repellitur, & circa cor & pulmones in majoribus alvis collectus stagnat fere; unde intolerabilis anxietas, cordis palpitatio, syncope & pessima alia, sepe tota vita manentia, mala. Constat ergo, vasa nostra vim habere contractilem & illam posse augeri.

Considerandę jam sunt causę præcipuę, quę propriam vasorum contractilitatem augere possunt.

1. Omne illud, quod augeat elasticitatem, facit ut plus resistent fibrę, & vasa ex his composita, distendenti liquido; & cessante causa distendente, majori vi attestent cavitatem suam. Hęc autem causę recensitę sunt numeris hic citatis: unicum suffi-

fufficit hic repetere exemplum. In flabulis bene paffus quiefcat equus, augebitur brevi corporis motus, laxata vafa plus diffenduntur, ubi vero quotidiano exercetur & fatis valido curfu, hirmioribus redditus per exercitia folidis partibus, brevi incipit fubfidere turgens nioles, & aucta fic vaforum contractilitate diffilatur de corpore accumulatum liquidum.

2. Conftat pet obfervata Anatomica hodierna certiffima, quod membranæ, quæ fua convolutione canales majores conflituunt, conflent mirabili vaforum textura. *Ruifchius* ( *Epift. Anaton. Problem. III. Tab. 3. fig. 1. 2. 3.* ) demonftravit fuis injectionibus, arteriarum coronariarum propagines per aortæ membranas difpergi; uti & per ramos majores arteriofos ex aorta mox oriundos. Invenitur & hic tunica cellulo-fa; inveniuntur folliculi præparantes, & emittentes unctiofum illud linimentum, quo interni arteriarum parietes obducuntur: omnia ergo tumorum genera, §. 112. num. 1. recensita, & hic fere locum habere poffunt: arteriæ enim in his membranæ poffunt fieri aneurismatice, vel & inflammatorie diffente; venæ poffunt fieri varicoſæ; loculi poffunt mutari in tumores ampulloſos; vafa lymphatica in phlyctenas & hydatides. Sed evidenter patet, tumentibus vafis has membranas conflituentibus, debere arctari cava canalium, qui ex his membranæ convolutis facti funt. Obſervatum fuit, cervos maſtatos, poſt diuturnum & velociſſimum curſum, habuiſſe totam aortam in externa ſuperficie fere nigranti, ob nimis impleta impulſo ſanguine hæc vafa. Sed non ita facile apparet, quare vis contractilis propria vaſis augeatur a majore tumore vaſculorum membranæ vaſis majoris conflituentium, cum augmentum contractilitatis tantum videatur pendere a majore elafiicitate & fortiori actione fibrarum muſcularium: ſed ſi conſideretur, quod liquidum vi cordis impulſum diſcendens majorem canalem, eadem hac actione urgeat latera ejuſdem canalis, hinc comprimat omnia vafa minora per membranas majores canalis diſperſa, patet, quod ceſſante hac cauſa diſtendende, mox iterum repleantur vaſcula illa, ficque conſpirent, cum contractilitate propria canalium, ut cavum minuant, & hoc ſenſu ſummo imperitorum nimis horum vaſculo-

Tome I.

rum juvat contractilitatem propriam majorem canalium, qui ex illorum contextu funt.

3. Dum cor expellit vi ſua muſculari ſanguinem cavis ſuis contentum in arteriis plenas ſemper naturaliter, ſequitur neceſſario illas debere diſtendi eo uique, ut capere poſſint omnem ſanguinem corde expulſum: hinc cordis ſyſtole eſt cauſa extendens arterias. Sunt ergo tunc arteriæ in ſtatu violento, & ſimulac cor ceſſat impellere, reſurgunt elafiicitate & vi ſua muſculari, ficque cavitatem ſuam arctant; ſed poteſt capacitas arteriarum eſſe major vel minor, licet arteriæ tamen plene ſint: minuta enim liquidi contenti copia plus contrahuntur arteriæ. Binæ ergo cauſæ ſunt, quæ arterias diſtendunt, nempe cordis vis ſanguinem in arterias propellens, & copia ſanguinis in arteriis jam contenti: ſi minuatür cordis vis, inertia totius circulationis adeſt; ſi minuatür copia liquidi diſtendens, inanitio peccat. Utroque in caſu vis diſtendens vaſa minuitur: ſed canalium omnium capacitas pendeat a binis cauſis contrariis, nempe ab impetu & copia liquidi per vaſa moti, & a vi contractili laterum reſiſtente cauſis diſtendentiſſimis; ſimulac ergo cauſæ diſtendentes minuantur, vis contractilis majorem effectum habet; id eſt, anguſtiantur vaſa. Hinc poſt mortem propria contractilitate, per frigus aucta, ceſſante cordis vi diſtendente, arteriæ funt anguſtiſſimæ, & omnem ſanguinem ſuum ſeſe exprimunt in venas facilius dilatabiles. Vix credi poſſet, quantum contrahi poſſint vaſa corporis, dum cauſæ diſtendentes ceſſant, vel minuantur multum. Dum Cholera furibundo impetu fuſum & deorſum evacuantur humores tanta copia, mox ſic contrahuntur vaſa, ut pulſus vix poſſit ſentiri; vena anrea conſpicue evaneſcant penitus; facies contracta penitus ſic mutetur, ut vel ab amicis poſt paucas horas vix agnoſcantur tales ægri. Uterus in gravidis adeo diſtenditur, excuſſo ſcitu & ſecundinis, quam cito contrahitur, quam arctum habet poſt paucas ſeptimanas cavum? Plura talia poſſent adduci, hæc pro Exemplo ſufficiant.

UNDE DISSECTI CANALES LIQUIDA PROPRIA COERCENT BREVI. Ratio ſatis evidens eſt: dum ſanguis cordis vi pellitur in arterias, quo major eſt reſiſtentia circa fines arteriarum, eo plus dilatant arterias;

H 3

ſed

sed ubi arteria discissa est, resistentia nulla fere est, & libere effluit per apertum vulnus sanguis; hinc non distenditur arteria, sed propria contractilitate sensim plus contrahitur, donec tandem exitum liquidi

effluxuri impediat omnino. Hinc dimidia discissa vasa pertinacissimam sæpe Hæmorrhagiam faciunt, quæ curatur felicissime, si integre discindantur, ut in Vulnærum historia postea dicitur.

§. 114. **A** Ugetur crassities in ipsa membrana vasis. 1. ab omni tumore ( 112. Num. 1. ) orto in iis vasis, quæ unita & contexta membranam efficiunt. 2. ab callis ibidem factis, cartilagineis, membranosis, ossis ( 51. )

1. De hoc dictum fuit §. 112. n. 1. & §. 113. n. 2.

2. Demonstratum fuit §. 39. quomodo per ipsius vitæ actuositatem minima vasa plurima, liquido expulso, contiguis factis lateribus, concrecant; & imprimis ab hac causa debitum robur in solidis partibus nasci. In tenella ætate omnia vasa debilissima cedebant facile distendenti fluido, elongabantur pariter: hinc eo majus incrementum, quo origini suæ propior homo est. In adulto homine major requirebatur firmitas corporis, & a concretis plurimis vasibus minoribus, majus robur accedebat firmitatibus, & vera nascebatur in multis partibus callositas; eo semper major, quo vita actuosior & diuturnior fuerat: hinc in decrepita senectute, vel per nimios labores, tandem nimia nascebatur rigiditas. Ut autem maneant functionum integritas, requiritur debita flexibilitas in vasibus, ut cedere possint impulsibus liquidis; per callositatem nimiam flexibilitas vasorum minuitur,

& membranae per callum factum reddiæ crassiores arctant cavum vasis quod constituunt. Observata Medica jam docuerunt in maxime longævis, in cartilaginem, imo & ossi, duritiem transire majores arterias. In Actis Anglicanis habetur, quod in cadavere senis centum & triginta annorum invenerint Aortam & Iliacas arterias pro maxima parte cartilagineas ( *Vide & Acta Lipsiens. anni 1709. pag. 219.* ) In longævo, & validissimis cursibus exercitato animali ( *Cervo* ) arterias in basi cordis toties osses invenerunt, quæ tunc in officinis *Os de corde cervi* vocantur. Verum tale os in media carne musculofo cordis humani inventum, quod quatuor pollices cum dimidio longitudine æquabat, latitudine vero pollicem, cum tamen vasa majora cordis minime osses forent, tantum subcartilaginea; nec poterat ultimæ senectutis vitio adscribi hoc malum, cum observatum fuerit in cadavere viri 72. annos nati ( *Academ. des Sciences Hist. pag. 3. P. an. 1726.* )

§. 115. **P** artium fluentium moles augetur, ut immeabilis fiat, vel 1. mutatione figuræ sphericæ in aliam majori superficie incurrentem in aperturam vasculi; vel 2. adunatis pluribus prius sejunctis in unam massulam.

Petractatis causis illis obstructionis, quæ arctando vasorum cavitatem viam præcludunt liquido transfluxuro, sequitur ut considerentur illæ mutationes fluidorum, per quas evadunt inepta, ut fluant per illas vasorum angustias; per quas in sanitate naturaliter fluere debant.

1. In sanguine hominis sani, projecto ex cordis cavis in arterias, hærent tot diversæ magnitudinis partes, quot sunt in corpore distinctæ vasorum series: per singulas enim vasorum decrecentis amplitudinis series proportionales fluunt molecule fluidi. Hoc quam maxime necessarium erat, ut omnia vasa manerent impleta: nisi enim in sanguine rubro forent tam magnæ par-

ticule, quæ tantum possent transire per ultimas angustias arteriæ sanguinem rubrum continentis; excluderentur vero ab omni vase, cujus diameter minor erat ultimo fine arteriæ rubræ; omnis sanguis dilaberetur ex vasibus maximis; idem jam in reliquis vasibus decrecentis magnitudinis obtinet. Microscopia jam docuerunt, partes minimas visibiles liquidorum circulantium sphericas esse, & singulas fere tantum per ultimas vasorum angustias transire, & sæpe adhuc cum quadam difficultate: sed ubi molecule liquidi sphericæ figuræ, maximo suo circulo applicata cavo vasi, potest transire, tunc patet evidenter, quod in quacunque alia posita æquali facilitate permeare



menare poterit. Hæc autem proprietas soli figuræ sphaericæ peculiaris est: si enim cylindricam v. g. figuram haberet talis molecula, tunc, si basi suæ applicaretur vasis aperturæ, transiret, si alio situ incurreret, penetrare non posset; hoc solidissime demonstravit *Pitæcarne* in suis opusculis (*Deferat. de circular. sang. per vasa minima* pag. 25. 26.) Ubi ergo a quacumque causa molecularum fluida nostra constituentium figura sphaericæ mutatur, tunc possibilitas æquabilis transmissionis per vasa tollitur: cum enim per cordis & arteriarum motum reciprocum cuilibet sanguinis particulæ omni momento concilietur alius motus, & alia positura; requirebatur ad æquabilem motum per vasa talis molecularum sanguinis figura, ut in quocumque situ transire posset per ultimas vasorum angustias; sed hoc in sola figura sphaericæ obtinet.

2. Per ultimas angustias arteriæ rubræ solitarius robri sanguinis globus transire potest, si iam vicini sanguinis globuli a quacumque demum causa concreverint plures in unam massam, orificium canalıs, quod singulos transmittere poterat, adunatis obstruatur: maximam autem proclivitatem esse in sanguinis partibus, ut concreverint, patet inde, quod extra vasa corporis, vel & in vasis, modo quiescat, sanguis citissime coagulatur.

§. 116. **M**Utatur figura: inprimis, desinente æquabili, & undique simul, atque æqualiter, premente moleculæ, proprio elateri jam commissæ, hoc est est, languente motu, vel laxato vase, vel minuta copia liquidi.

Dum sanguis ex cordis cavis in arterias plenas projicitur, magna fit compressio omnium partium sanguinis in arteriis contenti, cessante cordis actione, arteriæ contracta iterum valida vi premunt contentum fluidum: hinc omnes moleculæ sanguinis actione cordis, & arteriarum compressione condensantur. Ob. hanc causam eo densior sanguis fit, quo validiores fuerint cordis & arteriarum vires: ideoque in robustis exercitatis hominibus densus solidus sanguis, in debilibus longe tenuior, nec adeo concretens, invenitur. Dum paucis post partum horis homini sano sanguis mittitur, sæpe magna copia chyli reperitur supernatans sanguini: ergo: levior sanguine chylus est: sed postquam idem ille chylus per octodecim horas, imo & minori tem-

Sed præterea videtur aliud virium obtinere posse, quo impediuntur fluidorum moleculæ transire per ultimas vasorum angustias, si nempe manente eadem massa corporea expandentur in majus volumen. Constat experimentis physicis calore augeri, frigore minui corporum volumina: si jam vel a calore, vel alia quacumque causa, moleculæ fluidorum expandentur in majorem superficiem, manente eadem massa corporea, tunc non possent penetrare ultimas suorum vasorum angustias: sed vix videtur moleculæ fluidi sic expansæ resistere posse condensationi, quæ per actionem vasorum, comprimentium has moleculas, imprimis circa ultimas vasorum angustias fit; ibi enim singulæ fere vasorum lateribus contigunt prementur fortiter & condensantur: chylus enim, sanguine rarior, actione vasorum in sanguinem densiorem mutatur. Ob hanc rationem Celeberrimus horum Aphorismorum Auctor rarefactionem molecularum inter causas obstructionum non recensuit.

Fuit præterea quorundam opinio, ac si crassiora ingesta sanguini mista, obstructionem facere possent. Sed videtur ob stare absorbentium vasorum in tota corporis externa & interna superficie tenuitas: & quod omnem peregrinum sanguinem ingrediens statim cogatur transire per pulmonalium vasorum angustias.

pore, cum sanguine fluxit, actione vasorum in serum & sanguinem muratus, longè majorem acquisivit soliditatem: actio ergo vasorum condensat liquidorum particulas. Sed quando per microscopium lustrantur pellucidæ vivorum animalium partes, apparet, globosa fluidorum elementa per ultimas vasorum angustias quadam cum difficultate aliquando transiri, & in oblongam cylindricam figuram mutari; superatis vero his angustijs, propria elasticitate pristinam recuperare figuram: unde apparet, illas moleculas fluidorum elasticas esse, hinc, ubi a compressione vasorum liberantur, expandi in majorem molem. Sed quemam sunt illæ causæ, quæ sanguinis elementa, quantum oculis etiam armatis patet, sphaerica efficiunt? si considerare-

tur, valida cordis vi sanguinem pelli in vas conicum, reciproce ampliatur, & arteriarum, incurvarum statim ubi ex corde egreditur; apparet facile, nullam sanguinis particulam eandem motus directionem servare per bina momenta successiva: hinc omnes partes continuo ad se mutuo atteri; quidquid ergo angulosi emereret in tali elemento sanguinis, totam verriginem vicinorum sustinebit, & abradetur, vel complauabitur. Accedit præterea, quod ultimæ arteriarum angustiaë circulem sectionem habeant; hinc & hanc figuram possent conciliare utcumque flexilibus. Sic cera molli, vel argilla, inter manus rotando sphericam figuram acquirit. Si ergo causæ illæ, quæ æquabili pressione figuram illam sphericam fecerant, & factam conservabant, cessant agere; elasticæ molecule resiliunt & ab hac figura recedunt.

Sed hoc imprimis fit a sequentibus, nempe **LANGUENTE MOTU** cordis & arteriarum, quacumque demum de causâ hoc fiat. Ex modo dictis ratio patet, & observata certa facti veritatem demonstrant. Pallido morbo laborantes virgines languidissimam habent circulationem; hinc omnia torpent: & cum functionum integritas ab expedito transitu fluidorum per vasa pendeat, hinc omnes actiones vitales, animales, naturales vel abolitæ sunt, vel læsæ; sanguis, a debita soliditate recedens, aquosus tenuis fit, vel & iners lentusque, glutinosa tenacitate inmeabilis: dum vero per ferrum & exercitia corporis vasorum in fluida actio augetur, reddit color ruber, & debita sanguinis densitas. In similibus vero morbis

longe pertinaciores fierent obstructions, nisi laxa simul vasa facile cederent.

**LAXATO VASE.** Omnis enim actio vasorum in fluida consistit tantum in illo nixu, quo vasa ab impulso vi cordis liquido distenta conantur se contrahere in minus spatium; uti jam sæpius dictum & demonstratum fuit in præcedentibus: sed laxitate minuitur vasorum robur; ergo & minuuntur omnes effectus, qui a vasorum debito robore pendunt.

**VEL MINUTA COPIA LIQUIDI.** Patebit hoc evidenter, si considerentur sequentia: cor sua vi pellit sanguinem in arterias; resiliunt sanguini a corde expulso arteriarum plenitudo, elasticitas, & convergentes fines arteriarum: hinc sanguis per vim a corde datam fluit per arterias tali celeritate, cujus exponens est excessus virium cordis supra aggregatum resistentiarum: sed jam omnium resistentiarum aggregatum potest considerari tanquam potentia pellens a vertice Arteriæ conice basim versus: vis autem cordis agit contraria directione a basi versus verticem; hinc omnes partes sanguinis sunt quasi inter duo plana paralela prementia, unde summa, & simul æqualissima compressio. Si jam vasorum minuatur plenitudo, quæ inter causas resistentes cordi numeratur, minuitur necessario compressio partium sanguinis, a qua pendebat major soliditas harum. Accedit quod minuta liquidi copia minus distendantur vasa; hinc minus reagant in fluida contenta. Probatur etiam fuit §. 25. n. 1. & §. 42. n. 3. a minuta copia liquidi debilitari solidarum partium compagem.

§. 117. **A** Dunantur molecule, quiete, frigore, gelu, exsiccatione, calore, motu circulari violento, & vase forti comprimente, coagulo acido, austero, spirituosu, absorbente, viscositate, oleositate.

Bina recensentur causæ §. 115. quibus liquidorum molecule sic auferuntur, ut fierent immeabiles; nempe mutata figura, de qua actum fuit paragrapho præcedenti; & ubi plures particule, antea separate, nunc adunatæ cohererent inter se: causæ illæ jam enumerantur in hac paragrapho per quas hæc adunatio fit.

**QUIETE.** Causa fluiditatis in ipso sanguine non hæret: sani enim & robustissimi hominis de naso stillans sanguis, purissimo vase exceptus, mox concrevit in placen-

tam solidam, requiritur ergo alia causa, quæ sanguinem tam facile concrecentem fluidum servet, sed hæc causa est motus sanguinis continuus per vasa; simulac ille cessat, statim fiunt sanguinis coagula. Hinc syncopem frequentius passis toties insaniabilis palpitatio cordis, a sanguine in majoribus alveis circa cor & in ipsis cordis cavis stagnante, & concreto in polyposas massas, non resolvendas postea. Ideo post mortem etiam in sanissimis ante mortem animalibus concretæ tales massæ circa cor

&

& in majoribus vasis apparent. Quo fortior jam, & robustior homo est, eo majus periculum concretionis est, si a quacunque causa sanguis in vasis quiescat: ideoque debilibus puellis non adeo periculosa sunt animi deliquia minimis saepe causis tam frequenter orta, quia illarum sanguis nimis dissolutus vix, vel saltem tardissime, concrevit, quamvis immorus hæreat.

**FRIGORE, GELU.** Dum aperta vena effluit sanguis, & parissimum vase excipitur, post tria vel quatuor minuta coit totus in massam solidam, undique accretam plerumque laceribus vasis, quo continetur: si vero glaciali sub frigore idem teneretur experimentum, citius longe concrevit, & congelatur, tuncque serum inde non exprimitur. Non adeo facile autem determinari potest, quo frigoris gradu sanguis congeletur, cum tunc cito ex sua natura concrevit, etiam in aere calido; sed serum sanguinis circiter 28. gradu thermometri Fahrenheitiani concrevit in glaciem; hinc majus requirit frigus quam aqua, forte quia serum sanguinis salubus dives est. Sufficit ad hunc locum, quod frigus auctum sanguinem citius concretere faciat: Ideoque in syncope delapsi si tam diu hæserint, ut corpus penitus perfrigerit, tunc & a quiete & a frigore simul conspirantibus irresolubiles nascuntur circa vasa majora & cor Polypi.

**EXSICCATIONE.** Quando a quacunque causa subtilissima liquidorum pars distillatur, reliqua crassiora concrevunt facilius. Nisi doceant experientia, quis crederet, subtilissimum rorem arteriarum, ultimis finibus exhalantem in cavis narium, & pulmone, dissipata parte liquidissima, in tenacem adeo posse abire mucum, imo in coriaceas lemas mutari posse? nucus enim naturaliter obliquis his partes non fecerunt talis, sed ex limpidissimo humore stagnando nascitur. Dum conclamari Phisici nocturnis distillant furoribus, sanguis, diluente vehiculo orbis, circa cutanea minima vascula incipit hædere, & pustulas inflammatorias facit. Ideo sudorem, in morborum acutorum principio ortum, damnavit Hippocrates in *Prophetico*, & *Coacis Pnenotionibus*. Quia post mortem contractæ elasticitate & frigore arteriæ expellant liquidissima in venas, ideo sanguis plerumque in arteriis concretus apparet, non adeo in venis.

**CALORE.** Serum sanguinis fluidissimum ab aqua ebulliente coagulatur in scissilem massam: & in morbis, dum calor insurgit multum ultra gradum caloris hominis sani, statim incipit disponi sanguis ad concretionem: hinc respiratio tunc incipit esse difficilis & anhelosa, & cerebri actiones læduntur, quia per subtilissima illa vasa sanguis, jam fere concrevens, transire nequit: accedit simul, quod per calorem auctum subtilissima distillantur de corpore.

**MOTU CIRCULARI VIOLENTO, & VASE FORTI COMPRIMENTE.** Quo debilius est circulatorio, eo dilutior & tenuior sanguis est; ut patet in debilibus puellis, quo validior motus humorum per vasa, eo spissior & magis concrevens sanguis; patet in duro labore exercitatis hominibus. Dum in variolis primo die morbi sanguis mittitur, apparet satis bonus; si tercio vel quarto die educatur sanguis, jam inflammatoriam illam crustam habet, quia per febrem acuram dissipatis liquidissimis, plus compactis crassioribus partibus, incipit nasci maior cohesio inter moleculas sanguinis: quamdum enim plurimum tenuioris liquidi inter moleculas crassiores interponitur, pressio vasorum non mutabit illarum figuram; sed si distillato tenuiori liquido, moleculæ sanguinis crassiores, sibi contiguae factæ, valida actione vasorum comprimuntur, mutabitur figura sphaerica, & pluribus punctis se mutuo contingunt, & concrevunt. Dum aurem robusta & firma vasa magna vi premunt contenta fluida, subtilissima exprimuntur, crassiores partes reliquæ compressione hac adunantur.

**COAGULO ACIDO.** Non omnia acida sanguinem coagulant: vina enim acidula, acetum, succi acidorum maturorum fructuum, lac ebutyratum &c. porius dissolvunt: sed acida fossilia, ex sale marino, nitro &c. parata, sanguini inducunt coagulum. Dum vivi animalis venis hæc acida injiciuntur, mox sanguis in crassos thrombos concrevit, qui per venas, sensim ampliores factas, ad dextrum cor delati, mox in pulmonem pulsus, anxietatem summam excitant, & paulo post mortem. Interim tamen bibulorum vasorum oscula non facile hæc acida acerrima admittunt; mox contracta etiam a longe levioribus stimulis. Dum atra bilis, aliquando tam acidula, ut instar aquæ stygiæ pavimentum rodât, erosio vasis sanguini miscetur, subtilissima sæpe mors a coagulato sanguine oritur.

**AUSTERO.** Talia sunt imprimis alumen, & vitriolorum species variae, quæ fortissima coagula producunt.

**SPIRITUOSO.** Notum est in Chirurgicis, alcohol applicatum vasis dissicis validissimas hæmorrhagias sistere, coagulo sanguini inducto. Ipsum serum sanguinis ab alcohole assufo induratur ilico. Hinc apparet, quantis se exponant malis, qui spiritibus illis fermentatis adeo abutuntur. Alia occasione (§. 28. n. 4.) recensetur mirum exemplum, quod nempe in ebriola muliere omnia fere viscera invenirentur scirrhusa, & indurata.

**ABSORBENTE.** Sunt quedam corpora bibula, quæ omnem humorem proximum vi quadam trahunt in se; sic gypsum, calx viva, ossa animalium diu exulta, terræ argillaceæ valido igne excoctæ, omne liquidum, quod attingere possunt, imbibunt. Talia si miscerentur nostris humoribus tenuissima absorbendo facerent reliqua concrefcere. Rarius autem autem hæc integris viribus san-

guini miscerentur; prius enim occurrit liquidis, quibus saturantur; sed tamen in primis viis pessima inde mala fieri posse, imo mortem ipsam, testantur historię. Plinius (*Lib. XXXVI. cap. 24.*) narrat, C. Proculeium in maximo stomachi dolore, gypsum potu, sibi mortem conscivisse. Strangulando suffocare gypsum potum monet Dioscorides (*Lib. 5. cap. 134.*)

**VISCOSITATE.** Quomodo inde nasci possint obstructiones, explicatum fuit in *Capitulo de morbis a glutinosis spontanea*, & imprimis ibidem §. 72.

**OLEOSITATE.** Quando in obesitas per validissimos motus, calorem aeris intensum, vel febres acutas, soluta pinguedo sanguini affunditur, sæpe subita mors fit; quia illud oleum minima vascula suo lentore obstruit, & impedit, quo minus alia liquida per minima vascula transeant; unde sæpe subito lethalis peripneumonia nascitur, obstructis sic pulmonalis arterię angustius.

§. 118. **E** Rrore loci partes fluidi sunt non meabiles, si in os dilatatum ad basin canalıs conici ruit corpusculum finem longe angustiores tranare non potens. Plethora, motus auctus, rarefactio liquidi, laxatio vasis, dilatationem hanc præ cæteris creant; maxime si his progressis, statim contraria horum sequuntur.

Hæcenus enarrata sunt obstructionis causæ, quæ vel vasis cavum arctent, vel liquidis per vasa fluentibus concilient immedietatem, per mutam figuram molecularum fluidi, vel adunationem earundem. Sequitur jam alia obstructionis causa, ubi vasis debitam amplitudinem retinentibus, saltem non arctioribus redditis, fluidisque manentibus iisdem in omnibus suis dotibus, tamen obstructio nascitur: dum nempe crassiores fluidorum moleculæ dilatata oscula minorum vasorum ingrediuntur, per quorum ultimos fines transire nequeunt; atque hærent tunc immedietas fluidorum particulæ in vasis alienis: hinc tantum peccant loci mutatione, unde hæc causa obstructio vocatur *Error loci*.

De hac obstructionum causa non adeo frequens mentio fit apud Auctores, quamvis in morbis acutis frequentissima mortis causa sit. Apud Veteres, circulationis sanguinis ignarus, obscure satis in quibusdam locis adumbratur hoc vitium. Dum phlegmones naturam describit Galenus, (*Method. Med. Lib. X. cap. 6. Tom. X. pag. 233.*) dicit: *spum. sanguis calidus copiosior ipa aliquant. avi-*

*malis partem, procubuit, majora ejus vasa protinus distenduntur; que plenitudinem non ferunt, ab his deinceps, que minora sunt. Mox, ubi nec in iis satis continentur, excludat foras in illa ampla spatia, que inter vasa sunt, sic ut etiam omnia, que in composita carne habentur, tota occupet.* Unde concludi potest, quod in phlegmone sanguis aliena loca ingreditur.

Ut autem evidenter pateat, quomodo per errorem loci nascatur obstructio, sequentia merentur expendi.

Pars maxima in sanguine est globus ruber, qui naturaliter tantum in vasis maximis hæret; ultimæ jam angustię arteriarum, rubrum sanguinem vehentium, unicum tantum globum rubrum talem transmittunt, & sæpe adhuc cum quadam molestia; ut patuit, dum in vivorum animalium pelliculis partibus per microscopia observabatur circulatio; omnia remuoria ex arteriis rubrum sanguinem vehentibus, per lateralia vasa minora, ex his arteriis orta, elabuntur; solum crassissimum rubrum per ultimas angustias arterię rubrę transiens venam rubram ingreditur: proximum magnitudinē

tudine vas post arteriam rubram omnia liquida recipit ; excludit tantum sanguinem rubrum , & in hoc vase retinebitur etiam crassissima pars liquidi , per illud transeuntis , nempe globus serofus : reliqua tenuiora per minora vasa , ex arteria serosa orta transibunt . Sicque ex analogia credere licet , similem legem in reliquis decrefcentium vasorum seriebus obtinere . Per singula ergo diversæ magnitudinis vasa fluunt quædam particule tam magnæ , ut minora vasa ingredi non possint ; & hæ particule constituent naturæ & proprium singulis vasorum seriebus liquidum . Sic maximum vas transmittere potest omnes humores : minora autem vasa tantum transmittunt omnia fluida tenuiora una cum suo liquido naturali , unde nomen habent : arteriæ enim rubræ omnes humores recipere & transmittere possunt , arteriæ serosæ rubram partem sanguinis excludunt , transmittunt autem globos serofos & omnia his tenuiora fluida . Arteriæ jam rubræ ultimus finis , ubi in venam rubram transit , debet habere maiorem amplitudinem , quam arteria serosa ex arteria rubra orta ; aliter enim sanguis ruber non maneret in suis vasis , sed arterias serosas ingrederetur ; unde minima arteria rubra vasorum maximorum minimum est , sed vasorum minimorum maximum .

Si jam a quacunque causa augeatur diameter vasculi lateralis ex maiori vase orti , v.g. si major fiat apertura arteriæ serosæ ex arteria rubra orta , poterit globus ruber dilatatum principium arteriæ serosæ ingredi ; sed in canali conico , aucta semper angustia , brevi hærebit , & nullo modo per ultimos fines arteriæ serosæ transire poterit : nata ergo erit obstructio , cum moles particule transfluxuræ capacitate vasis transmittentis excedat . Hoc vitium jam obtinere potest in omnibus locis , in quibus vasa minora ex maioribus derivantur ; & potest fieri a torpesci materia , quæplex est numerus decrefcentium magnitudine particularum in sanguine ; excepto subtilissimo totius corporis fluido , quod per omnium minima vasa fluit : illud enim nunquam poterit errore loci ullum vas obstruere .

Causæ autem , quæ vasorum capacitatem augent , imprimis sunt sequentes .

**PLETHORA .** Dum nimia copia boni sanguinis in corpore adest , omnia vasa rubrum sanguinem gerentia turgent : hinc illa , mo-

le aucta , comprimunt adjacencia tenuiora vasa : sed dum arteria rubra nimio sanguine impleta distenditur , distrahuntur latera hujus vasis ; hinc oscula minorum vasorum , ex lateribus arteriæ rubræ ortorum , ab eadem causa fiunt ampliora , & admittunt crassiores partes , quam naturaliter capere debent . Ideo videmus , adnatam tunicam oculorum , quæ naturaliter sanguinea vasa rubra non habet , adeo sæpe rubere in plethoricis .

**MOTUS AUCTUS .** Quomodo per motum auctum fiat major amplitudo ad vasorum initia , & liquida crassiora impellantur in vasa tenuiora , explicatum fuit §. 100.

**RAREFACTIO LIQUIDI .** Si per calorem auctum , vel aliam quamcumque causam possibilem , augeatur liquidis vasis contenti volumen , manente eadem massa corporea , debebit vas continens dilatari : ergo vas dilatatum poterit admittere crassiores partes , quam quæ naturaliter per hoc vas fluebant . Dum foco quis assidet , partes externæ per calorem tumebunt , rubebunt magis , quam naturaliter solebant .

**LAXATIO VASIS &c.** Amplitudo vasorum pendet a binis sibi invicem oppositis causis . Liquidum vi cordis impulsum nititur dilatate canales , qui suarum fibrarum robore resistunt impulso liquido : si binæ hæ vires forent æquales , canales manerent in eadem amplitudine ; si vero prævaleat impetus impulsu liquidu , dilatabitur capalis , & quidem eo plus , quo major est excessus virium impulsu liquidu supra resistentiam laterum canalium . Si ergo , laxato vase , minuat resistentia laterum , impulsu liquidum magis dilatabit canales ; & molecule fluidi poterunt ingredi canales dilatatos , quæ antea excluderentur . Dum pars corporis diu exponitur vaporu aque tepide , tumebit , & rubebit , sanguine rubro nunc ingresso vasa minora dilatata . Ab hac causa toties adnata oculorum tunica , facillime dilatandis vasis constans , rubet ; cum naturaliter ejus vasa sanguinem rubrum non habeant . Hinc austriana calida tempestate & humida sine ventis , inter morbos populares recenset & ophthalmias Hippocrates ( *Epidem.* 3. *Tom.* IX. pag. 261. ) ; ab hac causa , ut videtur , imprimis ortas : nihil enim magis laxa reddit corpora , quam talis aeris constitutio .

**MAXIME SI HIS PRÆGRESSIS STATIM CONTRARIA MORUM SEQUANTUR .** Dum va-

lido

lido corporis motu quis calefcit, aucto sanguinis impetu & velocitate, dilatata vasa accreverunt alienos humores; hinc totum corpus in cure externa adeo ruber post validum cursum: si tunc in calido aere, bene tepto corpore, quiescant, niuuta celeritate sanguinis per vasa moti, incipiunt proprio robore praefata omnia se plus contrahere, & repellere crassiora impuissa in vasa laiora; redeuntque sensim omnia in pristinum statum: si vero aestuanti sic corpori frigida adspiret anra, gelidusve astatim biharur potus, quanta mala! Subito enim frigore constricta vasa crassiora fluida, quae ingressa fuerant, retinent, nec possunt haec retenta per angustissimos fines transire; unde facillime inflammationes, & morbi saepe subtilissime lethales sunt. Quoties hoc occurrit in praxi, quod, aestivis caloribus & labore

valido natam sitim dum gelido potu avidissime haussit expleat Rustici, saepe subito moriantur; vel sic muratum habeant in omnibus functionibus corpus, ut nihil sere de pristina sanitate superis? Dum pulvere ac ludore perfusus, in calidissima regione, fervidissimo dei tempore Alexander Cydnum amnem ingreditur, ut corpus ablueret; vix ingressi subito horrore artus rigere ceperunt, pallor deinde suffusus est, & totum propemodum corpus vitulis calor reliquit. *Exspiranti similem Min'istri manu excipiunt, nec satis compositi mentis in tabernaculum deferunt.* (*Q. Curtii Lib. II. cap. 5.*) Tam subito in valido, juvenili, & bellicis laboribus durato corpore prosternebantur omnes vires: sanissimum antea gravissimum mox opprimebat morbus; a quo Philippi Medici fide & peritia vix evasit.

### §. 119. U Nde cause, & natura obstructionis cujuscunque potent.

Natura obstructionis tantum consistit in impedito transfluxu fluidi per vas: & omnes cause fuerunt recentiores, quae agebant arctando vasa, vel inspissando liquida, vel & utrumque simul efficiebant.

Sed adhuc dubium videtur, an quidem obstructio nasci possit in omnibus vasibus: certum est in vasibus conicis, per quae liquida feruntur directione motus tendente a basi versus apicem, posse fieri obstructionem: fluidi enim particulae omni momento occurrunt angustiori sectioni coni; hinc, quae circa basim libere penetrabant, poterunt in ultimis angustis convergentis canalis facile haerere: tuncque liquidum a tergo urgens immanabilem moleculam angustioiem semper locum versus premit, sicque obstructionem augeat. In canalibus cylindricis, sive, ut Pitcairnus dicit, quorum latera paralela sunt lineae motus, poterit forte nasci obstructio, sed non ita facile; omnes enim fluidorum particulae, quae semel potuerunt ingredi talem canalē, poterunt & transire, cum ubique sit aequalis amplitudo. Possent tamen moleculae fluidorum saepe fuisse rarefactione v.g. majores, & hinc difficilius transire: sed a tergo urgens liquidum videtur hanc resistētiā facile superare debere. Verum est, quod concipi posset, moleculam, aptam transire per canalē cylindricum, aucto volumine, vel adunatam aliis disten-

dere partem vasibus cylindricis flexilibus ubi haeret, & sic obstruere; sed tunc non amplius manet cylindricus ille canalis: non haberet enim tunc aequalem ubique amplitudinem, & obstruens illud ibi haerens pelleretur directione motus ex majori amplitudine in minus spatium: & tunc idem obtineret, quod in arteriis fieri modo dictum est.

In venis autem, in quibus directio motus a vertice conici canalis versus basim tendit, obstructio locum non videtur habere posse, nisi ab externa compressione vasibus: quidquid enim angustum verticis orificium transivit, facile reliquis sectionibus canalis, semper ampliores, pervadere poterit, & adunatae licet supponantur fluidi moleculae, cum non suslineantur lateribus divergentibus venarum, facillime abripiuntur impetu subsequenti liquidi: uti demonstrevit in suis dissertationibus Pitcairnus (*Dissert. de Circulatione san'is in Animalibus genitis & non genitis pag. 107. 108. 109.*).

Sed & experimenta in vivis animalibus facia hanc rem demonstrant. Dum venae crurali canis immixti alcohol, sanguis statim in thrombos coagulatur deferrebat tamen per totam longitudinem venae ad cor dextrum; ex hoc vero in pulmones pulsi thrombi haerebant statim; summa nascebatur anxietas; conabatur summo tepitationis molimine animal superare has angustias; moriebatur brevi.

vi. Dum a tam valido coagulante non oriebatur obstructio in venis, a levioribus causis multo minus hoc fiet.

Hinc in canalibus, per quos vitæ tempore perpetuo motu feruntur liquida, non videtur nasci posse obstructio, nisi directio motus sit a latiori amplitudine versus majores angustias.

Nec obstat, quod ductus hepaticus & communis, ad venæ naturam accedens, obstruitur sæpius, licet ex angustis fistulis in latiorē ductum hepatis fabrica secretus liquor deferatur: nam ductus communis intestini duodeni exteriorē tunicam penetrans,

inter hanc & alteram descendit, mox perforata & hac, inter secundam & tertiam longo-satis itinere progreditur, tuncque tandem in cavum intestini patulo osculo hiat. Hinc plurimæ possent esse causæ, quæ ultimum illud osculum arctant, vel & penitus occludunt; sicque liberum bilis iter impediunt, quæ tunc stagnans concretescere poterit; uti observata Anatomica docuerunt.

In majoribus autem alveis & sinibus, in quibus sanguis venosus colligitur, & hæere potest, nasci posse concreciones polyposas, & inde obstructiones, certo constat.

§. 120. **Q**Uæ nata in corpore vivo impedit transitum fluxuræ materiæ; reliquæ impingentia sistit; horum actionem excipit; subtiliora exprimit; adunat crassiora; vas extendit, dilatat, attenuat, solvit; fluidum stagnans condensat; functionem integro fluore oriundam tollit; vasa inde irriganda deplet, siccat; capacitatem vasorum transmittendis liquidis minuit; copiam liquidi, velocitatemque per libera vasa augeat; adeoque omnia, quæ inde pendere possunt, mala producit.

Explicatis jam causis & natura obstructionis, expendi debent illa omnia, quæ ex obstructione ut causa sequuntur.

QUÆ NATÀ IN CORPORE VIVO IMPEDIT TRANSITUM FLUXURÆ MATERIÆ. In cadavere enim, ubi nullus motus liquorum per vasa superest, non nocebit obstructio: & ex ipsa definitione obstructionis §. 107. hoc evidenter patet; tunc enim dicebatur adesse obstructio, quando transitus liquidi per canalē tolleretur, a quacumque demum causa fieret.

RELIQUA IMPINGENTIA SISTIT, HORUM ACTIONEM EXCIPIT. Dum vivimus, jugi motu fluida per vasa feruntur, & quidem satis magno impetu; nam, uti alia occasione dictum fuit, digito pedis abscisso per apertas arterias ad binorum pedum & ultra distantiam expellebatur sanguis: dum ergo canalis obstructus est, liquidum vi cordis & arteriarum urgetur in locum obstructum illa quantitate motus, qua poruisset ad extrema corporis usque tanta adhuc cum celeritate pervenire, & singulis contractionibus cordis & arteriarum renovatur hæc vis agens in locum obstructum: cumque illud immeabile obstruens hæreat in canali conico, per quem liquidum a basi versus verticem pellitur, omni momento protruditur versus angustiorē locum: hinc omne liquidum impingens sistitur ad locum canalis obstructum, & materia obstruens immobilis hærens omnem

impetum liquidi a tergo urgentis sustinere debet.

SURTILIORA EXPRIMIT, ADUNAT CRASSIORA. Obstructio raro locum habet, (nisi a compressu externo vel errore loci facta fuerit), præterquam in ultimis vasorum angustis: hinc si v.g. sanguinis rubri globuli circa ultimos fines arteriæ rubræ immeabiles hæreant, quid fiet? Sanguis habet in se plurima minoribus moleculis constantia fluida, & omnis canalis major habet ramos laterales minores, per quos fluidissima transire possunt, crassiores vero partes minime; hinc dum vis cordis & arteriarum sanguinem pellunt in locum obstructum, necessario fluidissima, inter duo quasi prælia opposita pressa, transibunt in canales laterales minores, sola crassiora manebunt, apprimuntur contra locum obstructum, augebunt materiam obstruentem. Sed sanguis sanus ex sua natura in concrectionem tendit, orbiatus vero tenuissima parte longe magis concreset; & hinc augebitur malum. Dum in vera phrenitide sanguis, per arterias vertebrales & carotides allatus, immeabilis hæret ad fines vasorum, cor pergit per arterias omni momento bonum forte adhuc sanguinem adferre; sed per canales laterales liquidissima exprimuntur, crassiora accumulantur, donec infarctis fere omnibus corticis cerebri vasis immedicabilis reddatur.

datur morbus. Inde adeo malum signum in Peripneumonia habetur, si sanguis vena missus dilutus vix concresecat; denotat enim, sola tenuiora per pulmonis vasa transpirari, omnia crassa accumulari.

**VAS EXTENDIT, DILATAT, ATTENUAT, SOLVIT.** Dum cor sanguinem pellit in arterias, illæ distenduntur: sed hoc fit ideo, quia arteriæ plenæ sunt, & magna resistentia fit liquido impulso a convergentibus arteriarum finibus: si enim arteriæ vacuæ forent, vel nulla resistentia foret circa fines; sanguis ex corde in arterias pulsus libere perfluere, nec urgeret latera, ut recederent ab axi canalis. Quo ergo pleniores sunt arteriæ, quo major resistentia circa fines, eo plus dilatantur a sanguine vi cordis impulso: sed canalis obstructus ante locum, ubi hæret obstructio, plenus est, & maxima simul fit resistentia liquido impulso; hinc necessarii sequitur canalis obstructi dilatatio. Dum ligatura injecta liberum sanguinis per venas iter impeditur, mox ante ligaturam tumens dilatatur: sed dum vas extenditur, fibræ solidæ, latera vasis constituentes, distraherentur, minuuntur puncta contactuum, & hinc debilitatur cohesio; uti explicatum fuit §. 25. n. 3. Latera ergo vasorum minus possunt resistere causis distendentibus, & hinc magis dilatantur, donec tandem fiat cohesio nulla, idest ruptura. Si jam consideretur, obstructionem in maximis vasis raro obtinere, semper fere tantum in minimis; & quod canales maximi inter minimos, ultimæ nempe arteriæ rubræ, non quidem decimam partem capilli æquent; patebit facile, his obstructis summum metum esse rupturæ vasorum: longe majus autem periculum in ultimis serosis, lymphaticis &c. arteriis erit, si obstruantur. Ob hanc rationem, ubi valida inflammatio duravit per quatuor vel quinque dies, nimia distensione ruptis vasis tenerissimis obstructis, gangræna, vel saltem suppuratio, sequitur: frustra tunc expectaretur benigna resolutio.

Sed vasa obstructa, & hinc dilatata, comprimunt alia vasa vicina: hinc & in illis obstructio nascitur; sicque augetur malum.

**FLUIDUM STAGNANS CONDENSAT.** Expressione partis liquidissimæ, & compactione cassioris hærentis; uti modo dictum fuit.

**FUNCTIONEM INTEGRO FLUORE ORIGINEM TOLLIT.** Sic incipimus videre, quam

multiplex morborum species a sola obstructione oriri potest: omnes enim functiones a libero fluxu fluidorum per vasa pendunt; hoc impedito, turbantur omnes, vel & cessant omnino. Si polypose massæ concretæ circa magnum sinum dextri cordis pellantur in arteriam pulmonalem, actum est de vita: si venæ portarum ramuli in hepate obstruantur, nulla fiet bilis secretio &c. Cum ergo a tot causis obstructio nasci possit, forte mirum videri posset, non sæpius deleri, vel turbari functiones, dum forte quadam vasa, per hoc vel illa viscera dispersa, obstruantur sæpius: sed docuerunt Anatomici, vasa, per viscera dispersa, ubique fere emissis ramulis communicare; hinc, licet quædam ex illis obstructa fuerint, manet tamen liber circuitus per reliqua; nec statim a levi obstructione lædetur viscerum functio.

**VASA INDE IRRIGANDA DEPLET, SICCAT.** In multis partibus corporis sanguinis distributio fit per unum vas adferens: v. g. singulis renibus una plerumque arteria sanguinem dat; axillares arteriæ brachiis propiciant &c. patet evidenter, his vasis obstructis, nihil deferri posse ad omnes illas partes, quæ inde vitalem hauriebant sanguinem. Sed vasa nostra, nullis liquidis distenta, collabuntur, vel saltem se in minimam contrahunt diametrum. In vasis majoribus, ubi obstructionis causa ablata est, magno impetu irruens liquor collapsa vasa, vel contracta, iterum distendit: sed si in minimis vasis a simili causa talis collapsus factus fuerit, & manserit aliquamdiu; contigua latera concresecunt brevi; & impervia manebunt tota vita; omnesque functiones, quæ a libero per hæc vasa trajecta pendebant, erunt abolitæ. Sæpe accidit, post morbos acutos inflammatorios capitis, remanere surditatem, vel amaurosim, tota vita incurabiles: forte ab hac causa, quod obstructis inflammatione majoribus canalibus, minora inde derivata, compressa vel collapsa, concreverint: Dum in Apoplexia omnes cerebri actiones silent, raro curatur, quin maneant aliquod vitium in hac vel illa cerebri functione, fere semper incurabile.

**CAPACITATEM VASORUM TRANSMITTENDIS LIQUIDIS MINUIT; COPIAM &c.** Dum obstructa vasa transmittere nequeunt impulsa vi cordis liquida, debet in reliquis vasis liberis hæerere omne illud, quod per vasa obstructa transire non poterat: cuius causa



enim obstructio fere semper in arteriis fit, omne liquidum quod posse locum obstructum in arteriis hæret, per venas redibit ad cor; illæ enim facile deplentur: sic manebit eadem copia liquidi movendi, interim minuto canalium numero; hinc si notabilis pars corporis in suis vasis obstructa fit, reliquæ partes necessario majori copia liquidi distendentur; & inde fient omnes plethoræ effectus; & debeat omne illud suprapondium liquidi vel manere in vasis liberis distentis, vel debeat angere circulationis velocitas, ut, manente eadem copia liquidi, dato tempore per minores numero canales cor pellere possit sanguinem. Vivo canis, aperto abdomine, ligavi descendens aortæ truncum: omnis sanguis partium inferiorum, animalis nixibus inter hæc tormenta, accelerato motu redibat ad cor; sed non poterat vel guttula sanguinis ad inferiora transmitti: mox oriebantur summæ anxietates; cor celerrime palpitabat; oculi prominebant san-

guine suffusi; lingua, turgida sanguine, extra os prominebat; ingens copia spumæ circa os colligebatur, & moriebarur brevi animal. Dum cibi & potus larga copia distentus ventriculus aortæ truncum premit versus inferiora tendentem, turgida facies, rubri oculi, pulsus auctus, respiratio celerrior, docent & copiam sanguinis in partibus superioribus auctam esse, & celeritatem majorem per vasa sanguinem fluere; unde tot apud observatores habentur exempla hominum, qui largas inter epulas apoplexia correpti perierunt.

ADEOQUE OMNIA &c. Hæc certe infinita sunt: omnes enim functiones a libero tractu fluidorum per canales debitos pendent: sed obstructio nata, hunc liberum transitum impediens, potest omnes & singulas functiones lædere; & cum functio læsa morbus sit; ergo tot possunt diversi nasci morbi ex obstructione, quot possunt lædi diversæ functiones.

§. 121. **Q**UARE pro diversitate vasis obstructi, & materię obstruentis, illi effectus (§. 120.) variatis apparent phenomenis.

Cum ingens morborum numerus, qui ex obstructione nasci possunt, impediatur, quo minus describantur singuli, sufficit notasse præcipua capita, unde varii effectus obstructionis pendent. Longe alia enim apparent phenomena, dum sanguis inflammatoria densitate immixibilis factus hæret in tenerimis corticis cerebri vasis, quam si idem ille sanguis obstruxisset renum vascula multo firmiter: atque etiam longe major spes curationis affulget in inflammato-

ria tali obstructione corticis cerebri, quam si atrabilia materies fusa, mota, picea fere tenacitate hæc vascula obstruxerit. Aliquando enim materies obstruens talis est, ut dissolvatur sensim, modo minus urgeatur a tergo per impetum vitalis humoris; aliquando rebellis ad omnia insanabilem morbum facit. Si scirrhus confirmatus, vel malignus cancer, obstructionem fecerint, nec manu tolli possunt, quis curam promittere audebit?

§. 122. **I**N vasis Sanguiferis arteriosis rubris inflammatio primi generis fit, in illi vasi, calida flava, in Lymphaticis arteriosis dilatatis inflammatio secundi generis flava, errore loci, vel pellucida, calida, propria illi vasi; in arteriosis vasis Lymphaticis, majoribus, cedema calidum; in minoribus dolores sine apparente tumore; in pinguiferis, oſeis, medullosis, nervosis, biliosis alia.

**I**N VASIS SANGUIFERIS ARTERIOSIS RUBRIS INFLAMMATIO PRIMI GENERIS FIT. Generalis idea omnis obstructionis supponebat excessum molis transituræ supra capacitatem vasis transmissuri, uti definitum fuit §. 107. hinc potest in omni vase obtinere, per quod liquidum fluit, in minimo æque ac in maximo: sed ruber sanguis naturaliter tantum invenitur in vasis maximis; hinc, si in his canalibus obstructio fiat, hæ-

rebit crassissima pars sanguinis, id est, rubra, in angustis ultimis horum vasorum; si tunc impetus vitalis pergat a tergo urgere illud obstruens, erit inflammatio in vasis maximis inter minima, & vocabitur inflammatio primi generis. Sed ex vasis maximis oriuntur minores vasorum series; hinc ubi per maxima impediretur humorum circuitus, nihil fere ingredi posset minora ex his orta vasa, unde brevi mors in toto, vel in parte.

IN ARTERIOSIS SEROSIS FLAVIS RUBRA INFLAMMATIO ERRORE LOCI, VEL FLAVA PROPRIA ILLI VASI, CALIDA FLAVA. Vas sanguineum rubrum proximum magnitudine sequitur vas seorsum, quod solam partem rubram excludit; reliqua omnia admittit: sed in his vasis dilatatis circa principium possunt aliquando impelli globi rubri sanguinis, nec penetrare tamen per ultimas angustias; hinc errore loci obstructionem facere, ut dictum §. 118. erit tunc inflammatio rubra hærens in vasis non rubris naturaliter. Sed uti in vasis maximis rabris crassissima sanguinis pars, mutata figura molecularum, vel adunatione earundem, poterat inflammationem facere his vasis propriam; sic & crassissima liquidi, per arterias serosas flavas fluentis, pars, hærens circa ultimas angustias horum vasorum, poterit facere inflammationem serosis vasis propriam: & cum hoc possit fieri, licet nihil rubri ingressum fuerit hæc vasa; flava erit hæc inflammatio, non rubra.

IN LYMPHATICIS ARTERIOSIS DILATATIS INFLAMMATIO SECUNDI GENERIS FLAVA, ERRORE LOCI; VEL PELLUCIDA, CALIDA, PROPRIA ILLI VASI. Vas, quod proximè sequitur magnitudine vas seorsum, jam non habet amplius coloratum liquidum; omne enim rubrum & flavum angustia horum vasorum excluditur; sed & dilatata horum vasorum oscula poterit ingredi flavum seorsum, & sic in his vasis nasci poterit per errorem loci inflammatio flava. Atqui etiam crassissima pars liquidi per vasa hæc lymphatica fluentis per communes obstructionis cohibet causas poterit reddi immenabilis, & facere inflammationem huic vasi propriam. Eandem jam doctrinam poterit applicari reliquis decrefcentium vasorum seriebus, de quibus per solam Analogiam aliquid dicere possumus tantum: Anatomicæ enim horum vasorum demonstrationes deficiunt.

Inde patet, quod in maximis vasis, id est sanguineis rubris, unica tantum inflammationis species obtinere possit, immeabili nempe reddito liquido naturaliter per maxima vasa fluente: in reliquis vero decrefcentis magnitudinis vasis duplex esse possit inflammationis species: una ab errore loci, admissio liquido crassiori per oscula dilatata; altera a liquido naturali horum vasorum, immeabili facto.

IN ARTERIOSIS VASIS LYMPHATICIS MAJORIBUS OEDEMA CALIDUM. Quo usque hæc vasorum divisio in minora pertingat, quis dicere poterit? Majora vasa inflammata, liquidis coloratis distenta, tumore, & mutato colore loci, quem occupant, sub sensu nostris cadunt: sed ubi tanta vasorum tenuitas est, ut nec naturaliter, nec errore loci, capere possint colorata liquida, tunc, his vasis inflammatis, non mutabitur loci affecti color. Interim tamen distenta vasa & turgentia liquida, pellucida quamvis & non colorata, possunt molem partis augere, & facere tumorem. Generali nomine omnes tumores vocabantur *ἰσχυματὰ* (ut dictum §. 112.) & postea imprimis hoc nomen dabatur aquosis frigidis tumoribus: sed cum in hoc casu calor adsit, omnis inflammationis in majoribus vasis comes; hinc talis tumor dicebatur *oedema calidum*: sed hoc tantum obtinet, dum in majoribus lymphaticis arteriis inflammatio adest.

IN MINORIBUS DOLORES SINE APPARENTE TUMORE. Omnes sensus, imo omnem sere captum fugere minima corporis nostri vascula, satis firmis probatur argumentis. In primo enim palli flamine punctum illud saliens movebat liquida, vasis contenta, sed quantæ tenuitatis! Nervorum mirabilis structura; cerebri per nervos, ad partes corporis delatos, tam distincta actio in singulis musculis movendi, pro voluntatis arbitrio; sensuum organa tam vivida actione in nunte distinctas adeo ideas excitantia &c. hanc rem satis evincunt. Sed si minima hæc vascula inflammantur & tumeant, non augebunt ad sensus molem partis effectus; poteruntque tamen acerbissimos excitare dolores: nam in favissima podagra, & dolentissimo rheumatismo, sæpe nullus tumor apparet. Mitior semper horum malorum indoles observatur, quando partes affectæ tument.

IN PINGUIFERIS, OSSIS MEDULLOSIS, NERVOSIS, BILIOSIS ALIA. Prout jam diversè per vasa feruntur humores, prout diversorum viscerum vel partium corporis fabricam constituunt vasa, oriuntur ab horum obstructione varia mala. Si enim in pinguedinosi vasis hoc fiat, calore & stagnatione cito corrumpuntur pingue in pessimam converteretur ranciditatem. Ossis vasa inflammata cariem, exfoliationem, exco-

roles,

stoses, tophos &c. producent; quæ recondita offium cavis tenerrima vasa medullare oleum a sanguine fecerunt, si inflammantur, medulla corrupta ossæ cavo clauso eontenta terribiles morbos producere poterit. Nervi ipsi acerrimos dolores, dum inflammantur, parant; & peribit omnis nervo-

rum sic affectionum usus ad sensus & motus. Biliofa vasa obstructa impediunt, quo minus bilis, a sanguine venoso abdominalium viscerum per hepatis fabricam separata, ad debita loca feratur; sed regurgitans in sanguinem tachoymiam biliosam faciet, & plurima, quæ inde sequuntur, mala.

§. 123. **Q**ui vero sedem, naturam, materiem, causas, effectus obstructionum, hucusque (107. ad 123.) tradita novit; illi signa, quibus futura, præsentique obstructio, ut & ejus effecta, sciuntur, ignota non erunt.

In hac paragrapho agitur, quomodo & ex quibus signis in *Diagnosi* concludatur, obstructionem adesse; quomodo in *Prognosi* futura prævideatur; uti & effectus inde secuturi: sed ex illis, quæ præcedentibus hujus Capituli paragraphis dicta sunt, hæc omnia facile deducuntur.

**SEDEM.** Obstructio, facta ab externa causa, vasa comprimente, in omni loco canali nasci potest; a reliquis causis narratis orta obstructio imprimis hærebit circa maximas vasorum conicorum convergentium angustias.

**NATURAM.** Quæ, ex definitione data §. 107. tantum in excessu molis transituræ supra capacitatem vasæ transmissuri consistit.

**MATERIAM.** Quæ tot habere potest diversitates, quot sunt distincta suis dotibus

fluida per proprios canales mota: sed & idem liquidum, varia degeneratione morbofa, distinctas concreciones facere potest; unde iterum materię obstructionis ingens varietas. Potest v.g. sanguis inflammatoria tenacitate immeabilis reddi; potest in polypos concrefcere; potest frigido mucoso glutine lentescere &c.

**CAUSAS,** quæ hæctenus recensitæ sunt, & vel angustando vasa, vel augendo moleculas fluidi, vel denique errore loci agunt.

**EFFECTUS,** qui iterum varii sunt, ratione vasis obstructi & materię obstructis; & pro vario impetu, quo liquidum pellitur in locum obstructum.

Quomodo jam ex omnibus his cognitiss habeatur *Diagnos* & *Prognosis*, dictum fuit §. 27.

§. 124. **E**T cognita hac ejus diversitate, difficile non erit, propriam cuique curationem tradere.

Nulla generalis regula in cura obstructionis dari potest, sed sollicitè indaganda est causa, quæ obstructionem fecit; hac enim cognita, tantum certi quid statui potest. Solet quidem dici, in omni obstructione conducere, ut vas obstructum laxetur, ut facilius cedere & dilatari posset, & sic transmittere infarctum liquidum: sed si ab errore loci nata sit obstructio, laxatio vasorum an conducet semper? Certe §. 118. demonstratum fuit, inter causas erroris loci

merito recenseri laxationem vasis. Alterum generale indicatum in cura obstructionis prædicabatur dissolutio concreti obstructantis: sed nisi ex historia causarum noverit Medicus, cujus naturæ fuerit illud concretum, hærebit anceps. Aliam enim medelam poscit inflammatoria densitate concrefcens sanguis, quam si inerti frigido mucro lentescant humores. Idem in reliquis verum est: hinc pro varietate causæ cognitæ, obstructionis varia erit curatio.

125. **N**am illa, quæ a compressu externo (§. 112.), indicat ablationem causæ prementis, quæ, ubi possibilis, petenda ex secutura ejus descriptione.

In §. 112. recensitæ sunt illæ causæ, quæ observatæ fuerant externa compressione vasorum obstructionem fecisse: sed nisi causa illa comprimens nocatur, & cognita tollatur,

non poterit sanari obstructio inde orta, uti evidenter patet: Ideoque in numero citato in quatuor classes distinctas redactæ sunt hæ causæ, ut ordine indagari possint.

Postquam autem innotuit causa, quæ externe compressione vasis obstructionem fecerat, inquiri debet, an hæc tolli possit; an vero talis sit indolis ut nullo hæcenus cognitio artis molinine superari vel emendari possit. V. g. tumores illi ampullosi, qui a varia spissitudine materiæ contentæ, atheromata, melicerides, steatomata dicuntur, dum in externis partibus hærent, ubi manus accessus datur, non nisi difficulter tolli possunt; quid sperandum de similibus tumoribus, dum in interioribus corporis hærentes vicina comprimendo angustant? Dum uterus gravidæ mulieris dislentis suo situ, ut aliquando fit, venas iliacas premit, tumor œdematosus crura & femora occupat; nec tolli potest hoc malum, cessans sponte,

post partum detumescente utero. Quando scirrhus confirmatus, vel cancer ex eo natus, exstirpari non potens, obstructionem fecerit, quænam cognita medela superest? Idem in plurimis aliis obstructionum causis obtinet. Interim æque magnus Medicus est, qui incurabilem morbum distinguere potuit, quam qui sanabilem tollere valuit.

Reliquarum vero causarum in §. 112. recensitarum medela vel ex ante dictis hauriri potest; uti v. g. plethorici tumoris curatio; vel de illis postea singulis capitulis dicitur: v. g. de inflammatione, suppuratione, scirrhus &c. & luxatis fractis &c. Dum vero externo corpori applicata quædam vasa comprimunt, ut vestes, fasciæ, ligaturæ &c. facilis cura est, & sponte patet.

§. 126. **E**A vere, quæ ab aucta fibrarum contractione oritur, cognoscitur per signa, quibus visceris, vasis, fibræ nimia contractio scitur (34. 36. 40. 50. 53.); tum quoque illa, ubi hæc contractio a secunda causa (113. N. 2.) per suæ causæ signa clara; ut altera, quam inanitioni prægressæ adscripsimus (ibidem N. 3.)

In hac paragrapho agitur de signis. quæ docent obstructionis causam pendere a contractione propria vasorum aucta. Sed in §. 113. tres recensentur causæ distinctæ, quæ augebant vasorum contractionem. Prima erat aucta elasticitas fibrarum, canalium, viscerum; sed huius auctæ elasticitatis signa descripta sunt, dum de nimia rigiditate fibrarum, vasorum minimorum & majorum & viscerum dictum fuit in numeris hic ci-

tatis. Secunda causa erat nimia distensio vasculorum minorum constituentium majorum vasorum latera. hæc autem adesse cognoscitur nimie plenitudinis signis in Plethoræ historia recensitis. Tertia vero causa, quæ imprimis inanitioni prægressæ adscribatur, cognoscitur adesse per evacuationes quascunque magnas prægressas, faciem collapsam, pulsum parvum debilem, siccitatem linguæ & oris interni, vires prostratas.

§. 127. **S**Anatur hæc obstructio (113. 126.) per remedia contractionem nimiam fibræ, vasis, visceris emendantia (35. 36. 38. 54. 55.) 2. maxime, si ipsi affecto loco applicari possit eorum virtus, quod halitus, fomenta, balnea, litus, fomenta efficiunt inprimis. 3. per auxilia, quæ vascula, membranas componentia, nimis impleta deplent. Quo evacuantia in genere, sed præprimis illis vasculis applicata, spectant, quæ sunt laxantia, diluentia, resolventia, attenuantia, deterfiva, evacuantia. 4. per illa, quæ callositatem factam resolvunt.

1. De his dictum fuit in numeris hic citatis; & patuit, tunc artem multum posse efficere in similibus morbis, in quibus nimia rigiditas solidarum partium tollebat illud æquilibrium, inter fluidorum impetum & solidorum resistantiam, ad sanitatem requisitum. Sed aliud hic notandum occurrit, stimulos nempe mirabiles, imo & ipsos animi affectus, posse subito & efficacissime augere contractilitatem solidarum partium. Dum sulphuris accensi vapor pulmone hau-

ritur, mox sic constringitur in omnibus suis vasis, ut nil transmittat, unde omnibus animalibus majoribus lethalis sulphuris sitimus. Oleum vitrioli, penicillo applicatum vivi canis dissecti intestino, fecit illud sic contrahi, ut nullam omnino cavitatem haberet. Aceti guttula, oculo inaspera, sic facit constringi palpebras, ut nulla vi deduci possint. Nisi Medicus noverit hos stimulos tollere, vel enervare, non poterit curare nimiam contractionem inde ortam.

Quantum

Quantum autem possint animi affectus augere vasorum contractilitatem; patet obviis ubique observatis. Dum subito metu percussit homo, mox pallet, & collabitur tota facies, contractis omnibus vasis: si jam cogitemus, idem in interioribus fieri posse, quod in externa cute tam clare videmus, mirabiles & pertinacissimi inde possunt oriri morbi. Vidi mulieri sane; subito terrore affecta, mox ortum fuisse in mamma tumorem, qui, licet optimis tractatus remediis, in scirrhum irresolubilem induruit.

2. Si universa solidorum compages nimia rigiditate peccat, toti corpori & omnibus ejus partibus externis & internis illa applicari debent remedia, quæ nimiam illam tollunt rigiditatem: sed si in singulari parte hæreat hoc malum, quare omnia vasa laxarentur? Sufficit tunc topica medela, si applicari possit soli parti affectæ: hoc autem imprimis fit per

**HALITUS.** Aqua tepida emollit partes solidas corporis; sed aqua, in vapores resoluta calidos, longe magis. Durissima cervorum cornua, vaporis aquæ tepidæ exposta, sic emolliuntur, ut scissilia fiant. Cubiti articulationem, ob indurata ligamenta immobilem penitus redditam, vidi pristinam flexilitatem recuperasse, dum per binos menses quotidie per horam pars exponeretur aquæ calidæ vaporis. Hinc ubi commode vapor determinari potest ad partem, reliquis auxiliis aquæ calidæ halitus præferendus est.

**FOMENTA**, quæ fiunt ex aquosis, imprimis si mollissimæ herbæ his incoctæ fuerint, ut malva, althæa &c. semina lini, avena &c. tali decocto madidi panni lanei applicantur parti, superimponitur his pannis vesica oleo perficcata, ut impediatur exhalatio; deinde fistilibus calidis, variæ figuræ pro varijs partibus corporis, impositis calida servantur hæc fomenta: sic pars affecta in perpetuo vaporis balneo hæret. Dum pleuriticorum lateribus hæc sic applicatur, funium doloris levamen sentiunt.

**BALNEA.** Imprimis balnea vaporis, partes enim corporis aqua immerse comprimentur ab aqua, vapor autem aquæ omnia laxat, uti ante dictum est: observatum fuit, in similibus malis topicis profuisse, ultra fere quam sperari poterat, atque calidæ ex alto delapsum guttatim in partem affectam: chronicos admodum, & ad omnia fere remedia rebelles, circa genu tumores hac methodo curavi aliquoties.

**LITUS.** Si nempe ex blandissimis oleosis fiant. Rigida animalium coria oleo innacta flexilia redduntur; omnibus partibus corporis, in quibus requiritur flexibilitas, apponitur molle oleum: omnes musculi, tendinesque vaginis oleosis teguntur: omnibus ligamentis, essa articulata nectentibus pinguis unctuosus liquor affunditur. Sed ubique invenitur, illud pingue esse blandissimum, nullamque habere acrimoniam: magnus enim error foret credere, olea acria ambausta, Galbaneta illa Paracelsi &c. efficaciora esse ad hos usus. Ubi sola nimia rigiditas peccat in partibus solidis, mollissima olea pressa ex vegetabilibus; medulla ossium recens, mollissimum althææ unguentum & similia, pulcherrimi tunc usus; imprimis si, post balnea vel fomenta applicata, bene deterfis & siccatis partibus corporis hæc illinantur.

3. Dictum fuit §. 113. n. 2., quod per Anatomicas injectiones demonstratum fuerit, majorum vasorum latera minoribus vasculis constare: hæc vero nimis impleta possunt minuere cavitatem vasis, cujus latera constituunt. Si v. g. emulgentes arteriæ, inflammata in suis membranis, sic arctentur in minimis ramulis per renum substantiam dispersis, ut non fiat urinae cretio, erit ischuria, ab hac causa forte aliquando in morbis acutis observata. Post validissimos cursus lactatis animalibus, inventum fuit sæpius, majora vasa in suis tunicis fuisse penitus inflammata, & sanguine turgida: cura hujus mali perficietur per

**EVACUANTIA IN GENERE** &c. Nihil hic habemus nisi generalia; omnis enim depletio artificiosa fit fere tantum per majora vasa. Omnium fere maximum auxilium est venæ sectio; & sic depletis maximis vasis minus comprimentur minora horum latera constituenta, minori impetu urgetur liquidum in locum obstructum: & si magna fuerit facta sanguinis missio ad animi deliquium usque, contracta vasa minora, ablata pressione vitali a basi versus verticem, reprimunt hærens in illis fluidum in vasa: majora. Sed si loco affecto possint applicari remedia, tunc recentissia omnia conveniunt. si v. g. in morbo acuto ischuria ab hac causa nata fuerit, & arger nullum tenesimum exonerandæ vesicæ sentiat, nocet, circa renes hæreere hoc malum: tunc generalibus evacuantibus præmissis, fomenta lumbis applicantur, & clysmata inji-

euntur, quia colon intestinum renibus proxime adjacet, ut saltem quam proxime ad partem affectam applicentur remedia.

Quomodo autem LAXANTIA, DELUENTIA, RESOLVENTIA, ATTENUANTIA, DE-  
TENSIVA agant, explicatum fuit §. 54. n. 4.

4. Callus, uti dictum fuit §. 112. n. 1. in fine, fit, si vasa minima compressa, omni liquido expulso, lateribus contiguis factis, concreverint; tunc non amplius manet vas pervium, sed fit concreta membrana; unde nulla humiditas, nullus sensus in callo. Adfunt quidem eadem vasa quo-

§. 128. **V**eram illa obstructionis species, quæ ab hac causa, raro, si unquam, curari potest. Emollientia, & laxantia præcipua sunt. Unde mortis patet inevitabilis necessitas, & magna vitæ longæ per medicamenta parandæ difficultas.

An unquam constiterit, vas concretum iterum pervium factum fuisse, maxime dubito: quomodo enim hoc fiet? Si velis liquidi vitalis impetu & celeritate auctis divellere concreta latera, citius solventur vasis callo contigui parietes, per quod fluidum ad vas concretum devehit debet: præterea aucto motu vasa viva, ad calli limites appressa, complanabuntur, & callosa fient; sicque hoc modo callus potius augebitur. Dum callosa cutis externa facta est, unica spes curæ est, si caveatur omnis attritus; sicque sæpe sensum callus minuitur, dum eius extrema superficies sensum detegitur, & vasa viva supposita sensum protrudunt concretorum vasorum extrema. Homines, qui duris laboribus callosas manus habent, postea his abstinentes sensum molliores illas factas sentiunt: forte tamen nunquam loca illa callosa vasis apertis fient iterum perspirabilia. Sed si vel nunquam, vel difficillime saltem, calli externæ cutis possint resolvi, quibus remedia applicare possumus; quid fieri poterit, quando partes internæ callosæ induruerunt!

**EMOLLIENTIA & LAXANTIA PRÆCIPUA SUNT.** Per hæc enim durum hoc operculum, vasis vivis suppositis impositum, sic emolliitur, imprimis si & interna similia larga copia exhibeantur, ut sensum separetur a vivis partibus subiectis. Quibusdam hominibus, verno tempore imprimis, quando omnia turgere incipiunt, oritur intollerabilis dolor a callis pedum plantas occupantibus, sic ut incedere nequeant: vivæ partes, callo subiectæ, inflammantur; callosa duritie incumbente pressæ; illas mole-

ad materiem, non quoad liquidorum transfluxum. Callus tamen abscessus renascitur in cute externa, quamvis nullus transfluxus liquidi vitalis per callum sit. Videtur autem hoc fieri, quia concreta vasorum extrema vi vitalis liquidi sensum protruduntur, extremitates vero vasorum apertæ, callo contiguae, ab illo comprimuntur; hinc callus detritus, abscessus, incrementum iterum, uti quotidianis observatis constat. Quam difficulter autem callositas semel nata tolli possit, sequens docebit paragrahus.

stias pariunt: si tunc lacte cum farina lini cocto soveatur callus noctes & dies, incipit emollitus elevari, & secedere, interrim tamen subiectus locus, separato callo glaber apparet & politus, non perspirabilis; hinc iterum renascitur callus: quod præcaveretur, quantum fieri potest, si locus mollissima tegatur aluta, ut omnis attritus caveatur.

**UNDE MORTIS PATET INEVITARILIS NECESSITAS** &c. §. 39. n. 1. & §. 55. demonstratum fuit, vitam humanam tandem se ipsam destruere absoluta necessitate. Requiritur enim ad integritatem actionum vitalium debita flexilitas canalium, per quos vi cordis pelli debebant liquida: debebant vasa cedere posse distendenti fluida, & ablata causa distendente redire in priorem capacitatem. Sed ex dictis ibidem constitit, ipsis vitæ sanæ actionibus sensum majus robur accedere partibus solidis; aucto robore, plus resistere solida fluidis impulsis; donec tandem rigida penitus facta vasa non cederent liquidis a corde pulsis; unde cor non poterat evacuari: hinc placidissima sine morbo fere in ultimo senio mors. Si consideretur in variis ætatibus humanum corpus, patebit, quanta fiat mutatio in firmitate solidarum partium vario vitæ tempore. Recens nato infanti omnia mollia, liquidis plena apparent; tota superficies corporis vasis ubique patulis in omni puncto perspirabilis; ossa ipsa ceream fere flexilitatem habent: procedente ætate, sensum minuitur vasorum perviorum numerus; augeatur robur & firmitas, in omnibus partibus corporis ossa durecant: tandem in decrepita senectute totum

torum corpus exfuccum fit; articuli in juventute adeo flexiles obrigescunt, omnis fere pinguedo evanescit; flaccida, callosa, & turpibus rugis deformis cutis vix amplius perpirabilis manet; & ossa fragilissima fiunt: cartilagineos ossam induunt duritiem; & vasa, antea membranacea & flexilia, in cartilagineam, imo ossam, naturam mutantur. Quo autem per motus animales magis audia fuerit vitalium actionum efficacia, eo citius hæc rigiditas nascitur: hinc nimio labore exercitata animalia ante ætatem senescunt.

Qui ergo fatalem vitæ terminum se removere posse gloriabuntur, tenent hanc rigiditatem senilem præcavere, vel navam curare. Fuerunt ab omni tempore tales iactatores, qui *εὐπαιδίας*, imo immortalitatem ipsam, antea promittere mortalibus; persuaserunt pluribus, quod omnes sperant avide. Galeni sæculo Philosophus librum conscripserat, in quo docebat modum, quo quis senii expertus perpetuo permanere posset. Annum agebat quadragesimum, dum hoc scriberet; ad octogesimum annum vixit posse, sed gracilis adeo & exfuccus

factus, ut rideretur ab omnibus; & quamvis proprio exemplo doctrinæ suæ salutaris ostenderet, tamen effingia quærebat, dicens, non quemlibet hominem senectutis expertem permanere posse, sed ad hoc natura opus esse idonea: & promittebat, se infantium ad hoc idoneorum corpora reddiurum immortalia, si statim ab initio illorum curæ præficeretur. Tuto hæc iactabat periturus, antequam adolescerent (*Galen. de Marasmo cap. 2. Tom. VII. pag. 179. 181.*).

Sed dum in diæta dirigenda fidem tanti promissi ponebat, minus insaniebat, quam Chemicus, qui paucis guttulis quotidie sumitis vitam ad mille annos se producere posse gloriabantur; tunc deliberaturi, quando vellent mori. Paracelsus ipse quadragesimo octavo ætatis anno inortuus vanitatem huius promissi demonstravit.

Si quid prodesset ad vitam longam, forent illa, quæ nimiam rigiditatem firuram præcaverent: hinc victum humectantem somnibus prodesse dixit Galenus, (*De Sanit. tuenda Lib. V. cap. 5. Tom. VI. pag. 122.*) & alibi (*De Marasmo cap. 5. Tom. XII. pag. 183.*) hanc rem laxius deduxit.

§. 129. **I**lla fluidi ineptitudo ad transeundum per vasa, quæ a figura spherica amissa pendet, cognoscitur perspectis ejus caulis ( 116. ) quippe sensibiles plerumque sunt.

Demonstratum fuit in §. 115. quod sphaera sola sit inter figuras solidas, quæ datum orificium transire posset, quocunque situ ad illud delata fuerit; modo diameter orificii transmittentis maior sit sphaeræ diametro. Sphaeræ enim omnes sectiones factæ planis per centrum transcurrentibus, & cuius dato plano parallelis, sunt figuræ æquales, similiterque positæ, nempe æquales circuli. Simulac ergo elementa fluidorum, quæ solitaria per ultimas angustias vasorum transire debent, amiserunt hanc figuram, infinitæ poterunt esse posituræ varietates, quibus denegabitur transitus. Sed unde concludi potest, hanc obstructionis causam adeste? certe minimarum harum molecularum figura in pellucidis vivorum animalium partibus non nisi oculo armato detegitur;

hinc non facile erit per sensus hoc cognoscere in parte obstructa corporis humani. Sed cognitæ sunt causæ §. 116. descriptæ, per quas æquabilis compressio molecularum fluidi tollitur: ubi ergo novimus hæc causas præpressas fuisse, tunc obstructionem natam deperditæ figuræ sphaericæ molecularum fluidi adscribere possumus.

Sed causæ tres recenscebantur, quæ tollebant æquabilem compressionem elementorum fluidi: languides nempe nimis fluidorum per vasa motus, quem pulsus arteriarum docet; laxitas nimia vasorum ex dictis §. 27. & §. 44. adeste cognoscitur; & minuta copia liquidi, quæ scitur adeste, si evacuationes magnæ præceperint, collapsa sint vasa, siccitas totius corporis obtineat.

§. 130. **S**anatur vero remediis, quibus illa figura redditur. Qualia sunt, quæ motum augent per vasa & viscera. Ut stimulantia omnia, & robustantia; tum motus animalis citatio.

Corpus humanum illis instructum dotibus, quæ ad sanitatem requiruntur, valet ex ingestis diversissimis inter se connecere sanguinem, cuius elementa sphericam illam figuram habent: hæc autem figura non præexistit semper in particulis assumptorum, sed nata fuit per efficaciam vasorum & viscerum, qua ingesta convertuntur in naturam nostram. Ubi ergo deficit hæc figura in elementis fluidorum, totum, quod ars valet, est ut restituat illas causas, per quas naturaliter hæc figura his fluidorum elementis conciliatur.

Sed motus humorum per vasa flexilia, & reagentia valido nixu in distendentes humores, inducebat crudis ingestis hanc figuræ mutationem. Chylus per 12. horas cum sanguine fluens per vasa mutabatur in sanguinem; & eo celerior hæc mutatio, eo perfectior, quo validior esset, catæxis paribus, actio vasorum in fluida: hinc in robustis & exercitatis hominibus ingestorum subita assimilatio; in languentibus & debilibus, tardior.

Pater ergo evidenter, amissam figuram sphericam molecularum fluidi restitui pulcherrime, si augeatur robor vasorum, quo contenta fluida premunt, ut & si intra idem tempus spatium vasorum efficacia sæpius

applicetur fluidis contentis, id est, augeatur circulationis velocitas.

Quomodo vero & per quæ auxilia robor vasorum augeatur, dictum fuit §. 28. & 47. Quæ ratione augeatur circulationis velocitas, pariter dictum §. 28. nu. 2. Quomodo stimulantia hunc effectum producant, dictum fuit §. 75. n. 5.

Dum laxa illa, frigida, & mucosis humoribus plena, corpora curant Medici, excitant gratissimis aromaticis stimulis, & imprimis ferri, in acidis vegetabilibus blandis soluti, usu, languentem motum. Per frictiones, unctiones, equitationes, & corporis exercitia, circulationis velocitatem & efficaciam augent: redit brevi æmulus ille ruber color, sanguinis boni renascentis indicium; omnesque functiones, quæ languebant antea, vel & penitus depravatae erant, restituntur. Unde evidentissime patet, liberum esse tunc per vasa fluidorum motum; hinc redditam esse figuram sphericam fluidorum elementis, quæ requirebatur, ut per ultimas vasorum angustias in omni possibili postura transire possent.

Motus autem animalis citatior imprimis prodest duplici effectu: auge enim circulationis velocitatem, & reddit partes solidas corporis firmiores; ut dictum §. 28. n. 2.

§. 131. **L**iquidi spissior concreta moles, quum oriatur a tam variis & diversis causis (§. 117.), etiam pro re nata varia remedia, variam sanandi methodum, requirit: quæ diversitas in singulis dein morbis indagata ipsa auxilia, & applicandi modum dabit.

Obstructionis causæ, quatenus fluidis inhærebant, duplices erant: nempe vel figura mutata elementorum fluidi fecerat liquidi immeabilitatem; vel molecule, prius separatæ, nunc adunatæ a quacunque causa, non poterant penetrare vasorum angustias. Hæc vero adunatio molecularum a tam variis, imo penitus oppositis, causis pendet, enumeratis §. 117. ut nihil certi quoad curationem statui possit, nisi prius cognoscatur singularis causa, quæ fecerat concretionem. Quies enim & auctus motus; frigus & calor faciunt fluida nostra concrefcere: sed tam oppositæ causæ diversam etiam medelam requirunt. Dum in morbis languidis chronicis fluidorum immeabilitas nascitur, stimulantibus augeatur circulationis velocitas, ut dividatur concretum: dum in acutis inflammatoriis morbis phlogisticus lentor san-

guinem spissorem reddidit, venæ sectione debilitamus vitam; et tardior fiat sanguinis motus: dum nimis debilia vasa non satis efficaciter agunt in contenta fluida, concretiones nasci possunt in stagnantibus fere, vel non satis valide moris, liquidis; dum nimis fortia vasa compriment contentos humores, expressa parte tenuissima, compacta parte residua spissiori, concrefcunt.

In singulis ergo morbis, qui ab obstructione nati sunt, vel qui fecerunt obstructionem, omni cura inquirendum est in indolem causæ, a qua nata fuit liquorum immeabilitas; aliter nihil certi statui potest. Paragraphus autem sequens generalia tantum tradit auxilia, quibus concretio tollitur fluidorum.



§. 132. **A**T moles concreta in genere tollitur 1. motu vasis reciproco. 2. dilutione. 3. attenuante fluido adveſto, permisto, moto. 4. Coagulante causa educta.

1. Singulis vicibus, quibus cor expellit sanguinem ex suis cavis, arteriæ dilatantur; mox cessante cordis actione, arteriæ iterum contrahuntur: sic alternis vicibus liquidum impulsu superat vasorum resistentiā, & ab illa superatur: hinc omni momento vitæ liquida vasis contenta ad latera vasorum affricantur, imprimis in angustissimis vasorum sinibus, ubi solitaria, vel saltem pauca elementa fluidi simul possunt transire. Hic autem attritus fluidi per reciprocum motum vasorum impedit, quo minus concretio nascatur; & simul summum auxilium est, quod concretionem natam tollit. Sanguis noster vasis enissus illico concreſcit; per hunc autem attritum continuum a concretionem impeditur. Sed, uti demonstratum fuit §. 119. obstructio imprimis in arteriis locum habet: in arteriis vero ille motus reciprocos toto vitæ tempore durat; hinc moleculæ sanguinis adunatæ, hærentes in arteriarum angustis, mechanico hoc tritu dividi & resolvi posse videntur: sanguis enim vasis enissus, concreſcens illico, attritu solo potest iterum fluidis reddi. Sanguinis insulam rubram concretam solo tritu in mortario vitreo potui redigere in spumescens coccineum liquidum.

Pulchrum habetur apud Leeuwenboekium, (*Experiment. & contemplationes pag. 205. &c.*) observatum, quod demonstrat efficaciam reciproci illius vasorum motus in dissolvendo sanguine concreto. In vespertilio- ne fame & frigore languenti, dein parum refecto, observavi microscopiis tenuem illam membranam, qua expansa hoc animal alarum instar utitur: nullum observavi motum, nec in arteriis nec in venis, sed post sex horas elapsas, revivificante magis animali, vidit particulam sanguinis concreti oblongam, totum arteriæ cavum implentem, protrudi per arteriam, mox retropelli; dein protrudi iterum, sicque nec in redire hanc viam; donec tandem hoc attritu resoluta massula per ultimas arteriæ angustias transiret in venam. Non potest haberi exemplum magis evidens obstructionis ab adunatione molecularum fluidi natæ: & simul apparet, quomodo vitali motu fluidorum per vasa, & attritu ad latera vasorum, dividatur.

iterum hoc concretū, & resolvatur obstructio.

2. Quando nempe inter moleculas concretas insinuare se potest tenuius fluidum, sicque illas a contactu removere, tunc dicitur obstructio soluta esse per dilutionem. Ita si in exemplo mox narrato, dum massula concreta ibat & redibat in vase obstructo, potuisset affundi tenue liquidum, hoc pressione vasorum attritum cum hoc concreto, illud citius resolveret. Accedit præterea, quod diluentia aquosa sint, hinc semper laxiora reddant solida nostri corporis. Sed vas laxatum facilius transmittit immeabilem ibi hærentem massulam. Quia autem diluentia sola non semper possunt resolvere concreta, hinc sæpe aliis indigemus auxiliis.

3. Si jam simul diluenti liquido miscantur talia, quæ cognoscuntur habere hanc vim, ut possint solvere concretas moleculas in illas partes, ex quibus concreverunt, tunc omnis fit, quod ab arte expectari potest. Omnia autem hæc assumpta, venis recepta, cordis & arteriarum viribus advehuntur ad locum obstructum; dumque hæc massula concreta adhuc mobilis est, ut reciproco motu ire & redire possit, illam continuo præterlabantur, cum illa teruntur, moventur, miscentur, donec resolutio facta fuerit. Verum ubi adunatæ moleculæ, compactæ & immobiles hærent in vasorum angustis, tunc liquidum attenuans per vas obstructum protrusum a tergo urgere potest massulam obstructentem, non vero præterlabi, nec cum illa moveri & misceri; & tunc magna difficultas est resolvendi hoc concretum. Tale videtur obtinere malum in inflammatione non resolubili, ubi optima diluentia & attenuantia, magna quamvis copia ingesta, non valent dissolvere concretum inflammatoriam viscositate sanguinem.

4. Si hoc fieri possit; nam hic plerumque videtur hære magna difficultas: dum enim per acida v.g. coagulum sanguini inductum fuit, cognita quidem sunt corpora, quæ acidum trahunt; sed si coagulatus sic sanguis in ultimis vasorum angustis hæserit, lateribus vasis obstructi ubique contiguus, non erit facilis aditus ad hoc obstruens coagulum. Præterea acida illa fortissima non inducunt coagulum tantum interpositione suarum partium inter partes sanguinis antea non coherentes,

rentes, sed uno momento, & ipso quasi tactu, coherere inter se cogunt separatas massulas; hinc sanguini de vena fluenti, per acida admista statim coagulato, admistis alcalinis, quæ acidum in se statim trahunt, non redit pristina fluiditas. Si a spirituosius fermentatis tale coagulum inductum fuerit, eadem, imo maior erit difficultas, cum spirituoso illo expulso, factum tamen

coagulum maneat. Serum enim sanguinis, ab alcohole asufo induratum, non dissolvitur, expulso coagulante per calorem tam lenem, qui serum concretum minime faceret. Ubi vero a gelu coagulum inductum est sanguini, possimus spicula illa glacialia educere, admota prudenter aqua frigidissima; sed qua methodo, & quibus cautelis, hoc fieri debeat, dicetur §. 454.

§. 133. **R**eciproco vasi motum conciliant 1. quæ distendentes causas temperant. Ut est venæ sectio. 2. quæ vasa roborant (28. 29. 45. 46. 47. 49.) 3. frictio, & muscularis motus. 4. stimulantia.

1. Cause distendentes arterias sunt sanguis illas replens, & vis cordis utgens sanguinem in arterias plenas. Ut autem reciproco motus systoles & diastoles in arteriis maneat, non debent distendentes cause tolli, nisi enim arteria prius distendatur, non contraheretur postea: sed debent sic temperari, ut possint vicissim cedere causis illis, quæ arteriæ systolem faciunt: hinc merito dicitur, causas distendentes esse temperandas. Si enim distente arteriæ non possint se evacuare in venas nimis plenas, vel arteriosi fines obstructi denegent transitum, cor perget hæc vasa distendere, nec poterunt se contrahere: unde cessabit ille reciproco motus. Omne enim vas nimis distentum, si repletum maneat, est vas mortuum. Si jam hoc in omnibus vasis fieret, mors sequeretur illico: dum in quibusdam vasis hoc obtinet, in illis nulla fit circulario, sed in distensis vasis liquidum immobile stagnat.

Unicum tunc remedium est, quod tollit hanc plenitudinem, nempe venæ sectio; si venæ simul nimis plenæ transitum ex arteriis impediunt. Si vero in arteriis distentis circa finem obstructis angustus hæreat sanguis, arteriotome prodest porius; quia cum liber transitus ex arteriis in venas impeditus est, venæ sectio plenitudinem nimiam arteriarum tollere nequit. Sic in morbis acutis salutaris naturæ molimine tories soluta in narium arteriola plenitudinem illam tollit. Ideo tam sollicitè omnia signa recensuit Hippocrates, quæ docerent Medicum, noliri naturam hanc viam, ne imprudenti cura turbaret, vel impediret salutarem hanc evacuationem.

Sed præterea per sanguinis missionem minuuntur vires, quibus cor sanguinem in arterias pellit: postumus enim vitam minue-  
re pro lubita, imo animi deliquium & mor-

tem ipsam inducere per sanguinis missiones. Hinc patet sic omnium efficacissime minui distendentes causas.

Pater hoc clare in summe plethoricis; in quibus, dum vasa nimis distenta se contrahere nequeunt, suffocatur circulario; pulsus incipit languidus fieri, imo statuarum instar obrigeunt: simul ac larga venæ sectione solvitur hæc plenitudo, contracta vasa propellunt distendentes humores, redeuntque vires suffocatae antea.

Quantam autem efficaciam habeant hæc evacuationes in solvendis obstructionibus, docent pulcherrima observata. Dum Pleuritide acutissima decumbit homo, præ doloris acerbitate respirationem supprimens se ipsum suffocat: dum sanguis mittitur, sæpe statim levamen sentit; imo aliquando omnis sedatur dolor, contractis vasis repellentibus obstruentes massulas in majora vasa. Monitus per insomnia Galenus, juvenis adhuc, sibi ipsi dissectuit dextræ manus arteriam inter indicem digitum & pollicem sitam; permisit sanguinem effluere, donec sponte siseretur; sic enim somnium præceperat: & subito diurnus dolor extinctus est, in illa maxime parte fixus, qua jecur diaphragmati committitur. Alii homini per vulnus in malleolo infictum vulnerata fuerat arteria, nec quievit hæmorrhagia, donec Galenus vocatus totam arteriam difsecaret; sed hæc homini quarto jam anno molestus coarctatus dolor inde sanatus fuit! (Galen. de Curand. ratione per Venæ sectionem cap. 23. Tom. X. pag. 451.).

2. Reciproco motus contractæ & distentæ alternis vicibus arteriæ fiebat a cordis vi impellente sanguinem, & arteriæ elasticitate & vi musculari, qua se contrahit. Sed demonstratum fuit §. 126. nimiam debili-

bilitatem fibrarum producere vasculorum, ex his conflatorum extensionem, & in liquida contenta inertiam; hinc ubi nimia laxitas vasorum facit, ut minori efficacia se contrahant, tunc vasorum roboratio locum habet.

Sed ipsa nimia distensio vasorum robur debilitat. Sic vesica, diu distensa in urinæ retentione, paralytica fere facta, omnem se contrahendi vim amittit: & forte ab hac causa plurima in morbis pendunt. Qui valida laboraverunt ophthalmia, sæpe tota vita habent nimis laxa hæc vascula; unde a levissimis causis distensa rubent: roborantia, prudenter applicata, sola tunc proficiunt. Post morbos acutos inflammatorios capitis, sæpe manent Lesæ adhuc cerebri functiones, quamvis dulum deferbuerint morbi impetus; pulposi corticis vasculis infarctis adhuc manentibus: sensim soluta materie obstruente, aucto vasculorum distensorum robore, superatur malum. Si debilitante cura pergat Medicus, insanabilis sæpe postea stultitia manet.

Quomodo autem, & per quæ, vasa roborari possint, dictum fuit numeris citatis.

3. Per frictiones ut successiva & repetita sæpius vasorum mollium compressio & laxatio; hinc frictio supplet reciprocum illum vasorum motum. Possumus per frictiones, premendo liquida ab apice versus basim, facere, ut arteriæ venæ fiant; sicque ducere obstruens immenabile ex angustis arteriarum sinibus in latiore locum; relaxata parte, mox pellitur, iterum in priores angustias: dum hoc fit sæpius, idem

erit perfectæ, quod in veperitione videret fieri Leeuwenhoekeius, id est, ita illo & reddito atteretur & divideretur illud obstruens, sic ut transire possit in venas.

Quantum autem valeant frictiones in resolvendis obstructionibus, docent observationes Medicæ. Parotidem glandulam indutam, plurimis, illisque efficacissimis remediis frustra tentatam, resolutam vidi, dum bis de die, vaporis aque tepide cum aceto exposita prius parte, pannis laneis perficeretur per horam. Idem in strumosis colli glandulis observatum est sæpius.

MUSCULARIS MOTUS vero huc convenit: quatenus per illum accelerato venosi sanguinis motu cor irritatum fortius, & sæpius contrahitur: hinc augetur circulatio, & vasa eodem dato tempore sæpius distenduntur, & contrahuntur vicissim.

4. Constat observari certissimis, esse talia in arte remedia, quæ ingesta vel applicata corpori nostro augment morum in toto vel in parte; hæc vocantur stimulantia. Illa autem, mista vitali fluido per vasa moto, videntur vel sua mole & figura talibus, ut paucissimis punctis impetum sui motus communicent partibus quibus applicantur, irritare vasorum latera in frequentiores & validiores contractiones; tuncque mechanice legibus explicari potest horum actio. Vel sunt talia, in quibus licet sensibus nihil acrimoniæ deregatur, quæ tamen certissimo effectu, quamvis lateat modus agendi, motum humiorum per vasa, & vasorum attritum ad contentos humores augeant. De his autem dictum fuit §. 75. n. 5. & §. 99. n. 2.

§. 134. **D**iluit aqua, calida in primis, si hausta, injecta, exhalans, applicata; atque, dein ad loca, ubi solvendum hæret, pulsa sit. Quo derivantia, attrahentia, propellentia spectant.

Respectu liquidorum nostrorum, si pingua exceperis, unicum tantum diluens habetur, nempe aqua; & reliqua omnia, quæ diluenda dicuntur, tantum agunt ratione aque, quam continent. Diluere autem proprie dicitur, si aqua, admisione & interpositione suarum partium, separat adunatas moleculas. Sed requiritur certus calor gradus, ut aqua diluat: frigida enim potius coagulata fluida, constringit vasa; utroque hoc effectu nocens in hoc casu. Fervida aqua sanguinem uno momento concrefcere facit. Omnium optimus

ille calor gradus, qui parum tantum excedit sani corporis calorem. Aqua talis, vaporis forma, vel specie fomenti, cataplasmatibus &c. applicatur parti affectæ; vel potata, vel clysmate injecta, vel denique venulis absorbentibus, in corporis interna & externa superficie positis, resorpta, miscetur sanguini; & tunc æqualiter per totum corpus distribuitur. Sed indicatio curatoria requirebat imprimis, ut diluens aqua ad locum obstruendum iret plus quam ad alias partes.

Habemus jam in arte talia auxilia, quæ

sa-

faciunt, ut liquidi vitalis impetus & copia augeantur in parte quadam corporis. Sunt autem talia, quæ minuunt resistantiam in loco, versus quem indicatio jubet, ut majori impetu & copia ruant humores. Sed liquido, in partem corporis quamcumque pellendo, resistunt vasorum plenitudo & robur: omnia ergo, quæ vasa depleant, vel vasorum latera reddunt minus resistantia, efficiunt, ut in hæc vasa majori impetu & copia ruant humores. Hinc somenta, cataplasmata, vapores aque tepidi, laxanda vasorum latera, hoc efficiunt: cucurbitæ pariter, atmosphæræ pressionem dum tollunt in loco, cui applicantur, resistantiam minuunt: frictiones venas deplendo faciunt, ut arteriæ celerius se in venas depletas evacuent: hinc circulationis velocitatem in parte augent, efficiunt ergo, ut eodem dato tempore major humorum copia aucta celeritate per partem fluat; dum scarificantur partes, quibus imponuntur cucurbitæ, depletis vasis adhuc magis minuitur resistantia. Præterea omnia illa, quæ applicata corpori stimulo suo vasa irritant in celeriores contractiones, ob eandem causam idem præstant. Hinc sinapismi, vesicatoria, & tanto cum fructu adhibentur in hunc usum.

Patet per Experimenta, quanti usus sint hæc auxilia. Dum pars corporis exponitur aque tepidæ vapor, incipit brevi turnere & rubere, majori copia liquidorum huc derivata. Dum in acuta phrenitide omnes turbantur cerebri functiones, balnea, epispastica, cucurbitæ, applicata inferioribus partibus, quantum levamen adferunt! Pleuri-

tis longe pulchrius curatur, si calidis fomentis emollientibus nocte & die tegatur affectum latus. Dum strumosis colli glandulis laboranti solventissima exhibentur remedia, nisi partibus affectis somenta applicentur, vix multum profunt.

Omnia ergo, quæ hoc efficiunt, ut in loco, ubi obstructio hæret, vasa depleantur celerius, & impleantur facilius, DERIVANTIA & ATTRAHENTIA dicuntur: quia faciunt, ut aqua corpori applicata, venis recepta, sanguini mista, intra datum tempus majori copia veniat ad partem affectam.

Sed PROPELLENTIA dicuntur talia auxilia, quæ motum humorum per vasa augent: hoc enim aucto, celerior fit propulsio aquæ sanguini mistæ. Sed hæc agunt æquabiliter in totum corpus: attrahentia autem & derivantia aucti motus effectum versus partem obstructam determinant.

Quando jam hæc simul conspirant, sanatur sæpe talia mala, de quibus desperabant fere omnes. In spina ventosa, & veneris ossium motbis, qui omnia fere vel optima remedia eludunt, datur magna copia decocti Ligni Guajaci: impleto dein corpore per hoc decoctum, suscitatur major motus: dum per accensum vini spiritum, nudo sub stragulis decumbenti ægro applicatum, excitatur febris: sic decoctum Guajaci celerius propellitur per omnia vasa. Interim pars affecta vel fomentis mollissimis obvolvitur, vel sic locatur, ut directè recipiat accensi spiritus halitum: sic derivatur & attrahitur in hanc partem remediî efficacia, & sapissime sanatur.

§. 135. **A**ttenuant 1. aqua. 2. sal mar. gemm. ammon. nitr. borax, fixus alcalinus, volatilis. 3. Saponēs ex alcali & oleo nativi, compositi, fuliginosi, volatiles, fixi, bilis. 4. præparata Mercurialia. Quæ ipsa perducuntur ad loca debita per derivantia, attrahentia, propellentia.

1. Aqua inter illa, quæ attenuant, principem locum obtinet. Adepti dixerunt ex aqua, per seminale rerum principium mutata, concrevisse omnia; & ultimo artis & naturæ effectū in aquam omnia resolvi posse. Hinc fere universales solvendi vires in aqua agnoverunt. Elementis enim aquæ hæc proprietas inest, ut calore (aqua enim in glaciem concreta vim solvendi non habet) a se invicem separata, possint locare in interstitiis suis corporum solutorum particulas, illasque ibi sustinere sic, ut simul

cum aqua penetrant per minimas angustias, per quas aqua sola transire posset, nisi occurrant in hoc itinere aliis corporibus, quæ soluti corporis in aqua particulas fortius trahant, tunc enim excutiantur: v. g. salis marini granum sic solvitur in aqua ut dispareat totum; & licet decem libris aquæ diluatur in singulis aquæ guttulis hærebit proportionalis salis soluti molecula, poteritque sal sic solutus in aquæ magna copia transire per omnia vasa, per quæ aqua ipsa posset transire. Sed experientia docet.

docuerunt subtilissimam, quæ sub sensus cadit, fluidorum humanorum partem, aquam esse, saltem pro maxima parte. Urina teceus emissa halituosum quid spargit, quod vas prius collectum aquam exhibet, in qua aliquid spirituosum odorati hæret. Similis vapor & ex sanguine sano, teceus misso, exhalat. Subtilissimum exhalans de tota corporis superficie fluidum, tedioso labore collectum, aquam exhibuit, in qua larebat subtilissimum aliquid solo fere odore distinguendum; quod an aqua sit, an aliud quid, nondum per experimenta constat. Saltem inde patet, potuisse aquam transire per exhalantia vascula, quorum centena & amplius millia in spatio unius grani sabuli hiant, secundum calculum Leeuwenhoeckii; ubi ergo obstruens molecula per aquam poterit attenuari & solvi, ibit cum aqua per minima quæque vascula, & resoluta erit obstructio.

Hinc ablata sæpe modica aquæ quantitate inmeabiles redduntur humores, qui antea per angustissima fluxerant vasa, reddita aqua, iterum attenuantur: v. g. arteriæ exhalantes in narum cavis subtilissimum essant liquidum; quod, dissipata parte mobilissima aquosa, concretescit in mucum tenacem; nucus tamen ille iterum per aquam attenuari & solvi potest.

Sed vis hæc attenuans aquæ non valet solvere omnia concreta, in corpore humano observata. Salina quidem omnia, mucosa, mucilaginosa, gelatinosa, pituitosa frigida, saponacea, concreta per aquam attenuantur & solvantur; sed inflammatoria sanguinis spissitudo, concreta oleosa, sebacea, calcuosa &c. per aquam non solvantur. Habent tamen in arte & alia auxilia, quæ concrectiones illas dividunt, quas sola aqua solvere non posset; uti sunt salina multa, saponacea &c. sed & omnia fere hæc aquam requirunt pro vehiculo, ut penetrare possint ad locum obstructum. Aqua ergo in obstructionibus referendis fere universalem usum habet, dum vel agit attenuando, vel saltem vehiculi instar alia solventia deducit ad locum obstructum.

2. SAL MARINUS, GEMMÆ, AMMONIACUS. Satis affines sibi mutuo pluribus doctibus hi sales simili fere attenuandi efficacia pollent. Duo priores assumpti humoribus nostris miscentur quidem, sed per lo-

tii vias immutari fere redeant: hinc licet per pleraque corporis vasa transeant, tamen horum actione non immutantur. Omnia autem illa, quæ ingesta per corporis vires mutari nequeunt, semper maiorem motum excitant; hinc & stimuli vice funguntur simul.

Ammoniacus autem sal, prioribus levior, salibus nativis sanguinis magis affinis, per vires nostri corporis mutabilis, & penetrabilis maxime, præfertur fere, & laudatur merito tamquam summum deobstruens in acutis æque ac chronicis morbis.

Videtur autem salium horum actio inde pendere, quod humoribus misti, soluti, ad locum obstructum delati, vasorum actione quasi attriti ad moleculam obstruentem, pondere suo & figura dividant illud concretum; sicque aptum reddant, ut transire possit per vasorum angustias, dum simul stimulo suo vasorum in contenta fluida actionem augent.

Quantam autem vim habeant, docetur observata Medica. Dum a contusione sub integra cute, fractis vasis, sanguis in thrombum concretus hæret, sales hi soluti in aqua, applicati loco contuso, felicissime concretum sanguinem resolvunt. Qui sale marino abutuntur, sanguinem tandem habent sic dissolutum, ut vix vasis coerceri possit; unde validissime sæpe hæmorrhagiæ oriuntur, partim a nimis dissoluto sanguine, partim a nimia acrimonia humorum, erosio vasis.

NITRUM. Hodiernum a Veterum nitro penitus differre videtur: illud enim videtur vel fuisse alcaline naturæ; vel saltem ammoniacum Veteres vocaverunt nitrum. Plinius (Lib. 31. cap. 10.) dicit, nitrum in picatis vasis adjecti, ut liqueceret; calce respersam reddere odorem vehementem; in testa aperta exuri, ne exulet. Sed hæc dotes sali ammoniaci perfecte conveniunt; nitro autem hodie in officinis dicto minime quadrant. Alio autem in loco (Lib. 36. cap. 26.) de vitri inventionem scribens narrat, famam ferri, quod appulsa navæ mercatorum nitri, cum sparsi per litus epulas perant, nec esset curtinis attollendis lapidum occasio, globos nitri de nave subdidisse, quibus accessu permixta arena littoris transucentes nobilis liquoris fluxisse rivus, & hanc fuisse originem vitri. Sed hæc història alcalinum nitri Veterum

terunt indolem arguere videntur : unde Boyleus & alii dixerunt, sodam Ægyptiorum esse nitrum Veterum.

Illud autem, quod hodie in officinis nitrum vocatur, Veteribus videntur incognitum fuisse, miro modo ambigens inter naturam vegetabilem, animale, fossilem : reperitur enim in desertis & inhabitatis locis in Indiis orientalibus crusta tenuissima superficiem terræ tegens, post largas pluvias imprimis apparens, in aliis locis de terra nigra excoquitur : in vestitiis adificiis, cæmeteriis, stabulis, columbariis colligitur nitrum : in plantis quibusdam reperitur sal essentialis, sola inspissatione, succi expressi & depurati collectus, qui omni dote nitrum refert.

Nitrum hoc, si purum sit ab omni sale marino, in aere sicum manet, in aqua solvitur totum, inter salia fere levissimum : summum attenuans, per corporis vires mutabile, refrigerans, tantum usum habet, imprimis in morbis acutis, in quibus obstructions ab inflammatoria sanguinis densitate nascuntur. Præfertur tunc sal marino & genimæ, quia levius est, & superabile corporis viribus : sal ammoniacum vero præferunt, quia sal volatilis alcalinus, in his morbis nocens, magnam partem salis ammoniaci constituit ; extricandus forte a ligante acido salis marini, si occurreret putrefactis vel alcalinis humoribus.

BORAX. Mirabilis penitus sal, cujus indoles nondum bene cognita est, & cujus historia confusa penitus vel apud optimos scriptores habetur. Voluerunt esse Veterum chryfocollam : sed Dioscorides ( *Lib. 5. cap. 104.* ) colorem porri læte virentis commendat in chryfocolla, & monet in fine capituli, esse ex eorum genere, quæ vomitum concitant, imo & necem inferre possint : & alibi ( *Lib. 2. cap. 99.* ) ex urina & ære Cyprio parari gluten, auro seruminaudo idoneum ( *ἀποζωα ἑπὶ τῷ χρυσῷ πλάσσει* ) dicit. Plinius ( *Lib. 3. cap. 5.* ) segetis instar læte virentis colorem commendat : unde in Neronis spectaculis Circi arenam Chryfocolla straram fuisse dicit. Monet etiam vomitum excitare, & auri fabros illud sibi vendicare agglutinando auro ; sed addit tunc Cypria temperari æruginæ, & pueri impubis urina, addito nitro.

Unde ex colere & effectis videtur Veterum Chryfocolla cuprum in se continuisse : sed in actis Academicæ Regiæ scientiarum ( *PAn. 1728. 1729. 1732. etc.* ) Celebrissimi Viri, salis hujus proprietates indagantes, invenerunt ; boracem nihil in se cupri habere ; sed esse naturæ utcumque alcalinæ, magnamque astringentem habere cum soda Ægyptiorum ; verum esse minus alcalinum, & habere præterea in se terram vitrificabilem, & salem neutrum nondum bene cognitum.

Inter deobstruentia remedia magnum nomen obrinuit, unde & difficillimis morbis sanandis solet adhiberi, parum miro, quem habet, stimulo, partim vi salina attenuante agens.

FIXUS ALCALINUS. Artis tantum, non naturæ filius, a Kali herbula dictus ; quæ vivis flammis combusta cineres salissimos relinquit. Sal ille ex variis admodum paratur vegetabilibus, semper fere idem, tantum maiori vel minori acrimonie diversus. Adhibetur imprimis, ubi frigus, inertia, lenta pituita prædominantur ; ubi calor, putredo, siccitas magna adsunt, non adeo tutus horum salium usus.

VOLATILIS. Omnia hæcenus explorata animalia, & vegetabilia, per putrefactionem dant salem volatilem alcalinum. Animalia omnia hæcenus examinata simplici destillatione hunc salem largiuntur. Animalium humores non alcalini, admisso sale fixo alcalino, præbent salem volatilem alcalinum. Plantæ quædam acerrimæ, ut sinapi, cochlearia, nasturtium, cepæ &c. salem talem continent, fractis tantum plantarum harum partibus, suo halitu se manifestantem, & levi destillatione facile inde extricandum. Ex omnibus illis natus sal volatilis alcalinus, per artem purissimus redditus, omni dote apparet idem.

Usum habent eundem fere hi sales, ac alcalini fixi ; sed mobilissimi levissimo caloris gradu disperguuntur quaquaversum, & aufugiant ; hinc non tam durabili effectui agunt ; si vero coerceantur ad locum, ubi agere debent, omnia destruant : sal enim alcalinus volatilis, cuti applicatus, & renaci emplastro testus, illam comburit in crustam gangrenosam. Majorem ergo adhuc cautelam horum salium usus requirit.

3. Saponem omnes olei cum sale accuratam

tam

tam adeo miscelam habent, ut in aqua dilui possint, absque ullo apparente oleo; hoc enim requiritur, ut saponem dici possint. Tales jam saponem habentur plurimi nativi. Mel, Veteribus adeo usitatum, & Chemico examine, & pulcherrimo usu in morbis, imprimis acutis, inu & in chronicis plurimis saponaceas vires solventissimas exhibuit. Saccharum posterioribus sæculis maximo in usu, antiquis tamen, uti videtur, cognitum, in igne deflagrans, in aqua solubile & in chrysallos redigendum, similis valet efficacia. Fructum horzorum bene maturorum succi recentes, vel & in sapam inspissati, incredibili solvendi virtute fundunt omnia. Herbarum recentium succi nativa miscela oleum & salem sic unita habent, ut saponem merito dici possint; imo in quibusdam tanta efficacia est, ut saponis arte parati instar sordidas emulcunt vestes: docet hoc saponariae dictæ herbæ succus.

Dum certa lege oleum animalium, vel vegetabilium, acri sali fixo alcalino unitur, nascitur sapo; in quo antiqua detergens & dissolvens lixiviosa salis vis inest, omnia oleosa, pinguis, resinosa, pituitosa, amurcosa solvens; abest tamen nimia & sepe rodens acrimonia. salis alcalini fixi: hinc talis sapo, aqua dilutus vel vacuo ventriculo, & intestinis imprimis in propriis humoribus horum viscerum huc affluentibus solutus, universale fere deobstruens dat, tuto faciens, quod acriora solventia nonnisi cum periculo efficerent.

Efficacissimi per artem parantur saponem, dum purissimum & attenuatissimum oleum vegetabile jungitur sali alcalino sincerissimo fixo, vel volatili. Sic alcohol vini cum sale volatili alcalino concrevit in saponem mirabilem, Offam Helmontianam dictum. Idem alcohol, ab omni aqua liberum, siccissimo ab igne sali fixo alcalino unitum, verum facit saponem. Athereum terebinthinæ oleum, alcalino sali difficili arte unitum, saponem præstantissimum facit, Starkeyanum vulgo dictum. Quo purius & subtilius oleum, quo magis sincerus sal fuerit, eo præstantior usu sapo inde natus.

**FULIGINOSI.** Fumus, dum aperto igne combustilis materia uritur, camino receptus, condensatus, ejus parietibus accrescit tum a flocculorum nigrorum; est verus car-

bo volatilis pingui oleo dives, fuligo dictus. Chemica hujus analysis docet, in aquam, sales, olea, terram, resolvi posse; unde saponacea ejus indoles patet. Cataporia ex fuligine facta, auro obducta ne displiceant nimis, deglutita in lentis morbis, vi attenuante saponacea fumos fecerunt effectus.

**BILIS.** Verum saponem nativum in animali corpore exhibet. Crulis ingestis, per ventriculi actionem jam parum subactis, in homine statim bilis affunditur, ut aquabilissima fiat omnium miscela, & solubilitas in aquis. Sericeas vestes, pinguebus maculatas, bile animalium pulchre depurare noverunt artifices.

Pretiosa pigmenta Pistores bile diluunt, ut æquabilissime deduci possent. Quantam autem vim dissolvendi habeat bilis, docent morbi, in quibus bilis, impedita fluere per consuevas vias, regurgitat in sanguinem; dissolvitur enina totus in aquam tenuem; unde diuturnum Icterus fere semper hydrops sequitur. Bilem inspissatam in extracti formam, ne putrescat, servant officinæ: unde cataporia fiunt ad hos usus. Imo tumido abdomini juniorum infusa bilis inspissata fundit concretas massas in intestinis herentes, & per alvum evacuat.

Pro varia jam morborum indole varii saponem adhibentur. Sapo, Venetus dictus, ex purissimo oleo presso & sincero sale alcalino factus, sine ullo fere renixu fundit omnia; in morbis autem acutis, putridisque, non semper adeo tuti usus: tunc nesci, saccharum, horzorum fructum succi recentes, vel inspissati præferuntur; maximi usus imprimis, ubi inflammatorium spissum resolvendum est. Si frigus, inertia, mucosa humorum Indoles prædominentur; acriores saponem fuliginosus, vel ex oleis stillatitius aromaticis & sale volatili alcalino facti, ut sunt sales volatiles oleosi officinarum, præferuntur. Profunt tunc & illi, qui ex cohobole & salibus fixis alcalinis fiunt &c. Ubi putredo adest, vel futura metuitur, a bile, adeo sponte in putredinem prona, abstinentur.

4. **PRÆPARATA MERCURIALIA.** Argentum vivum, sic dictum est, quia argenti fulgorem suo splendore refert, & tremula fluiditate vitalis quid habere videtur: unde & *ἀργύρεον* vocavit Dioscorides; *ἀργύρεον* *νικητήριον* Aristoteles, quasi argentum mobile dixit; hoc

hoc Veteribus quidem cognitum fuit, sed damnatum tamquam deleterium. Dioscorides (*Lib. 6. cap. 28.*) dixit hydrargyrum epotum eadem facere, quæ Lithargyron, cuius noxas (*ibid. cap. 27.*) descriperat: & alibi (*Lib. 5. cap. 110.*) monet, quod oporteat servari hydrargyrum in vitreis vel plumbeis, vel stanneis, aut argenteis vasibus; aliam enim omnem materiam exedit, & facit dissilire, potestatem autem habet deleteriam epota, gravitate erodens interiora. Plinius (*Lid. 33. cap. 6.*) pariter damnavit, vocans argentum vivum vomitum liquoris æterni, rerum omnium venenum, quod exest ac perumpit vasa permanens tæbe dira: unde & postea (*ibid. cap. 8.*) mihi, ex quo argentum vivum excoquitur, usum in Medicina tamquam temerarium damnat. Galenus (*Lib. 9. Simplic. Medicament. Tom. XIII. pag. 270.*) brevi tantum sermone agens de Hydrargyro, dicit, se non habere eius ullam experientiam; neque ut interimentis, si epotum fuerit, neque an id faciat externe appositum. Proscriptus hinc fuit argenti vivi usus etiam a Græcis Medicis recentioribus. Arabes primi inceptum externo usu argentum vivum abhibere ad cutaneos morbos sanandos. Postea ad luen veneream curandam laudaverunt externum tantum usum Medici, donec primus fuerit Joannes de Vigo, qui præcipitatum rubrum interne exhibuerit. Postea ipsum argentum vivum in nativa forma dederunt in pilulis Barbozzæ dictis; uti in tractatu absolutissimo de morbis Venereis demonstrat Celeberrimus Astruc (*pag. 126. &c.*)

Mirabile hoc fluidum metallicum, soli auro pondere cedens, simplicissimum est & divisibile admodum, cum per ignem volatilis fumi forma dissipetur in auras (quantum enim debent increvisse superficies ratione molis, antequam ponderosissimum argentum vivum in aere sustineri possit!) Nullam præterea habet acrimoniam sensibus observabilem; cum & oculi tenerimus sensus, & crudum vulnus nullam asperitatem, nullum dolorem ab applicato argento vivo percipiant. Dum blandum adeo apparet & iners remedium corpori viventis applicatur externe per linimenta; emplastra &c. vel & in vapores resolutum bibula ingreditur extrorsum patentia vasa; vel deglutitum parca copia & repetitis vi-

cibus fuerit, miro modo mutat totum corpus, fundit; dissolvitque totum sanguinem in sætidam quasi colluviem, quam per salivationem, vel & per alvum quandoque de corpore expellit.

Oritur tunc primo ægritudo per totum corpus, major calor, febris, vires incipiunt prostreri quasi, appetitus minuitur, sitis oritur major; post cadaverosus halitus exspiratur ore; gingivæ, lingua, palatum, tonsillæ, glandulæ sub lingua & aliæ vicinæ incipiunt tumere, dolere, calere; dentes assurgunt, lingua ad latera & apicem, ubi dentibus contingit, est imprimis, ulceribus albis dolentissimis eroditur; similiter & pars interior genarum & labiorum afficitur; tota facies tumet; labia tumentia retorrida sunt sædo aspectu; tunc effluit viscosus olidus humor ingenti sæpe copia, exulcerans omnia loca, quæ alluit. Durat hoc per plures dies: sensum tunc minuitur omnia recensita, exhaustum: apparet totum corpus, & decolor. In quibusdam, vel ex suppressa salivatione jam incepta per frigus admissum imprimis; vel ex peculiari idiosyncrasia versus ventriculum & intestina tendit remedium virtus; & similia tunc in his partibus videntur oriri mala, quæ oculis videremus fieri in partibus oris interni. Tunc sævissima cardialgia, & tormina intestinorum acerbissima oriuntur, alvi fluxus aquosus, olidissimus, copiosus subito sæpe vires prostrernit; animi deliquia, imo ipsam mortem producit.

Hoc saltem patet, argenti vivi usum, sive per salivales ductus, sive per alvum educantur humores, dissolvere omnia, attenuare, dividere: sanissimus enim homo, opima corporis pinguedine nitens, incautus dum argentum vivum, ad cutandam fæciem; corporis affricat, validissimum passus fuit salivationem: per viginti dies, totus pallidus & emaciatus emerit, toto sanguine sic dissoluto, omni pinguedine attenuata & educta de corpore.

Pitcatnius; (*Dissertatio de causis diversæ Molis, quæ sunt sanguis per pulmonem, natis & non natis, p. 37. 38.*) qui ex communibus omnium corporum legibus plurimam deduxerat pulcherrima in Medicina, fuit in illa opulione; gravitatem argenti vivi: solam sufficere; nec aliam facultatem hic desiderari, ut explicentur mirabiles illi effectus: imo audacter addidit, aurum, in formam san-



sanguini permiscendam redactum, habituum vires ponderi proportionales, & omnia medicamenta tantum superaturum virtute, quantum potere superaverit.

Argentum nempe vivum in minutissimas moleculas divisibile, sanguine fere decies & quater ponderosius, venas ingressum, per pulmonis angustias pulsum, ex sinistro corde cum sanguine in arterias proiecctum, habebit eandem celeritatem ac reliquæ sanguinis moleculæ; momentum ergo motus in argenti vivi particula erit ad momentum motus in sanguinis molecula, ut pondus argenti vivi est ad pondus sanguinis. Tanta ergo vi irruentes argenti vivi particule in sanguinis moleculas, illas dividunt, & attenuant: rubedo peribit in sanguine dissoluta; extricabuntur olea & sales attenuata pariter, unde fetor & putredo, attenuati humores per dilatata, impetu irruentis tanta vi argenti vivi, vasorum oscula exiunt de corpore. Omnia autem hæc effecta debent augeri, quia argenti vivi moleculæ motum semel impressum diutius retinent: demonstraverunt enim Mechanici, retardationes corporum æqualium, sed diversæ densitatis, æquali cum velocitate per idem liquidum motorum, esse in ratione inversa densitatum.

Simplex hæc, & cognito ponderi argenti vivi innitens, explicatio mirabilium horum effectuum sufficere visa fuit. Quædam tamen serio hæc meditantibus obveniant dubia, quæ non prurigne obloquendi Viris, quos veneror, sed veritatis amore, meliora addiscere paratissimus, proponam.

Ex universalibus illis argenti vivi proprietatibus non videtur explicari posse, quare soluti per vim assumpti argenti vivi humores salivales ductus potius ruant, quam per alia corporis loca.

Præparata mercurialia officinarum in parva quantitate omnes illos producunt effectus, quos longe major argenti vivi copia tantum facit. An verosimile apparet, in corpore humano argentum vivum extricari ita posse ex his præparatis, ut nativa ipsi forma redeat, & pristinum pondus; cum per artem nonnisi summo igne, & additis talibus, quæ acidum argento vivo unitum in se trahunt potentissime, hoc fieri possit? Et licet daretur, sic reviviscere in corpore argentum vivum, nondum ulla patet ratio, quare pauca grana facerent, quod

uncia integra argenti vivi vix efficit.

Novi faris, quid respondeatur ad hanc difficultatem; quod nempe argenti vivi minutissime divisi moleculæ, salinis spiculis infixis horridæ, pondere metallico unito concentratissimo acido, plus dividant omnia, quibus occurrit. Sed si consideretur præparatum album officinarum, levissimum exhibens inter præparata mercurialia pulvisculum: in ejus preparatione enim assuæ muriæ salis-marini excutitur in spiritu nitri solutum argentum vivum, edulcoratione repetita pulvis ille insipidus fere & blandus fit; tamen vidi sapiens, quod gravis viginti, divisis dosibus datis, imo & aliquando longe minori quantitate excitata fuerit satis valida salivatio. Levitas hujus præcipitati albi, & debilis salium argento vivo unitorum acrimonia in hoc pulvere, videntur repugnare huic sententiæ.

Nobili Viro cæcitate languida & confirmata uriusque oculi laboranti, jussit Empyricus, ut bina grana pulvisculi mercurialis (quem postea turbith minerale fuisse dixit) naribus attraheret, statim vomitu, sudoribus, sedibus, urina, saliva, lacrymis, decem aut duodecim horarum operatione, adeo commotus fuit, ut caput ejus plurimum intumuerit; tertio tamen aut quarto die post hæc facta gradatim rediit visus; & post mensem philosophicum acutior, quam unquam antea fuerat. Sic narrat Boyleus (*De utilitate Philos. Experim. pag. 346. 347.*).

Ex hac historia patet, omnes effectus argenti vivi ortos fuisse, dum pulvisculus mercurialis internas nares tangeret tantum.

Argentum vivum purum, vase vitreo sicco, sincero, contentum, solo concussu mechanico agitatum, dedit pulverem mollem, nigrum, tenuissimum, saporis acris metallici, aeris saporem utcumque referentis. Sexaginta & una destillationibus purissimum redditum Argentum vivum majorem copiam dedit similis pulveris. Argentum vivum in concubitibus vitreis conicis fundo plano instruit, phiala chemica vitrea inversa clausis, calori 180. graduum expositum per plures menses, dedit similem omni dote pulverem.

Sed pulvis ille sic natus, & Æretoria vitrea valido igne destillatus, rediit in argentum vivum, pauca grana tantum relinquens fixæ matiei.

Simplici destillatione ex retorta vitrea pu-

purissima ex Argento vivo nascebat pulvis ruber splendens, valde friabilis, saporis acerrimi metallici, nauseosi, penetrabilis, vix ex ore delendi, corpus humanum diu & valide turbans, & ad excretionem disponens: tamen pulvis ille sic natus, validissimo igne iterum fere totus mutabatur in argentum vivum (*Herm. Boerhaave de Mercurio experimenta in transfusionibus Philosophicis Anglicanis num. 430. Mens. Novemb. & Decemb. An. 1733.*)

Ex his apparet, argentum vivum, sine ullo addito, solo triu mechanico, sola ignis actione posse mutari in acerrimam indolem; iterum tamen redire majori igne in pristinam formam, deposita omni acrimonia. An ergo argenti vivi efficacia a communibus omnium corporum proprieta-

§. 136. **C**ausa coagulans educitur attractione alterius fortius trahentis. Sic acida in alcalina, olea in alcalina, &c. trahuntur, quæ experimentis Chemicis in primis inveniuntur.

Per Chemica experimenta constat, obtinere in quibusdam corporibus miram proprietatem, quæ alia corpora trahunt & sibi uniunt: v. g. olei vitrioli drachma si tribus aquæ libris diluatur æquabilissime, dein affundatur oleum tartari per deliquium, illud sibi uniet vitrioli acidum, & cum illo concrecet in salem compositum. Dum fluidissimum argentum vivum liquato per ignem sulphuri instillatur sensim, & agitatione continua miscetur, concrecunt hæc simul in nigram massam; quæ valido igne si urgeatur, non redit argentum vivum, nec avolat, sed simul unita sublimantur, & dant cinnabarim. In hoc casu ut reddatur pristina fluiditas argento vivo, debet addi huic massæ, ex sulphure & argento vivo concretæ, tale corpus, quod potentius trahit sulphur, & sibi uniat; tunc enim redit argento vivo antiqua indoles. Hoc fit, dum limatura ferri miscetur cinnabari; & dein summo igne urgetur ex re-torta: unitur tunc sulphur limaturæ ferri, & liberum ab hoc vinculo argentum vivum in excipulum transit.

Plurima alia recenseri possent experimenta Chemica, quæ docent, unita simul corpora, admissione alterius, quod potentiori vi trahit alterutrum horum, cedere a se invicem. Argentum in aqua forti solutum, immisso cupro, præcepit fundum peti; solutum cuprum similiter addito ferro

tibus pendet? An non potius singulari ejus naturæ, per experimenta sola cognoscendæ, hæc attribui debet? Sufficit inter Medicos novisse, quid agat argentum vivum humano corpori applicatum, licet modum, quo agat, ignoraverit. Aliorum remedium virtus non magis patet inquirentibus; quis enim explicavit modum, quo scamoneum totum sanguinem, in putridam aquam solutum, per alvum deturbet? Quis intellexit antimonii, & ejus præparatorum, mirabiles dotes &c.?

Omnia jam hæc remedia hæc §. recensita iterum determinari debent ad illa loca, quantum fieri potest, ubi hæret solvendum: hoc autem fit per DERIVANTIA, ATTRAHENTIA, PROPELLENTIA; de quibus dictum præcedenti paragrapho.

excutitur &c. Alcohol dissolvit, & sibi uniat, olea stillantia; affusa aqua, lactescit antea limpidum fluidum, & secedunt sensim olea prius soluta.

Magna tamen hæc semper difficultas manet, dum non ita facile cognoscitur causæ coagulantes, & sæpe causæ penitus oppositæ coagulum nostris humoribus inducunt. Numquid quies & nimis motus sanguinem coagulant? An non frigus summum & urens calor in massas irresolubiles faciunt coire sanguinis elementa? Quis intellexit modum, quo ab ingenti terrore (quod vidi) stirrhus in mamma subitissime nascitur, nullis remediis postea resolvable? &c. Præterea dum coagulans causa fecit concrefcere fluidorum nostrorum moleculas inter se, illas sæpe sic mutat, ut ablata causa coagulante, tamen non restituantur pristina fluiditas. Si quis dubitaret de hac re, tentet coagulatum affuso oleo vitrioli sanguinem iterum fluidum reddere additis alcalinis salibus.

Pulchrum tamen habetur in arte exemplum, quo patet, humorum nostrorum coagula quædam sic posse resolvi per educationem causæ coagulantis, ut redeat fluiditas, sic ut restituitur liber omnino per vasa humorum transfusus; dum nempe per acerrimum gelu extremæ partes corporis omni vitali humorum influxu privatæ sunt, si tunc nive tegantur, vel immergantur

aqua

aque gelidissimæ, tantum non congelataz, extrahuntur ex parte congelata spicula illa glacialia, redit vita in partem, & concretis fluidis redditur pristina fluiditas.

Plura forte talia adhuc latent in rerum natura, quæ educatione causæ coagulantis valerent resolovere concretæ in corpore humano. Calculi elementa in limpidissima san- hominis urina fluit; adunata postea sic coherant, ut hætenus per artem resolvi

non potuerint. Qui posset vim illam, qualicumque demum sit, qua ununtur calculi elementa, tollere, solveret calculum. Interim non semper summæ solvendi virtuti magna acrimonia comes est: bandum oleum solvit ceram, quæ aquæ stygiæ resistit; iners ovi cocti albumen myrrham diffuere facit, quæ aliis menstruis sua tenacitate vix solvi potest. Pulcherrimus talium remedium usus meretur, ut investigentur sedulo.

§. 137. V Erum quam liquidum, in loca aliena pulsus, non penetrabile fit, hincque obstructions creat, producantur multi, malignique morbi unde meretur id malum attente perpendi.

Hic agitur de illa obstructionis causâ, quæ explicata fuit §. 118. ubi nempe nec in vasis angustatis, nec in liquidis concretis hæret obstructionis causâ; sed tantum fit, quia liquida ingressa sunt canales minores, quam sunt illi, per quos naturaliter fluere debent: hinc quamvis talia liquida ingredi poterint vasorum minorum dilatata orificia, non poterunt tamen per angustos horum vasorum fines transire: hærebunt ergo, & obturabunt hæc vasa.

Quam ferax inde oritur morborum seges, patet facile consideranti, quod illibata sanitas totius corporis & singularum partium pendeat a debito liquidorum transfluxu per vasa proportionalis amplitudinis; & quod auctam celeritatem transfluxus humorum per vasa sequatur statim hoc malum. Dum enim valido motu musculari, vel per febrim augetur circulationis velocitas, videmus statim rubore perfundi multas corporis partes,

quæ antea non rubebant: manifesto indicio, sanguinem rubrum jam ingressum esse plurima vasa, in quibus naturaliter antea non reperiebatur.

Sed non tantum numerosissimi inde pullant morbi, sed & periculosissimi simul inde nasci possunt. Facile enim concipimus, quod sicuti pars rubra sanguinis per errorem loci ingredi potest vasa ferrosa, ita & reliqua decrepantis magnitudinis fluida possint impelli per easdem causas in aliena vasa. Si jam a tali causâ obstructio nascatur in teneris illis cerebri & cerebelli vasculis, unde vita & humanitas pendent, subito lethales orientur morbi, quorum causa tamen in cadavere omnem sensum fugiet. Tales autem morbi merito maligni dicuntur.

Apparet ergo evidenter, quantæ utilitatis sit recte intelligere hujus mali naturam, & cognito malo debitam adhibere curationis methodum.

§. 138. S Cimus id factum, si novimus 1. causas ejus (§. 118.) quæ ut plurimum satis observabiles, prægressas fuisse. 2. his dein successisse contrarias. 3. ubi effectus ejus clare cernimus. (§. 120. 121. 122.)

Queritur jam, sper quæ certo cognoscere possimus, hanc obstructionis causam obtinere.

1. In §. 118. enarratæ sunt causæ, quæ observatæ fuerunt errorem loci produxisse: Plethora nempe, motus auctus, rarefactio liquidi, laxatio vasis. Plethora adesse cognoscitur ex dictis §. 106. 1. Motus auctus indicatur signis recensitis §. 101. Rarefactio liquidi noscitur ex illis, quæ §. 106. 2. dicta sunt. Laxatio vasis præsens scitur ex dictis §. 27. & 43. & §. 44. imprimis

Tom. I.

autem, si observetur error loci obtinere sine plethora, motus aucti, vel rarefactionis signis, tunc laxitas vasorum sola causa videtur esse. Ut enim vasa minorâ recipient crassiores solito humores, requiritur, ut prius dilatentur; naturalis enim horum vasorum angustia excludit crassiores humores. Sed hæc dilatatio vasorum oritur vel ab aucta vi, qua urgentur humores in vasa, vel a minuto robore vasorum, quo renituntur nimis dilatationi. Ubi ergo non adsunt causæ, per quas ma-

J

jori

jori impetu fluida agunt in vasorum latera, error loci potest tantum fieri a minori refistatia laterum vasorum, id est a laxitate nimia. Hæc autem causa frequentissime obtinet; toties enim ophthalmiæ a sola laxitate nimia vasorum oriuntur; non quidem adeo acutæ, sed magis diuturnæ. Sic in moribundis, resoluto vitali robore, videmus viscidum exprimi sudorem, maculas rubras, purpureas, lividas nasci, a crassioribus nempe liquidis ingressis minora vasa, & resolutione sphincterulorum, quibus vasa videntur coarctata contentos humores.

2. Si jam dilatatis vasis per plethoram, motum auctum, rarefactionem liquidorum, vel laxitatem nimiam, applicentur talia, quæ subito constrigant vasorum capacita-

tem, certi sumus errorem loci obtinere; ingressi enim crassiores humores dilatata vasa, retinentur iisdem contractis, nec retrogredi poterunt, nec per angustias ulteriores propelli, unde necessario sequitur obstructio. Si æstuans a valido labore homo bene tecto corpore quiescat, sensim vasa omnia contracta proprio robore retropellunt alienos ingressos humores: si nudum corpus idem homo gelido vento exposuerit, sæva nascitur tam sæpe ab hac causa pleuritidis, vel & alij inflammatorii & difficilissimi morbi.

3. Confirmatur autem hæc diagnosi, quando observantur illæ mutationes lesarum functionum, quæ descriptæ fuerunt numeris citatis.

§. 139. **F**acile quoque est prævidere, quid fiat ex hoc malo posito per ea, quæ expolita sunt ( 120. 121. 122. 123. )

Quando jam hoc malum cognitum est, adesse, & simul constiterit, a quam causa ortum duxerit, & quam corporis partem occupaverit, facile erit prædicere effectus hujus mali. Longe enim alia metuantur ab errore loci, qui a nimia circuitus humorum velocitate oritur, quam ab illo, qui a nimia laxitate vasorum fit: multo

periculosior error loci in vasis encephali, quam in eute brachii &c. Sed in numeris citatis omnia hæc explicata fuerunt: §. 120. generales omnium obstructionum effectus considerabantur; sequentibus vero 121. 122. 123. dictum fuit, quid in variis vasorum seriebus, & diversis corporis partibus inde foret metuendum.

§. 140. **C**uratio fit 1. impactum retropellendo motu retrogrado in vasa majora. 2. id resolvendo. 3. vasa laxando. 4. suppurando.

Hæret molecula obstruens in vase conico, semper in angustius vergente: quamdiu jam manet eadem magnitudo moleculæ obstruentis, & eadem firmitas laterum vasis obstructi, non poterit illud obstraculum ulterius protrudi versus majores angustias; nihil ergo tunc superest, nisi ut retrogrado motu retropellatur versus basim conici vasis; sicque iterum ingrediatur vasa majora. Patuit autem ex Leeuwenhoeckii observatione §. 132. num. 1. enarrata, quod massula obstruens retropelleretur sæpe, dein protruderetur iterum, sicque iter & rediret in canale obstructo: causa autem protrudens moleculam immensibilem in majores angustias est impetus fluidi a tergo urgentis; cessante hoc impetu, contractilitas laterum canalis obstructi reprimebat hanc moleculam versus latiorē locum.

Obtinere autem talem retrogradum motum fluidorum in vasis, simulac cordis vis

impellens cessat, vel minuitur, docent certissima observata. Dum in syncopen delabitur homo, incipit minui cordis actio; imo si perfecta fuerit syncope, cessat integre. Incipiunt tunc statim pallere labia & oculi, facies contrahi & subsidere, collapsus, vel potius contractus, elasticitate suorum laterum, vasis minoribus, & retropellentibus fluida contenta in majora vasa.

Si jam v. g. globus ruber, orificium dilatatae arteriæ serosæ ingreditus, ibi hæreat immobilis; idem ille, retropulsus in arteriam sanguineam rubram, ex qua derivatur arteria serosa, libere fluat per ultimas arteriæ rubræ angustias, & resoluta erit obstructio. Eadem jam poterit fieri obstructionis solutio in reliquis decrefcentium vasorum seriebus.

2. Ex data definitione §. 107. obstructio nascebatur ex excessu molis transiituri supra capacitatem vasis transiituri: si jam possit

possit immeabilis hærens molecula sic dividi, ut per vas obstricti ultimas angustias transiret. sublata erit obstructio. Hæc methodus resolvendi obstructionem patuit in modo citato Leeuwenhoeckii experimento, ubi ita illo & reditu massula obstruens ad latera canalis attrita solvebatur sic, ut transire posset.

3. Apparet evidenter, effectum fore omnino eundem, si vas obstricti angustetur capacitas, si vas moleculæ obstruentis minuat moles; utroque enim in casu liberum conciliabitur iter fluido transmittendo per canalem antea obstrictum; quod requirebatur. Laxari autem sic posse vasa, ut non tantum admittant crassiores humores, sed & transmittant per ultimos suos fines, quotidiana docent observata. Uteri internam superficiem constituentia vasorum ibi hiancium oscula tenuissimum tantum rorem transmittunt omni tempore, dum non menstruantur mulier; menstruant vero tempore rubrum dimittant sanguinem: his cessantibus; contrahuntur iterum, nec admittunt sanguinem rubrum. Multis hominibus accidit; ut ruditer vestiri per strata lapidea sine ullo dolore parum mingant sanguinem, non ruperit, sed tantum dilatatis fistulis renalibus; sola quies sollicitur hoc malum, contractis iterum his fistulis, antea nimis dilatatis.

Mirum forte videri posset; quod §. 118. inter causas, per quas aliena vasa ingrederentur crassiores humores; recensatur vasorum laxatio; hic autem in curatione ejusdem multi laudetur eadem vasorum laxatio. Sed notandum; quod: laxitas vaso-

rum; quæ facit, ut dilatatis orificiis admittantur quidem, sed non transmittantur crassiores humores; sic causi erroris loci: talis vero laxitas, quæ facit; ut admissa crassiora liquida transmitti possint per ultimos fines canalis, faciet obstructionem ab errore loci ortam.

4. Ubi jam moleculæ obstruens tam valide impacta est vas coniventer angustis, ut non possit retrocelli in maiora vasa, nec resolvî per arrem; neque tanta possit conciliari valis obstricto laxitas, ut transmittat immeabilem moleculam; tunc unicuique hoc sapere est, ut vis vitalis, a tergo urgens in locum obstrictum, ascindat partem obstrictam: vas tunc liberum, sed parvulum, humores suos effundit, solidis illis tenerimis abscessis misceat, calore loci, attritu vicinorum vasorum, hæc simul abeant in homogeneum album, spissum, pinguem homorem, præ dictam: hoc vocamus *suppurare*. Hæc est sola via, qua natura se liberat ab omni parte adeo obstricta ut resolvî non possit. Salutare semper est hoc naturæ conueniens; modo vasa, sic in pus mutanda una cum infarcto immeabili liquido, non sint absolute necessaria ad vitam; & pus sic factum commodè evacuari possit.

Dum in febre ardentissima, nempe peste, oritur circa glandulas axillares, vel & inguinales, sæva inflammatio, cum summa duritie, nulla arte resolvable; suppuratione circa margines abscinditur totum hoc mortuum a vivis partibus, & excidit: quod arte nulla nisi per solam suppurationem fieri potest.

§. 141. **I**mpactum retrofertur. 1. Evacuando liquorem; qui impactum urget; magna, subita Sanguinis Missione, unde nixu contracti vas retro agitur: 2. frictione ab extremis vas ad basin.

1. Dum arteria vi cordis distenta se contrahit, retroprimeret contentum fluidum versus latorem locum, nisi a tergo urgens impetus liquidi impediret; dum ergo illius liquidi minuitur copia, & debilitatur impetus a tergo urgens; retrogrado motu ab apice basim versus movebitur in arteriis contentum fluidum; sicque; quoad determinationem motus fluidi, arteriæ fient pro tempore venæ. Sanguinis missio jam utrumque hoc præstat: minuit enim fluidi vas contrahi copiam; & debilitat cordis impellen-

dis robur: possunt enim pro lubita sola sanguinis missione ad mortem usque solvere hominis vires.

Sed ut hæc fiant cum fructu, debet magna esse & subita sanguinis missio: parva enim quantitate sanguinis subducta non satis minuitur copia; & nisi subita fuerit, non ita debilitatur vis cordis a tergo sanguinem urgens. Robustus enim homo paulo de vulneris viri binas libras sanguinis pleno rivo dimitteret, quin cadat in animi deliquium; dum triplam copiam sanguinis

perdere poterit, cum guttatim de naso stillat, vel dente evulso (ut sæpe observatum fuit) tenuis arteriola iugi stillicidio noctes & dies sanguinem fundat: nec tamen tunc animo linquitur.

Confirmat hanc rem observata in morbis acutis inflammatoriis. Dum acuta plenitudo decumbens præ immani dolore inspicere nequit, sicque suffocatur fere, solvitur patulo vulnere brachii vena: fluente adhuc sanguine sæpissime incipit minui dolor; imo integre cessat aliquando, liberatis vas obstructis retrogrado hoc motu humorum versus latiora vasa. Dum inflammati oculi rubent penitus a sanguine alienis vasibus impulsio, venæ sectione magna, imo ad animi deliquium usque, facta, statim rubor ille disparet, retro pulso sanguine in maiora vasa. Non enim requiritur, ut massæ obstruentes retrogrado hoc motu ferantur per magnam longitudinem, antequam ingredi possint latiores truncos: Anatomicæ enim injectiones docuerunt frequentissimas anastomoses & divaricationes truncorum in ramos in exiguo etiam spatio inveniri.

Veteres Medici, licet sanguinis circuitum ignoraverint, tamen per solam observationem effectuum in morbis, largam sanguinis missionem commendaverunt ad similia mala. (*Galeni Comment. I. in Aphorism. Hippoc. Tom. IX. ps. 40.*) Galenus explicans Aphorismum 23. sect. 1. ubi de evacuationibus agitur, & quidem ad animi deliquium usque, talem evacuationem laudat in febribus ardentissimis, in maximis inflammationibus, & vehementissimis doloribus, & alibi: (*De curandi ratione per venæ sectionem cap. 12. Tom. X. pag. 441. 442.*) ubi fervescens sanguis in se plenitudo, acutissimam accendens febrem, subito ac simul evacuari expedit, eamque inanire tentandum, vel ad animi deliquium usque, virum modo suspecto robore. Quæ autem sequuntur mox, indicant, Galenum hic de sanguinis missione agere: movet enim, ad pulsuum diminutiones Medicum attendere debere, tangendo eos, sanguine etiarum

fluente, ne pro animi deliquio mors occurrat; quod tribus Medicis accidisse turpi errore narrat.

Signa autem instantis animi deliquii a largamissionem sanguinis manifesta apparent: pulsus enim incipit robore minui, vacillare, levis oritur vertigo, pallent oculi & labia, nausea oritur & sæpe vomitus & sanguinis effluentis celeritas minuitur: tunc abstinendum ab ulteriori vacuatione.

2. Quando impetus liquidi, a tergourgentis moleculam obstruentem, sublatusest vel saltem minorum plurimum, tunc sola contractio vas reprimat immeabilem massulam versus latiore locum. Omne ergo quod vasorum contractilitatem, augeat, vel simili effectu cum illa conspirat, juvabit hunc retrogradum motum. Frictio autem externe comprimendo vasorum latera facit idem, quod contractilitas propria fecisset, & hujus efficaciam augeat, ut dictum §. 28. num. 2. hinc patet ejus utilitas, imprimis si ab extremis vasibus basin versus frictio instituat.

Quantum autem hoc prodest, docent iterum observata. Longe felicius sanguinis missione Pleuritis solvitur, si illo tempore, dum fluit adhuc sanguis, leviter perfricetur latus affectum; vel ægri profunda & sæpe repetita inspiratione, vel & tussi, affectam partem moveant: unde sæpe vinocalido vel aceto nasibus supposito, cardiaci titulo, cogimus ægros, ut vel inviti tussiant; dum sæpe acerbi doloris prægressi metu hoc facere non audent. Dum valido cursu agitantur animalia in venatu, observatur sæpe, ablata cute totum panniculum adiplum, imo & ipsam carnem musculosam, fere nigrescere, ob infarctum sanguinem in vasibus alienis: ideo reduces post validos cursus equos in stabulis perfricant equiones, ut tollatur hoc malum; didicerunt enim experientis, nisi hoc fecerint, languere hæc animalia, & inepta penitus reddi ad solitos labores.

Veteres lassatos longo itinere homines in balnea ducebant, & perfricabant: idem adhuc in Asia fieri consuevit.

## §. 142. Impactum resolvitur remediis (137. 134. 135. 136.) antepositis.

De his omnibus dictum fuit in numeris hic citatis, Maxime notandum videtur,

quod sanguis noster, sponte sua concretus dum quiescit, concretus tamen sensum

sim iterum resolvatur: sanguis enim, de vena sani hominis missus, concrevit brevi in placentam solidam; unde sensum exprimitur serum tenuius, cui innatat concreta massa rubra, insula dicta. Effuso omni sero, rubra illa crassa pars post aliquot horas iterum simile serum dat, sicque tandem fere tota collescit. Hinc admodum probabile videtur, moleculas ob-

struentes, in vasis hærentes, calore corporis sensim sic posse solvi, modo impetus fluidi a tergo urgentis minuatur, & non adsit nimirum robor vasorum, per quod densantur nimis valide fluida.

Hæcque videtur esse ratio, quare morbi inflammatorii felicius curentur in laxis corporibus, quam in robustis & valido labore exercitatis hominibus.

§. 143. V Asa laxantur remediis ( 35. 36. 54. ) propositis.

§. 144. D E Suppuratione dicitur in historia Inflammationis.

Hactenus explicati sunt morbi simplicissimi, qui in solidis partibus corporis humani occurrant; nimis debilis nempe, vel nimis valida cohesio partium inter se, nulla habita ratione fluidorum. Dein spontaneæ fluidorum & morbosæ degeneraciones fuerunt enarratæ: tum considerata fuerunt illa vitia, quæ in solidis, & fluidis simul consideratis observabantur simplicissima; nempe incitatus, vel torpens nimis fluidorum per vasa quotus: uti & Plethora, sive

nimia boni humoris abundantia. Tandem & de obstructione actum fuit, quia & solidarum partium vitia, & humorum, vel & utrisque simul conspirantibus originem suam debebat.

Sequitur jam ex ordine §. 16. descripto, ut agatur de soluta cohesione partium, id est de Vulnere: patebit enim consideranti, omnia hæc præmittenda fuisse, antequam Vulneris historia & curatio tradi posset.

## DE VULNERE IN GENERE.

M Irum forte videri posset, Celebratissimum horum Aphorismorum Auctorem externos & Chirurgicos dictos morbos tanta cum cura tradidisse, cum plerumque animis hæc insederit opinio, internos morbos solos ad Medicum pertinere, externa vero mala Chirurgis relinquenda esse. Sed illa Medicinæ pars, quæ de externis morbis agit, omnium vetustissima est. Podalirius & Machaon, Æsculapii filii, bello Trojano ducem Agamemnonem secuti, non mediocrem opem commilitonibus suis attulerunt; quos tamen Homerus non in pensilentia, neque in variis generibus morborum aliquid attulisse auxilii, sed vulneribus tantummodo ferro & medicamentis mederi solitos esse proposuit ( *A. Cor. Celsi Prefatio Lib. I. pag. 1. & 2.* ).

Postea quidem in tres partes Medicina diducta est; ut una esset, quæ victu, altera quæ medicamentis, tertia, quæ manu mederetur. Nec tamen ideo Chirurgia a Medicis neglecta fuit. Medicinæ parens Hip-

ocrates pulcherrima de vulneribus capitis, de ulceribus, fistulis, fracturis, luxationibus, posteris reliquit: nec perfunctorie hæc tractavit, sed machinas & modos reponendi luxata & fracta membra descripsit satis diffuso sermone.

Præterea summum usum habet, ad habentes morbos in interioribus corporis partibus cognoscendos & curandos, eosdem considerare, ubi externas partes corporis occupant. Sensibus tunc omnia patent, & facilius intelliguntur.

Inflammationem & varios ejus exitus longe evidentius intelligimus, dum externas partes occupat, quam dum in internis partibus latet. Quantum lucem affundit testis capitis morbis cognitio vulnerum capitis! Idem in multis aliis verum est.

Cum ergo omnis ordinata doctrina a facillioribus intellectu ad difficiliora pergat, jure merito internorum morborum historiam præmittuntur morbi externi, Chirurgici dicti.

§. 145. **V**ulnus est soluta cohesio recens, cruenta, partis mollis, a corpore duro, acuto, moto, pressio, vel resiliens.

Vulneris hic traditur accurata definitio, nempe quod sit soluta partium cohesio: sed additur, quod, ut vulnus vocetur, debeat esse recens; sic enim distinguitur ab ulcere; in quo etiam est partium antea coherentium solutio: tamen apud Hippocratem ulcus & vulnus ( *ἡλὲς καὶ τραύμα* ) aliquando promiscue sumuntur ( *Lib. de Capit. vulneribus cap. 12. Tom. XII. pag. 120.* ) & quidem in uno & eodem Capitulo. Additur deinde in definitione, quod sit soluta cohesio cruenta; si enim vulnus tam parvum fuerit, ut sanguis ruber non exeat, vix considerationem meretur, cum ne quidem tenuissimæ aciculæ apice cutis pungi possit, quin cruor effluat.

Additur dein, quod sit solutio PARTIS MOLLI, ut distingatur a solutione continui, quæ in ossibus fit per fracturam, fissuram &c. Præterea, ut distingatur a contusione, additur, separationem continui fieri in vulnere a CORPORE DURO, ACUTO, quod parva superficie motum suum parti corporis imprimat. Sed corpus durum & acutum non potest separare cohesionem, nisi motu vel pressione applicetur ad partes coherentes; vel nisi partes corporis moveantur vel premantur ad durum & acutum corpus, sed resiliens simul. Facile enim patet, eundem fore effectum, sive lanceola brachio, sive brachium lanceolæ impingat.

§. 146. **C**ausa ergo sensibilibus ejus est durities, acuties, motus, resiliencia instrumenti vulnerantis.

Hæc per se patent; nisi enim durum esset instrumentum vulnerans, non posset superare vim, qua coheret partes unitæ in-

ter se; nisi acutum foret, faceret contusionem loco vulneris.

§. 147. **S**ubjectum pars mollis, adeoque textura vasorum sanguiferorum, serosorum, lymphaticorum, adiposorum, nervosorum, membranosorum, tendinosorum; tum vesicularum, quæ ex his constantur.

Ex ipsa definitione patet, vulneris subiectum esse partem mollem; sed hodierna Anatomæ docuit, partes molles corporis humani esse meram vasorum texturam: hinc nullum vulnus potest esse, quin plurima vasa discindantur, & quidem diversarum series. Nulla enim arteria sanguifera discindi potest, quin lædantur fere omnis generis vasa: tunice enim hujus vasis ex aliis minoribus vasis fiunt, horum tunice iterum ex minoribus vasis, donec ad ulti-

ma perventum sit. Hinc simplici vulnere arteriæ sanguifere vulnerantur & serosa & lymphatica vasa &c. vulnerantur & folliculi, qui lubricans illud smegma dant, quo interni majorum arteriarum parietes inuncti apparent; vulnerantur membranz, musculosæ fibræ arteriæ tunicam musculosam constituentes &c.

Patet ergo vel in levi vulnere omnes partes in hac paragrapho recensitas lædi posse.

§. 148. **I**n quo subiecto (147.) causa (146.) producit coherentis separationem, liquidi contenti effusionem.

Cum ergo nulla possit fieri separatio cohesionis in parte molli, quin lædantur plurima vasa, apparet evidentissime, omne vulnus duplicem semper præstare effectum; separat nempe a se invicem partes solidas ante coherentes, & deinde educit ex vasis vulneratis illud liquidum, quod in vasis erat præsens.

illo momento, quo vulnerantur, uti & illud, quod circulationis legibus mox advehitur ad locum vulneratum per vasa, nunc dissecta. Cum ergo patuit ex paragrapho præcedenti, omne vasorum genus in vulnere posse lædi, apparet evidenter, omnis generis liquida ex vasis vulneratis effluere posse.



§. 149. **I**nde ledit actiones, quæ pendent ab integritate partium, & ab determinato fluxu liquorum per vasa.

Totum corpus humanum solidis & fluidis constat: nullum potest concipi vulnus, quin tollat cohesionem solidarum partium, & interrumpat circuitum humorum per vasa, prius integra, nunc divisa. Sed omnes functiones nostri corporis ab integritate partium solidarum, & debito motu fluidorum per vasa, pendunt: hinc nullum potest esse vulnus, quin ledit saltem aliquas functiones. V. g. ut digiti manus ad voluntatis arbitrium flecti possint, requiritur integritas musculorum pro-

fandi & sublimis, per quos hæc flexio peragitur. Si jam vulnere facto discindantur tendines horum musculorum, perit illa actio ab integritate harum partium pendens.

In Physiologicis demonstratur, quod ad actionem musculi cujuscunque inter alia requisita necessarius sit liber influxus spirituum per nervos; si jam discissus fuerit nervus ad musculum tendens, determinatus fluxus liquidi nervosi in musculum impeditur, & tollitur ejus actio.

§. 150. **Q**uæ vulnera proinde occupant eas partes, quarum integritas vitæ inseparabilis, Lethalia sunt.

Lethale vulnus vocatur omne illud, quod mortem inferit effectu suo inseparabili. Sed mors adest, dum sanguinis influxus in cor, ejusque expulsio ex corde impeditur. Ut autem bina hæc fieri possint, requiritur plurimarum aliarum partium integritas. Omne

ergo vulnus, quod tollit requisita ad influxum liberum sanguinis in cor, & expulsionem sanguinis recepti ex corde, erit ex sua natura lethale. Qualia autem sint vulnera lethalia, & quibus partibus inflicta, postea dicetur.

§. 151. **H**orum (150.) autem alia inevitabili necessitate mortem ferunt.

Vulnera illa, quæ mortem inferunt suo effectu, conveniunt in illo omnia, quod sanguinis in cor receptionem, & ejus expulsionem ex corde tollant; sed tamen magnum occurrit inter illa discrimen: quædam enim sunt inevitabiliter lethalia; sic ut licet accuratissime fuerint intellecta, & ad amissim cognitz partes, quas vulnus læserat, tamen nullo auxilio hætenus in arte cognito poterit impediri, quo minus mors, ut effectus inseparabilis, ex vulnere ut causa fieret. V. g. si gladio ancipiti per hominis thoracem adacto vulneretur lata plaga aorta illo in loco, ubi ex Pericardio emergit, exibat omnis sanguis corde sinistro expulsus per hoc vulnus, accumulabatur vel in thoracis cavo, vel exibat de vulnere, nec rediit per venas ad cor dexterum, unde inevitabilis mors sequitur. Nec

potest ulla arte præcaveri: non datur enim accessus manibus, ut ligetur, consuatur &c. & licet hoc fieri posset (quod tamen impossibile omnino est) ligata aorta, non posset evacuare se cor sinistrum; hinc suffocaretur sanguinis circuitus, unde vita pendet.

Sed si aorta bifida facta, ad femur & crus utrumque tendens, vulneretur in his partibus, erit vulnus hoc ex se lethale quidem, quia omnis sanguis per arteriam hanc discissam affluet, sed tamen non erit inevitabiliter lethale, quia torculari vel laqueo arteria sic comprimi poterit, ut nullum sanguinem emittat; & postea poterit ligari &c.

In renunciationibus autem, quas Medici de vulneribus ad Judices mittunt, hæc sollicitissime distinguenda sunt.

§. 152. **A**lia, sibi relicta, mortem inferunt, sed artis auxilio ita emendari possunt, ut mortis periculum absit.

Omnes arteriæ majores, per artus dispersæ, vulneratæ ad mortem usque sangui-

nem dimittent; hinc talis arteriæ vulnus lethale quidem est, per artem tamen potest

rat impediri, quo minus mors inde sequeretur. Talia plurima habentur apud Observatores exempla. Studiosus vigilem publicum noctu sic vulneraverat ense, ut arteria profunde decurrens sub surae musculis discissa fuerit: vulneratus ingentem sanguinis jacturam passus prolabitur, invenitur fere mortuus: rescitunt debilem cardiacis; statim iterum sanguis effluit ad animi deliquium usque. Vulneris orificium sputicis pulveribus replet, frustra sic conatus hæmorrhagiam compescere, non satis peritus Chirurgus, interim pergunt vino & similibus languentem vulneratum rescicere, sicque aucto sanguinis moru augebatur hæmorrhagia, ex qua miset perit. Vulneris hæc lethale pronunciatum est. Vacum quidem est, quod hoc vulnus fuerit causa mortis; tamen in arte cognita erant talia auxilia, per quæ vulneratus servari poterat: si enim sub poplite compressisset arteriam idonea ligatura Chirurgus, potuisset hæmorrhagia sisti; aut dilatato vulnere arteria vulnerata potuisset ligari; vel saltem ex-

stirpatione membri vita servari potuisset.

Similis etiam casus contigit, dum in conflictu gladio vulnerabatur brachium, & discindebatur arteria profunde decurrens supra ligamentum inter radium & ulnam medium; poterat arteria in brachii parte superiori supra os fere nudum decurrens comprimī, sicque hæmorrhagia sisti, deinde amputato membro vita redimi: sed nec zger crudelem curam admittere voluit, nec Chirurghi urgebant necessitatem, credentes se compressione valida sanguinem sistere posse. Perit misere vulneratus putrefactione summa per compressionem hanc orta, qui per artem servari potuisset.

Hinc apparet, quam necessarium sit Medicis & Chirurgis, qui vulnera tractant, & de illorum lethalitate ad Judices ex officio renunciare debent, cognoscere decursum majorem vasorum, & illa loca, ubi comprimī possint commodè, ut mors ab hæmorrhagia secutura præcaveatur. Exactissimæ Eustachii tabulæ omnia hæc accurate designant.

§. 153. Tandem ex non lethalibus, neglectus, vel error, lethalis potest facere.

Omnium hoc frequentissime accidit illis, qui minus merentur; nempe quibus in conflictibus bellicis vulnera intuscia sunt. Quoties perierunt vulnerati ab hæmorrhagia, quæ compesci potuisset a perito Chirurgo? Quot perierunt sanguine sub cranio effuso, qui terebratione calvarie in tempore adhibita potuissent servari? Crani integumenta externa, valida contusione laesa, cum exigua vulneris simul facti apertura, fecerunt sæpissime neglectu solo suæstissima symptomata; imo ipsam mortem: quæ omnia præcaveri sæpe potuissent bona curandi methodo adhibita. Innumera hujus rei Exempla apud Observatores occurrunt.

Sed non tantum neglectus illorum, quæ exacte fieri debent, verum etiam turpes errores vulnera non ex se lethalia fecerunt esse lethalia. Raro moriuntur homines ex hæmorrhagia, nisi maxime arteriæ discissa fuerint; sed magnam sanguinis jacturam passi in animi deliquium cadunt, tuncque sistitur hæmorrhagia: si sic relinquatur semimortui fere, in moderato tantum

calore, detur solum jus carniæ patet quantitate, sed repetitis vicibus; languida potest sustineri vita, vas discissum se contrahit; imo sæpe consolidatur: sicque servari fuerunt multi, qui certo perituri videbantur.

Dum autem ob ingentes hæmorrhagias in animi deliquium lapsos spirituosis conantur refocillare, non restitunt perditam humorum copiam, sed vim vasorum in liquida augent; unde nova redit sanguinis jactura, & morus causa augetur. Multi post conflictus bellicos, per dies integros inter cadavera relictis, omni fere sanguine exhausti, revixerunt postea.

Scripterant Chémici quidam; Arsenicum per nitrum fixatum summum remedium esse ad hæmorrhagias sistendas: sed quam periculosa est applicatio tam virulentis remediis ad crudum vulnus; dum vel minimum hujus venis receptum post crudeles convulsiones mortem inferre potest.

Hinc dum ex auctoritate publica iustantur cadavera percussorum, primo inquirendum est, an vulnus tale fuerit, ut inde

inde mors necessario sequi debuerit; an vero mors præcaveri potuisset arte hodie cognita: deinde an mors secuta post vulnus ascribenda sit vulneri, an vero aliis causis.

Non sufficit ergo sola vulneris in cadavere inspectio, ut de eius lethaliitate iudicium ferri possit; sed debent & cognosci omnia, quæ vulnerato acciderunt post vulnus inflictum.

§. 154. **PRO** varietate alterius ejusdem actionis, a parte integra prius exercitæ, etiam alia vulnerum effecta, atque inde variz appellationes oriuntur, vix ignotæ perito actionem Sanitatis.

Quot sunt partes diversæ corporis humani, quæ vulnere lædi possunt, tot poterunt esse distinctæ actiones læsæ, quarum integritas a cohesione parrium, per vulnus separatarum, pendebat. Sed qui ex Anatomicis & Physiologicis novit partium corporis usum, quantum per artem hodie excultam licet, ille cognita parte vulnerata poterit determinare damna, quæ inde sequuntur. Sic tendine musculi discisso, patet facile, actionem musculi abolitam esse, quæ ab integritate hujus tendinis pendebat &c. Ancilla lagenæ vitream manū tenens cadit; fractæ lagenæ frustum vulnus facit profundum medio loco inter carpum & cubiti articulum in parte interna; valida oritur hæmorrhagia, vulnerata arteria quæ sub flexore carpi ulnari decur-

rebat: idonea ligatura circa humerum comprimebatur, ad nudum ibi fere os humeri, arteriz truncus; feliciter sistebatur hæmorrhagia, sed conquerebatur ægra, quod stuporem in digito minimo & medietate digiti minimo proximi sentiret; credebatur Chirurgus a valida compressione stuporem ortum fuisse. Eustachii accuratissimis tabulis confusus ausus fui prædicare, nervum discissum esse, qui digito minimo & medietati adjacentis digiti prospicit; hinc immedicabile fore hoc malum. Eventus asserti veritatem demonstravit: sanata enim, non rogante, sæpius digiti minimi apicem flammæ candellæ impoſuit sine ullo doloris sensu.

Patet ergo, maximam vulnere varietatem esse, quoad varia effecta a diversis partibus corporis læsis pendentia.

§. 155. **NEC** minor nominum, formarum, & effectuum varietas in vulneribus, a diversitate causæ vulnerantis (§. 146.) quoad figuram, modum adigendi, pungendo, secando, cædendo, agitando, illatum, vim impingendi, ablationem ex vulnere, relictionem in eo, infectionem venenatam.

Considerantur hac paragrapho vulnerum diversitates, quatenus ab instrumento vulnerante pendunt.

**QUOAD FIGURAM.** Si conica acuta figura fuerit præditum instrumentum vulnerans, erit punctura, cito se claudens; tuncque difficiliter cognoscitur vulneris profunditas: si vero in acutum cuneum formatum fuerit, erit scissura &c.

**MODUM ADIGENDI &c.** Nam inde oritur magna varietas: **PUNGENDO** enim fit vulnus angustum, sæpe tamen profunde penetrans. **Secando**, quando cuneus acutus per partes molles protrahitur, sunt tunc longa, sed minus profunda vulnera.

**CÆDENDO.** Majori tunc vi penetrat instrumentum vulnerans & profundius adigitur: & nisi acutissimum fuerit, simul contusionem facere poterit.

**AGITANDO.** Ad quod maxime attenden-

dum est: dum enim vulnus extenso directo brachio insigitur ense, sæpe inter partes transit, a quibus læsis summam foret periculum, sine adeo magno malo; sed si ensis in vulnere hærens fuerit agitur & circumrotatus in vulnere, longe plures partes læduntur. Figura autem vulneris hoc docere poterit: si enim vulneris magnitudo respondeat magnitudini instrumenti vulnerantis, directo tantum impetu vulnus inflictum fuit; sed si v. g. lato gladio vulnus rotundum factum fuerit, designat eodem circumrotatum fuisse in vulnere.

**VIM IMPINGENDI.** Pro vario enim impetu, quo instrumentum vulnerans fuit impactum corpori vulnerati, vulnus magis vel minus profunde penetrabit.

**ABLATIONEM EX VULNERE, RELICTIONEM IN EO.** In gravissimis enim vulneribus aliquando prodest relinquere instrumen-

tum

rum vulneram, cum sæpe partes vulneratae circa hoc constringant, ac sic hæmorrhagia filius: quæ, educto instrumento vulnerante, ipso sæpe momento mortem affert. Sic saltem aliquo tempore vita sustinetur. Dum telo Turnus miser Pallantis pectus perforat, (*Virgil. Æneid. Lib. X. v. 486.*).

*Ille rapit calidam: frustra de vulnere telum,  
Una eademque via sanguisque animatque  
sequuntur.*

Dum immitis Achilles hasta transfixerat Hectoris cervicem, ut morienti insularet; reliquit in vulnere telum, quod mortuo evulsit (*Homer. Iliad. Lib. 22.*).

Imprimis hæc obtinet diversitas vulneris ab hac causa, si hamatum telum fuerit, unde non sine magna laceratione educi potest.

**INFECTIONEM VENENATAM:** Mira circa hanc rem: capta experimenta evicerunt, esse in rerum natura talia venena, quæ innoxie quamvis possent deglutiri, vulneribus tamen applicata certam & subitam mortem facerent. In viperarum morfu vulneri dentibus facto immixtus venenosus succus certo & hominem & majora animalia, gallinas, columbas &c. necat. Dum magni Hetruriae Ducis iussu inquirebant Eridirissimi Viri naturam bujus veneni, & quidam in felle viperæ vim venenatam latere assererent, Veterum auctoritate, uti & recentiorum multorum testimonio mori, in angulo itans viperarum captor, antiquis Maris & Psyllis audacior, bilem viperæ dindio cyatho frigida mistam bibit intrepidus, nihil inde mali passus. Nec diversis animalium speciebus exhibitum fel viperinum ullam noxam intulit; nec vulneri recentiori infusillatum fel viperinum aliquid mali fecit (*Francisc. Redi. observat. de Viperis pag. 14. &c.*).

Aliis longe probabilior videbatur hæc opinio, quod venenum illud viperarum hæretet in loculis illis, qui dentibus adjacent. In illis enim cavitatibus hæret humor colore & sapore similis oleo amygdalino; dumque mortuum infert vipera,

compressis maxillis necessario vulneri adspersitur illud liquidum: sed quamvis virus hoc vulneri dente viperæ facto immixtum tam lethales effectus faceret, idem ille venator, qui bilem viperæ deglutierat, pari audacia maxime & simul rursus viperæ expressum ex his loculis liquorem, simul omnem spumam & salivam, quam ore continebat, vino dilata hausit sine noxa. Simili successu animalibus ingerebatur (*Ibid. pag. 18. 19.*).

Lethalia illa tela Buntamenium, quæ levi vulnere indubitatam adferunt mortem, vino infusa aut alio liquore per plures dies, nullam malignitatem conciliaverunt liquido, in quo tam diu hæserant (*Ibid. pag. 33.*).

Dum per Lybie aridissima deserta duceret exercitum Caro, sitientes milites non audebant bibere de fonte, quem turba serpentum tenebat, sed facientissimus dux hortabatur, ut audacter biberent, dicens:

*Vana specie conterritis lebi  
Ne dubita miles tutos haurire liquores.  
Noxia serpentum est admixto sanguine pestis.  
Morfu virus habent, & satum dente  
necantur.  
Poëla morte caret: Dixit, dubiumque  
venenum:  
Hauit, & in tota Libyes fons unus arena  
Ille fuit, de quo prius sibi posceres  
vandum. (*M. Annæi Lucani Pharsal.  
Lib. 9.*).*

Dum oleo Tabaci madidum filum per vulnus acu factum trahitur, in animali vivente; illud cito perit. Viperam sic spatium minori, quam est octava pars horæ, necavit Redi, (*Observat. de viperis pag. 98.*) qui tamen in omnibus Tabaci speciebus non invenit hoc oleum eandem habere malignitatem. (*Redi Experim. Naturalia pag. 500.*).

Plura forte talia sunt, quæ melius latent: Ubi ergo adsunt anomala symptomata, quæ non possumus suspicari ex vulnere, ut causa, fuisse, tunc de infectione venenata instrumenti lædenti cogitandum est.

§ 156. **TUM** etiam omnia eadem (§ 155.) variant pro differentia partis vulnus excipientis (§ 147.) quoad ejus duritiam; molliorem, nexum, situm, effectum, liquida contenta, faciem mutatam.

Vulne.

Vulnere diversitates enarratæ sunt binis præcedentibus paragraphis, quatenus ab actionibus per vulnus læsis defumebantur, uti & illæ, quæ pendeant a diversitate ipsius causæ vulnerantis. Hac autem paragrapho considerantur illæ vulnerum varietates, quæ oriuntur a diversâ indole partis vulneratæ.

**DURITIEM, MOLLITIEM.** Modica vi instrumentum vulnerans penetrabit mollia abdominis integumenta; longe validiori indigebit impetu, ut durum calvariz os dividat.

**NEXUM.** Dum tendo musculi discissus est, motus partis illius, cui naturaliter necessebat, perit; hinc pro effectu vulneris habetur. Dum parva arteriola dentis evulsi, in alveolo latens, læsa sanguinem fundit sæpe ad mortem fere usque; hoc non fit ideo, quia tam parvus arteriz ramulus læsus est, sed quia offensæ alveoli superficie affixus non potest se contrahere, & sic claudi. Quando in flexura cubiti per venæ sectionem inausito casu læditur aponeurosis illa, a parte tendinea bicipitis musculi orta, sæva symptomata, quæ sequuntur, non pendent a tam levi vulnere, sed a nexu illius tendineæ expansionis cum aliis partibus.

**SITUM.** Si arteriarum intercostalium ramus, licet exiguis, lædatur sic, ut simul perforata pleura in pectoris cavum sanguis fluat; poterit effuso sanguine corrupto pulmo inflammari, suppurari, & lethalis tabes inde sequi: tantum ideo quia vulnerata arteria talem situm habebat, ut posset in cavum pectoris sanguinem dimittere. In aliis enim corporis partibus longe majores arteriarum rami sine periculo discinduntur. Longe periculosius vulnus est inflictum internæ femoris parti, ob maxima vasa ibi decurrentia, quam si externæ parti femoris simile contigisset.

**EFFECTUM.** Multis partibus corporis talis inest proprietas, ut vulnere vel alia quacunque causa læsis his partibus, turbentur aliquando functiones aliarum partium; cum tamen ex hæcenus cognita Anatomie nondum constet ratio, cur læsis

prioribus turbentur aliarum actiones. In Exemplo res patebit. Post dolores colicos vel iliacos aliquot vicibus toleratos oritur in Colica dicta Pictorum brachiorum Paralysis, & sæpe pergente malo verus Marasmus artuum superiorum. Quis ex cognita fabrica partium explicabit rationem mirabilis hujus eventus? Post vulnere abdominis, discissis mesenterii nervis quibusdam post enormes dolores mors sequebatur, nec reperiebantur in cadavere magna vasa discissa, nec viscera læsa. In cane, discisso nervo intercostali & paris octavi, in his animalibus eadem vagina contentis apparuit oculum ejusdem lateris obscurari, mole minui, inflammari; sæpius repetitis Experimentis constitit, semper oculos inde mutari sensibilibiter. Hoc autem patuit non ex cognita structura partium, sed ex effectu observato post vulnus factum (*Accad. des Sciences l'an. 1727. Memoires pag. 6. &c.*). Hinc patet, ingentem iterum nasci vulnerum varietatem ex effectu, quæ a parte vulnerata observantur in corpore producta esse: tamen sæpe sola observatio facti docet mirabiles tales eventus, cum ex cognita partium structura hæcenus a priori non demonstrari potuisset, hæc mala metuenda esse.

**LIQUIDA CONTENTA.** Si vesicula fellea vulnerata bilem in abdominis cavum effuderit, hæc cito putrescens pessima producat mala. Si ureteribus discissis urina per vulnus stillans in abdomine accumuletur, hæc corrupta omnia abdominis viscera putrida labe inficere poterit &c.

**FACIEM MUTATAM.** Possunt enim partes corporis per vulnus læsæ plus minusve degenerare a naturali conformatione, sicque miro modo externam partium faciem mutare.

Dum musculi faciei unius lateris paralytici fiunt, quam mira fit distortio faciei in latere opposito, quia musculi æquilibrio antagonistarum destituti retrahunt faciei partes. Idem per vulnera, læsis quibusdam faciei vel aliarum partium musculis, vel nervis dissectis ad hos musculos tendentibus, fieri posse satis patet.

§. 157. **H**ujus multiplicatis originem nosse ut opus, ita nomina subtiliter distinguere non juvat.

Ad omnia illa, quæ tribus præcedentibus paragraphis dicta sunt, attendendum

esse Medicis & Chirurgis, qui vulnera curant, nemo dubitat; ex his enim Diagno-

sis & Prognosis vulnerum pendet, utpote quæ cognitioni structuræ & usus partium, tanquam firmis fundamentis inniuntur. Cognito enim instrumento vulnerante, & quo modo & qua vi applicatum illud fuerit corpori; deinde considerata natura partis vulneratæ, & cognitis ejus usibus naturalibus per vulnus læsis, prævidemus, quid metuendum sit; intelligimus, quid ars efficere possit, ut tollat mala jam facta, vel caveat futura. Difficile autem videtur, va-

riis nominibus vulnerum diversitates tam numerosas designare ita, ut nomen datum distinctam offerat menti ideam: difficilior longe memoriz hæc sit imprimere, ut usum habere possint. Integram sic tabulam tractui suo de vulneribus præfixit *Pareus*, ut vulnerum diversitates traderet. Rem consideranti apparebit facile, hæc non adeo magni usus esse: sufficere vero generalem cognitionem illorum, unde tanta vulnerum diversitas pendet.

§. 158. **S**I in corpore sano, robustoque factum vulnus in loco visibili, non irrigato magna quadam arteria, nec nimis tendinosa, hæc oriuntur phænomena; si modo a frigore, aere, siccatione, vulneris hiatus defenditur.

Ut aliquid certi de vulnerum curatione dici possit, necessarium præmittenda sunt illa phænomena, quæ fidelis observatio per sensus facta docuit obtinere in vulnere a primo initio, quo inflictum est, ad integram consolidationem usque. Hæc autem omnia dum notantur illo ordine, quo se mutuo excipiunt, dant evidentem cognitionem methodi, qua natura uritur, ut separatas per vulnus partes in pristinam cohesionem restituat.

Ut autem omnis evitetur error, & confusio, nihil hic consideratur, præter solum vulnus, & corpus vulnerati supponitur perfecta sanitas valere; aliter enim phænomena observata non forent adscribenda soli vulnere, sed etiam pro parte penderent a morbo vulnus comitante. Longe enim aliz mutationes apparent in vulnere, si cacochymia v. g. scorbutica, Venerea, Rachitica corpus obsederit. Præterea corpus supponitur robustum; in debilibus enim languida circulatio minori impetu humores versus vulnus ducit: hinc dolor, calor, tensio &c. longe minora sunt circa labia vulneris, quam in homine validis viribus prædito.

Deinde omnia hæc debent sensibus patere: unde in externis corporis partibus vulnerum phænomena imprimis observanda; & his visis discimus, quid in internis cor-

poris partibus vulneratis contingat. Ob hæc causam & supponitur, quod nullum vas arteriosum majus simul læsum sit, undatim enim tunc profluens sanguis impedit, quæ minus omnia accurate lustrari possint.

Additur præterea, quod vulnus non debeat esse in loco *nimis tendinoso*: si enim v. g. tendo cuiusdam musculi lædatur per vulnus, nec discindatur ramen integre, musculus huic tendini affixus trahendo tendinem læsum horrenda poterit producere symptemata, quæ non adeo pendent a vulnere, quam a musculo tendinem vulneratum trahente. Postea autem describuntur illa mala quæ ab arteriis majoribus discissis, vel tendinibus per vulnus læsis, oriuntur.

Præterea aer, impiiis frigidus, admixtus mero modo mutat partes vulneratas, & lædit tenerrima vascula, illaque excidat. Sic si per vulnus calvaria denudata, & aeri liber accessus fuerit ad nudum os notabili tempore, vix sanabitur tale vulnus, nisi prius exfoliatione separata fuerit ossis lamella. Hoc autem non pendebat a vulnere; si enim statim ab aere defensus fuisset os nudatum, hæc exfoliatio non contigisset.

Sub his ergo conditionibus recensentur phænomena, vulneribus omnibus propria, sequentibus numeris.

1. Partes, inter quas causa vulnerans adacta, sensim magis magisque a se mutuo recedunt, licet causa ablata sit, nisi punctura fuerit parva.

Simul ac causa vulnerans divisit cohesionem partium, distantia inter partes separatas est æqualis crassitie instrumenti ledentis: hinc dum maleficis a carnifice

acuta novacula facies discinditur, apparet tantum linea rubra, sed sensim labia vulneris a se invicem recedunt, & post paucas horas sæpe lineæ geometricæ amplitudine

dine hiant. Vis enim illa, qua coheret partes solidæ corporis nostri, pergens agere utrimque retrahit extrema discissa, quia in loco vulneris destructa est partium cohesio.

Nisi PUNCTURA FUERIT PARVA. Dum enim instrumentum vulnerans pungendo parvum vulnus fecerit, simulac penetravit cutim, & læserit tunicam cellulosam subje-

ctam (nisi fuerit macilentissimum vulnerati corpus) vulnus apparet fere nullum, quia tunica cellulosa a cutis oreffione in loco vulneris libera, statim assurgit in vulnus, illudque claudit. Hinc dum obeso homini vena secatur, subito sæpe sanguinis effluxus sistitur, pinguedine vulnus cutis obturante.

### 2. Cruor primo cum impetu effluit, dein sensim sponte sistitur.

Si non sit vulnerata magna arteria, neque talis, quæ ossi affixa se retrorahere & claudere noquit, primo quidem vulneris momento vasa discissa sanguinem cum impetu eructant, paulo post contractis vasorum discissorum orificiis propria elasticitate, & se recondentibus sub vulneris labiis, minuitur brevi, & tandem sponte cessat sanguinis effluxus. Hoc evidentissime apparet in sectione calculi: ibi enim magno satis vulnere cutis & subjæctæ partes dis-cinduntur, effluit uncia una vel altera san-

guinis, sed, nisi infelici casu major arteria vulnerata fuerit, paulo post fere integre cessat hæmorrhagia; quæ aliter multum turbaret operationem. Omnis enim sanguis, qui ex vulnere sacro effluit, fere tantum ex arteriis exit, venæ enim satis magnæ etiam discissæ, nisi obstaculum positum fuerit inter cor & vulnus venæ inflictum, parum tantum sanguinis stillant; arteriæ autem sua elasticitate facile se contrahunt, & sic sanguis brevi sistitur.

### 3. Tum crusta sanguinea cavo vulneris innascitur.

Cum ergo ex vulnere sanguis arteriosus fere tantum exeat, uti modo dictum est; & ille ex sua natura etiam in homine sano & robusto extra vasa hærens statim coaguletur; ideo simulac incipit cessare impetus sanguinis erumpentis, fit tale coagulum sanguinis effluentis sive thrombus dictus, vel eschara sanguinea, quæ labiis vulneris agglutinatur, & totum vulneris

hiatum tegit perfectissime; sicque pulcherrimæ molimine tegitur & defenditur vulnus; subque hoc tegmine sensim consolidantur separatæ per vulnus partes. Et quia thrombus ille calore corporis & ære contiguo exsiccat magis & magis, satis durum sic nascitur vulnere operculum, quod postea sanato vulnere sponte cadit.

### 4. Et liquor dilutus, rubellus, tenuis effluit.

Dum ille thrombus sic incipit, uti & si natus auferatur, non effluit sanguis fere, sed tenuis levi rubedine tinctus liquor, loturæ carnum recens macularum similis. Hoc autem videtur fieri, quia vasa

sanguinea rubra discissa, sensim contractis suis orificiis, pauculum rubri sanguinis, majorem autem copiam tenuioris liquidi non rubri transmittunt.

### 5. Tum vero labia vulneris incipiunt rubere, calere, dolere, tumere, retorqueri, fundo interim tumido assurgente, præcipue assurgente adipe in aperturam vulneris, ibidemque cito degenerascente.

Cum vasa discissa proprio elatere contrahunt sua orificia, uno fere claudunt, humores soliti fluere per hæc vasa sistuntur; hinc nascitur tunc circa labia vulneris obstructio, & impetus vitæ, a tergo urgens fluida in vasa obstructa, illa dilatat ante

locum obstructum, unde nascitur vera inflammatio. Ideo rubent secundo vel tertio die labia vulneris, adest simul major calor inflammationis comes, uti & tumor; quæ omnia, si moderata fuerint, nihil mali designant, cum naturaliter in omni vulnere

nere fiant. Hæc est ratio, quare vulnus recens infistum vix doleat; tertio autem imprimis dicit, vel & aliquando citius, nata inflammatione, tumentibus partibus vulneratis, dolor sepe satis magnus sentiatur in vulnere.

Ideo Hippocrates (*Epidemic. Lib. II. Tom. IX. pag. 181.*) dixit, *gravibus vulneribus infistis si tumores non appareant, ingens malum*. Idem in Aphorismis habetur pronuntiatus (*Aphor. 66. & 67. Sect. 5.*) ubi addidit, *molles tumores boni, crassi pravi sunt*. Si enim nullus oriatur circa vulneris labia tumor, designat vitales vires deficere; si nimius sit, valida inflammatio, peroris exitus metum facit.

Alibi pulchre notavit (*De Fracturis. Tom. XII. pag. 249.*) & tanquam utilissimum in arte præceptum commendavit: quod nempe *tertia & quarta die minores vexanda sunt vulnera, & ab omni exploratione per specillum tuas sit abstinendum, & ab omnibus aliis, quibus vulnera irritantur. In totum enim plerique vulnera tertio aut quarto die recrudescere consueverunt* &c.

Ob eandem causam monuit, (*Ibidem. Tom. XII. pag. 252.*) ubi os fractum, percutum eminens, reponendum erat, illud debere fieri eodem die, vel postmodum; sed non tertio, quarto vero vel quinto minime.

6. Atque eodem tempore febricula cum calore & fiti adeſt.

Si nempe vulnus fuerit alienius momenti, in parvo enim vulnere hæc symptomata non ita obſervantur. Simulac enim oriuntur symptomata præcedenti numero descripta, oritur major calor in vulnere, & in toto corpore; pulsus fit celerior, inquietudo nascitur & insomnia turbulenta; urti & sitis major, & urina fit magis rubicunda. Omnia autem hæc symptomata durant, quamdiu ille tumor, dolor, & calor, uti & restitio laborum in vulnere adsunt; his cessantibus, desinunt & illa: levis talis febricula, vulneratis hoc stadio contingens, non nocet; imo prodest potius, quatenus per hanc febriculam pus nascitur:

7. Hinc tertio, quartove die serius, vel pinguis, æqualis; pus.

Vulnere factio statim exibat sanguis; postea contractis magis vasculis discissis ichor febriculus; dein oriebatur inflammatio vul-

Dum sororis stuprum vindicaturi Simeon & Levi persuascentes incautis, ut circumciderentur; tertia die post circumcisionem, acerrime dolente vulnere impune occidebant omnes (*Genes. cap. 24.*).

RETORQUERI, FUNDO INTERIM TUMIDO ASSURGENTE &c. Panniculus adiposus cuti subiectus facillime distendi potest & tumere; patet in obesis, hydropicis, & emphysemate, in quo aer, panniculum adiposum ingrossus, tam mirabiles ejusdem expansiones facit. Cras autem superinducta huic panniculo adiposo tenaci vinculo eum coercet: hinc ubi cutis per vulnus divisa est, sensim recedunt distisse cutis margines; panniculus autem adiposus, in loco vulneris cutis aquabili pressione liber, brevi astringit, & tumet, unde retrotracta utrimque cute, ex protuberante panniculo adiposo, vulneris labia retorquantur, & in vulneris fundo tumida moles affurgit. Sed manente eodem impetu liquidi vasa distendentis, si minuantur causæ, quæ huic distensionem resistunt, vasorum amplitudo augebitur; cum ergo cutis resistentia in vulnere subacta sit; panniculus adiposus in vulnus affurgens, magis dilatabitur, & in fungosam distam carnem Chirurges excrecet, sicque degenerabit satis cito.

pure autem facto, solet plerumque cessare. In sectionis calculi, extirpatione mammæ, & similibus vulneribus, illo tempore adeſt hæc febricula, boni tunc semper omnis. Hinc monuit Hippocrates (*Aphor. 47. Sect. 2. Tom. IX. pag. 85.*) circa puris generationem dolores ac febres magis accidunt, quam (pure) facto.

Hic autem agitur de tali febricula, quæ a vulnere ut causa hoc tempore nascitur; potest enim vulneratis ab aliis causis plurimis febris contingere. In magnis enim vulneribus v. g. pure jam facto, sed copioso & pro parte bubulis venis resorpto, hectica febris, corpus depalcens, oritur sepe.

ocys, vulnere adeſt liquor tenax, albus, pinguis, æqualis; pus. neris cum symptomatibus descriptis; & post hæc incipiebat apparere in vulnere liquor unctuosus, consistentiam fere habens cremoris.



moris lactis recentis, parum subflavescentis, æquabilis omnino, inodorus, saporem blandum chyli sere infar habens, vocatur Pus: quod si bonum fuerit, omnes dotes recensitas habet. Sed pus tale numquam fit, si vulnus rectum non fuerit; sed sub thrombo, nato in vulnere, vel Emplastro tegente, pus illud nascitur. Hinc pus non fit in valis, sed extra vasa in vulnere generatur, ab effusis humoribus, calore corporis totis & mutatis. Si enim pus omne in vulnere hærens linteis carptis mollissimis absterfum fuerit, post horam vulneris superficies undique madida apparebit tenui liquore, non pure; sed si per viginti quatuor horas Emplastro rectum fuerit vulnus, illo ablato, pus apparebit. Unde pus fit extra vasa; sed materies, unde fit, per vasa adfertur.

Pus autem sic natum in vulnere pulcherrimos effectus præstat: hac enim via utitur natura, ut semilaceras partes, inflammata vasorum extrema, una cum infarctis liquidis in labiis & fundo vulneris hærentia, solvat, & a partibus vivis & sanis separet: deinde sub hoc pure facto recrescunt omnia perita.

Naturam ubique secutus Hippocrates (*De Visceribus in initio, Tomo XII. pag. 131.*) ideo dixit, recentia vulnera (*ἑλκυστα νεώτατα* enim potius de vulneribus quam de ulceribus validentur intelligi debere) tam & ambientes partes minime inflammari, si coherente suppurentur. Postea addit ibidem, quod acuto telo infictum vulnus possit sine suppuratione curari, sed carnes contusas & dissectas putrefcere & in pus versas ex-

tabescere, deinde novæ carnes nasci necesse est.

Dicit eodem in loco: tunc inflammantur vulnera, quum ad suppurationem tendunt: suppurant autem alterato & calefacto sanguine donec putrescens fiat pus illorum vulnorum. Non autem hic per putredinem videtur intellexisse malignam & vere putridam dicendam humorum degenerationem, sed tantum illam immutationem, qua in pus abeunt, uti hunc locum legenti facile patebit.

Hinc bonum pus in maximum securitatis signum Chirurgis dat: quin imo Galenus ausus fuit pronunciare, *nihil mali posse accidere ulceri pus procreanti.* (*Commentar. 10 Aphor. 22. Sect. 5. Tom. IX. pag. 207.*).

Puris enim confectio fit, dum boni humores debito motu ad vulnus feruntur; hinc sanantis superstitis actiones pro sua causa agnoscit. In corpore enim cacoehymico raro bonum pus in vulnere nascitur, sed degenerans malum a conditionibus bonis puris ichor; & hinc in talibus vulnera, licet levia, difficillime sanantur. Talia corpora ideo *δυσήλκυστα* dixerunt veteres Medici. Ob hanc causam dixit Hippocrates (*Aphor. 8. Sect. VI. Tom. IX. pag. 352.*) *Hydropicis oris in corpore ulcera non facile sanantur.* Si magno impetu per validam febrem moveantur humores, secum vulnus apparet sine ullo pure: si e contra vires vitales langueant, deficit iterum puris confectio. Hanc ob rationem, ulceris scititate inter signa mortis sursum recenset Hippocrates (*In Progn. Tom. VIII. p. 605. & Coar. Pref. n. 496.*)

8. Simul rubor, calor, dolor, tumor, retorsio labiorum, febricula, cessant, vel minuantur.

Omnia enim hæc symptomata tantum oriebantur, quia in labiis vulneris vasa dissecta, contracta sua elasticitate: negabant libèrè transitum liquidis impulsis; hinc vera nascebatur inflammatio, unde rubor, calor & calor in loco fiebant. Panniculus interrim adiposus, cutis æquali pressione liber, recipiebat in vasis suis dilatatis alienos humores, unde turgebat in fundo & retorquebat labia vulneris. Suppuratio autem separabat extremitates obstructas vasorum, una

cum immeabili liquido hic hærente; unde pure facto vasis obstructis iterum; parulis factis restituebatur liber transitus per hæc omnia. Omnia ergo illa symptomata, quæ ab inflammatione labiorum & fundi vulneris oriebantur, necessario pure facto minuantur multum, vel & penitus cessant.

Hoc autem vulneris stadium solent Chirurghi vocare tempus digestionis: cumque vident omnia ante tumentia nunc subsidere, dixerunt pus fundere & dissolvere omnia.

9. Et sensim cavum vulneris a fundo sursum, & ab ambitu versus centrum crescente nova, rubra, viva, materie, carne dicta, impletur, coeunte margine albo, subcirculéscente, molli, æquali.

Quon-

Quando, bona digestionē facta, omne illud, quod non poterat iterum ad integritatem requisitam reduci, separatim est a vasis vivis, tunc putum vulnus dicitur, & tota ejus superficies undique æquabiliter apparet humida & perspicabilis, nihil asperi, nihil siccū in fundo & labiis vulneris conspicitur. Tunc incipit illud stadium vulneris, quo consolidatio perficitur. Sub pūre enim, naturali & blandissimo balsamo, videmus tunc quotidie sensim elevari fundum vulneris; uti & ab ambitu marginum versus centrum æquabilissime prodire novam materiam, quæ microscopiis lustrata tenerrima & pulposa vasorum extrema exhibet. Hoc vocant incarnationem Chirurgi: non quod caro, proprie dicta musculosa, sic recreſcat, sed obtinuit usus, novam hanc rubram & vivam materiam, in vulnere puro (quotidie auctam, carnem vocare. Omnium pulcherrime hoc apparet in illis vulneribus, in quibus iactura substantiæ facta est: dum v. g. acinacis ictu cutis cum subiecti panniculi adiposi parte ablata est; tunc enim naturaliter primo in vulneris fundo apparet vasorum recreſcentium congeries, deinde a marginibus similia protruduntur, quæ cum prioribus a fundo surgentibus concurrunt, uniuntur, siquæ perditam corporis substantiam restituunt mirabili naturæ artificio. Nihil enim ars hic agit, impedimenta tantum remover, aerem

arceat tegendo vulnus, reliquum Corporis creata fabrica perficit. Hæc sic fieri novimus omnes; quæ lege fiant, ignoramus omnino. Eleganter huius rei veritatem expressit Galenus dicens: (*Method. Med. Lib. III. cap. 3. Tom. X. pag. 59.*): *conſpici debet circa carnis generationem, quod materies illius sit sanguis bonus, opifex vero et auctor (ἐκταυρὸς τοῦ καὶ τοῦ κρέατος) natura.* Agit autem ibi de methodo, quæ uicis cavum curari debet. Ignorabant tamen Veteres subtilissimorum vasorum mirabilem structuram, quibus partes nostri corporis constant. Anatomicis demonstrationibus edocti hodie stupemus, quomodo elongata vasorum in vulnere hiantium oscula vicinis concurrant, uniuntur, concreſcant; nec hoc tantum, sed arteriæ arteriis, venæ venis, nervi nervis &c. sic debent uniri, ut renascatur similis deperditæ in vulnere substantia. Infinitam Creatoris sapientiam adoramus qui corpus humanum his dotibus instruxit.

Interea dum hæc fiunt in cavo vulnere, margines autem rubri & tumidi, nunc incipiunt subſidere æquabilissime; colorem subcæruleſcentem margaritarum inflat acquirunt; siquæ primum cicatricis rudimentum circa margines nascitur; sensimque augetur centrum versus: donec æquabilissime clausum fuerit vulnus.

Hæc est naturalis & perfectissima vulneris sanatio.

#### 10. Postremo sicatur vulnus, & obducitur cicatrice.

Ubi jam omnia recreverunt in vulnere deperdita, & unita fuerint omnia, quæ per vulnus separata fuerant, locus vulneris siccus apparet, ubi antea in singulis punctis videbatur humiditas.

Si jam non fuerit multum perditum de substantia, nec valida nimis suppurazione multum fuerit consumtum de panniculo adiposo & cute, omnia sic consolidantur, ut vix appareat aliquod discrimen inter locum vulneris & vicinam cutem: tuncque vix cicatricis nomen meretur. Ubi vero magna cutis portio ablata est, vel multum subiectæ membranæ pinguedinosæ consumtum fuerit per suppurationem, tunc apparebit locus vulneris magis albescens, magis solidus, & sæpe magis depressus, quam vicina cutis: vocatur tunc cicatrix, quæ semper minus perspicibilis est, quam reli-

qua corporis externi superficies, magisque polita & glabra apparet, quam reliqua cutis: Hoc imprimis patet, dum post mammæ vel majoris steatomatis exstirpationem, magna portione cutis sic abscissa, cicatrix nascitur; tunc enim vulneris solidati superficies polita, splendens, immobilis, & accreta partibus subiectis apparet.

Sic descripta fuit historia vulneris in corpore sano, & enarrata sunt illa omnia, quæ fidelis observatio docuit fieri in vulnere, ab initio ad integram consolidationem usque: & inde postea certissima poterit deduci methodus, quæ vulnera curari debeant, imitando nempe naturæ in curandis vulneribus viam, removendo illa, quæ nocere possent, subministrando talia, quæ deficere videmus. Sed monitum fuit, tantum hic agi de tali vulnere, in quo nec

major

major arteria, nec locus admodum tendinosus laesa fuerant. Ergo jam videndum, quanam

mutationes phaenomenorum simplici vulnere accidant, si tales partes per vulnus lesae fuerint.

§. 159. **SI** arteria non nimis magna, nec Cordi admodum propinqua, omnino transversim diffecatur, retrofiliens, atque inter solida vicinia se recondens, sibiimet obturaculo est; & cetera ut (§. 158.) prius.

Dum sanguis cordis vi in arterias, sensim semper angustiores factas, pellitur, in latera illarum incurrens illa ab axi canalis removet; & hinc arteriarum capacitatem auget: tanto autem magis ceteris partibus arterias dilatat, quanto major est resistentia circa fines arteriarum; unde arteria ligata intumescit plurimum inter cor & ligaturam. Huic autem dilatationi resistunt arteriarum fibrae musculosae orbiculares satis valida vi, qua iterum contrahuntur in pristinam dimensionem, simul ac cordis vis impellens cessat. Quando ergo arteria, per vulnus diffecta, patulo orificio sanguinem fundit, minuitur resistentia sanguini a corde impulsio, & hinc minuitur causa dilatationis arteriae: praevalet ergo vi orbicularium fibrarum, per quam omni momento arteria plus contrahitur, sicque sensim, si non nimis magna fuerit, orificium diffectae arteriae clauditur. Accedit praeterea, quod fibrae longitudinales, ob eandem causam plus contractae, arteriae longitudinem minuunt, unde arteria integre diffecta retrofilit, & inter vicinas

partes solidas se recondens harum mole & pondere plus adhuc comprimitur & angustatur. Si jam simul per vulnus factum notabilis copia sanguinis exiverit, debilitatis inde viribus, & minuto sanguinis impulsu impetu arteriae diffectae contractio augetur. Dum magnus pedis digitus uno cunei ictu extirpabatur, vidi binas arterias a latere abscissi digiti ultra vulneris superficiem ad lineae Geometricae forte longitudinem eminare; dum per pauca minuta permittebatur liber sanguini effluxus per patula haec vasa, inceperunt retrorahi, minuebatur haemorrhagia, & post bideum soluto apparatu nullus effluebat sanguis, oclusis jam diffectarum arteriarum sinibus. Si vero magna admodum fuerit arteria diffecta, vel cordi admodum vicina, non valet resistere arteriae contractio sanguini tam valida vi impulsio; hinc ad mortem usque pergit haemorrhagia. Quo enim minor est arteria, & quo magis distat a corde, eo magis retardatur impetus sanguinis a corde impulsus, quia resistentiae majores sunt.

§. 160. **SI** eadem (§. 159.) vulneratur transversim non tota diffecta, retrotractis fibris vulnus ampliatur; hinc Haemorrhagia perpetua; & ea sedata, a tenuitate cicatricis cedente Aneurisma.

In hoc casu, ob rationes dictas §. 158. n. 1. vulnus arteriae inflictum, recedentibus a se mutuo sensim plus partibus diffectis, ampliatur magis: sed quia pars quaedam adhuc cohaeret, non poterit vulneratae arteriae extremum retrohile, & se recondere sub partibus vicinis; nec poterunt fibrae orbiculares sic contrahi, ut claudatur arteriae vulnus. Cum ergo in hoc loco resistentia nulla sit, & in reliquis vas integris satis magna, perget hoc vulnus sanguinem fundere ad mortem, vel animi deliquium usque. Saepius autem accidit, quod non ad mortem usque sanguis fluat, sed ad summam debilitatem tantum; tunc incipit sensim nasci in loco arteriae diffectae quasi rudimentum cicatricis, quod valet quidem

compescere sanguinem, debili adeo cordis vi motum, ne exeat, sed pars, a distendente sanguine magis dilatatur, & protuberat: vocatur tunc *aneurisma*, sive arteriae dilatatio, quia arteria in illo loco non amplius manet aequabilis conicus canalis, sed in saccum extenditur. Cum enim amplitudo arteriarum pendeat a duabus causis, nempe a vi qua sanguis corde pulsus dilatare nititur arterias, & a resistentia laterum arteriarum; ideoque haec amplitudo mensuretur (uti dictum §. 26.) ratione composita ex ratione directae impetus sanguinis impulsus, & ratione inversae resistentiae laterum; patet evidenter, debiliore facta arteria in quadam parte, ibi necessario plus debere extendi. Quia jam per ipsam hanc extensionem

magis adhuc debilitatur talis arteriæ locus, patet ratio, quare sæpe adeo ingentes tu-

mores aneurismatici oriuntur: qualia exempla passim apud Observatores occurrunt.

§. 161. **S**I arteria major tota difsecta, oritur perpetua, usque ad defectum animi, vel vitæ, Hæmorrhagia; inferius posita tabescunt, & patri exeduntur, sed lenta gangræna; aut arefacta penitus contrahuntur.

Pleno tunc rivo undatim effluit sanguis, non æquabili celeritate tamen, sed per subsultus, nunc minori, mox iterum majori impetu; quia illo tempore, quo arteriæ sunt indistole, cordis vis sanguinem urgens sola tunc expellit per apertam arteriam sanguinem: sed magna pars impetus, sanguini a corde conciliati, impenditur dilatandis arteriis: hinc tantum tempore distoles arteriarum sanguis propellitur illo excessu, quo cordis vis superat resistentiam laterum arteriarum. Dum vero, cessante cordis actione, arteriæ comprimuntur, longe majori celeritate sanguis per illas movetur, & simul color sanguinis exeuntis coccineus fulgens est: & ex his illis signis novimus sanguinem ex arteria, non autem ex vena, effluere. Vena etiam, licet magna fuerit, vulnerata, leni stillicidio sanguinem fundit, (. nisi in summe plerhoricis) semper magis nigricantem, minusque rutilum. Si jam arteria maxima fuerit, & cordi admodum propinqua, cita mors sequitur, omni sanguine per vulnus brevi tempore expulso. Sæpe tamen ad animi deliquium tantum: & si tunc vulnerati non resocillarentur vino vel cardiacis, sed sic fere mortui relinquerebantur; spes adhuc aliqua superest, manente tali vita, sed debilissima, arteriam difsectam posse contrahi & consolidari. Mirabile hujus rei Exemplum viderat Celeberrimus horum Aphorismorum Autor, illudque solebat hac occasione auditoribus suis narrare.

Vulnerabatur in pago vicino inter pocula rusticus cultro sub axilla, & difsecta arteria axillari incredibili impetu exilliebat sanguis: brevi post concidens credebatur expirasse, & pro mortuo deponeretur. Sequenti die, dum accedebant illi, qui publica auctoritate occisorum cadavera examinare debebant, ut de vulnere lethaliitate ad iudices ordinarios renuntiarent, invenerunt aliquem ad-

huc calorem circa thoracem; cæterum nulla vitæ signa: differebant scrutari vulnus per aliquot horas, incipit sensim parum resocillari vulneratus, quem tamen brevi peritarum existimabant omnes. Sed præter omnium opinionem diu in summa tali debilitate manens vulneratus evasit tandem. Brachium autem illius lateris aridum & excusum penitus Mumie fere instar tota vita mansit. Si ergo in tam magna arteria, & cordi adeo vicina, potuit fieri consolidatio, apparet non tam facile desperandum esse etiam in periculosissimis vulneribus arteriarum: modo nullis stimulis vinosis vel cardiacis augeatur debilis vita in talibus vulneratis, forte plures evaderent.

Si jam arteria talis major difsecta sola prospiciat partibus inferius positis, nec ulli alterius arteriæ rami huc pertingant; necessario tollitur omnis omnino vitalis liquor influxus in has partes. Sequitur inde mors harum partium, quæ tunc duplici modo fit: vel enim liquida, in partibus suppositis hærentia, non amplius propulsa motu arteriosi sanguinis, stagnant & corrumpuntur: tuncque putrida fit, sed lenta simul gangræna: quia omnis vitalis impetus, movens partes vivas ad gangranosas illas crustas, hincque prosperere cito faciens malum, hic deficit: vel humores in partibus suppositis relictæ post diffectionem arteriam majorem, contractione propria valorum, & musculorum vicinorum actione, transeunt in venas, & redeunt ad cor: sed nihil interim poterit a corde redire ad has partes; unde sensim omni liquido orбата vasa harum partium collabuntur, & concrevant: cumque maxima pars nostræ molis corporeæ ab humoribus pendeat, idcirco moles harum partium ultra fidem fere imminuitur, & omnia arefacta penitus contrahuntur; ut apparuit in Exemplo modo allegato.

§. 162. **N**ervi majores, tensique, toti difseciti retroiliunt, se recondunt, ramulos vulnere paulo superiores trahunt, tendunt, vicinis dolorem, obstructionemque creant, parti vero infra Vulnus positæ stuporem, immobilitatem, marcoremque, aut & gangrænam.

Jam

Jam considerabuntur illa phenomena, quæ apparent, quando nervi majores vulnerantur. Nullum enim vulnus cutim lacerare potest, quin innumere fibrillæ nervæ dissecantur; sed de his hic non agitur. Consideramus hic tantum nervos majores, prout ab Anatomicis demonstrantur, qui sunt fasciculi nervorum communi involucri rectorum.

RETROSILIUNT &c. Illud, quod in majoribus nervis proprie nervus dicendum esset, tenerrimæ encephali pulpe propagæ, non videretur talem habere firmitatem, ut dissectum elasticæ vi retrofilire possit, sed molliissimis in sua origine ex medulla oblongata & spinali nervis circumponuntur tenacia involucria, ut tato deferri possint ad illa loca corporis, in quibus suo munere fungi debent. Ab his vaginis nervorum firmatas & elasticitas pendet, unde & parvæ satis fibrillæ nervæ Anatomico scalpello resiliunt; & nisi hoc foret, nervorum demonstratio, imprimis ubi in tenues dividuntur ramulos, omnino foret impossibilis. Dum ergo discinditur major nervus, extrema discissa vi contractili vaginalium, nervos involucria, & vasorum per huc disperforum; utrimque retrofiliiunt, & sub vicinis partibus se recondunt. Quo crassior autem nervus est, eo, cæteris paribus, densiora involucria habet: & cum nervei fasciculi minores, qui uniti hunc majorem constituunt, etiam suis investiantur involucriis, ideo magni nervi dissecati satis valida vi retrorahuntur.

RAMULOS VULNERE PAULO SUPERIORES TRAHUNT &c. Nervi quidem distribuuntur in ramos, ut arteriæ & venæ; sed rami ex arteriis venisve orti cum cavo trunci, unde oriuntur, communicant; unde liquidum ex trunco in ramos continuitate motus fertur. Sed alia ratio obtinet in nervis majoribus: minores nervos ramorum instar a se dimittuntibus. Major enim talis nervus continet innumeros minores nervorum fasciculos communi involucrio colligatos; qui iterum ex aliis minoribus constant: nec finem hujus divisionis hæcenus invenit subtilissimorum Anatomicorum dexteritas & industria. A majore autem nervo in decursu suo secedunt ubique tales nervorum fasciculi, qui rami majores nervi dicuntur; non quod substantiæ continuatione inde propagentur, ut in arteriis & venis, sed antea uniti cum aliis simili-

bus molem majoris nervi constituiebant; nunc inde secedentes tendunt singuli ad debita loca, ut suo fungantur munere. Omnes ergo nervi, qui ex majore nervo ramorum instar derivantur, jam adfunt tales in illo loco, ubi major nervus ex medulla oblongata vel spinali originem ducit. Sed in arteriis & venis rami ibi originem suam ducunt, ubi ex trunco majoris canalis exeunt.

Dum ergo truncus major nervosus discissus est, ille retrofiliiens simul trahet ramos nervosos ex hoc trunco ortos paulo superius, quam est vulnus inflictum; unde a violenta hac distractione fibrillarum nervosarum immanes dolores in partibus vicinis, ad quas illi ramuli pertingunt, oriuntur; & ideo sæpe longe acerbior dolor in partibus vicinis est, quam ipso vulneris loco. Posse autem a simplici tali distractione fibrarum nervearum enormes fieri dolores, docent plurima observata. Dum Phlegmone panniculum adiposum occupans & distendens suppuratur, cutim elevat & nerveas cutis fibrillas distrahit cum summo dolore; pure dein facto, perusta cure lanceola Chirurgica, cessat ilico dolor omnis, dum distendens cutim pus effluit. Quam sævus dolor oritur, dum inflammatorius tumor tenfam & nervosam adeo meatu auditorii membranam elevat? dum in lue Venerea tumens ossis substantia Periosteum distrahit, præ doloris acerbitate sæpe violentas sibi ipsis intulerunt ægri manus.

Præterea vaginæ illæ, quæ nervos majores, & deinde secedentes ramos, involucriunt, innumeris constant vasculis; uti hodie per Anatomicas injectiones certo novimus: non poterant ergo rami nervosi a trunco discisso & retrofiliente distrahi, quin simul & distraherentur hæ vaginæ, & sic elongentur vascula hæ consentientia: sed demonstratum fuit §. 112. num. 3. omnem causam, quæ vasa nimis trahit & elongat, minuire vasorum capacitatem; unde obstructio nasci poterit, & omnes ejus effectus.

PARTI VERO INFRA VULNUS POSITÆ STUPOREM &c. Nervorum actiones in corpore humano observatæ sunt distinctissimæ omnino. Quidam enim sensum præbent partibus, ad quas tendunt; alii motum muscularem efficiunt; nutritio partium denique, & vita, ab aliis videtur pendere. Diversas autem illas actiones per diversos

fieri nervos, docemur in morbis, evidentissime. Accidit enim sæpe, paralyfes particulares, imò & ipsam hemiplegiam nasci, in qua dimidium latus corporis immobile omni actione musculari voluntaria caret, superfluo sensu, calore, & nutritione in parte affecta; tuncque magna spes curæ affulget. Aliquando una cum motu sensus perit, & fit talis stupor in parte affecta, ut non amplius aegris appareat hæc pars pertinere ad corpus, sed sentiant obstaculo occurrentia huic parti, ac si baculo porrecto eadem tangerent; pejor tunc longe mali conditio. Dum autem simul frigus in parte paralytica est, & torosa partis substantia incipit decrescere, immedicabile fere semper malum est; uti in paralyfi, Colicam Piclonum dictam sequente, tristes exemplis constat. Nervi autem his adeo diversis functionibus infervientes, origine sua in encephalo distinctissimi licet sint, tamen collegati in majores fasciculos nervos ad partes tendunt: talibus ergo funiculis nervis discissis integre, omnes illæ functiones diversæ, a nervis integris pendentes, abolerentur: unde stupor & insensibilitas partium infra vulnus positarum; uti & earundem immobilitas & marcor: nisi rami, supra vulnus factum ex trunco emissi, partibus inferioribus prospexerint, vel alii trunci nervei ramos ad has partes dederint.

Minus forte evidens apparebit ratio, quare gangræna partium infra vulnus positarum nervum majorem penitus dissectum sæpe sequatur. Sed gangræna dicitur illa partis molliis affectio, quæ, abolito influxu vitalis humoris in arterias, & effluxu per venas, in mortem tendit. Si ergo nervo majori dissecto gangræna sequatur, debet tolli vitalis ille humorum influxus & effluxus: arteriæ tamen & venæ sunt integre, humores per illas fluentes boni; soli nervi discissi sunt. Si autem consideretur, motum liquidi per arterias pendere a binis causis, cordis nempe vi & arteriarum actione: & simul notetur, cordis vim pro maxima parte impendi dilatandis arteriis, hinc præcipuam causam motus fluidi per arterias esse earundem contractionem, quæ partim ab elasticitate qui-

dem arteriarum, maxime tamen pendet a vi musculari fibrarum orbicularium, quæ arcuantur dilatari arteriæ, & propellant contentum liquidum; cumque constet ex Physiologicis, actionem musculi requirere integritatem nervi ad musculum delati, & truncos nervos ramos dare vicinis arteriis, apparebit, nervo destructo, perire vim muscularem arteriæ, quæ urget liquidum contentum; supererit ergo sola Elasticitas arteriæ, & impetus a corde communicatus. In venis autem sanguis movetur illo motu, quem habet, dum ex arteriis in venas transit; adjuvatur dein motu musculorum adjacentium, qui turgentes, dum agunt, adjacentes venas premunt, sicque sanguinis venosi motum promoveunt. Nervis autem discissis, musculi suppositi paralytici manent; hinc nulla illorum actio superest. Minuto ergo impetu sanguinis ex arteriis in venas pulsus, decidente musculorum venis adjacentium actione, incipit sanguis in venis tardius moveri, accumulari, stagnare; atque ita major adhuc resistentia oritur arteriis, quarum actio jam debilitata erat; unde tandem integre suffocatur motus vitalis fluidorum per arterias & venas in partibus talis vulneris suppositis, id est, nascitur gangræna.

Sic ratio apparet illorum malorum, quæ observantur sequi nervos majores integre discissos; observata autem Medica docent in simili casu talia sequi mala.

Sanissimus, & cruda senectute vigens vir, sexagesimum quartum ætatis annum agens, ex alto delapsus spinam dorsi acuto lapidis angulo sic impingit, ut ipso momento totus corporis inferior truncus ab infimo margine ultimarum costarum, & artus inferiores carerent sensu & motu, medulla spinali læsa in tam alto loco. Incausam adhibitis omnibus, sexta die gangræna plantarum pedis utramque occupabat; septima placide perit.

Similem causam in juvene sanissimo viginti annorum vidi, cui circa ultimas lumborum vertebrae hærebat malum; miseram ille vitam per decem septimanas traxit, sed horrenda gangræna totas nates, pedum plantas, utramque calcem depalcebat, miserissimo spectaculo.

§. 164. **N**ervi tenſi, tendinoſi, puncti, vel dimidiato diſſiſſi dolores, aliquando primo obtuſos, nonnunquam vivos excitant, primo loco vulneris, poſt per omnes nervos nexos, vicinoſque; hinc calotes, tumores, rubores late ſparſos, febres; deliria, ſpaſmos, inflammationem, inflammati aperturam cum evacuatione acris, tenuis, & copioſiſſimi ſæpe feri, poſtea inſenſibilitatem, rigiditatem, exſiccationem, immobilitatem produciunt, vel gangrænam, & mortem: atque hæc quidem omnia eo violentiora accidunt, quo nervus eſt fortius tenſus ſupra partes firmas, iſſique annexus, aut & involucris magis tenacibus indutus.

Hi ſunt calamitoſiſſimi illi caſus, ubi a levi vulnere tam dira ſæpe ſymptomata oriuntur. Accidit aliquando, ut, dum vena in brachio pertunditur, laderetur ipſe bicipitis muſculi tendo; vel, quod ſæpius fit, lata illa aponeuroſis ab hoc tendine orta, muſculos cubiti tegens. Ipſo hoc momento ſæpe oritur dolor intolerabilis, quem miſero ejulatu ægri exprimunt. Dum Carolo nono, Galliz Regi, Medicorum juſſu vena ſecabatur, ipſo momento, quo vulnuſculum inſigebatur, præ doloris acerbitate Rex alta voce clamavit, paulo poſt totum brachium intumuit, nec poterat ſine magno dolore flexi vel extendi articulus cubiti: ſævus interim dolor in loco puncturæ, & poſtea per totum brachium diſpergebatur: applicatur vulnuſculo oleum terebinthinæ calidum cum pauxillo ſpiritus vini rectificati, & aliis dein idoneis remediis poſt triſtre ſpatium brachii uſus integre reſtitutus fuit (*Les Oeuvres d' Ambroſe Pare livre XII. chap. 41.*).

Aliquando & in initio talis mali tantum ſentitur obtuſus dolor, poſt pauca ſæpe horas immaniter auctus, totum brachium ad humerum uſque occupans; aliquando & ſubaxillares glandulæ ſaris cito tument & inflammantur. Conqueruntur ſæpe in ipſo vulnere adeſſe ſenſum vivi ignis partem comburentis. In cute externa maculæ rubræ oblongæ apparent, peſſimo fere ſigno. Dum in Paronychiæ maligna ſpecie tendines flexorum digiti afficiuntur, rubra zona, per cutem cubiti, longitudinaliter ſecundum ductum muſculorum digitos ſequentium decurrens, tam mali habetur ominis apud peritos Chirurgos; acutiſſima ſæpe in ſaniſſimo etiam homine accenditur febris; & partim ab hac febre, partim per doloris vehementiam turbato cerebro, deliria, convulſiones, mors ipſa ſequitur. Funestum tale exemplum mortis ſecutæ poſt nervi puncturam Paræus in loco moſto ci-

tato habet. Hippocrates (*Epidem. Lib. V. Tom. IX. pag. 343. 344.*) narrat, quod homo ſibi ſubulam ad digiti longitudinem, in femur ſupra penam adegerit: nullus effluebat ſanguis, vivens cito clauſum fuit, totum femur intumefcebat, & tumor extendebatur ad inguen & laterum molliſſitudinem (venæ) tertio autem die mortuus eſt. Alter acutotelo poſterius paulo infra cervicem vulnerabatur; vivens autem accepit vix eſſatu dignum, non enim alte penetrabat: non longo tempore poſtea euſo ſiculo contrahabatur, uti ſolent opſiſtichono correpti, & maxillæ claudabantur; & ſi quid liquidi aſſumeret ore, & deglutire tentaret, redibat per nares: reliqua omnia deteriora fiebant; ſecunda die mortuus eſt. Piuirmi tales triſtiſſimi caſus apud Obſervatores occurrunt.

Quamvis autem non ſemper mors ſequatur tales nervorum læſiones, moleſtiſſima tamen plerumque adiunt mala: tota enim pars tumet immaniter, inflammatur, & vel per elatas epidermidis bullas, vel & per ipſum vulnuſculum ſponte dilatatum exit incredibilis quantitas reus liquidi noctes & dies: quia autem adeo urentem dolorem ſentiunt ægri, acrimoniam depluentis icboris acculant; cum tamen guſtu non detegatur in hoc liquido effluente tanta acrimonia. Aliquando gangræna totum panniculuni adipolum depaſcitur; ſuppuratio mitis nunquam hic fit, ſed ſinooſæ collectiones ichoroſæ materiæ omnem pinguedinem muſculis interpoſitam conſumant; vaginæ pinguedinoſæ tendinam deſtruntur; unde poſtea, cute muſculis accreta, tendinibus & muſculis deſectu celluloso tunica concretis cum vicinis partibus, fit rigiditas & immobilitas omnium, & totius membri uſus perit. Deſtructis valida gangræna, vel ſuppurazione, nervorum tunicis, (nam & in nervorum involucris cellulosa tunica reperitur) uſus horum perit, ſitque inſenſibilitas, marcor &c. Quam mirabile videtur, in corpore etiam

sanissimo, a levi nervi punctura posse nasci tam miras humorum degeneraciones, tam enormes dolores, tot partium usum peritus destitui a levissimo etiam vulnere! Ratio horum phenomenorum postea dabitur §. 181. & sequentibus.

Notandum quam maxime, omnia hæc eo violentiora accidere, quo nervus læsus fortius tensus est: hinc tam periculose puncturæ sunt circa ultimas digitorum phalanges, ubi fortissimi tendines inferuntur, & in vola manus, ubi expansio illa tendinosa palmaris musculi tensum illud & tendineum scutum facit. Augetur præterea hæc malignitas, si tenacioribus involucris nervosæ partes læsæ fuerint; uti patet imprimis in periculosissima Paronychia specie, ubi tendo inferus ultimæ phalangis digiti punctura læsus, vel alia quacum-

que de causæ inflammatus, lævissimos dolores, phrenitidem, convulsiones, syncopen, imo mortem ipsam sæpe fatis subito infert; vel, si evaserit post diros adeo cruciatus æger, fideratum ultimæ phalangis ossiculum cadit; manus in pugnum contracta per totam vitam manens immobilis tristes funesti mali reliquias, arte insuperabiles, ostendit. Ratio autem tam enormis malignitatis, tota fere pendet inde, quod tendinibus flectentibus phalanges digitorum circumponatur ligamentum illud mirabile, cartilagineum fere duritiem habens; si enim primis horis incipientis mali peritus Chirurgus audaci sectione dividat omnes partes incumbentes ad os usque, sicque pertundat thecam illam tendines ambientem, minuitur dolor illico, & præcaventur omnia illa funesta symptomata.

§. 164. **Q**Uæ eadem ( 162. 163. ) perum mutata, etiam in tendinibus diversimode læsis obtinent, atque sævissima quidem.

Tendo musculi examinatus discerpi potest in tot fibrillas, in quot poterat dividi musculus ipse: inter quas fibrillas iterum interponuntur vasa numerosissima, uti insectiones Anatomicæ docuerunt. Sed tendinum illæ fibrillas videntur esse tantum continuaciones fibrarum musculosarum, quæ nervis musculos ingressis originem suam debere videntur ( *Herm. Boerhaave Instit. Med. §. 395.* ). Hinc non mirum, tendines læsos, nervorum propagines cum sint, nervis similia mala pati. Sed uti in majore nervo reperiuntur omnis generis vasa, & tunica cellulosa, nervosas fibras a se mutuo separatant, sic idem in tendinibus observatur. Quia autem tendines movendis partibus tantum inserviant, nervi autem præterea & sensum, & nutritionem, in plurimis corporis partibus faciunt, hinc non omnia eadem mala sunt a tendinibus læsis, quæ nervis vulneratis accidunt: multa tamen in utroque casu adfunt communia phenomena, quæ tamen plerumque violentiora in tendinibus læsis adhuc observantur.

Integre discissi nervi, nisi ramuli vulnere paulum superiores trahantur a resiliente trunco discisso, non multum doloris faciunt; partibus autem inferiorebus omnes usus tolluntur, quos a nervo integro habebant. Sic & tendine integre discisso aboletur motus partis, qui ab hujus tendinis

integritate pendebat; cæterum dolor sæpe nullus, nisi qui omni vulnere simplici adest, nec sæviora sequuntur symptomata. Hoc vidi in homine, cui ultro tendines erectores digitorum abscissi fuerant. Memorabilis casus, qui hoc confirmat, habetur in Actis Academiæ Regiæ scientiarum ( *P. An. 1722. Mem. pag. 70. Gr.* ). Saltator agilissimus, dum validissimo saltu corpus elevare nititur, disrumpit utriusque pedis magnum tendinem, quem Achilles vocant, integra manente cute; distantia autem trium digitorum transversorum erat inter tendinis rupti extrema. Idonea ligatura restitutus fuit in pristinam sanitatem; nec rupturæ momento, nec toto curæ decursu illum dolorem sensit.

In alio homine, integra etiam manente cute, ejusdem tendinis illa pars, quæ oritur a musculis gastrocnemiis, rumpebatur, manente integra illa parte tendinis, quæ musculo soleo, gastrocnemiis subiecto, originem debet. Aderat magnus dolor, valida inflammatio, & tumor partis ( *P. An. 1728. Mem. pag. 331. Gr.* ). Inde appareret, longe majora mala sequi tendinem semidiscissum, quam si integre divisus fuerit.

Sævissima autem mala a tendinibus vulneratis leviter, oriuntur; imo a levi tantum attritu tendinis, involucris suis nudati,



dati, totam genus nervosum turbatur uno momento per totum corpus: quod maximum, cum tendines involutris suis tecti, imprimis pinguedinosa illa vagina, quæ molli oleo lubricando tendinum mobilitatem expeditam adeo servat, ferant sine magno malo, ut valide trahantur, imo consuantur. Notum enim est in Chirurgicis, quod tendines dissecos, tenaculis arreptis extremis, attrahant, trajecto filo in unionem retineant, sicque felicissime sanent, parte affecta sic disposita, ut musculi, quorum tendines sunt disseci, flaccidi maneant. Ubi vero involutris illis nudus tendo vel leviter attingitur, quam horrenda oriuntur mala!

Nobili viro valida inflammatio totum pedem a genu ad malleolos usque occupaverat; valida simul aderat febris; & in corpore suis cacoehymico tantæ inflammationis resolutione expectari minime poterat: oriuntur hinc inde collectiones purulente & ichorose materię; & magna pars tunice cellulose sepatabatur; imprimis circa malleolum internum consuta omni pinguedine, ipsique vaginis tendinum separatis, nudi apparebant tendines. Monuerat Chirurgum Celeberrimus Boerhaavius, ne tangeret; neglexit illic hoc monitum, & credens tunicæ cellulose partem esse, tenaculo prehendit tendinem, ut auferret; ipso momento miser æger convulsus fuit totus a capite ad calcem, cum immani dentium stridore; sicque per aliquot momenta tetanodes factus obtrivit.

Terribile & huius rei exemplum habet Hippocrates (*Epid. Lib. V. Tom. IX. pag. 348. in fin.*) Throni Damonis filius circa tibiam malleolum ulcus habebat; juxta nervum jam purum erodente medicamento illi apposito, conigit opisthotomo correptum mori. Satis autem

videtur probabile, quod per nervum purum (*νεῦρον καθαρὸν*) intellexerit tendinem vaginis suis nudum, qui tunc albo colore niteret. Eadem observatio reperitur & alibi (*Epid. Lib. VII. Tom. IX. pag. 570.*).

Nullum autem pulchrius habetur remedium ad nervorum, vel tendinum puncturas, ut præcaveantur horrenda illa symptomata, vel mitigentur, si jam adsint, quam Balsamum Peruvianum nigrum, leviter calefactum, vulneri instillare; deinde spatula calefacta apposita officere; ut magis penetraret, & diffundatur per omnia vulneris loca: postea totum membrum mollissimis cataplasmatibus aut fomentis involvatur, vel blandissimis olleosis illiniatur continuo. Si vulneris angustia Balsamum Peruvianum non admittat facile, dilaturur parum.

Quantum autem possit olei calidi perfusio, ubi totius generis nervosi irritatio, & convulsiones inde futuræ metuuntur, propria calamitate didicit Galenus; qui in palæstra dum exercebatur, divulsam habuit acromium a clavicula. Palæstræ magister, luxatum humerum credens, summa vi & repetitis vicibus distrahebat partem, ut nempe restitueret os luxatum: distractis tam enormi vi musculus, sensit instare convulsionem sibi Galenus, jussitque totum diem & noctem oleo calido partem perfundi, dum nudus sub aestu canaliculæ decumberet in pelle sic figurata, ut oleum assu- sum lente delaberetur in pelvim suppositam: quod sic collectum & calefactum reassundebatur continuo. Tellatur autem, quod dum vel medico tempore intermitteretur olei assusio, sentiret illico musculos cervicis distendi, & instare convulsionem (*Galen. Comment. I. in Hippocr. de Articulis. Tom. XII. pag. 323.*).

**E**T Membranæ, tendinum, nervorumque sæpe productæ quum sint, iidem afficiuntur morbis (162: 163.)

Non omnes quidem membranæ læsæ tanta mala faciunt, sed illæ imprimis, quæ tensæ admodum sunt. Tendinosa illa membrana, quæ a fascia lata producit; similis aponeurosis a glutæo musculo orta senioris musculos validissimos ambiens & coerens, si levi punctura lædatur, enormia producit mala. Idem apparet in bicipitis aponeurosi; per venæ sectionem in brachio

institutam aliquando læsa. Meatum auditorium invadens membrana, adeo tensa, si inflammatorio tumore ibi orto distrahat, intolerabilis dolor oritur, delirium, imo sæpe mors sequitur; ut Hippocrates in *Prognostico* & *Coacis prænotionibus* monuit. Imprimis autem metuenda est læsio illarum membrandarum, quæ vel tendinum producta sunt; vel exquisitissimo sensu nervorum,

per suam substantiam disperforum, copiam  
& irritabilitatem testantur: qualia v. g.

obtinent in Perioſteo, quod tam acerbos  
aliquando dolores facit, si lædatur.

§. 166. Quid lymphatica, adiposa, venosa vasa, & vesiculæ patiantur in vulneribus, quid efficiant, ex lege circulationis, & consideratione vicinorum facile intelligitur.

**LYMPHATICA.** Vasa, quæ ab Anatomicis demonstrantur sub nomine lymphaticorum, omnia venosa sunt: docet hoc liquidus motus per illa vasa ex ramis in truncos, uti & valvulæ, quas Ruyschius tam evidenter demonstravit Bilio, has unquam in his vasis demonstrari posse neganti (*Dilucidatio vabularum pag. 2. & 3.*). Hæc vasa lymphatica venosa læsa non facient magnum malum: venæ enim sanguinæ, etiam satis notabiles, vulneratæ non multum sanguinis fundunt. Sed his venis lymphaticis respondent similes arteriæ lymphaticæ, quæ vulneratæ, nec integre discissæ tamen, molestissimum & perpetuum lymphæ stillidium in vulneribus facere poterunt. Numerosissima autem talia adesse in corpore vasa, potest etiam concludi ex injectionibus Anatomicis per arterias factis: replentur enim colorata materie tales partes in suis vasis, in quibus naturaliter nullus sanguis ruber apparebat. Tendines & ligamenta sic replevit Ruyschius, ut ruberent penitus: ergo adferunt in his partibus plurima talia vasa, quæ liquido tenuiori non colorato replebantur in sanitate. An ideo frequens talis lymphæ profluvium observatur vulneribus circa articulos infidelis? Chirurgi ideo articulorum lympham vocaverunt (*Leedewater*) quia frequenter observabant circa articulos ex ulceribus, vel & vulneribus, exillare magnam huius lymphæ copiam.

**ADIPOSA.** Corporis humani pinguedinem sanguini misceri posse, & cum illo per vasa moveri, satis certo constat: videmus enim, per febrem acutam in obesius paucorum dierum spatio pinguedinem adeo minui: imo & in sanguine, venis educto in talibus morbis, apparuerunt oleosæ guttulæ. Malpighius (*De Omento, Pinguedine & adiposi ductibus pag. 42.*) dum in ranis adnatæ trunco venæ portarum oleosæ strias observabat, his compressis vidit conspicuas olei guttulas in trunco venæ portarum una cum sanguine in hepate abripi. De hac

go re nullum videtur superesse dubium: quæritur tantum, an pingue tale oleum propriis vasis seratur continuo motu, uti reliqui humores; an vero collectum hæreat in ampullulis, quæ orificiis suis recipientibus uniuntur arteriis, unde hoc oleum secerantur, orificiis vero emitrentibus communicarent adjacentibus similibus ampullulis, uti etiam venis, quæ pingue hoc ab arteriis secretum, in folliculis illis collectum, iterum reciperent, & reliquis miscerent humoribus. Malpighius fere videtur in tractatu modo memorato fuisse in hac opinione, quod essent talia vasa pinguedinosa, quæ continuo ductu, nullis ampullulis interpositis, oleum deferrent: in Posthumis autem ejus operibus (*pag. 25.*) dicit, pinguedinem propriis in loculis contineri & concervari, velut in peculiaribus officinis; vasorum autem seu ductuum adiposorum existentiam nondum asserere audeat, licet circa ipsa folliculis plurimum se exercuisset. Sive autem pinguedo talibus ampullulis, unitis simul & in se mutuo patentibus, constet; sive dentur talia vasa pinguedinosa, his læsis pingue contentum exisset, corrumpi poterit, sicque multa mala producere valebit. In equi abdomine, post validum cursum mortui, astricto, totam cavitatem ejus oleo tenui suffuso plenam reperit Ruyschius (*Epist. Anatom. ad Clariss. Herm. Boerhaav pag. 55.*) Hoc certum est, quod pinguedo laxissima sit, facile in vulnere protuberet, fungosas carnes sic dictas faciat; imprimis si pingua loca vulnerata nimis emollientibus tractentur.

**VENOSA VASA.** Modo non fuerint admodum magna, non adeo metuenda faciunt mala: hæmorrhagia enim valida raro inde nascitur, nisi in valde plethoricis, quæ tunc non nocet, utpote nimiam sanguinis copiam minuens. Vicinæ autem venæ, crebris anastomosibus inter se junctæ, defectum vulneratæ venæ facile supplent. Hoc tamen videtur notandum, quod si cognoscatur notabilis vena per vulnus læsa esse, tunc

tunc non posse applicari sine periculo acris illa styptica, quæ hemorrhagiæ in vulneribus compescenda causa aliquando adhibentur, vitriolum v. g. alumen, alcohol &c. metus enim est, ne hæc paulo venæ vulnero recepta sanguinem ingreditantur, ejusque coagula faciant; quæ per latiorē continuō factam venam ad cor dextrum delata, dein pulmonalis arteriæ angustis impulsæ, funesta maxime possent producere mala.

**VESICULÆ.** Quales sunt omnes folliculi glandulosi, in quibus per arterias secretus a sanguine humor membranaceo cavo colligitur, & deinde proprio emissario ad usus peculiares emittitur. Laxis per vulnus his vesiculis paret, illarum usum destrui; quanti autem momenti sit hæc iactura, ex cognito usu harum partium paret: sic v. g. feminalibus vesiculis dissecis, apparatus facile, totum turbari generationis opus.

§. 167. **SI** vulnus oculo patet, ejus præsentia, & natura scitur 1. Sensu ipso, absque impedimento conspectus, & suppressio cruoris fluxu. 2. Scientia anatomica vicinorum.

Summa imprimis hic cautela opus est Medico aque ac Chirurgo, qui ad vulnerum vocantur, ne de vulnere judicium ferant, priusquam omni cura illud examinauerint: quidquid enim tunc tumultuario consilio minus cauti pronunciant, postea forte ad iudices deferetur. Si tunc infelix eventum periculosum fuisse vulnus probet, quod prima illa inspectio leviores momenti esse dixerant, Parroni, qui rei causas agunt, postea Medico aque ac Chirurgo infamiae notam inurent, ac si illorum imprudentiæ deberent imputari gravia illa mala, quæ vulnus inflictum secuta sunt. Chirurgi autem prudentiores plerumque solent tunc præsentem Medicum rogare, quid de vulnere & ejus effectibus metuendis sentiat: sique cauti evitant sæpe periculum. Utilissimum ergo erit, si illi qui Medicinæ exercendæ se applicabunt aliquando, omnem arripiant avide occasionem, ut vulnera, & graviores operationes, sæpius videant; ut sic sensim assuefiant intrepido animo hominum calamitates intueri. Non sine ratione Hippocrates dixit (*De Flatibus in initio, Tom. VI. pag. 213.*) *Medicus periculosa intuetur, ingrata contrahens, & ex aliorum calamitatibus proprias lucratur miseris, ægratantes vero per artem a maximis malis, morbis, doloribus, tristitia, morte per artem vindicantur.* Humani generis commoda, ex arte salutari nata, levant hæc radia. Sepe enim accidit, Medicos, fabricæ corporis humani peritissimos, vulnere aspectu, ejularum adstantium, vulnerati quærens, sic turbari, ut titubantes longe aliud iudicium ferant de vulnere, quam quidem rursus, si pacata mente omnia considerassent.

Non ergo festinanter, sed summa cum animi attentione vulnus examinandum est, prima enim deligatione hoc licebit, quod postea fieri commodè non poterit. Sequentibus enim diebus sæpe vulnus sic tumebit, dolebit, inflammabitur, ut sine magna molestia & irritatione specillum ferre nequeat.

Si jam vulnus sit in tali corporis loco, qui oculo patet, auferenda sunt omnia illa impedimenta de vulnere, quæ faciunt, ut minus distincte examinari possit. Aqua tepida, cum melle & vino, & paulo salis marini, vulnus abluit, concreti sanguinis thrombos sic tollunt, ut tota superficies vulneris undique pateat. Quandiu autem sanguis adhuc cum impetu de vulnere fluit, omnia sic inundantur, ut nihil distincti cernere liceat; hinc sanguinis fluxus coercendus: quod in artubus facile fit, idonea ligatura compressis vasorum truncis: in aliis locis corporis, nisi magna admodum vasa fuerint læsa, alcohole vini calido poterit compesci hæmorrhagia.

2. Sine hac enim scientia nihil certi determinari poterit. Inspectio enim vulneris ejus magnitudinem, profunditatem, decursus docere poterit, cognitio autem partium, quæ in vulneris loco ponuntur, ex sola Anatome haberi potest. Fidelissime Eustachii tabulæ, in quibus arteriarum & venarum majorum nervorumque situs, uti & musculorum origines & decursus tam accurate notantur, summi hic usus esse poterunt, ut, cognito vulneris loco, possit determinari, quænam partes corporis per vulnus læsæ sint, & quodnam inde damnum metuendum sit.

§. 168.. **V**ulneris autem absconditi præsentia, & natura noscitur. 1. Ex Scientia anatomica, situ vulnerandi, modo & vi inflicti. 2. Ex læsa actione sequente vulnus. 3. Ab excretis intra vel extra corpus expulsi. 4. Ab effectis supervenientibus, dolore, singultu, spasmo, tumore &c..

Difficilius longe vulneris cognitio, ubi illud totum oculis lustrari nequit: ingressum instrumenti vulnerantis in externis inregimentis videmus; quo usque tamen penetraverit, sepe latet: multum tamen juvabit, si attendatur ad sequentia.

1. Ex Anatomica scientia partium novimus, quænam hic locentur partes; sed situs vulnerati illo momento, quo vulnus accepit, uti & ipse situs vulnerantis, dum vulnus infixit, demonstrabunt viam, qua instrumentum vulnerans penetravit versus interiora corporis. Si tunc simul adsit instrumentum vulnerans, poterit aliquando ex amplitudine vulneris integumentum cognosci, ad quam profunditatem adactum fuerit. Omnia hæc sedulo metentur inquiri ex ipso vulnerato, vel illis, qui adfuerunt illo tempore, dum vulnus infligebatur. Si v. g. vulnus gladio inflicti intra sextam & septimam collam veram transiverit perpendiculari directione, penetrabit in abdominis cavum; si reclinato versus posteriora corpore homo vulnus accepit, gladio ab inferioribus sursum adacto, poterit in thoracis cavum penetrasse. Si vero versus anteriora proclivi corpore gladius eodem loco penetraverit, poterit per totum abdomen ad pelvim usque pergere: Sic a latere inflicti vulnus potest longo satis itinere sub integumentis supra costas pergere, imprimis in obes, nec penetrabit tamen in cavum thoracis. Quando jam vulnus profunditas specillo explorabitur, conducit maxime cognoscere situm vulnerati, dum vulnus accepit, tuncque illum in eodem situ reponere: nisi enim hoc fiat, sæpius accidet, ut panniculus ad ipsos viam obturet: sic in venæ sectione, imprimis in obes, sepe accidet, primo momento sanguinem pleno saltu exilire; mutato parum situ brachii, mox cessat sanguinis fluxus, pinguedine cuti supposita se interponente inter aperturam venæ & cutis.

2. Dum ex Physiologicis cognoscimus illa, quæ requiruntur ad actionum singularum corporis integritatem; facile videmus

ex actione post vulnus impedita, vel abolita ponitur, an quædam, an vero omnia requisita ad actionem exercendam per vulnus sublata sint. V. g. si vulnus in cavum abdominis penetranti succedat illico actionum vitalium languor summus, cor palpetur celerrime; pulsus parvus, celer, inæqualis sit, pallor faciei & laborum adsit, & frigus extremorum; concludimus, vas majoribus diffusis sanguinis ingentem copiam in cavum abdominis effundi. Si vulnus collo inflicti, sine notabili hæmorrhagia, similia sequantur symptomata, metuimus, ne nervi hic decurrentes, qui vitalibus visceribus prospiciunt, læsi sint. Si post capitis vulnus eadem obtineant mala, cerebelli læsio, vel ab extravasati humoribus compressio, adeo creditur. Si vulnera capitis omnium actionum animalium abolito sequatur, eadem de cerebro timeamus. Si post vulnus dorso inflicti omnia infra posita sensu & motu privari observamus, spinalem medullam læsam esse concludimus. Idem de reliquis actionibus verum est.

3. Si post vulnus thoraci inflicti coccineus spumescens exit sanguis de vulnere, vel ore expuitur, notimus pulmonis vasa discissa esse. Si ex vulnere abdominali chylus effluat, tenuis intestini læsio significatur, si fœces prodeant, crassi intestini vulnus indicatur; si sanguis emingatur, renes, ureteres vel vesicam læsam novimus &c.

4. Dolor ingens, subito natus post vulnus inflicti, denotat nervos, tendines, vel membranas tendinosas, aut nervosas, læsas esse. Singultus autem, a diversissimis partibus læsis, fieri poterit, uti & spasmus. Post validas hæmorrhagias singultus & convulsio sæpe oriuntur, illaque tunc admodum mala pronuntiavit Hippocrates in Coacis Prænotationibus & Aphorismis. Ab ileo singultum ortum damnavit Hippocrates: hinc & intestini vulneratis supervenire posse valde probabile est. Diaphragmatis, Oesophagi, ventriculi capitis vulnera singultus sequitur. Hinc illud signum solum consideratum semper malignum vulneris effectum ostendit.

ostendit, non semper certo partem vulneratam indicat.

Tumores autem subitanei, vulnus sequentes, vel humores effusos, & in loco præternaturali collecto, designant, vel aeternam per vulnus cava corporis loca ingres-

sum, & mire dilatatum calore corporis. Dicitur postea de miris illis tumoribus vulnera pectoris sequentibus, dum aer paniculum adiposum ingressus immani tumore totum corporis externam superficiem distendit.

§. 169. **E**X cognitis (167. 168.) determinatur prævisus vulnerum eventus.

1. Mors, vel vita vulnerati.
2. Sanatio possibilis, impossibilis, integra, pro parte.
3. Curatio facilis, difficilis, brevis, longa.
4. Effectus a vulnere, peracta sanatione, superstes, fururus; ut tabes, insensibilitas, immobilitas, figura laesa &c.

Postquam per adminicula artis hodie cognita, post debitum examen omnium illorum, quæ binis præcedentibus paragraphis dicta sunt, habetur vulnus diagnosi, quæ docet partem læsam & abolitas vel impeditas actiones corporis sani per vulnus; tunc poterit prædicti vulneris eventus, & patebunt illa mala, quæ a vulnere ut causa sequi poterunt. Hæc vocatur vulnere Prognosis, in qua determinanda sepe summa cautela opus est. *Est enim prudentis hominis, primum eum, qui servari non potest, non attingere, nec subire speciem ejus, ut occisi, quem fors ipsius interuenit. Deinde, ubi gravi metu sunt certæ tamen desperatione est, indicare necessariis periclitantis, in difficili esse: ne, si vieta ars malo fuerit, vel ignorasset, vel sefellisset videatur. Sed ut hæc prudenti viro conveniant, sic rursus histronis est, parvam rem attollere, quo plus præstitisse videatur (A. Corn. Celsi Medicin. Lib. V. cap. 26.).*

Animadversione tamen quam maxime dignum est, dari aliquando tales casus, in quibus vel Anatomæ peritissimi fallerentur in determinandis partibus per vulnus læsis. Observata enim fuerant frequenter viscerum internorum positura, diversissime a situ naturali, quem communiter obtineant. Accuratissimus MERY in militis defuncti cadavere mirabilem viscerum transpositionem invenit. Cordis basis sinistrum latus respiciebat, apice in dextra parte thoracis hærente; magnorum vasorum ex corpore egressorum situs pari modo mutatus erat. In abdomine ventriculus sic positus erat, ut pylorus in sinistro latere hærens duodeno intestino continuaretur. Hepar sinistrum hypochondrium, dextrum vero lien occupabat, intestinum cæcum, & coli initium

in sinistro ilio hærebant &c. (*Journal des Savans Janvier 1687. Et acta Lipsiens. 1690. pag. 405.*) Simile exemplum & viderat celeberrimi Caroli Drelincurtii pater, ubi sedibus permutatis lien a dextris cessat, hepar a sinistris (*Caroli Drelincurt. Opuscula pag. 721.*)

Hæc autem in sanis hominibus contigerunt, & a prima origine talis mutatio situs in visceribus obtinuit. Sed & per morbos frequenter mutari viscerum situm fidelibus constat observatis. Post frequentissimos vomitus in cadavere mulieris situs ventriculi imprimis, uti & aliorum viscerum abdominalium, mire mutatus inveniebatur (*Académie des Sciences l'an. 1716. Mémoires pag. 128.*). Admodum verosimile videtur satis frequentes esse tales mutationes situs viscerum. In illis enim cadaveribus, quæ vel ipse dissecti, vel ab aliis dissecta vidi, plurima talia observare licuit. Vidi Lienem in pelvim prolapsum, ventriculi fundum infra umbilicum porrectum, coli intestini illam partem, qua ventriculo subjacet, inde sic reflexam, ut infra umbilicum hæreret, arcum formans, cujus convexa pars pelvim, concava ventriculum respiciebat &c.

Errores autem, qui inde in vulnere Prognosi contingunt, vix evitabiles videntur. Quis enim auderet talia prædicere, & quibus signis hoc posset cognosci?

Præterea peculiaris vulnerati diosyncrasia plurimum mutare potest effectus vulneris inflicti. Sunt v.g. tam pusillanimes quidam, ut conspectu sanguine, licet alterius de vulnere fluat, mox in animi deliquium cadant. Unde Hippocrates (*Prorethoricon Lib. II. Tom. VII. pag. 817.*) prudenter monuit, multa vulnera in locis minime ma-

lis esse, & nullo modo gravior videri, sic tamen dolet piaga, ut respirare non possint: alii vero pro vulneris dolore, ubi nihil periculosi ad rat, speciem quidem dixerunt, verum d. mori, & periclitantes mortui sunt. Quidamque enim aut corpora in febres pronon habent, vel rantes facile turbantur, talia patiuntur. Sed neque hec admirari oportet, neque formidare, illud expendendo, quod & animæ & corpora hominum plurimum differunt, & vim maximam habent &c.

Sub his ergo cautelis determinatur prognosis vulneris, in qua quæritur.

1. An nempe vulnus inflictum tale sit, ut pro effectu suo physico mortem faciat, nulla arte evitandum; an vero post vulnus vita superstes manere possit.

2. Sanatio vulneris dicitur, ubi partes, per causam vulnerantem separatæ a naturali cohectione, iterum concreverunt simul unitæ. Si v. g. digitus sic diffectus fuerit transversum, ut exigua tantum cutis portione adhuc cohereat, non poterit promitti talis vulneris sanatio: servari quidem poterit ager, sed mutilatus hinc sui corporis parte. Præterea accidit sæpe, ut vulnere curato non restituantur usus omnes parti vulneratæ, quos in sanitate habebat; tunc non est sanatio integra, sed tantum pro parte. V. g. si insignis nervus diffectus fuerit omnino per causam vulnerantem, vulneris talis sanatio integra nunquam erit; omnes enim illæ functiones partis vulneratæ, quæ a nervi diffecti integritate pendebant, manebunt abolitæ.

3. Nisi enim hæc statim ab initio præmoneantur, culpa difficilis curæ, vel diu protrahit, in Chirurgum vel & Medicum conjicietur. Facilis autem cura dicitur, quæ sine multo ægri incommodo, & absque magno artis molimine perfici poterit. Dum v. g. tendo muscoli erectoris pollicis diffectus se subdlexerit subintegumentis, non poterit hoc vulnus curari, & restitui usus naturalis huic parti læsæ, nisi, dilatato vulnere, tendinis abscissi extremum tenaculo prehensum protrahatur, & dein consuatur cum altero extremo: sed hæc non sine difficultate & dolore fieri possunt. Prudentia postulat, ut hæc non semper ægris revelentur, amicis tamen vulnerati hæc omnia indicari debent, ne postea curationis molestæ radia inpatientur Chirurgo & Medico.

Ubi v. g. vulnus cum notabili substantiæ jactura inflictum est, dum acinacæ curæ & panniculi adiposi magna pars abscinditur, requiritur satis magnus temporis spatium, ut restituantur hoc perditum. Si simplex tantum divisio cutis & panniculi adiposi facta fuerit per instrumentum vulnerans, bene unitis ex artis præscripto labijs, brevi tempore poterit consolidari tale vulnus, si sanum vulnerari corpus fuerit: si autem notabili cacochymia laboret, longe tardius & multo difficilior cura periclitetur. Hæc autem in vulnere Prognosis determinari debent, quia multorum animis hæc infodit opinio, ac si Chirurgi turpis lucri causa vulnere curam de industria prostraherent; quod ab honesti viri animo quam longissime abesse credere fas est.

4. Omni cura & ad hæc attendendum est. In vulneribus enim non lethalibus solent Judices penam statuire proportionalem damno, quod vulneratus ex vulnere inflicto ut causa recepit. Ideo Patroni, qui rei causam agunt, omni versutia, quæ sæpe nimis valent, solent culpam malorum, vulnus sequentium, imputare Chirurgo & Medico; qui vulneris curam gesserunt. Ideo in prima deligatione ex cognitione Anatonica partis, cui vulnus inflictum est, & ex functionibus læsis post vulnus acceptum, debent indicari mala illa, quæ hoc vulnus, quamvis optima arte curatum, sequuntur. Vel si non possit hoc tam certo determinari, saltem moneri debet, periculum esse, ne hoc vel illud damnum maneat post vulneris curationem. Nullibi enim iniquius agitur cum Chirurgo, quam in his casibus: curato enim vulnere si partis pristina mobilitas v. g. perierit, solent plerumque narrare, quis inflixerit; & summa injuria sæpe damni relictæ culpam in Chirurgum, non in percussorem, conjiciunt. Ubi ergo arteria, parti cuidam sola prospiciens, diffecta est, atrophiam partis post curationem prædicimus futuram; si nervus major ad partem tendens per vulnus destructus sit, insensibilitatem, immobilitatem sæpe, præfigimus &c. si vulnus non possit curari, nisi post diuturnam & validam suppurationem (uti v. g. dum ossis læsi partes separari sensum debent) consumto sic panniculo adiposo, profundam & turpem futuram esse cicatricem præmonemus &c.

§. 170. **M**ors inevitabilis a vulnere ex quinque effectis sequitur, adeoque necessario Lethalia vulnera ( 151. ) Hæc sunt.

Enumerantur hæc paragrapho illa vulnera, quæ inevitabili necessitate, nulla arte hæcenus cognita superanda, tollunt illam corporis conditionem, quæ omnino requiritur, ut commercium mutuum inter mentem & corpus duret quodammodo, aut queat restitui utcumque, nec necesse sit id omnino tolli ( *Herm. Boerhaave Inslitut. Medic. §. 42.* ) : sed ex Physiologicis constat, absolute hæc requiri actionem musculosam cordis sanguinis in cor receptionem, & recepti ex corde expulsionem. Hinc numero 1. recensentur illa vulnera, quæ influxum liquidi nervosi, ad cordis actionem musculosam requisiti, tollunt; 2. numero illa, quæ diffusis cordis cavis impediunt, quo minus sanguis corde contineri possit; 3. numero enumerantur illa vulnera, quæ efficiunt ut patulis vasculis vulneratis effluens sanguis non redeat ad cor. Cum autem in homine nato

cor dextrum non possit evacuare sanguinem suo cavo contentum nisi per pulmonem, & ad hoc requiratur ejus dilatatio per respirationem, ideo numero 4. recensentur illa vulnera, quæ respirationem integre tollunt. Tandem cum inevitabili vitæ & sanitatis effectu, & ex humoribus, & de solidis partibus plurima pereant quotidie, requiritur ad constantiam vitæ, ut tot & talia in humoribus & solidis restituantur perpetuo, quot & qualia per ipsius vitæ actualitatem perduntur. Horum autem omnium iactura restituitur ex ingestis alimentis, per actiones naturales ( vide §. r. ) in substantiam similem nostris partibus solidis & fluidis mutatis. Numero 5. ergo recensentur illa vulnera, quæ integritatem partium, ad hoc opus absolute requisitarum, tollunt.

Ad hæc autem quinque capita reduci possunt omnia vulnera absolute lethalia.

1. Quæ influxum nervosi liquidi a Cerebello in Cor interceptant. a. Cerebelli vulnera, & Cerebri, profunda adeo, ut medullam oblongatam lædant multum. ß. vasa sanguifera intra cranium soluta cum effuso cruore, quo pressione, vel concepta putredine vitam tollit, nec terebra levare potest ob conditionem loci, ut interiora orbitæ Oculi, & ossis Temporum, ossis Ethmoidis, basios cranii &c. 7. Medullæ Spinalis superioris profunda vulnera. ß. tum ea, quæ nervos cardiacos dissecant.

a. Cordis actio, cum verus sit musculus, illa omnia requirit, quæ & in aliis musculis corporis necessario adesse debere per experimenta novimus. Sed spirituum influxum per nervos in musculum requiri ad actionem ejus constat certis experimentis; idem ergo & in corde obtrinebit. Præterea novimus ex Observatis Medicis, quod ubi, a causis violentis externis effuso sanguine intra cranium, comprimitur rota cerebri moles, omnes sensus, & omnes motus, a voluntatis arbitrio pendentes, perfecte aboliantur: cordis tamen actio in initio talis mali insurgit potius, ut docet pulsus robur & celeritas in Apoplecticis. Sed ex Anatomicis notum est, cerebellum nullissime defendi, cerebro subjacens, & rectum expanso illo duræ matris velo, non tam facile posse comprimi ab effusis humoribus, quam ipsum cerebrum; Ubi autem eadem illa causa perennes vel auctæ incipiunt ipsum cerebellum comprimere, ( quod solidioris fabricæ cum sit, ideo etiam

iam magis resistit causis comprimentibus ) tunc cordis actio cessat, & vita perit. Unde novimus, cerebellum per nervos dare spiritus requisitos ad motum muscularem cordis. Vulnera ergo, ipsum cerebellum insigniter lædantia, vel & penitus destruentia, merito pro lethaliibus habentur.

Experimenta in vivis animalibus capta hanc rem confirmant. Cani majori cerebrium tessellatim dissecabatur fere per integram horam; moriebat ut ipso momento, dum lædebat cerebellum ( *Perault Méthode des Animaux partie 2. c. 7. p. 407.* ) : *Duo capite canis per superiora aperto, cerebellum infusa secatur, & e calvaria eximitur, illico fere moritur canis, etiam si cerebrum & medulla oblongata caudæ iniquitatem lædantur* ( *Raymoudi Vieussens neurographia universalis Lib. 1. c. 20. p. 127.* ). In castellis junioribus quibus calvaria adhuc mollior, & suturæ hifcentes; per futuram sagittalem adigendo cultellum in cerebellum idem experimentum tentavit Bohnius.

Bohnius, viditque eosdem, post leviores partium externarum concussiones, expirasse; remota vero calvaria apparuit, in uno totam fere illius compagem perforasse, in altero ad medullasum eius nucleum tantum penetrasse instrumentum (*D. Johannis Bohnius de renunciatione vulnerum &c. pag. 169.*).

Nec obstat vulnere cerebelli lethali-tati, quod in recens natis carellis, capite deruncato, cordis motum, systole & dia-stole rite alternantibus, plurimis horis integrum perstitisse videt Wepferus (*Cicu-tæ Aquaticæ Historia & mox pag. 91.*). Agitur enim hic de durabili vitæ actione, non de mira illa cordis proprietate, qua etiam corpore exemptum motum suum continuar post mortem ipsam, uti dictum §. 1. Magnus enim ille Vir ex his experimen-tis minime deducere voluit aliquam con-clusionem, quæ repugnaret prioribus obser-vatis; uti ipse eodem loco testatur.

Cum autem ex Anatomicis constet, ex cerebello nullum derivari nervum, sed to-tam cerebelli substantiam medullarem col-lectam abire in medullam oblongatam; ex qua postea nervi prodeunt; satis patet, hujus oblongatæ medullæ insignes læsiones mortem certo effectu producere. Si jam si-mul consideretur, ipsum cerebellum, & me-dullam oblongatam, tam tuto recondi, ut vulnerari nequeant sine insigni læsione ce-rebri ipsius, magnorum vasorum, musculo-rum &c. magis adhuc patebit horum vul-nere lethalias.

Cerebri autem ipsius vulnera, quamvis maxima fuerint, non semper lethalia esse, docent observata plurima; de quibus postea dicetur in vulneribus capitis.

§. Dum vasa sanguifera: arteriosa, vel & venosa majora, a quacunque causa rum-puntur, effundunt concrementum sanguinem, uti & illum qui continuo vi cordis per hæc vasa integra fluxisset: sed cranii cla-rum os codere nequit, & naturaliter encephalon totum calvariæ cavum exactissime replet; ideo sanguis effusus debet necessa-rio comprimere omnia illa, quæ calvariæ cavo continentur: unde statim ab effusis intra cranium humoribus cerebri func-tiones incipiunt aboleri; & postea, eadem causa pergente, & cerebellum, & oblonga-ta medulla comprimuntur, & vita inde pendens tollitur. Si jam effusus vasis fra-ctus sanguis non fuerit tanta copia, ut com-

pressionem tollere possit cerebri, & cerebel-li, & medullæ oblongatæ actionem, pore-rit tamen nocere alio modo. Humores enim corporis humani, extra vasa sua effusi, spontanea degeneratione corrumpuntur; tar-dius quidem, ubi omnis aëri accessus de-negatur, sed tandem tamen etiam putre-scunt, acres fiunt, tenebrimam encephali fabricam rodendo, inflammando, suppuran-do destruant & consumunt. Unde tot Exem-pla apud Observatores habentur, quæ probant, vulnera & contusiones capitis, quæ vix ullius momenti habebantur, post lon-gum satis temporis intervallum, subito mortem induxisse. In cadaveribus apparebat copia ichorose vel purulentæ materiæ, & sæpe notabilis consumtio encephali inde fa-cta. Exempla hujus videri possunt apud Bonetum (*Sepulchret. five Anatom. practice. Tom. III. pag. 318. 319. 320. &c.*).

Præcipua ergo in talibus casibus curæ spes ponitur in percrebratione cranii, ut liber exirus concilietur effusis humoribus. Sed si talis sit loci vulnerati conditio, ut hanc operationem non admittat, mors sequetur inevitabilis; talia autem loca sunt imprimis sequentia.

INFERIORA ORBITÆ OCULI. Illa nempe pars orbitæ oculi, quæ calvariæ fundi ma-ximam partem constituit, & quæ inferio-rem situm habet, si spectetur calvaria, sed orbitæ oculi lacunar superius facit. Hæc enim orbitæ pars ab ossis frontis lamella fit, quæ in plurimis locis adeo tenuis est, ut in mundaris calvaris pelluceat; & ne-quidem unguis crassitiem habeat. Hæc au-tem lamella, cuius cerebri. anteriores lobi incumbunt, & satis magna vasa sanguife-ra, ob tenuitatem summam levi vulnere facile perforatur, effusus sanguis sub cere-bro in ipsa basi calvariæ hæret, hinc te-terra educi nequit. Unde apparet, quam periculosa sint vulnera huic parti infligia. Vulnerabatur homo baculi extremo non ad-modum acuto in oculi sinistri orbita: il-lis, qui curationi præerant, videbatur exigui momenti vulnus: brevi tamen postea periit vulneratus. Publica auctoritate dum inqu-irebatur mortis causa, cranio ferra diviso, ap-paruit vulnus sat profunde penetrasse ipsum cerebrum (*Friderici Ruyschii Observ. Ana-tom. Chirurg. Centuria. Observatione 54.*).

OSsis TEMPORUM: Foveæ in calvaris mandatis apparentes, arteriarum duræ matris pulsa



pulsu excavatz, demonstrant, circa tempora fatis notabiles arterias decurrere: His ergo lætis, sanguis effusus declivi via versus basim calvariz tendet: & ob musculos ingentes temporales hic positos, non datur terebrationi locus; omnia ergo illa mala metuenda, quæ ab effusis humoribus compressione vel corruptione nocentibus, expectanda sunt.

**Ossis ethmoidis.** Forte primo aspectu videretur, adeo tuto recitandum hoc os, non facile lædi posse; sed si reclinato versus posteriora capite gladius acutus per nares sursum adigatur, poterit eo usque facile penetrare. Præterea si laterali orbitæ oculi parti versus nasum infligatur vulnus, poterit levi vi lamellam illam ossis ethmoidis, quæ orbitæ oculi partem constituit, & os planum dicitur, perforare, & sic in calvariz cavum pergere. Talem casum habet Bonetus (*Sepulchret. sive Anatom. practi. Tom. III. pag. 317.*) ubi Juris Studiosus infra orbitam sinistri oculi ense punctum vulneratus fuit, & post 24. horas apoplecticus mortuus est. Aperto cadavere apparuit, vulnus per orbitam oculi & os ethmoides prope cristam galli penetrasse in dextrum cerebri ventriculum: basim cerebri, & cerebelli regio, copioso sanguine extravasato repleta erat. Apparet facile, nullam superesse in tali casu medelam.

Reliqua autem, quæ basim cranii penetrant, vulnera ob easdem rationes inevitabili effectu mortem adferunt.

γ. Postquam ex medulla oblongata novem paria nervorum intra cranium secesserunt, omnis reliqua medulla cerebri & cerebelli simul collecta in unum caudicem, vertebrarum theca tuto defensa, porrigitur ad os sacrum usque. Ex hac medulla spinali omnia capiti subiecta membra, & plurima viscera, pro magna parte suos nervos accipiunt: si ergo in superiori loco spinalis medulla vulnere satis profundo lædatur, destruitur medullaris ejus substantia, & omnis actio cerebri & cerebelli in subiectas partes tollitur; quatenus nempe ab harum fibrarum medullarum integritate pendet. Par enim octavum, vagum dictum, & nervus intercostalis, altiori loco ex ipsa medulla oblongata intra cranii cavum orta, plurimis visceribus vitalibus proficiunt. Hinc a tali vulnere non quidem in instanti mors sequitur, tamen tales vulnerati omnes pereunt majorem vel minorem

temporis intervallo, prout vel profundius læta fuerit medulla, vel altiori in loco. Ratio facile patet: tota enim cerebri & cerebelli moles sua fabrica a sanguine arterioso secernit subtilissimum illud liquidum, quod dein secretum per medullares fibras, & nervos his fibris collectis constantes, deferitur ad omnia & singula corporis loca. Dum igitur, manente eadem copia liquidi allati ad organum secernens illasum, destruitur tantus numerus canalium, qui secretum liquidum continere & deferre debebant ad loca debita, sequitur debere turbari, & tandem destrui functionem ipsius organi secernentis. Accedit, simul & lædi plerumque magna satis vasa sanguinea; unde effusi humores facile in cranii cavum reascendant, impleta prius vertebrarum theca. Lethalem autem talium vulnorum eventum docuerunt Observata Medica.

Rusticus ex arbore decidit, cervicis vertebra secundam prope atlantem luxatam habuit (ut postea in cadavere apparuit) hoc modo per quamplurimos dies vixit, dein mortuus. Alii tamen in simili casu brevi temporis spatio mortui fuerunt (*Boneti. Sepulchret. sive Anatom. practi. Tom. III. pag. 427.*).

Sennertus (*Tom. III. Lib. V. part. 4. cap. 3. pag. 371. Galen. de Hippocr. & Platon. placitis Lib. II. cap. 4. in fine. Tom. V. pag. 97.*) dicit, se novissime lanium quendam, qui boves mactatus, eos non securi, quod vulgo fieri solet, percussit, sed exiguum cultellum eo in loco, quo caput vertebris colli conjungitur, in spinalem medullam adigebat; unde bos attonitus quasi statim concidebat. Inde jam Galenus notat, quod tauri, quibus spinalis medullæ origo juxta primam vertebra quotidie disseccatur, statim procumbant, pereuntes simul cum sectione & respiratione, & voce.

In junioribus canibus simile experimentum institutum parem successum habuit.

Hippocrates (*De morbis Lib. I. Tom. VII. pag. 532.*) spinalis medullæ vulnera lethalia pronuntiavit. Et alibi (*Proorrhætic. Lib. II. cap. 11. Tom. VIII. pag. 819.*) dicit: medulla spinæ si agrotaverit, sive ex lapsu, sive ex alia aliqua causa, sive sponte; homo & crucibus impotens fit, ut neque si tangatur, percipiat, neque ventre aut vesica circa prima tempora sterius vel urinum egerat, nisi coctus. Quem autem vetustior salus fuit

*morbus, non urgente homine & stercus prodit, & urina. Moritur autem post hac non multo tempore interposito.* In hoc autem loco patet, quod agatur de lésione medullæ spinalis in loco inferiori, & tamen mortem inde futuram præfagit. Summum etiam tunc periculum adeffe probant bina Exempla recentia in illis, quæ dicta sunt ad finem §. 162. Quosdam tamen evasisse, vel saltem miseriam vitam diu protraxisse in simili casu, ubi circa vertebrae lumborum luxatio facta medullam compresserat, docet Hildanus (*Observat. Chirurg. cent. V. pag. 458. 459.*) binis Exemplis. In uno casu abcessu facto & ulcere fistuloso relicto, symptomata remiserant plurima, sic ut alvum & urinam postea continere potuerit, sed ab umbilico omnia inferiora sensu omni & motu erant privata; & sicque per annos aliquot vixit. Qualis autem tandem fuerit exitus, sibi non constituisse affirmat Hildanus. In altero casu secunda vertebra lumborum intropulsa erat, cum paralyti inferiorum, & resolutione sphincterum ani & vesicæ. Juvenis cum esset, & optimo corporis habitu præditus, post annum sensus rediit, & aliquis motus, qualis autem fuerit eventus tandem, non notat auctor.

Ex notabili autem lésione medullæ spinalis superioris evasisse aliquem, quantum novi, non constat ullis observatis.

§. Per nervos cardiacos enim defertur tenuissimum illud fluidum, cerebelli fabrica separatum, a purissimo sanguine arterioso, quod requiritur ad motum muscularem

Cor in Pericardio hæret liberum, nulli parti nexum, nisi vasis, quæ cor ingreditur, vel ex corde exeunt. Omnia jam hæc vasa, quibus cor necitur, in Pericardio libera sunt, mobilia, nulli parti vicinæ accretæ. Nervi ergo qui cordis substantiam ingreditur, debent una cum vasis, quibus cor necitur, ad cor deferri. Cor enim nulli alteri parti in Pericardio coheret. Hinc nervi ad cor pertingentes non hærent liberi, uti ex tabulis Anatomicis quis credere posset; sed applicati nudent venis, quæ cordis cavis sanguinem immittunt, & arteriis, quæ sanguinem cordis cavis expulsum excipiunt. Ex qua nervorum ad cor tendentium mirabili positura in Physiologicis explicatur cordis systole & diastole, dum eadem causa, quæ motum cordis facit, momento post motum factum destruit necessitate fabricæ:

unde uno momento vitæ cor salmideo quasi spasmò contrahitur, momento sequenti perfecte paralyticum fit.

Patet hinc, nervos cardiacos in cordis vicinia non posse lædi per vulnera, quin simul lædatur maximorum vasorum integritas circa cor; tuncque mors vulnus tale sequeretur inevitabilis ex lésione horum vasorum. Hic autem consideratur sola lésio nervorum cordis. Sed Anatomica observationes docuerunt, omnes nervos, qui ad cor perveniunt, ortum ducere a pari octavo, nervis intercostalibus, vel & nervis recurrentibus. Sed nervorum horum trunci possunt in suo decursu lædi, sicque aboleri horum nervorum effectus, quem cordi præstant.

Willisius (*Cerebri Anatome pag. 324.*) cani vivo, circa jugulum cute discissa, utriusque parvis vagi trunco ligaturam injectis strictissimam: mox torpuit anima, & obmutuit; & circa hypochondria motus convulsivus cum magno tremore passum est. Hoc affectu postea brevi cessante, quasi moribundum jacuit, alimenta respiciens: vixit tamen, iisdem nervis penitus discussis, postea per plures dies, donec inedia fere exsingeretur.

Cadavere tamen aperto, sanguis intra cordis ventriculos, & vasa majora coagulatus admodum in grumos concreverat. Sed per inediam necatis animalibus talia sanguinis coagula non inveniuntur. Causam vitæ tandiu adhuc protraxit Willisius ipse a ramulis nervi recurrentis & intercostalis ad cor tendentibus deduxit.

Idem Experimentum & Lowerus sumit, & observavit, statim cor palpitare & contremiscere: atque sic per diem unum aut alterum miserum animal, corde tremulo, peccore admodum suspensio, languidam vitam protrahit, & tandem expirat. Tantam autem angustiam patitur animal, ut coerceri nequeat, nisi firmis vinctulis cohibeatur (*Lowerus de corde pag. 90. 91.*). Bohnius tamen affirmat, animal, quod huic martyrio philosophico exponere, fulmine quasi factum a contractis funiculis expirasse (*Jam. Bohnius circulus Anatomico-Physiologicus &c. pag. 96.*). Nervis parvis octavi, una cum nervis par intercostale constitutis, circa cervicem ex transverso recisus, animal illico languore futuræ mortis præannuncio, afficitur, tremulos motus patitur, vices illius sensum labascunt; & intra viginti circiter horas

vita

vita delituitur (*Viesiens Neurographia* pag. 170. ). Idem experimentum feci in cane, ligans in utroque colli latere par oclavum & intercostale: nullum edebat amplius ejulatum, sed summo nixu aliquid sonori edebat faris obscuri: per intervalla temporis immani furore & anxierate corripiebatur, omnia obvia mordens sumpta cum ferocia. Antequam autem talis insultus accideret, prius incipiebat nasi apex miro modo corrugari. A sexta vespertina ad undecimam noctis horam sic vixit; sequenti mane jam inventi mortuum.

Ex omnibus his patet, nervis cardiacis in animali vivo dissecis, mortem securam fuisse citius vel serius, & animal statim quasi agone mortis laborasse; qui sit a corde non amplius valente expellere contentum suis cavis sanguinem. Sed observamus in morbis aliquando per bidduum & ultra homines in tali agonia hærere, sanguine non potente transpirari per arterias obstruatas. Idem videtur etiam contigisse in his animalibus, quæ, nervis his ligatis vel dissecis, diutius vitam protraxerunt. Forte etiam alii nervuli per cordis substantiam distribu-

ti adhuc vitalem motum tam diu sustinebant: sic inventus fuit ramus nervi notabilis ex plexu gangliiformi semilunari Vieusensii ortus, prope magnum plexum mesentericum, ex abdomine in pectus ascendens, & auriculæ dextræ & cordis basi insertus (*Acad. des Sciences Par. 1734. Hist. pag. 60.*). An insita cordi mirabilis proprietas, qua etiam relictum ab omnibus vasis valet motum suum continuare, potuit adhuc producere vitam destructis nervis cardiacis? de hac autem cordis irritabilitate dictum §. 1.

Sic per experimenta apparuit, quid fiat in brutis a dissecis nervis cardiacis. In hominibus autem rarissime contingit, truncos octavi paræ aut intercostalium nervorum lædi, quin simul tollatur integritas vasorum adjacentium; quorum læsio sola mortem inferre potest. Carotidum enim trunci, & jugulares magnæ venæ incumbunt in collo his nervis; & posterius laterales vertebrarum processus cavent ne facile lædantur. Nec memini, me apud observatores Medicos aut Chirurgicos legisse exemplum ullum, quod doceret nervos cardiacos solos læsos fuisse.

2. Quæ sanguinem Cordis effundunt ex ejus cavis vulneratis: unde vulnera Cordis profunda, in cava penetrantia, lethalia.

Cum cor sit musculus semper motus, cuius omnes partes sic conspirant, sic uniantur, ut una alterius officio carere nequeat, & sit fons vitæ, unde dimanant omnia; veteres Græci, & Arabum plurimi, dixerunt, quod vulnera cordis sine certo & cito lethalia. Sed videntur hæc dixisse potius ex hypothesi, quam ex rerum experimentis.

Mirabilia quædam habentur apud Autores Exempla, quæ, si vera forent, probarent sine corde vixisse animalia. Cæsari Diatatori, quo die primum veste purpurea processit, atque in sella aurea sedit, sacrificanti bis in extis defuit cor (*C. Plinii Secundi Lib. XI. cap. 37. pag. 284.*). Cæsari immolanti cor hostiæ non apparuisse, idque pro retro o silentio habitum, neque enim consistere naturaliter animal sine corde posse, nartat Plutarchus (*In vita Cæsaris pag. 737.*). Idem & Suetonius (*cap. 77.*) in vita Cæsaris habet. Sed Haruspices audacter imponebant sæpe credulis, ut pro lubitu de rebus gerendis decernerent. Hinc suspecte admodum fidei hæc testimonio sunt, cum adeo repugnet cognitæ animalium Oeconomia.

Vix enim credibile videtur, cor unquam in homine, vel aliis animalibus, defuisse; sed incautos decipere potuit, situs, figuræ, magnitudinis &c. cordis adeo insignis varietas, aliquando per morbos inducta: uti in observatis Medicis habetur.

Celeberrimo tamen horum Aphorismorum Auctori communicata fuit vigeſimo hujus sæculi anno mirabilis observatio a Clarissimo Anatomico Edinburgenſi, quæ docet, posse existere monstra in rerum natura, quæ omnem scientiam usus partium turbant. Inquirebat Eximius ille Vir vasa seminalia in forice majore vivo & agilissimo; apparebat ren dexter duplex, sed aperta capsula tegente, apparuit verus ren dexter: alterum illud, quod remem simulabat, corpus, proprio fasculo inclusum, habebat talem magnitudinem & figuram, qualem cor in hoc animali habere solet, basi sua corporis superiora, apice autem inferiora speciebat. Cor hoc omni cura examinatum habebat duos ventriculos, septo medio separatos, & auriculam sinistram; aderant valvulæ cordis & columnæ carnes; de catæro nullum auriculæ dextræ, nec venæ cavæ,

M nec

Tom. I.

nec pulmonarium venarum vel arteriarum, aut aortæ vestigium. Aperto thorace, nec pericardium, nec cor invenitur; sed ex ipsis thoricis verberis, loco inter binos pulmones medio, emergebat auricula dextræ: ex hac exibant arteriæ pulmonales. Vasa, quæ sanguinem reducant a pulmone, uniebantur in unum truncum, qui erat aorta; quæ deinde distribuebatur solito more. Hoc animal adultum erat, reliqua viscera bene formata habebat; cor quidem aderat, sed aberrans & inutile, instructum tamen solitis partibus. Sine actione cordis ergo animal vegetum & agilissimum vixit.

Corde exsecto, animalia quædam vixisse adhuc aliquo tempore, resantur satis fideliter observata. In sacrificiis corde ex animalibus evulso, & iam aris imposito, respirant, clamant fortiter, imo aufugiant; donec sanguinis profluvio moriantur. (*Galen. de Hippocr. & Platon. placitis Lib. II. Cap. 4. in fine. Tom. V. pag. 97.*) Thorace vivi animalis aperto, vinculo cordis basi circumjecto constringebantur omnia cordis vasa; dein sub vinculo cor totum rescindebatur celerime; solutus dein laqueis, quibus animal colligatum erat, vidit Vesalius canes, sed præcipue feles, aliquo usque cucurrisse (*Vesal. pag. 570.*). In catulis vivæ canis atero exsectis, abscisso corde, vita supererat per quadrantem horæ, cum motu sensibili membrorum; & quadam adhuc sibilantis vagitus specie. Ex Zoologia porro constat, vermes, & animalia, quæ ad hoc genus proxime referuntur, corde exsecto, vixisse diutissime: imo & talibus animalibus in partes dissectis, singula segmenta per notabile temporis spatium vitam continuant. Sed ex Malpighii & Leeuwenhoekii observationibus constat, animalia in prima origine sua vermis vitam vixisse: hinc forte in animalibus, quamdiu in utero hærent, aliquid de antiqua illa vitæ tenacitate superest. Rana, corde exsecto, saltabat, aquæ injecta natabat; imo summa agilitate exiliens de vasculo aqua pleno per conclave saltare pergebat per horæ spatium, & amplius (*Boyle de utilitate Philosophiæ Experimentalis pag. 113.*).

Homini vivo cor exscindebatur a carnifice: dumque illud jam carnifex manu teneret, iria aut quatuor precum verba auditus est proferre: (*Vernham. Histor. vitæ & mortis pag. 559.*) sed monet ibidem

magnus vir, amicos rei carnifici mercedem dare, ut subtilissime hæc peragat, & miserum ab his cruciatibus liberet. Hinc non adeo mirum videtur, quod dum frigus insolitum vasa discissa parum stringeret, & ultimis illis vitæ momentis intensissima esset dispositio omnium organorum animalium, aliqua adhuc pressio sanguinis per pauca momenta in cerebrum egerit, per quam in sic dispositis organis ultimo illo nixu perrexerit loquela per tantillum temporis spatium: si simul consideretur, pulmones, aperto thorace collapsos, & insolito frigore aeris undique contractos, contentum aerem expulisse satis valida vi. Non viderur ergo hoc experimentum adeo repugnare cordis necessitati. In experimento autem Vesaliano ligatis omnibus vasis, arteriæ contractiles, elasticitate per frigus admissum aucta, poterant sanguinem per cerebrum, cerebellum &c. pellere, & hinc vitam diutius continuare.

Illæ autem experimenta, in ranis capta, uti & plurima similia in viperis, testudine &c. quæ docent, hæc animalia corde exempto satis diu vivere posse, demonstrant, modum vivendi in animalibus non posse adeo generalibus regulis limitari; sed illud varium esse in diversis, sic ut non facile sit historiam vitæ generalem condere; sed possumus tantum notare experimenta.

Nullis autem cæris observatis constitit, cor unquam in homine defecisse; vel cordis fabrica penitus destructa, notabili tempore supervixisse hominem. Unde satis patet ratio, quare cordis vulnera majoris momenti merito ut lethalia considerari mereantur. Non omnia tamen vulnera cordis lethalia esse, & differre plurimum inter se, prout variis cordis partibus infliguntur, certum est.

Si enim per vulnus arteriæ vel venæ coronariæ truncus in basi cordis discissus fuerit, mors videtur inevitabilis, & cito quidem secutura; quia imperi omnium maximo aortæ contractione validissima sanguis per arteriam coronariam per cordi substantiam musculosam transpiratur, per venas citissime rediens; singulis enim cordis contractionibus totum cor pallet, expresso omni sanguine, momento post, dum cor est in diastole, tota cordis substantia repletur in omnibus vasis.

Si vero vulnus dextrum ventriculum cordis in cavum usque penetraverit, effundetur san-

sanguis partim ex lēsis vasis ipsius substantiæ cordis, partim ex ipso cordis cavo in pericardium; & ex pericardio in thoracis cavum, vel exibat de vulnere externo. Vulnerus illud dilatabitur, dum cor impletur: illo enim tempore, quo cor constringitur, partes vulneratæ ad se mutuo accedunt potius, nec fiet hoc tempore magna sanguinis effusio. Iuterim, effusio sanguine, debilitabuntur vires, supersite tamen adhuc cordis actione, & manente vita. Sed dum adest summa debilitas, cor sere quiescit; si tunc simul nullus fiat motus muscularis, sanguis venosus sedatissimus motu & minima copia influet. Si tunc simul ablineatur ab illis, quæ copia sanguinis per nutritionem subito augment, & omnia cardiaca dicta, quæ semper motum suis stimulis augent, evitentur sedulo, videtur tunc vita posse servari, & sanitas restitui. Nisi enim in vulneratis, & in abortum passis sæminis, exempla docuissent practica, nemo crederet, quam parca copia, & parvo motu sanguinis, homo posset vivere. Sic enim per validam hæmorrhagiam minutam quam maxime sanguinis copia, & projectis viribus, vulnus factum vix amplius dilatatur, incipiunt nasci concretiones rudimenta, & paulatim perfici; modo caveatur, ne aucta copia vel motu sanguinis, disrumpantur illa, quæ jam inceperant concretescere.

Præterea in vulneribus cordis dextri hoc notandum, quod pulmo pergat agere, & sua dilatatione facillimam viam paret sanguini ex corde dextro pellenso. Hinc systoles tempore ob liberum per pulmones iter, non exprimeretur tanta copia sanguinis per vulnus factum. Ideo major adhuc vulneris consolidationi nascitur opportunitas.

Cordis vero sinistri vulnera longe adhuc videntur esse periculosiora. Si enim ventriculus sinister cordis læsus fuerit, nec tamen integre perforosus, vulnus illud dilacerari debet necessario, dum cor sinistrum validissima vi musculari, qua dextram cor tantum superat, contentum sanguinem premit in aortam adeo resistentem, illamque & omnes eius ramos per universum corpus dilatat. Fibræ enim cordis sinistri tunc supra contentum sanguinem & resistentem distrahuntur, hinc vulnus augebitur, donec in cavum cordis penetrans viam faciat sanguini huc facilius exeunti, quam per aortam resistentem; vel si aliqua consolidatio

hic fieri incipiat, summus metus est, ne locus ille debiliior in aneurismatico tumorem extendatur, sicque turbetur cordis actio; & vita quidem contrahatur, sed non nisi cum summis ætumnis, morte sola terminandis.

Si vero cor sinistrum patulo vulnere in cavum penetrante perforetur, mors cita accerta sequetur. Omnium autem subitissimè lethale videtur fore tale vulnus, quod aortæ ipsius principium immediate supra valvulas discinderet. Corde autem sinistro perfosso, valvulæ aortæ sustinent sanguinem in arteriis contentum; hinc totum systema arteriosum plenum manet, arteriæ deinde contractæ sanguinem promovent; sicque vita aliquo tempore adhuc sustineri posset.

Observationes quoque Medicæ docuerunt post vulnera cordis sæpe adhuc notabili tempore vixisse homines; imprimis corde dextro solo perfosso. Imo quædam observata docuerunt, possibilem esse consolidationem vulnerum cordis.

Juvenis amicum cultro transfixit inter tertiam & quartam costam sinistram: vulneratus ex suburbio domum pedibus ivit, & per quinque dies supervixit. Aperto cadavere apparuit, vulnus sub sterno cordis ventriculorum dextrum penetrasse foraminis angusto & obliquo (*Thom. Barbol. Hist. Anatom. rarior. Centur. 1. Hist. 77.*).

Ingolfstadii studiosus, a typographo punctum læsum in sinistra parte thoracis, plateæ satis longæ spatium in cursu confecit; mente porro & sensibus integerrimis ferme per horam integram ita constitit, ut loqui & Deo se commendare potuerit. Aperto cadavere Medici Professores omnes, & alii spectatores viderunt, vulnus ipsam cordis substantiam, & utrumque eius ventriculorum transversim penetrasse, sic ut instrumenti vulnerantis genus ex vulneris forma dignoscere & in iudicio explicare potuerint (*Schenckii Observ. Medic. rarior. pag. 275.*).

Nobilis vir in singulari certamine sub mamma sinistra vulneratus gladio: post vulnus acceptum pergit pugnare, fugientem hostem per ducentos passus prosequitur, tandemque mortuus procidit. In cadavere invenitur vulnus cordis substantiam penetrans, quod digitum caperet, & magna copia sanguinis effusi Diaphragmati incumbens (*Patient Lib. X. cap. 32.*).

Serenissimus Danicæ Rex in venatu coram  
M. 2. vum

vum sclopeto trajecit: accepto vulnere, animal quinquaginta passus conficit, antequam cecideret. Cor a venatoribus extrahit lustrans Regius Archiater, tunc præsens, invenit per utrumque ventriculorum ponderoso globulo tractatum, sic ut vulnus trium digitorum apices admitteret (*Thom. Bartol. Hist. An. tom. rarior. Centur. 1. Hist. 77.*).

In cadavere hominis, olim thoracem vulnerati, vidit Chirurgus cicatricem vulneris cono cordis inflicti (*Ad. Lipsienf. Ann. 1705. pag. 287. ex Celebrissimi Chirurgi Wolsfi Observatione posthuma 21.*).

In apris, canibus, cervis in venatu & do-

3. Quæ cruorem a corde, & a cerebro, cerebelloque derivant vel in cava corporis, vel extra illud, neque medellam capere possunt ob situm loci. Ut magna vulnera Pulmonis, Hepatis, Lienis, Renum, Pancreatis, Mesenterii, Stomachi, Intestinelorum, Uteri in gravidis, Vesicæ circa arterias ejus majores, Aortæ, Carotidum, Vertebraliū & similia arteriarum, venarumque.

Prioribus numeris hujus paragraphi demonstratum fuit, vulnera illa lethalia esse, quæ cerebelli fabricam destruunt, vel latis medalla oblongata, & ipsa necesse spinali in loco altiori, aut ipsi nervi cardiaci, impediunt, quo minus vitalis influxus spirituum, fabrica cerebelli a sanguine secretorum, in cor & alias corporis partes perficiat illa quæ ad vitam requiruntur. Sed ut per cerebelli fabricam separentur illi spiritus vitales, requiritur, ut sanguis cordis vi musculari pellatur in arterias; hinc & vulnera profunda, cordis cava penetrantia, lethalia iudicantur. Tota autem cordis actio consistit in eo, ut sanguinem per venas advectum recipiat, receptum autem propellat in arterias: omnia ergo vulnera, quæ sic lædunt vasa, quæ sanguinem ad cor deducunt, vel & illa, quæ sanguinem corde expulsum recipiunt, ut sanguis per apertum vulnus extra corpus fluat, vel in cavis corporis accumulatur extravasatus, neque redeat iterum ad cor, impediunt, quo minus sanguis debita copia & impetu requisito prematur per arterias encephali; unde necessario omnes functiones cerebri & cerebelli turbantur, & tandem penitus abolentur. Nec refert, an vasa lædantur in suo decursu, antequam per viscera dispergantur, quorum fabricam constituunt: an vero in ipsis visceribus lædantur simili cum effectu, nempe sanguinis vitalis effusione tam notabili, quæ lædat cordis & cerebelli actionem. Non omnia ergo viscerum & vasorum vulne-

mentis observationibus inventa fuerint cicatrices vulnorum cordis sanavorum, & glandes plumbeæ diu ibi relictæ. Plurima talia habentur observata, quorum collectionem vide (*Miscell. Cur. decur. 2. An. 6. pag. 166. &c.*).

Ex omnibus his concludere licet, vulnera cordis esse semper periculosissima; tamen non semper subito, nec certo lethalia. Simul paret, nequidem in periculosis vulneribus semper desperandum esse, sæpe enim dum vita debilissima sustinetur tantum, possunt fieri consolidaiones vulnorum, de quibus nullus cogitasset, quod possibiles forent.

ra, quæ hac paragrapho recensentur, absolute lethalia sunt, nisi sub hac limitatione. Præterea requiritur, ut talis vulneris facti sit conditio, ut ligatura, nec aliis artis auxiliis, non possit impediri sanguinis effluxus. Inter hæc vulnera primo recensentur

MAGNA VULNERA PULMONIS. Omnem sanguinem totius corporis per venas allatum cor dextrum accipit, illumque propellit per pulmonera in cor sinistrum: dum ergo lato vulnere lædatur pulmo, sanguis, vicini adeo cordis vi pressus, exibat per vasa discissa; hinc non rediit ad cor sinistrum, sed per vulnus factum effluit; vel in aerium cavum pulmonis transiens undatim eructabitur; vel tandem effusus in pectoris cavum, pulmonis liberam expansionem impedit. Apparet hinc facile lethalis talium vulnorum effectus.

Observata iam Medica funestum eventum vulnorum pulmonis evincunt. Charrææ glande sclopeto expulsa trajectum pectus fuerat, cum pulmonis fissuri ejusque vasorum insigni dilaceratione: intra novêmeron cum insigni hæmorrhagia, spirandi difficultate &c. obiit percussus (*Bohnius de renunciatione vulnorum p. 222.*). Eodem in loco & bina alia habentur exempla, quæ hoc confirmant. Habentur quidem & observata apud Auctores, quæ pulmonis vulnera sanata fuisse docent, sed vel fuerunt leviora, vel talia ad quæ manus Chirurgi pertingere potuit. Sic apud Hildanum habetur (*Centur. 2. Obs. 32.*) quod pulmonis pars, per vul-

nus pectoris inflictum erumpens, ferro candenti instrumentum fuerit abscissa, & æger postea integre sanatus fuerit. Aliud satis mirabile exemplum habet ( *Centur. 1. Observ. 46.* ), ubi post vulnus thoraci inflictum difficultas anhelitus maxima, sanguinis cum tussi rejectio &c. docebant pulmonem vulneratum esse, tamen evaserit æger, & post tres menses a curato vulnere tussiendo una cum pure turundam, Chirurgi imprudentia in cavum pectoris delapsam, rejecerit; & tandem evaserit. Si ergo post vulnus pectoris æger moriatur, & aperto cadavere pulmo læsus appareat, merito iudicibus renunciatur, tale vulnus mortis fuisse causam, licet quædam pulmonis vulnera sanata fuerint aliquando. Imo in levioribus etiam pulmonis vulneribus metus est, ne talia vulnera degenerent in ulcera pulmonis, quæ postea lenta tabe consumunt vulneratum. Tale exemplum habetur apud Forestum ( *Observ. Chirurg. Lib. VI. Observ. 4.* ).

HEPATIS. Per venam enim portarum abdominalium viscerum sanguis venosus collectus deferretur per hepar: ipsius ascendentis cavæ venæ truncus hepatis innascitur: totum hoc viscus molle, ac si spongia fere foret sanguine plena, apparet. Arteriz quidem hepaticæ, si ingens visceris huius molles spectetur, satis exiles sunt, sed venæ portarum insignes rami per hepar distribuntur. Ideo apparet, periculosissima semper esse vulnera hepatis, & si insignes rami vasorum per hepar distributorum læsi fuerint, semper lethalia; & quidem plerumque satis subito, ingenti sanguinis copia in abdominis cavum, vel & per vulnus effusa: unde animi deliquium & mors brevi sequuntur. *Jaculo in fœcus cominus percusso, statim cadaverosus color affusus est, oculi concavi, anxietas, corporis jactatio, eodem quo percussus est die.* ( *Hippoc. Epid. 7. Tom. IX. pag. 567.* ) Facile autem patet, omnium periculosissima esse illa vulnera hepatis, quæ circa portas ejus infliguntur ( *Celsus Lib. V. cap. 26.* ), quæ ideo a Celso pro insanabilibus habentur: illa vero, quæ jecinoris crassum dividunt, difficilia quidem, non tamen omnino insanabilia, esse voluit. Satis notabile exemplum vulneris in hepate sanati in Epistola ad Sennerium recenset Hildanus: ( *Centur. 2. Observ. 34. pag. 110.* ) ubi maximo vulnere inflicto dextro hypocondrio, cum tali

Tom. I.

hæmorrhagia, quæ animi deliquium induceret, & educto forcipibus hepatis frusto, quod in vulneris apertura se offerebat, licet sævissima supervenerint symptomata, tamen optime convalescit vulneratus. Post triennium continua febre periit, & in cadavere apparuit, portiunculam quandam infimi lobi hepatis abscissam fuisse, & vulnus cicatrice bona fuisse obductum. Sed apparet ex ipsa hac historia, vulnus non penetrasse ad majores vasorum hepaticorum ramos. Imo & leviora hepatis vulnera, licet non illico lethalia, funesta tamen sæpissime fuerunt observata. *Licetor imperterritus, in præstus vincula audacissimo cuidam nebula, ictus fuit bipenni, in infima jecinoris fibra. Cujus exsultans sanguis in pus conversus, conspexit ipsum in lentam febriculam: utique tam vehementem universi corporis marcescem, ut conficeretur ante diem quadragimumum* ( *Tulp. Observ. Medicar. Lib. II. cap. 26.* )

LIENIS. Quamvis Democritus dixerit, ( *Epist. ad Hippocr. de natura humana Tom. I. pag. 29.* ) quod noxius & inutilis corporis humani incola splen ex adverso hepatis dormiat, & per Experimenta in vivis animalibus capta constitit, posse lienem excindi superflue vita, nec adeo multum turbata sanitate; imo & in ipsis hominibus hoc factum fuisse legatur ( *Boyle de utilitate Philosophæ. Experimentalis Exercit. I. pag. 109. 110. Miscell. curios. dec. 1. ann. 4. 5. pag. 210. & dec. 2. ann. 3. p. 378. & ann. 7. pag. 239.* ), tamen tam magna habet vasa sanguinea, & cordi adeo propinqua, hoc viscus, ut lethalis merito timeatur hæmorrhagia post splenis vulnera. Mortem inde secutam fuisse testantur observata Medica. *Inter ludica puerilia, ictus fuit scipione, in regione Lienis, juvenis quatuordecim annorum, cum insigni dolore, & tam frequenti animi deliquio, ut postridie ejus diei vitam cum morte commutaverit* ( *Tulp. Observ. Medicar. Lib. II. cap. 9.* ). Alium casum similem ibidem habet Auctor, & in utroque cadavere lien in cava sui parte rimam egerat, quæ duos facile digitos caperet. Similia bina exempla lienis fissi a percussione externa, cum sanguinis extravasatione ingenti copia in abdomine collecta, & morte subito secuta, vidit *Bohnus* ( *De renunciatione vulnerum pag. 282.* ).

Leviora tamen Lienis vulnera, æque ac hepatis, non semper absolute lethalia esse,

M 3

quam.

quamvis semper periculosa, valde probabilis est.

**RENUM.** Servari non posse, quibus renes vulnerati sunt, Celsus dixerat (*Lib. V. cap. 26.*). Qui magnitudinem arteriarum emulgentium considerat, facile credet, lethalem hæmorrhagiam sequi posse, si majores emulgentium rami in renem substantia, vel & in ipso renis ingressa discendantur, si simul peritonæum læsum fuerit, sanguis in abdominis cavum effluet; si vero a posteriori corporis parte inflicta vulnus renem læserit, integro manente peritonæo, tunc mirabilis fiet sanguinis effusio in tunicam pinguedinosa musculis interpositam, neque sanguis tam libere poterit ex renis vulnere effluere. Nec obstat locus Hippocratis, ubi sectionem imperat in calculo renem: dicit enim ibi, *quam dolor urget, multa calida lavato, & qua parte precipue dolor est, fatus tepenter admoveto; quam vero intumuerit, & extuberavit, sub hoc tempus juxta renem secato (κατὰ τὸν νεφρόν) & extracto pure, atremum medicamentis urinam moventibus curato &c.* (*De internis affectionibus cap. 15. Tom. VII. pag. 649.*) Apparet enim evidenter, quod noluerit renem ipsum discitari, nec per sectionem factam arenas educi voluit. Quid autem de Nephrotomia sentiendum sit, dicetur postea in Capitulo de calculo.

Non omnia tamen renum vulnera lethalia esse, docet Foresti observatio (*Lib. XXV. Observ. 20. p. 194.*): ubi juvenis viginti annorum, cultro in lumbis vulneratus, e regione renis dextræ, a sanguine, in vesicam delapso ex rene vulnerato, per sex dies urinam omnino suppressam habuit; feliciter tamen & ab hac ichthuria, & a renis vulnere, evasit.

**PANCREATIS.** Si pempe vasorum trunci vel rami insignes per hoc viscus dispersi discendantur, poterit, effuso sanguine in cavum abdominis, vel & corrupto postea, mors sequi ut effectus talis vulneris. Tamen Pancreas ventriculo subjacens raro videtur ledi posse, quin simul per alia viscera vulnus transeat.

**MESENTERII.** Quam magna vasa sanguinea per mesenterium decurrant, & quo locentur ordine, Eustachius 27. tabula figura 2. & 3. pulchre demonstrat; præter enim insignes venæ portarum ramos, & venæ cavæ propagines, magni trunci arteriosi per mesenterium deferuntur, arteria nempe me-

senterica superior, & inferior. His ergo vasis a caula vulnerante difcissis, lethalis hæmorrhagia sequi poterit, & abdominis cavum effuso sanguine repleti. Talis casus habetur apud Bohnium, (*De renunciatione vulnerum pag. 264.*) ubi ex punctura regionis epigastricæ tertio æger die expiraverat. Observatum autem fuit in cadavere, ielum per omentum in mesenterii centrum penetrasse, sicque præter vascula Epiploica exiliora, propagines arteriæ mesentericæ superioris insigniorem rescussisse: unde abdomen satis vastum & obesum cruore extravasato & ad corruptionem inclinante, targebat. Ex onenti vasis disruptis similitur mors, per hæmorrhagiam repleto toto abdomine, secuta fuit (*Comment. Acad. Scient. Imperialis Petropol. Tom. I. pag. 382. 383.*) Sed aliud adhuc periculum imminet a læso per vulnus mesenterio, cujus cognitio Celeberrimo Ruyschio imprimis deberi videtur. Ille enim per quinquaginta & amplius annos Amplissimi Magistratus auctoritate, in populosissima urbe Amstelodamo, cadavera violenta morte peremptorum lustravit, ut de vulnere conditione ad Judices renunciaret. Dicit enim, se frequenter observasse, vulnera, mesenterio inflicta, intra duos tresve dies fuisse lethalia, postquam acerrimis & assiduis doloribus abdominis excruciat fuerant vulnerati: sollicito tamen examine constitit, nullam aliam partem alicujus momenti fuisse læsam. Præterea Ornithotrophii, dum gallos castrant, si videant mesenterium hac operatione vel minimum læsum fuisse, statim hæc animalia jugulant, probe edocti per experimenta, brevi moritura a tali vulnere (*Ruysch. adversus. Anatom. decad. 2. N. IV. pag. 8. 9.*). Videtur autem lethalis talium vulnere effectus a læsis nervis mesenterii pendere. Quam mirabile enim imperium in ipsas etiam vitales functiones corporis humani habeant nervi per abdominalia viscera dispersi, docent Observata Medica in herniis suffocatis, intestinorum susceptionibus &c.

An in coacis Prænotionibus aliquid simile adumbratur, (*N. 509.*) dum ibi dicitur: *periculis & quibus nervi interiores, sunt tenuis aliquis, sive crassus vulneratus fuerit, si plaga transversa fuerit & magna sicut si parva & recta, nonnulli evadunt.* Cœlius loco dicitur: *legit si; & iusta,* quæ



quæ lætio propius huic sententia accederet  
( *Foetus Tom. I. pag. 200.* )

**STOMACHI, INTESTINORUM.** In hoc numero considerantur vulnera harum partium, quatenus vasis sanguineis ruptis mortem facere poterint effuso sanguine, nam illa mala, quæ sequuntur a contentis ventriculi & intestinorum per vulnus dilabentibus, considerabuntur quinto numero huius paragraphi. Ventriculum enim ambiunt satis magna vasa, quæ circa urinumque ejus orificium versus fundum descendunt, & in hoc itinere frequentibus anastomosis junguntur similibus vasis a fundo ventriculi sursum ascendentibus. Hinc uno insigniori ramulo discisso, sanguis per omnia vasa ventriculi relicta trajetibus facile effluit per vas vulneratum. Plurima mortis secuta post ventriculi vulnera exempla habentur apud Observatores: unicum notasse sufficiet, quod demonstrat, maximum hæmorrhagiam inde oram fuisse. Villæ in hypochondrio dextro sub costis spuris gladio valde lato vulnerabatur; multa cruenta vomuit & per alvum deiecit, supervenere sudores, syncope, extremorum frigus, convulsiones: tertio die perit. Aperto abdomine, vulnus ingens apparebat in ventriculi fundo, venis & arteriis, quarum maximus ibi numerus est, integre discissis; ingens simul erat in abdomine sanguinis effusæ copia ( *Boneti Sepulchreton Tom. III. pag. 362.* ).

Intestina autem, mesenterio annexa, per illud vasa sua recipiunt, quæ utrinque intestinali fistulæ circumapplicata, in parte intestini mesenterio opposita, Anastomosis inter se junguntur. Vulnera ergo intestinalis, imprimis circa mesenterium inflicta, satis magnos vasorum truncos discindere possunt, unde magna sanguinis in cavum abdominis effusio, & mors. Homo vulneratur in hypochondrio dextro, paulo supra umbilici regionem, gladio acuto; conqueritur de vehementi abdominis dolore; multum sanguinis per alvum deiecit: supervenere & ventriculi subversiones, singultus, frequens animi deliquium, hora quarta mortuus est. Aperto abdomine, absterisque, quibus refertum erat, excrementis & sanguine, intestinum Colon totum undequaque per transversum discissum & sphacelatum repperit est ( *Idem ibid.* ).

Multum autem videtur augeri periculum a læsibus majoribus vasis ventriculi & inte-

stinorum ideo, quia continuo motu peristaltico hæc viscera moventur: hinc hæc vulnera nunquam sere quiescunt. Forte etiam similia mala oriuntur a nervis læsis, per ventriculum & intestina dispersis: quæ & post mesenterii vulnera sequuntur, uti modo dictum est.

Interim tamen apud Observatores vulnerum ventriculi & intestinorum sanatorum occurrunt frequentissima exempla. Unde non omnia talia vulnera pro lethaliibus habenda sunt.

**UTERI IN GRAVIDIS.** Uterus, postquam mulier concepit, & ovum imprægnatum incipit sua mole aucta uteri cavum implere, extenditur quaquaversum, & pari proportionem omnia ejus vasa omni mensura ampliatur, ac maiorem copiam humorum recipiunt: Hinc uterus gravidæ mulieris habet sere eandem crassitiem, quam habebat uterus contractus in non gravida; & tamen in tam amplam molem distenditur, dilatatis nempe vasis, & repletis simul. Unde dixit Hippocrates, ( *De mulier. morbis Lib. I. cap. 23. Tom. VII. pag. 744.* ) ubi in utero mulier gerit, paulatim a toto corpore sanguis in uterum defertur, & in orbem id, quod in utero est, circumspicitur, ipsum augeat. Et inde rationem deducit, quare gravidarum depravetur color: quod nempe purus sanguis quotidie ex corpore destillet, & ad factum feratur &c. uti habetur in eodem libro de morbis mulierum, ( *Tom. VII. pag. 748.* ) quem locum antea alia occasione allegavi. ( §. 69. N. 2. ) Apparet hinc, quam periculosa sint vulnera uteri imprægnati, cum tanta copia sanguinis distendantur vasa. Periculum augeat, quod fœtus uterum distendens impediatur, quominus uterus se contrahere, & sua vasa angustare possit: si vero post inflictum utero vulnus excluderetur subito fœtus, aliqua spes esset, contracto utero, hæmorrhagiam sisti, & vulnus consolidari posse. Talia enim habentur exempla mirabilia, quod dissecto utero ipso, & per latum vulnus ducto fœtu, supervixerint mulieres. Mulieri primiparæ læsa vagina post partum difficilem conceverat sic, ut apertura ejus pisi magnitudinem vix retinuerit; imprægnata postea iterum fuit, cumque partus doloribus obortis nulla spes esset, illam parere posse, fœtusque jam mortuus esset in utero, feliciter, dissecto abdomine, &c.

utero, feliciter, dissecto abdomine, & utero ipso, eductus fuit, nullo symptomatico vel animi deliquio superviente, (*Act. Lipsi.* an. 1693. pag. 230.) & superstiti matre. Aliud habetur exemplum partes talis Cæsarei dicti, publico testimonio confirmatum. Fœmina primipara quadragésimo octavo ætatis anno, omnibus tentatis auxiliis, ob loci angustiam non poterat parere: septima die pericrissima, nec minus intrepida, obstetrix dissecto utero fœtum eduxit, nullo malo securo, & muliere postea integra sanitate fruente (*Acad. des Scienc. Par. 1731. Hist. pag. 41.*).

**VEICE CIRCA ARTERIAS EJUS MAJORES.** Quamvis Hippocrates vesicæ vulnera ut lethalia damnaverit, nec posse coalescere dixerit, (*De Morbis Lib. I. cap. 2. Tom. VII. pag. 532. & ibidem cap. 4. pag. 536. uti & in Coacis Prænationibus, N. 503. 504. 509.*) constat tamen certissimis hodie & frequentissimis observatis, vesicam vulneratam in calculi sectione sanari. Periculum tamen est, ne magna fatis per vesicam decurrentia vasa discissa validam faciant Hæmorrhagiam; ex magnis enim truncis arteriarum Iliacarum fatis vicinis orta valido impetu sanguinem fundunt. Vascularum horum origo & decursus in Eustachii Tab. XII. fig. 1. habentur. Imprimis augeatur hoc discrimen, quia in calculosis vesica, sæpe longe crassior facta, dilatata plus vasa habet: his autem vas discissis, quamdiu calculus adhuc in vesicæ cavo hæret, non poterit vesica se penitus contrahere; hinc parulo vulnere sanguinem fundere pergunt. Calculo vero educto, contracta vesica & lotio per vulnus factum libere effluente, claudi possunt iterum vasa dissecta.

**AORTÆ.** Sanguis ex pulmone redux in eor sinistram pellitur omnis in maximam vas arteriosum totius corporis, quod aorta vocatur: quæ in arcum curvata deorsum tendit, spinæ accumbens, sinistrosque parum declinans, usque ad os sacrum; ibi in binos ramos æquales dividitur, quæ vocantur arteriæ Iliacæ; toto autem hoc itinere a corde ad locum illum usque, ubi bifurcatur, aortæ nonnisi retinent. Facile jam patet, si vulnere lædatur aorta ipsa, nullam superesse medelam, cum directo impetu sanguinem omnem ex corde sinistro accipiat, nullusque deat accessus manibus

Chirurgi: in intimis enim corporis tuto latet, corporibus vertebrarum incumbens. Eo autem citius lethale erit tale vulnus, quo magis vicinum cordi fuerit.

**CAROTIDUM.** Arteriæ carotides, ex ipsa curvatura aortæ, ex corde sinistro egressæ oriuntur (saltem sinistra carotis, dextra plerumque ex subclavia arteria ejusdem lateris oritur) binæ hæ arteriæ ad latus utrumque asperæ arteriæ decurrunt usque ad laryngis altitudinem, ubi in binos dividuntur ramos singulæ, quorum unus, externis imprimis capitis partibus prospiciens, carotis externa vocatur; alter calvariam ingressus per encephalon distribuitur, carotis interna dictus. Toto decursu, ab origine ex aorta, vel subclavia, ad illum locum usque, ubi in binos dividuntur ramos, simpliciter carotides vocantur. In homine arteriæ illæ fere digiti minoris amplitudinem habent: hinc apparet, quanta hæmorrhagia, illis vulneratis, fieri debeat, dum tam propinquæ cordi impetu maximo pulsus sanguinem accipiunt. Verum quidem est, Carotides fere toto hoc decursu satis propinquas esse tegumentis corporis externis, sic ut digito illarum pulsus in collo percipi possit facillime. Præterea impune videtur ligari posse carotis arteriam, cum per alteram & vertebrales arterias sanguinis idonea copia ad caput deduci possit. In cane, cui ante ocellum abscideram nervos recurrentes, ligavi utramque carotidem, nec potui observare illum aliquid mali inde pati: inveni enim hoc animal post alios octo dies elapsos vegetum & alacte: ligavi tunc venas jugulares sine ullo observabili malo. Post quatuor dies inveni canem sanum omnino. Examinans tunc ligaturas carotidibus injectas inveni illas firmissime hætere, & thrombum valde densum & compactum hætere inter ligaturam & cor. Aperto cranio in cerebro nihil mutatum apparebat, imo cerebri volumen potius auctum quam minutum apparebat.

Si vero ponderetur illæ difficultates, quæ occurrunt, ubi in homine carotis arteria discissa est, patebit tale vulnus merito lethale dicendum esse: ingens enim hæmorrhagia paucis certe minutis horæ hominem e medio tollere poterit. Ut ergo salvari posset talis vulneratus, requireretur, ut peritissimus adestet ipso momento vulnus infecti Chirurgus, qui digitis ad resistentem asperam arteriam comprimeret utrumque carotidis

rotidis disciffæ extremum, simul artubus ligaturæ injicientæ forent, ut compressis venis minor sanguinis copia rediret ad cor, sicque impetus effluens sanguinis minueretur. His factis deberet utrumque extremum carotidis disciffæ vellegari, & inventum deinde ligari. Non fufficit enim ligaffe arteriæ illam partem, quæ cordi propior est; pergeret enim sanguis effluere per alteram arteriæ disciffæ extremum, quia carotides sub basi cerebri cum se invicem, & cum vertebralibus arteriis, magnis satis ramis emissis, junguntur. Ex his omnibus patet, unicum Chirurghum, dextrerrimum quamvis, non fufficere, sed ad minimum requiri, ut bini adfint tales. Præterea vix videntur arteriæ disciffæ extrema posse inveniri, nisi integumentis divisis amplius redderetur vulnus; unde postea sæpe in Chirurghos, optime quamvis de vulnerato meritis, mors imputaretur post vulnus secuta. Si vero vulneratus tantum sanguinis amisisset, ut in animi deliquium lapsus cessaret fere hæmorrhagia, posset forte hoc tentari.

**VERTERALIUM.** Arteriæ vertebrales, ex arteriis subclaviis ortæ, utrimque per foramina processuum transversorum vertebrarum colli pergunt versus cranium. In hoc transitu ramulos per vertebrarum commissuras ad spinalem medullam, ejusque involucra,

transmittunt; uti etiam ad masculos vicinos. Disciffæ ergo illæ arteriæ non possunt facile retrorahri, & sic orificia sua claudere: & cum sub basi cranii ramis emissis cum arteriis carotidibus internis communicent; hinc sanguis, per carotides allatus, per has arterias vulneratas effluere poterit, unde patet ingens periculum. Nulla autem hic datur opportunitas ligandi arterias has vulneratas, cum offeis illis foraminibus lateant disciffæ arteriæ extrema: unica spes esset, si per hæmorrhagiam debilissimo reddito agro, & vita tali minima sustentata parco & blando victu, nullisque datis cardiis, consolidari posset arteriæ disciffæ extremum. Hoc autem non penitus impossibile esse, docent ipsa cordis vulnera sanata aliquando, & memorabile illud exemplum antea enarratum (§. 161.) ubi axillari arteria disciffa: homo tamen evaserat.

Facile jam patet idem periculum imminere ab aliis magnis arteriis vulneratis, emulgentibus v.g. Iliacis &c.

Venarum autem maximarum vulnera præriter lethalia esse ob easdem causas patet: cum autem plurimæ venæ magis versus corporis superficiem ponantur, faciliusque comprimantur; neque tanta sit velocitas sanguinis in venis quam in arteriis; ideo cæteris paribus, venarum vulnera minus periculosa sunt vulneribus arteriarum.

4. Quæ Respirationem integre tollunt; ut abscissio laryngis cum subductione fistulæ sciffæ, vulnera magna bronchiorum, vulnera lata, utramque cavitatem thoracis, cum admissu aeris, perforantia, vulnera diaphragma ab utraque parte mediastini thoracis penetrantia, vel ejus nervosa dissecantia.

In homine nato, ut sanguis ex corde dextro in sinistrum transire possit, requiritur, ut pulmo, per aerem inspiratum dilatatus, viam faciat sanguini, ex corde dextro pulso per arteriam pulmonalem in venas pulmonales, & deinde in cor sinistru. Necessaria ergo ad vitam est respiratio, quæ si per pauca tantum momenta tollatur, vita perit. Ad respirationem autem requiritur, ut aer libere pulmonem ingredi possit, illumque expandere: omnia ergo vulnera, quæ aeris ingressum in pulmonem impediunt, vel pulmonis dilatationem per aerem ingressum, lethalia sunt. Talia autem sunt sequentia.

**ABSCISSIO LARYNGIS CUM SUBDUCTIONE FISTULÆ SCISSÆ.** Aspera arteria, cæ-

tilagineis illis segmentis constans, semper aperta, numquam collabi, nec facile comprimari potens; liberum aditum aeri in pulmonem servat: dum ergo vulnus aereum hanc fistulam sic dissecat, ut dicissimum extremam inferius se subducens sub partibus vicinis occultetur, & aerem admittere nequeat, actum est de vita. Si vero vulnus quantumvis magno lædatur, patula tamen via manet aeri in pulmonem, minime lethale erit tale vulnus; uti docent fidissima observata. Frequentissimi enim Medicis & Chirurgis occurrunt tales casus, in quibus homines, vitæ periculi, violentas sibi ipsis intulerunt manus; vel & a latronibus compressi discissam habuerant arteriam asperam, & tamen sanati fuerunt postea. Pauca tantum

tam adducentur observata, quæ hanc rem  
monstrant. Juvenis Melancholicus inopinata  
mentatione, quas speraverat, remissa, sibi  
lædè siccitè asperæ arteriæ extrinsecus, il-  
læsi venis jugularibus & carotidibus utri-  
que adhaerentibus; nox voce privatus jace-  
bat. Chirurgus ducta vulneris labia con-  
suevit; miser vulnerati vires peritus futuram  
dilacerat; Emplastro, fabelli platinè illito,  
utrique labii vulneris appposito, filisque  
transmissis adducto, amebantur iterum vul-  
neris labia, & mensis spatio sanatum fuit  
vulnus. Nihil postea remansit vitii, præter-  
quam quod in concenitu Mexico cogeretur  
paulo submissius canere, quam solabat ante  
plagam inflictam ( *Tulp. Observ. Medic.  
Lib. I. cap. 50.* ). Similis casus legitur &  
apud Bartholinum ( *Thes. Barb. & Hoffm.  
Med. Cent. V. Hist. 89.* ) de puella, quæ sibi  
ipsi fauces præciderat, & vulneris futuram  
pariter laceraverat; postea tamen curata.

Tria similia Exempla habet Paræus ( *Lib.  
10. cap. 31.* ) ubi homini aspera arteria di-  
scissa fuerat una cum vena jugulari; inflicto  
vulnere statim vocem perdidit: unitis fu-  
tura vulneris labiis, iterum loqui potuit;  
& licet mortem brevi securam credidisset  
Paræus, præter spem convaleuit. Binis aliis  
una cum aspera arteria & œsophagus discis-  
sus fuerat, unde mortui fuerunt, postquam  
per quatuor tamen dies post vulnus inflic-  
tum supervixerant, & confutis labiis vulneris lo-  
quela perditâ redierat, sic ut unus percussor-  
um indicaverit, alter se sibi ipsi hæc vulne-  
ra inflixisse confessus fuerit, atque ita fa-  
mulum criminis suspicione liberaverit.

Memini me ante multos annos vidisse mi-  
litem, qui ossiatum stipem petens ostendebat  
patulum ingens foramen asperæ arteriæ,  
quod spongia solebat regere, tuncque com-  
mode loqui poterat, detecto autem forami-  
ne, vox peribat. In conspectu bellico huic  
homini per globum plumbæum pars insignis  
asperæ arteriæ ablata fuit; unde non po-  
tuerunt adduci ad se invicem vulneris labia,  
sed relicta fuit talis apertura; plurimis ta-  
men annis postea supervixit.

VULNERA MAGNA BRONCHIORUM. As-  
pera arteria, postquam per colli anteriora  
in thoracem descendit, circa illum locum,  
ubi aorta ex corde egressa incurvatur, in  
binos dividitur ramos, qui singuli ad pul-  
monem ipsi lateris tendunt: hi rami tunc  
deposito asperæ arteriæ nomine, bronchia

vocantur, horumque ramorum subdivisio-  
nes in pulmonibus factæ deinde illud no-  
men reuenerunt. Cum ergo asperæ arteriæ &  
bronchiorum munus sit aërem inspiratum  
per pulmonis cava aërea distribuere, aer  
per magna horum vulnera elapsus, in ca-  
vo thoracis accumulabitur; calore loci ex-  
pansus pulmonem comprimet; sique omnem  
eius actionem impedit: unde suffocatio &  
mors: imprimis, si utrique pulmonis bron-  
chia sic lædantur: tunc enim respiratio in-  
tegre tollitur. Unde Hippocrates ( *Coac.  
Prænot. Num. 509.* ) dicit: *Moriatur, si in  
anteriori (asperam) bos nomine semper intel-  
ligenti* ) & *pulmonem magnæ admodum pla-  
gæ injectæ sunt, sic ut percussio pulmonis mi-  
nus sit, qui per os prodit, spiritus, quam qui  
per vulnus exiit*. Periculum autem talium  
vulnorum augeatur, quod vix videantur ma-  
gnis vulneribus bronchia lædi posse, quin  
vasa sanguinea, horum bronchiorum divi-  
siones suis ramificationibus comitantia, si-  
mul discendantur.

VULNERA LATA, UTRAMQUE CAVITA-  
TEM THORACIS, CUM ADMISSU AERIS,  
PERFORANTIA. Pulmones, quamvis in tho-  
race undique exacte clauso continentur,  
semper sunt plus distenti, quam si aëri li-  
bero undique exponerentur, tunc enim col-  
labuntur, & in spatium minus contrahun-  
tur, imprimis actione contractilii fibrarum  
muscularium, quæ segmenta bronchiorum  
inter se connectunt. Naturaliter enim in  
homine inter pulmonem & pleuram nullus  
aëst aer, sed per glottidem aëri in pul-  
monem semper relinquitur liber aditus.  
Unde pulmo plus distenditur per aërem in-  
gressum per glottidis rimam, quam com-  
primatur per aërem externum, costas &  
diaphragma prementem, quia costarum ar-  
cua figura & diaphragmatis nexus cum  
costis & vertebriis impediunt, quo minus  
aer externus diaphragma premat in pecto-  
ris cavitatem eo usque, ut fieret æquili-  
brium inter vim aeris externi & ejusdem  
pulmonis contenti. Hæc est ratio, quare  
pulmo pleuræ semper contiguus inaneat,  
etiam post mortem, quamvis thoracis clau-  
si manet integritas; uti patet evidenter,  
si illa pleura musculi intercostales caute  
separentur; tunc enim pulmo omnino con-  
tiguus apparet pleuræ, præ tenuitate fere  
pellucida. Dum vero pleura perforatur, a-  
ëre illapso in pectoris cavum, pulmo col-  
lapsus

lapis statim contrahitur in minus spatium, & a pleuræ contiguitate recedit; diaphragma, antea cavum a parte abdominalis, tenuissimum, & in cava pectoris tritum, statim flaccidum fit, & deorsum collabitur. Ex quibus pater evidenter, naturaliter in homine pulmones pleuræ undique contiguos esse, nec aerem hærere inter convexam pulmonis superficiem & pleuræ cavum. Ideo, dum per unguiculos, huic scopo intervenientes, elevatis costis & diductis a se muris, diaphragmate contracto & plano factò ampliatur thoracis cavitas, esset inter pleuram & pulmonem superficiem spatium aere vacuum; sed aer per glottidem libere ingrediens pulmones sic distendit, dum pectus dilatatur, ut naneant semper pleuræ contigui; sicque perficitur inspiratio. Dum vero, perfosso thoracis cavo, liber datur accessus aeri in cavum, aeris, per glottidem ingressi, pressio aequilibratur: hinc non distenditur pulmo, sed propria contractilitate abibit in minus spatium. Si hoc jam fiat in utroque pectoris cavo simul, non poterit pulmo uterque collapsus dilatari per aerem inspiratum; & hinc cor dextrum non poterit per collapsum pulmonem pellere suum sanguinem, sicque brevi suffocabitur cordis motus, & peribit vita inde pendens.

Galenus jam in vivis animalibus tentaverat hæc experimenta, & conclusit (*De usu partium Lib. VI. c. 3. Tom. IV. p. 419.*) Quod ideo semivocale & semirespirans illico fiat animal a magnis vociferibus alterutram thoracis partes penetrantibus; voce autem & respiratione penitus destituit, si amba cavitates perfossæ fuerint. Et inde deduxit mediam, thoracem in bina cava separantis, usum, & vulnere penetrante unius lateris cavum, in altero maneat respirationis integritas. Postea & Vesalius in vivis animalibus sectiones administrans nudata pleura demonstrabat, pulmonem illi semper contiguum manere; pertusa autem pleura, illius lateris pulmonem concidere, thorace interim æque ac prius moto; postea illud lateris pulmonis quam maxime aperiens, plaribus costis relectis, per membranas thoracem intersepientes poterat videri, quomodo alter pulmo in thoracis cavo adhuc integro pectoris motum sequeretur; illis vero membranis pertusis, & ille pulmo concidebat illico (*Vesal. de corporis humani fabrica Lib. VII. cap. ult. pag. 571.*).

Ex his experimentis videretur concludi posse, vulnera thoracis cavum utrumque penetrantia sic, ut aeri ingressus detur, esse certo & subito lethalia. Quousque autem hoc verum sit, patebit ex sequentibus experimentis.

Autè duodecim, si recte memini, annos debebat in hac Academia WILLIAM HOUSTRON, eruditione singulari & imprimis Anatomie & Botanice scientia insignis, cuius amore tædiosissima suscepit itinera, naufragia, captivitates & alia plurima mala passus, & magno scientiarum damno in patriam redux in flore ætatis lento morbo periit, longiori vita dignissimus. Magno meo bono huius Viri familiariter usus fui; & plurima me ab illo didicisse gratus recorder. Ille quadam die me conveniens rogavit, an crederem, vulnera utrumque cavum pectoris perforantia lethalia esse? Anui, & argumentis modo ena satis asserti veritatem probare conatus fui. Audivit placide ratiunculas, & dein eduxit ridens de sinu caniculam, cui ante triduum utrumque pectoris latus perforaverat: alacriter curtebat animal, ac si nihil mali passum fuisset. Examinans omni cura intuscula vulnera, vidi in cava thoracis penetrare, nec pulmonem accretum esse illis locis, quod suspicabar primo: candelula cerea, applicata utrique vulnere, aere per vulnera attracto & expulso exstinguebatur. Obscure insolitum spectaculum, & postea in canibus similia experimenta plurima tentavi; quoniam autem successerint, referam.

Canis perforavi anteriorem partem pectoris sinistri: statim aer cum sibilo intravit, tubo immisso removi undique pulmonem a pleura. Postea & dextro lateri thoracis vulnus infixi, digito immisso itidem pulmonem undique a pleura removi: remoto digito pars magna pulmonis cum impetu per vulnus erupit; pergebat respirare & ejulare canis; vi iterum intrusi pulmonem in pectus, exibat de novo. Hæmorrhagia aderat satis valida; & post quadrantem horæ moriebat animal.

Repetens in alio cane hoc experimentum, per vulnera facta aeri per siphonem inflavi valide; longe diutius vixit: sed non adebat tanta hæmorrhagia. Dum quiescebat animal, pulmo in thoracis cavo manebat. Dum autem præ dolore magnos motus faceret; per vulnera facta pars pulmonis erupit.

Alteri canis pariter utrumque thoracem per-

perforavi: tubo aërem inflavi in cava pectoris, dein asperam atriam reseculi; postea totum abdomen cruciatim discidi, tunc diaphragmate pertuso in latere sinistro, vulnere in cavum pectoris sinistram penetrante, solutus vinculis vixit animal per bihorium, & pendulis de abdomine intestinis cucurrit per cubiculum.

Longe magis mirabar, alium canem, perforato utrimque pectore, abdomine aperto dein, & pertuso utrimque diaphragmate, per quinque horas vixisse.

Hæc experimenta frequenter iteravi, fere semper simili cum successu: sed dum maximis vulneribus pectus perforarem, quæ paralelo ad costas ductu dimidii digiti longitudinem æquarent sæpe, vel & superarent, vidi animalia satis cito mori: sed tunc ingens semper aderat hæmorrhagia.

Dum una cum eruditissimis amicis, qui hæc experimenta mecum tentabant, conabar invenire rationem, quare perforato utrimque pectore in animali pergeret vita & respiratio; incidit hæc opinio: quod si vulnera inflicta minorem haberent aperturam, quam erat glottidis rima, tunc aer facilius irruens per glottidis aperturam, quam per vulnus distenderet pulmonem. Præterea animal summo nixu videbatur expandere pulmonem, ut per vulnus sæpe exprimeretur; sicque aeris ingressum liberum per vulnus impediēbat: simul vidi evidenter, quod adductis ad se invicem costis animal minueret vulneris aperturam quam maxime. Ut certi essemus de his, institui sequens Experimentum.

Canem in utroque pectoris latere, loco medio inter binas costas infliximus satis magnum vulnus; vulneribus immiximus tubulos ex bractea ferri, quorum aperturæ longe majores erant, quam apertura glottidis in hoc animali: hac methodo vulnera manebant parula, cessabat illico respiratio, & peribat vox, atque animal videbatur mortuum. Clausis dein per digitos impositos tubulorum orificiis, & perficaco valde abdomine, incipiebat iterum citissime respirare, remotis digitis emissâ parte aeris in cavo thoracis contenti, mox iterum tubulos claudebamus, sic augebatur respiratio, & redibat vox amissa: apertis iterum tubulorum orificiis desinebat respiratio, nullam vocem emittebat animal, & moriebatur. Hoc experimentum aliquoties iteravimus, semper eodem cum eventu: & vidimus, quod, nisi firmiter

retineremus in vulnere tubulos, posset animal fummis nixibus moto thorace excutere tubulos de vulnere, & costas sic adducere, ut pergeret respirare.

Unde videtur concludi posse, vulnera, utramque thoracis cavum penetrantia, & aërem admittentia, tunc tantum esse cito & certo lethalia, si vulnerum orificia glottidis aperturam amplitudine sua superent.

An non huius rei vestigium habetur in illo loco Coacarum Prænotionum in eodem hoc numero modo allegato, ubi dicitur: quod moriatur homo, si percussio pulmone minor sit, qui per os prodiit spiritus, quam qui per vulnus exiit?

Non memini, me legisse apud Observatores exempla hominum sic vulneratorum, ut mors secuta potuerit adscribi foli aeris ingressui in utrumque thoracis cavum: semper enim fere simul læduntur viscera thoracis cavo contenta. Sed apud Schenckium (Lib. II. de Vuln. thoracis Observ. 3. pag. 297.) habetur, quod homo delapsus ex alta arbore in palum acutum incidit, qui lumborum mculos perforans, sursum in pectoris cavum usque penetravit. Curatus ab hoc vulnere foramen fistulosum in dorsi regione habuit in thoracis cavum penetrans, per quod lumen admotum flamm erumpente in thoracis constrictione agitabatur, & nonnunquam exstinguēbatur: sic diu supervixit sine ulla noxa.

VULNERA DIAPHRAGMA AB UTRAQUE PARTE MEDIASTINI THORACIS PENETRANTIA. Pleura dicta membrana thoracis utrumque cavum investit, sic tamen, ut singulo cavo thoracis sua propria membrana sit. Possunt ergo concipi, ac si binæ pleuræ forent tales vesicæ cavæ sibi mutuo adjacentes, & in loco contactus accretæ sibi mutuo. Harum membranarum duplicatura mediastinum vocatur, quod thoracis cavum dividit biseriam; sic tamen, ut in parte anteriori mediastinum declinet sinistrorsum, unde dextra cavitas pectoris major est sinistra (Academ. des Sciences l'An. 1715. Mémoires pag. 211. &c.). Cum ergo mediastinum non sit simplex membrana, sed ex binis pleuræ facies sibi accumbentibus nata, satis exacte dixit Galenus (De Anatom. admin. Lib. VII. cap. 2. Tom. IV. pag. 148.) describens membranam succingentem thoracis, ex illa nasci thoracem interfepientes membranas (ὡς καὶ διαπάραιτις τῶν σπλάχνων). Si jam vulnus ab utroque mediastini latere diaphragma læserit,

ferit, potest aer per has vias ingredi thoracem, & sic impedire pulmonis expansionem; eodem modo ac statim dictum fuit de vulneribus thoracem utrimque penetrantibus.

Sed si consideretur, magnum hepar diaphragmati accumbere, uti & linum &c. satis patet, non facile posse ladi diaphragma in binis distinctis locis, quin & illa lendantur viscera; unde mors, secuta tale vulnus, non posset ascribi soli aeris admissioni in cava pectoris: preterea enim diaphragmatis & musculorum abdominalium actione pressa viscera obturbant aeri liberam viam per hæc vulnera factam: sed uti ex experimentis modo citatis paruit, deberent hæc vulnera satis ampla esse. Unde videntur rarissime, si unquam, talis casus contingere posse.

VEL EJUS NERVOVA DISSECTANTIA. Medium diaphragmatis locum dixerunt ejus centrum tendineum. Est satis lata plaga tendinea, sive aponeurosis, ad quam omnes fibræ carnes diaphragmatis concurrunt. Vocatur & pars nervosa diaphragmatis, quia veteres tendinibus etiam nervi nomen imposuerunt. Putabatur jam actione fibrarum carnearum diaphragmatis tendineum illud centrum undique deorsum trahi; hinc si vulnus huic parti inflictum foret, singulis vicibus, quibus agit diaphragma, distraheretur fibræ semilaceræ, augetur vulnus, dolor fieret invulnerabilis, & inde convulsio, & mors. Sed demonstravit clarissimus SENAC, (*Acad. des Sciences P. an. 1704. Mémoire, pag. 251. Or.*) partem illam medium tendineum diaphragmatis non descendere in inspiratione, cui eo: pericardio inclusum incumbit: cujusque adeo turbaretur situs & motus, quia pericardium lata superficie huic tendineæ diaphragmatis parti accrescit. Probatum & hoc ibidem ex diaphragmatis structura & nexu.

5. Quæ motum Chyli in cor tollunt; abscisso œsophagi, magna vulnera ventriculi, intestini tenuioris, superioris integra dissectio, vulnus ductus thoracici, vel alvei chylosi.

Recensentur hoc numero vulnera illarum partium, quarum integritas requiritur, ut alimenta ingerantur, digerantur, & chylus ex his præparatis deferatur in sanguinem; ut inde restituantur illa, quæ viræ & sanitatis actionibus perduntur quotidie.

ABSCISSIO ÆSOPHAGI. Integra nempe

Sed aliud sequitur post diaphragmatis vulnera, nec minus funestum malum: unde non adeo subita quidem, certa tamen post diras calamitates mors sequitur. Nam nempe partes corporis, abdominis cavo contentæ, diaphragmatis & musculorum abdominalium actione pressæ vulneris diaphragmatis ingreduntur, illud dilatant, in pectoris cava transeunt, sicque pulmonem comprimendo, & cordis ipsius actionem turbando, post summas misérias mortem inferunt citius vel ferius. Sic PARAC. (*Liv. X. cap. 32.*) se vidisse testatur in homine, qui vulnus acceperat in media tendinosa parte diaphragmatis, ventriculum per hoc vulnus, pollicis magnitudinem non superans, thoracis cavum ingressum fuisse. In alio per octo menses superstiti, post acerrimos dolores colicos mortuo, inventum fuit intestinum colon pro magna parte in thorace hære: licet vulnus diaphragmatis minimi digiti apicem tantum capere posset. Simile exemplum etiam habetur apud SENNERTUM (*Lib. II. part. 2. cap. 13. pag. 372.*) de studio qui proprio se confodet ense, post binos menses tamen inte curatus: sed septem mensibus elapsis post crebros vomitus exspiravit. In cadavere apparuit, vulnus per pulmonem & diaphragma penetrasse. Ventriculus totus ascenderat in sinistram thoracis cavum, & cor cum pericardio depulerat in latus dextrum; ubi vivus adhuc, post vulnus sanatum, manu imposita cordis pulsus jussu observari.

Hinc apparet, quam periculosa sint diaphragmatis vulnera. Hollerius tamen testatur, se observasse in suspensi cadavere, cujus dissectione in scholis Medicis Parisiensibus præfuerat, vulnus obductum cicatrice in parte carnosa diaphragmatis (*Holler. Comment. in Aphor. 18. Sect. 6. pag. 344.*).

abscisso œsophagi omnem transitum ingesta ad ventriculum tollit. Vulnera enim œsophagi, non integre dici, sanata fuisse testantur Auctores. Sed apud SCHENKIIUM habetur, (*Observ. Med. Lib. III. Observ. 6. pag. 316.*) quod homo quidam carcibus detentus sibi ipse guttur, qua parte tractam

*anemiam spectat, ferro vulneravit, & digito vulnus sanare amplavit, ut per ipsum alimenta & medicamenta ad us usque transmiserentur. Sanatus tamen fuit paucis diebus.* Aliud Exemplum habetur apud Bohnium ( *De renunciatione vulnerum* pag. 208. ) de juvene, cui a larronibus maximo vulnere faucibus inflicto, dum elato capite lac biberet, illud per vulnus effluebat; dum vero supinus biberet, illud in ventriculum descendebat. Unde patebat oesophagus non omnino rescissum fuisse. Ex hoc vulnere tamen convaluit. Integre autem discisso oesophago una cum aspera arteria, rerratam versus ventriculum discissi oesophagi extremum non potuit unire Parvus alteri extremo, licet tanta valeret in arte peritia. Per futuram quidem univit asperam arteriam vulnus, sicque loquelam amissam misero restituit, ut potuerit indicare percussorem; quarta tamen die post vulnus inflictum periit. Aliud simile Exemplum habetur ibidem ( *Les ouvertures d'Ambruse* Paré Livre X. chap. 21. pag. 249. ). Cum autem oesophagus aspera arteria tegatur, corporibus vertebrarum incumbat, & a latere maxima vasa adjacentia habeat, raro solus vulneratur. Hinc forte credi posset, adiacentium partium vulnera pariter mortis causam fuisse. Mirabilis habetur, & forte unica hactenus in arte descripta observatio, quam publicavit Celeberrimus Boerhaavius. Illustrissimo nempe Heroi, Nobilissimo Baroni de Wassenae, Reipublice nostrae Architalasso, post maximos vomendi conatus, abruptus fuit oesophagi tubus prope diaphragma: unde, post enormes cruciatus, ingestis, una cum aere deglutito, in cavum pectoris delapsus, intra 24. horas mors accidit ( *Atrocis nec descripti prius morbi Historia* Ors. scripta ab Hermanno Boerhaavio. ). Conclufit optimo iure tunc Magnus Auctor, similia casum, si recurret, indicio huius historiae deregi quidem posse, nullis tamen unquam remediis sanabilem fore.

**MAGNA VULNERA VENTRICULI.** Omnes cibos & potus dehlutitos suo cavo recipit ventriculus: cuius fabrica, affusus humoribus, & mora ibi hæc sic mutantur, ut deinde per intestinales tubum delata præbeant marem, quæ tenuissimis fistulis venosis resorpta, sanguini mista, & ulterius elaborata, restituere possit illa, quæ sanitatis actioni-

bus de corpore perierant. Si ergo magnum vulnus inflictum fuerit ventriculo, contenta per vulnus dilabentur extra corpus, vel in cavum abdominis: sicque omnis nutritio deficiet necessario. Accedit, quod & ventriculi vulnæra, quatenus ipsam ventriculi substantiam, tot arteriis, nervis undique repletam, ledant, sint admodum periculosa. Dum autem pereunt ex vulneribus ventriculi non multo temporis intervallo post inflictum vulnus, non potest inde deduci mors secuta, quod nutritionis defectu perierit eger; sed ipsam substantiam ventriculi lesionem tunc mortis causam fuisse, satis patet. Bina talia ventriculi vulnerati exempla habet Bohnius ( *De renunciatione vulnerum* pag. 242. ) sic ut mors intra biduum secuta fuerit. Ubi autem vulnera ventriculi mortem inducunt, quia ingesta alimenta continere nequit ventriculus perforatus, tunc lentior mors sequitur sensim defectu nutritionis tabefacto corpore. Imo aliquando consistit per observationes Medicas, vulnera talia, in fistulosum ulcus degenerantia, plurimis annis aperta mansisse, superflite aegro; sic ut potuerit pro lubitu per hanc aperturam cibos potusque emittere; vel clauso per externum apparatus vulnere eadem retinere: Qualia bina exempla habentur apud Schenkium. ( *Observat. Medic. rarior.* pag. 248. ). Imo plurima talia vulnerum ventriculi sanatorum integre exempla apud Auctores occurrunt. Habetur mirabilis admodum historia in Aftis Anglicanis ( N. 420. pag. 184. & *Abridg. Trans. VII.* pag. 506. ). Maurus juvenis maturos Musæ fructus decerpit, & avide comedit: vitricus ejus ira furens, ut hoc ulcisceretur, cultro magnum vulnus abdomini juvenis infligit, & lata plaga ventriculū sic discindit, ut comesti fructus cum imperu per vulnus erumperent. Peracto hoc facinore, dum amici vulnerati insequerentur, fenex sibi ipsi ventriculū simili fere vulnere lacerat. Post quatuor horas Chirurgus veniens utrique vulnerato & ventriculū & integumenta abdominis discissa confuit, parvo foramine relicto, ut puri exituro pateret via. Febre corripuitur ambo vulnerati, quæ per quatuordecim dies durabat, & mensis circiter spatio juvenis convaluit; senex, sexagesimum ætatis annum agens, magis periclitabatur, & tardius curatus fuit. Uterque tamen, post quindecim a curato vulnere annos, integræ sanitatē fruebatur. Videtur.



Videntur hæc observata docere, quod non omnia ventriculi vulnera, magna quamvis, absolute semper lethalia sint. Si nempe aditus derur manibus Chirurgi, ut futura possint uniri. Parva autem ventriculi vulnera satis magnam spem curæ faciunt, modo cibis vel potu non distendatur ventriculus; tunc enim contracto manente ventriculo consolidari possunt.

**INTESTINI TENUIORIS, SUPERIORIS, INTEGRÆ DISSECTIO.** Videntur talia vulnera absolute lethalia esse. Intestini enim discissi extremum chylum in cavum abdominis effundit; qui ibi corruptus contenta omnia cavo abdominis viscera tabefacit; unde certa mors. Si vero vel casu, vel arte, discissi intestini extremum externo integumentorum margini accreverit, parebit via, qua motu peristaltico ventriculi & intestinorum contenta omnia intestini cavo exhibunt de corpore. Chylus enim ex ventriculo in intestina egressus per tantam longitudinem tubi intestinalis ejusque gyros & anfractus impeditur, quo minus elabatur de corpore, antequam per vasa lactea & venarum meseraicarum oscula inde resorptum fuit omne illud, quod corporis nutrimento inservire posset. Si ergo intestinum tenue integre discissum fuerit, in loco superiori, id est, ubi pyloro satis vicinum est, defrandabitur necessario nutrimento corpus, & lento peribit marasmo, si per vulnus integumentorum contenta exeant; si vero in cavum abdominis delapsa accumulentur, ibi corrupta mortem accelerabunt.

Intestinorum autem crassorum vulnera, uti & tenuiorum in loco remotiori a ventriculo, uti & illa quæ non integre discindunt tubum intestinalis, periculosa semper sunt, non tamen absolute lethalia. Maniacus cultro osthodice vulnera proprio abdomini inflixerat, quorum octo in abdominis cavum penetrabant: febris mox secuta, tensio abdominis, respiratio difficilis ac dolens, nausea, vomitus, diarrhoea &c. sumestum præfagebant exitum: repetitis venæ sectionibus, tenuissima diæta, rara deligatione vulnerum, præter spem evasit tamen. Post septemdecim menses mania iterum correptus ex alto præcipitem se dedit, unde illico mortuus fuit. In cadavere inventæ fuerunt cicatrices sanatorum vulnerum in hepatis lobo medio, intestino jejunæ, & colo (*Acad. des Sciences P. an 1795. Mém. pag. 42. Cr.*).

Canis majori intestinum tenue secundum longitudinem divisum fuit; reposito intestino, non confuto, futura clausum fuit vulnus abdominale; sine ullo molesto symptomate animal sanatum fuit (*Philosop. transact. abridg. Tom. V. pag. 272.*).

Plurima similia apud observatores exempla occurrunt. Intestinis autem crassis & tenuibus integre discissis supervixisse homines, modo vulnere externo afflueretur extremum intestini discissi, ut exirus pateret fecibus, pluribus exemplis constat; de quibus dicitur in vulneribus abdominis. Requiritur tunc, ut a ventriculo ad locum discissum tanta supersit intestini longitudo, ut ex ingestis paratus chylus per veas lacteas & meseraicas resorptus, nutritioni corporis sufficere possit.

**VULNUS DUCTUS THORACICI, VEL ALVI CHYLOSI.** Omnis chylus, ex intestinis, per vasa lactea resorptus, & ingens copia lymphæ per lymphaticas venas in unum hunc alveum confluit: illo ergo læso, & contentum humorem dimittente, cessant omnes illi effectus, qui a chylo, sanguini misto, & vasorum & viscerum actionibus ulterius perficiendo, pendunt; deficit nempe nutritio. Verum quidem est, venarum meseraicarum oscula undique hiare in intestinorum cavo, & resorbere partem tenuissimam Chyli, restaque via ad hepar deducere; album autem chylosum succum solæ venæ lacteæ diæte ex intestinis hauriunt, sed non videtur sustineri vita posse, si solæ venæ mesentericæ ebiberent tenuissima tantum, chyli autem admissio in sanguinem impediretur. Pulcherrimis experimentis demonstravit Lowerus (*De corde Cr. pag. 229. Cr. ad 239.*) nihil chyli per venas meseraicas resorberi. Canis thoraci in dextro latere intra duas costas inferiores aperto, digitum inmisit, & ungue velut in ferram resecto, commune chyli receptaculum tribus a pastu horis valde turgidum præfregit: confuto dein vulnere, animal, licet cibo saturaretur quotidie, intra paucos dies exspiravit. In cavæ ventriculus & intestina repleta, vasa lactea chylo turgida apparebant, in ductu thoracico nihil chyli reperiabatur, sed in pectoris illa parte, cui vulnus inflictum fuerat, binæ chyli libræ repertæ sunt. In altero cane pectus sinistram perfodit inter tertiam & quartam costam superiorem: immisso per vulnus digito laceravit truncum

clausum

factum ex binis ductibus chyleris in hoc animali adunatis: eventus fuit similibus. Ut autem certus esset, dilaceratum fuisse ductum thoracicum, aperto post mortem animalis abdomen aquam siphone injectis in ductum chylerum: quam vidit toram per vulnus factum dilabi in pectoris cavum. Duni autem animali, sic vulnerato, post diem unum aut alterum, paucis horis post largum cibum sumptum, aperta vena sanguis mitteretur, nihil chylosi apparebat in sanguine; uti aliter in simili casu semper invenitur.

Ex his experimentis concluditur, chylum non ingredi venas mefericas, & ingressu chyli in sanguinem impedito, viam diu sustineri non posse.

Rarius accidit, in homine per vulnera solum ductum thoracicum ladi: mediis enim fere vertebrarum corporibus incumbit, medio inter venam sine pari a dextris, & aortam descendente a sinistris, loco, sic ut aorta pro maxima parte ipsi incumbat: deinde ascendens pergit supra corpora vertebrarum sub oesophago, sub arcu venae Azygos, inde supra corpora vertebrarum sinistram inclinat, pergit sub carotide sinistra usque ad medium ultimae cervicis vertebrae, ibique arcus forma incurvatus sinistram deorsum tendit, & terminatur in venam subclaviam sinistram. Toto ergo hoc decursu tutissime reconditur, & maximis vasis decurrit: hinc vix ladi potest, quin & aliae vulnerentur

partes; a quibus laesis mors sequi poterit.

Habetur tamen apud Bonetum (*Sepulchr. f. Anat. Pract. Lib. IV. pag. 360.*)

Exemplum vulnerati, cui, ex symptomatibus vulnus sequentibus, ductus thoracicus laesus fuisse videtur. Nobili Baroni circa mediam dorsi vertebram scloperato vulnus infligitur, globo subter sinistram scapulam exeunte: initio non adeo male se habuit vulneratus, consueta tantum vulnorum symptomata passus. Post quatuordecim dies observatur in linteis copiosus albicans humor, per intervalla rediens: debilis inde manet & macie conficitur, licet appetitus foret integerrimus. Vixit sic per plures menses, & incepit per binas septimanas effluxus illius humoris cessare. Genio indulgens, calidioribus imprimis usus, subita commotus ira, Epileptici insultibus afficitur, postea hemiplegia lateris sinistri correptus perit. In cadavere pulmones, illa parte, qua vulnus insitum fuerat, insigni putredine correpti apparebant.

Magna suspicio adeit, ductum thoracicum laesum fuisse: cum autem vitam tam diu prorraxerit, forte non penitus destructum. Praeterea ductus thoracicus in suo decursu saepe bifurcatus insulas quasi format: forte talis bifurcationis unus ramus laesus fuerat. Fateor meras tantum hac esse conjecturas, cum & mortis genus, & pulmonis corruptio doceant, non a sola laesione ductus chyleris mortuum fuisse vulneratum.

§. 171. **V**ulnera sua natura lethalia, arte vero curabilia (152.) sunt, praedicuntur:

1. Vulnera Encephali terebra levanda.

Sequitur nunc altera classis vulnorum, illorum nempe, quae mortem inducunt, & certam quidem, si sibi relinquantur. In arte tamen cognita sunt auxilia, quibus adhibitis mors, horum vulnorum effectus & sequela, praecaveri possent.

Primo loco inter illa numerantur vulnera Encephali: Generale hoc nomen comprehendit omnia illa, quae calvariae cavo continentur. Notum jam est ex Anatomicis & Physiologicis, calvariae cavum naturaliter exactissime plenum esse: simulac ergo mutata figura cranii angustatur spatium, vel fractis vasibus effusi humores colliguntur sub integro cranio, necessario molliis encephali fabrica comprimitur, laeduntur omnes

functiones, quae inde pendent, tandem & destruuntur penitus.

Si jam cranium intropressum, vel effusi humores compresserint encephalon sua copia; vel denique coarctati mora erofint sua acrimonia tenerissimam hanc pulsam, unde tota vita & humanitas pendit, mors secuta erit effectus talis vulneris. Sed si humores effusi haereant in tali loco calvariae, ut per terebram apertura facta potius tolli, appareat facile, potius servari vulneratum: & uti postea in Capitulo de vulneribus Capitis dicetur, plurima sunt talia observata, homines ab effusis humoribus compresso cerebro jam apoplecticos factos fuisse, qui trepano applicato, & edu-

eductis extravasatis liquidis fuerunt sanati.

Bina ergo requiruntur in tali vulnere, quod nempe causa mortis secuta evidens

fuerit inventa humor extravasatus compressens encephalon, & quod hæserit effusum liquidum in tali loco, unde potuisset tuto educi.

2. Vulnere arteriæ, venæve majoris in loco, ad quem manus Chirurgi pervenire potest.

Maxime necessarium est Chirurgo, ut cognoscat decursum arteriarum & venarum majorum, imprimis in artubus: in cavis enim corporis hærentes magni trunci vasorum, si vulnerati fuerint, ipsius manum non admittunt. Et imprimis requiritur, ut cognita sint illa loca artuum, ubi magnæ arteriæ & venæ decurrunt adeo nudæ, ut comprimantur. Talia sunt in artubus superioribus loca subaxillaria, anterior & superior ossis humeri pars, ubi arteriæ magnus truncus ad nudum fere os subjacens comprimere potest, sicut facile omnis hæmorrhagia a vulnere locis inferioribus inflicto sisti potest. In artubus inferioribus talia loca sunt in interiori & anteriori fere media femoris parte, uti & sub poplitibus. Omnibus his locis splenia apposita, tornatili machina hodie adeo cognita (*tournequet*) appressa valide, truncos vasorum sic comprimunt, ut omnem sanguinis transitum impediant. Sic lethalis Hæmorrhagia præca-

vetur, & datur opportunitas Chirurgo, ut suppresso sanguinis fluxu, & dilatato, si opus sit, vulnere, arteriam vulneratam possit invenire, & inventæ idonea remedia, ligaturam &c. applicare. Hinc videtur hodie nullum artuum vulnus fere absolute lethale dici posse per hæmorrhagiam, quia per artem cognitam potest compesci per compressionem truncorum, in locis imprimis subaxillaribus & in inguinibus; & si tunc arteria vulnerata tam profunde hæreat, ut ligari nequeat, extirpatio membri adhuc superest, qua vulnerati vita servari potuisset. Dum autem natorum vasorum decursum ignorant Chirurgi, omni molimine per ligaturas, stipticos absorbentes pulveres, uti gypsum &c. adiungunt, ne sanguis ex læso vase erumpens per vulneris aperturam exire possit, qui tunc totum panniculum adiposum implet, & postea corruptus horrenda putredine omnia depascitur, uti tristissima docuerunt Exempla.

3. Viscerum, ad quæ manus & medicamenta cum effectu sanationis pervenire possunt.

Nisi certis experimentis constitisset, tuto fieri posse, quæ crederet, viscerum etiam vitalium partes, vulnere nudatas, abscindi posse, ne postea corruptæ mortem inducerent. Celsus (*Lib. V. cap. 26. N. 24. in fine pag. 295.*) jam audacter pronuntiaverat: si quid aut ex iocinore, aut pulmone duntaxat extremo dependat, id præcidatur. Unicum sufficiens memorabile admodum Exemplum, quo constabat, sæpe talia curari posse, si manus detur accessus, quæ fere desperata haberentur: Infligebatur homini ingens vulnus sub papilla sinistra: temulentus ille neglexit vulnus: postmodum pulmonis pars tres transversos digitos æquans hians vulnere prorupit. Temerarius ille vulneratus neglexit omnino tam grave vulnus, nihilque applicuit; & bidui itinere quamvis abesset, Amstelodamum se contulit ibique in valedudinarium receptus fuit. Illico emortua jam pulmonis pars, filo prius

constricta, forcice abscindebatur, quæ lanci imposita tres circiter pendebat uncias. Decimo quarto die vulnus jam coaluerat, nihilque supererat mali præter levem tussiculam, non semper sed subinde duntaxat molestam. Sic per sex annos supervixit, quocumque locorum navigans, & ebrietati indulgens dissolutissimæ vitæ homo. In cadavere nihil mali inventum fuit, nisi quod pulmo vulneris loco accreverat, unde tamen nihil incommodi, præter levem illam tussiculam, passus fuit (*Tulpii observat. Med. Lib. II. Observ. 17. pag. 125.*).

Præcedentis paragraphi numero quinto recensentur bini illi casus, ubi ventriculi gravissima vulnera, a perito Chirurgo per futuram unita, fuerunt sanata. In vulnere abdominalium historia patebit, viscera abdominalia læsa sic, ut effuso sanguine, vel contentis suis, in cavum abdominis mortem inducerent, ligari posse, vulnere margini affusi &c.

4. Quæ mortem inferunt emissio suo liquido in cava illa, unde id educi sine discrimine vitæ potest; ut thoracis, abdominis, ureterum, vesicæ, intestinorum quædam vulnera.

Multa vulnera sunt lethalia, non ob copiam sanguinis effusi, sed quia sanguis extravasatus, mora & calore loci corruptus, putrida labe exedit & tabefacit viscera, quæ aluit. Sic v. g. vulnera thoracis post magnam hæmorrhagiam vulneratus in animi deliquium labitur, vasa disscissa se contrahunt, & cessat omnis sanguinis effluxus. Interim sanguis in thoracis cavo hæret, qui ibi manens corrumpitur, & vicinum pulmonem exedens lenta, tæbe hominem conficiet. Idem in abdominis cavo verum est. Sed paracentesis in thorace & abdomine institui potest, & sic effusus sanguis educi, omniaque hæc mala præcaveri. Si vero ureteri, vel vesicæ fundo, tale fuerit insitum vulnus, ut urina in cavum abdominis effluat, parerit facile, urinam, jam ex sua indole in putredinem pronam, longe citius putrescere, hincque omnia contenta abdominis lædi summopere. Sed poterit, perforato abdomine educi omne, quod ibi collectum hæret liquidum,

& cathetere flexili vesicæ immisso impediri, ne urina in vesicæ cavo colligatur, sicque illam dissendat; unde, contracta semper manente vesica, vulnus intusculum facilius consolidabitur. Si vero ureter disscissus fuerit, educa prius urina in cavum abdominis effusa, siccissima tunc diæta adhibeatur, magna spes est, ureteris extremum abscissum consolidari posse. Peribit quidem sic usus renis, sed plurima docuerunt observata, alterum renem posse vires supplere, integra satis sanitate. Calculo enim impacto & obstruente omnino ureteris unius cavum, constitit, homines diu supervixisse, altero rene integro, & tunc plerumque multum aucto in mole sua.

Novimus autem urinam in cavum abdominis effluere, ex vulneris loco, si nulla vel paucissima tantum emingatur urina, & tumore quotidie aucto dissendatur abdomen.

Idem jam & in quibusdam vulneribus intestinorum verum est, de quibus postea dicetur in vulneribus abdominis.

## §. 172. **P**radicitur lethale fore ex non lethali ( 153. ) per has causas.

1. Omissione purgationis effusi puris, unde tabes purulenta; vel effusi sanguinis, hinc putrefacti.

Sub hac classe comprehenduntur illa vulnera, quæ tales lædunt partes, quarum integritas tolli potest, supersistere vita; post quæ vulnera tamen mors aliquando sequitur, non ex vulnere ut causa, sed quia vulnerati incuria, vel medentis errore vel imperitia, vel alio morbo, non a vulnere orto, vel denique propria vulnerati idiosyncrasia, talis accidit mutatio in corpore, unde functiones ad vitam requisitæ abolentur. Possunt autem hæc commode reduci ad quatuor sequentia capitula.

**OMISSIONE PURGATIONIS EFFUSI PURIS, UNDE TABES PURULENTA.** Ex illis, quæ dicta sunt §. 158. Num. 7. constitit, in omni vulnere alicuius momenti pus nasci; imo hoc requiri, ut sepatentur illa, quæ vulneris consolidationem impedirent. Si jam vulneris talis sit conditio, ut pus factum in vulnere decidat in cava corporis loca, vel, nimis diu relictum in vulneris

superficie, attenuatum resorbeat per aperta venarum orificia, poterit totus sanguis insci purulenta cacochymia, unde febris hæctica, & lentus marasmus. Si jam apparet, pus in cava corporis loca delapsum potuisse sine periculo educi, vel puris resorptionem potuisse impediri idonea vulneris depuratione, constat, mortem secutam non adscribendam esse vulnere, ut causæ, sed omissioni purgationis puris effusi. Dum post magnas exsuffipationes latum vulnus quotidie ingentem copiam puris colligit, magna sæpe oritur in cura difficultas: si enim sæpius de die depuretur vulnus abstergo pure, impeditur consolidatio vulneris, quod tunc in foniculi quasi naturam degenerat, & incredibilem copiam liquidi plorat; sicque ægri marasmo vero contabescunt, nullo vitio hærente in humoribus vel solidis partibus, tantum ideo, quia nimia puris confectione tantum perditur

de corporis nutrimento, ut marcescant reliqua. Si vero diu rectum maneat vulnus, retentum in superficie vulneris pus, mora & calore corporis attenuatum & acrius redditum, reforescet venosis oculis apertis, miscetur sanguini, purulentum cacochymiam & tabem inducit; vel per metastasin ad viscera nobilia delatum necat. Qualia exempla plurima frequenter in praxi occurrunt.

VEL EFFUSI SANGUINIS, HINC PUTREFACTI. Dixerat Hippocrates ( *Aphor. 20. Sect. VI. Tom. IX. pag. 259.* ). *Si in ventrem sanguis effusus fuerit preter naturam, necesse est suppurari.* Galenus ibidem in commentariis suis monuit, quosdam hunc Aphorismum legere sic, ut non haberetur ἢ τῷ κοιλίῃ sed sine articulo ἢ κοιλίῃ, & tunc significaretur sanguinis effusio in quodcumque cavum; addiditque, illorum sententiam confirmari, quia additur in hoc Aphorismo *preter naturam*. Tuncque sensus huius Aphorismi esset, quod sanguis ex suo loco naturali effusus in quodcumque ca-

vum corporis suppurari deberet. Mouit etiam ibidem Galenus, supurationis nomine hic intelligi omnem sanguinis corruptelam, non autem tantum convesionem in pus proprie dictam. Si aeri liber accessus detur, sanguis in cava corporis effusus putrescit satis cito, & corrumpendo vicina viscera; vel reforescit putrida acrimonia destruendo tenuissima vitalium vascula, mortem infert. Si vero aeri nullus accessus detur, diu sine corruptione manere potest, imo sensim attenuatus iterum resorberi sine noxa, uti saepe post validas contusiones apparet, quando sanguis, vasis fractis sub cute integra effusus, per mensem & ultra sepe haret; sensim iterum disparens sine ullo malo. Ubi ergo sanguine effuso in cava corporis, aeris simul libero accessu facto, mors sequitur; & in cadavere non invenitur vulnus fuisse ex sua natura lethale, mors adscribenda est huic causae: si nempe per artem tuto sanguis effusus potuisset educi.

## 2. Commisso vitio in sex rebus non naturalibus.

Ex Pathologicis notum est, res non naturales dictas in sex classes dividi, sunt enim: aer; cibus, potus; motus, quies; animi affectus; retenta excreta; sonitus, vigilie. Hoc autem nomen vocantur, quia usu vel abusu, bonae naturales, aut male contranaturales fieri queunt: Prudens Medicus omnia haec dirigit, a nocituris abstinere jubet vulneratum, profutura commendat. Si jam vel Medici incuria, vel vulnerati obedire nolentis culpa, committantur vitia in usu sex rerum non naturalium, potest vulnus, minime ex sua natura lethale, sic mutari, ut mortem inferat. Innumera habentur apud Autores observata, quae hoc probant evidentissime: pauca quaedam notasse sufficiat.

Dum in castris vulneratos milites curabat Parvus, doluit quam maxime, quod ad singulas tormentorum bellicorum explosiones vulneratis recrudesceret haemorrhagia: imprimis autem inde ladebantur illi, qui capitis vulneribus decumbabant: unde omnia augebantur symptomata, & mors accelerabatur plurimis ( *Les Oeuvres d'Ambrise Paré Liv. X. Chap. XIV. pag. 231.* ) Puero annorum quatuordecim bregmatis os fractum fuerat, extracta fuerat officula quam plurima, febris, dolor & reliqua

symptomata cessabant, spes optima integra curationis affulgebat. Pater pueri, quamvis severissime prohibuissent Chirurgi, prope cubiculum decubentis permisit rusticis debacchantibus, ut tympana pulsarent, fistulas inflarent, saltarent &c. Postridie miser puer acutissima febre, delirio, spasmo, nausea corripiebatur, & quarto post die mortuus est. Pater, re ad magistratum delata, graviter multatus fuit ( *Hildan. Observ. Chinarg. Cent. 1. Observat. 20. pag. 25.* ). In simili casu, dum decimo quarto post vulnus capiti inflatum die omnia se optime habebant, subita commotus ira puer, valida corripitur febre, & phrenitide periit quarta die postea ( *ibid. Observ. 17.* ).

Nobili viro laeva manus amputata fuerat a dexterrimo Chirurgo: vulnere jam fere sanato, uxorem interpellavit: illa a Chirurgo monita recusavit: vulneratus sine coitu semen emisit; protinus recidit in febrem, deliria, spasmos, & alia gravia symptomata, & quarta die obiit ( *ibid. Observat. 25.* ). Ex his observationibus satis patet, quanta cum cautela trastandi sint gravibus vulneribus decumbentes, quam severe monendi, ut obediant, nisi temeritatis poenas mortis periculo luere velint.

## 3. Neglectu, vel errore Chirurgi.

Observationes medicæ plurimæ docuerunt, & quotidiana exempla confirmant, capitis contusiones & levia satis vulnera, dum negligentius tractantur, dira symptomata, & mortem ipsam produxisse. Quot perierunt vulnerati hæmorrhagiis, qui servari potuissent, si arteriarum trunci, in locis illis ubi nulli fere hærent, idonea ligatura compressi fuissent! Quantus numerus vulneratorum perit post conflictus bellicos, dum Chirurgi obruti multitudine negligentius tractant singulos! Nec minor vulnerorum pernicies turpibus debetur erroribus. Militis dextro pectori sub mamma magnum infligitur vulnus: sanguinem cum tussi per os rejicit: imperitus Chirurgus vulneris labia futura unit: sequenti die advocat Paræus: invenit febrem validissimam, respirationem & loquelam difficillimam, sic ut mortem inflare merito metueret. Discedit ilico futuram, digito per vulnus immisso thrombum vulneris orificium obturantem removit, elevatis pedibus, capite denitro, clausit ore & naribus vulnerati eduxit de pectoris cavo octo uncias sanguinis jam corrupti & foetentis; iniectionibus dederit thoracis cavum, & eduxit residuos grumos, sicque ultra spem vulneratus convaleuit: qui prioris Chirurgi turpissimo errore periisset certissime (*Les Oeuvres d' Ambroise Paré Liv. X. Chap. 32. pag. 251.*). Quam horrenda aliquando orta sunt mala, dum caustica æterna tendinosis & membranosis partibus applicuerunt Chirurgi. Exci-

derat barbitonfori tuberculum ad apicem dextri pollicis Hildanus: rudis ille sibi persuadens radicem mali nondum esse extirpatam, crudo vulnere nonnihil Arsenici applicuit: mox dolor ingens, febris, vigiliæ, anxietas, animi deliquia, corripuerunt incautum, sic ut de vita periclitaretur: tamen evasit, sicque in propria pelle didicit, in aliena cautius postea mercari (*Hildani Observ. Chirurg. Centur. VI. Observ. 80. pag. 607.*). Habetur & ibidem aliud exemplum mortis secutæ, in robusto Helvero, medio ætatis flore, ab imprudenti applicatione Arsenici ad tumorem cancerosum manus carpum obidentem. Nec solis rudibus in arte hominibus contingant errores, sed & exercitatissimi aliquando doluerunt, talia sibi accidisse. Ut hoc demonstraret, sufficit folius Hippocratis exemplum, qui ingenue fateatur, se deceptum fuisse, dum in capitis vulnere non distinxerat ossis lesionem, putans futuram esse, & hinc crediderat ægrum sectione non indigere, qui decimo sexto die periit, sero nimis adhibita sectione (*Hippocr. Epid. Lib. V. N. 22. Tom. IX. pag. 340. 341.*). Dum Medicorum principi tale quid accidere potuit, unusquisque nibil humani a se alienum credat, sed omni cura adhibita errores prudenter evitet. Si jam talis error a Chirurgo vel Medico commissus detegatur, acquiescat jubet, ut Judicibus indicetur, ne alieni erroris penam luat ille, qui vulnus infixit.

## 4. Temperie naturali aut morbosa ægri, vel manifesta juxta historiam ejus ægri, vel aliquando adeo singulari, ut non nisi hoc eventu se manifestet. Quam intentus observet semper in suo rescripto ad Judices consultus Medicus.

Maximi momenti est in vulnerum renunciatione ad ipsam temperiem vulnerati attendere; & tamen hoc sæpe vilipenditur omnino: In plurimis locis publica auctoritate constituti sunt quidam Medici & Chirurgi, qui cadavera occisorum lustrant, & illa, quæ videntur, ad Judices renunciant. Sed Medicum vel Chirurgum, qui vulnerato adfuit, sapissime non consulunt, ut ex illis cognoscant, quid de ægri temperie, morbis prægressis, symptomatibus post vulnus inflictum secutus &c. observatum fuerit. Omnia tamen hæc videntur admo-

dum necessaria esse, ut fidelis fiat de vulnere renunciatio. Multi enim homines adeo facile irritabile habent totum systema nervosum, ut levissima de causa spasmo, tetano, similibusque malis corripiantur: Alii, dum sanguinem alieno de vulnere exsurgentem vident, in syncope delabuntur. An non admodum probabile videtur, etiam a levi vulnere in talibus hominibus gravissima symptomata, imo mortem ipsam produci posse? An mors secuta tunc soli vulnerei ut causæ adscribi debet? Perfarum Rex ludens cum concubina, quam maxime de-

peri-

peribat, pugionis aciem versus ejus præcordia dirigit, dumque illa nudum pectus simularis ictibus exponit, stomacho læditur, sed exiguo sane & oculis vix conspiciendo vulnuculo. Tamen repente prolapsa citius expiravit (*Amarit, exoticar. Engelbert. Kempfer. pag. 59.*). Præterea in nonnullis morbis circa finem viæ nihil fere sanguinis superest in corpore: sic in pthisicis post mortem sæpe paucæ tantum nigræ sanguinis inveniuntur. Si jam tali homini per leve vulnus pauculum illud, quod superest, sanguinis subducatur de corpore, certa mors sequetur, sed non pendens a solo vulnere. Notum est, Lucem Veneream, & scorbutum pessimum, ipsam durissimorum, in corpore ossium substantiam sic erodere, ut penitus cariola facta a minima vi frangantur; si ergo in tali casu calvaria levi percussione capitis fracta mortem fecerit, non pendebit hoc a sola causa vulnerante. Sed hæc & alia similia cognosci possunt ex illis, quæ in ægri corpore observata sunt, antequam vul-

§. 173. **H**inc renunciatio de Vulneribus, definitio temporis, intra quod lethalitas determinatur, peti possunt.

Judices, antequam de pœna percussoribus infligenda decernant, solent Medicis ac Chirurgis committere curam, ut in cadavere occisi inquirant, an mors, secuta post vulnus, a vulnere facta fuerit. Illi accurate notant, quas corporis partes per vulnus læsas invenerint; deinde communi consilio concludunt, an vulnus fuerit absolute lethale, an vero ex sua natura quidem lethale fuerit, per artem tamen hodie cognitam mors præcaveri potuisset; denique an vulnus læserit tales partes, quarum integritas non absolute ad vitam necessaria erat, & tamen ex singulari idiosyncrasia vulnerati vel incuria, vel neglectu aut errore illorum, qui curæ vulnerati præfuerunt, mors secuta fuerit. Hæc omnia retribunt ad Judices, & hæc vocatur renunciatio de vulneribus. Apparet hinc, quanta cautela hic opus sit, dum imperiti sæpe, quando cadaver examinant, non tam iustitiam, quam faciunt. Quantum fieri potest, inquirendum in figuram & magnitudinem instrumenti vulnerantis; in situm vulnerati & vulnerantis dum vulnus infligebatur: in symptomata omnia, quæ vulnus infligendum ad mortem usque secuta sunt.

Tom. I.

nus infligendum fuerit. Forte longe alia latere possunt, quorum nullum unquam apparuit indicium, & quæ tantum vulneris infligendi occasione manifestantur. Dum enim evolvimus illa, quæ in cadaveribus repentina morte extinctiorum invenerunt Obsevatores, videmus sæpe a latentissimis causis uno instanti mortem secutani fuisse; cum tamen nihil in sanitate læsum ullius momenti apparuisset ante mortem. Si jam tali homini paulo ante mortem vulnus infligendum fuisset, perperam adscriberetur vulneri mors secuta, pendens ab alia longe causa. *Fine namque vite nostre variis & occultis causis exposito, interdum quedam immutentia supremi spiritus titulum occupant: cum magis in tempus mortis incident, quam ipsam mortem accersant* (*Valer. Max. Lib. IX. cap. 12.*). Unde in similibus casibus debet renunciari ad Judices, vulnus inventum fuisse tale, ut mors secuta post vulnus, non videatur adscribi posse vulneri ut causæ. Sic suo munere functi sunt Medici & Chirurghi, reliquum ad Judices pertinet.

Præterea considerata sunt omnia illa, quæ vulnerato acciderunt, vel applicata fuerunt, postquam vulnus infligendum fuerat. Tunc denique prudenti sectione investigatur, quousque & per quas partes penetraverit instrumentum vulnerans. Tandemque ex cognito usu partium læsarum concluditur, an mors secuta adscribi debeat vulneri infligito ut causæ, an non.

Non videtur autem facile determinari posse, quo temporis spatio lethalitas vulnorum limitetur. Plurimis hominibus inedit hæc opinio, quod si ultra novem dies supervixerit vulneratus, tunc mors postea secuta minime possit vulneri adscribi; & contra, si ante hoc tempus moriatur vulneratus, tunc vulnus infligendum fuisse necessario & absolute lethale. Sed arteria major, in brachio vel crure difflisa, poterit paucarum horarum spatio, imo & citius, hominem e medio tollere; cum tamen hoc vulnus non absolute lethale sit, sed per artem curari potuisset. Sic & effusus in calvaria sanguis, si hæreat tali in loco, ex quo per artem educi nequit, nec tamen tanta ejus copia sit, ut comprimendo omnem encephali usum statim turbet;

N 3

potest

potest ibi per septimanas hætere, sensim corrumpi, & dein eraso cerebro, cerebello, vel medulla oblongata, mortem facere: & tale vulnus jure merito lethale renunciabitur, licet tam diu supervixerit æger. Si intestinum tenuius integre discissum fuerit in loco non admodum distante a pyloro,

poterit vita protrahi per multos dies, donec nutritionis defectu sensim contabescat vulneratus; & tamen tale vulnus erit absolute lethale. Ex quibus satis apparet, nihil certi posse definiiri quoad vulnorum lethali-tatem ex temporis intervallo, quod vulnus inflictum & mortem secutum intercessit.

§. 174. **E**X historia pariter Vulnerum ( ab 145. hucusque ) facilis erit prædictio eventuum aliorum, qui ( 169. ) præfagiendi habentur.

Paragraphus 169. agebat de Prognosi vulnorum: ibi enim determinabantur illa, quæ vulnere cognito, tanquam sequela hujus, præcognosci poterant futura. De vita vel morte vulnerati dictum fuit §. 170. 171. 172. Reliqua circa sanationem possibilem vel impossibilem, facilem curationem vel difficilem, & effectus vulneris post ipsam sanationem supersites, ex ipsis vulneris natura bene cognita evidenter deducuntur. Dum enim quis ex Anatomicis & doctrina usus partium intellexit, quænam partes læsæ fuerint, quænam functiones abolitæ vel depravatæ sint, poterit determinare, an curatio possibilis sit vel non, an facilis vel difficilis, an aliquid læsum manebit in functionibus post sanatum vulnus &c. In Exemplo res patebit. Si vulnus inflictum fuerit dorso manus, novit Medicus ex

Anatomicis tendines musculorum digitos extendentium hic locari, jubet vulneratum digitos erigere; si jam videat, quod indicem omnino erigere nequeat, concludit, tendinem, ex unitis tendinibus musculi extensoris communis & indicatoris dicti musculi constatum discissum esse: si jam possibile sit, tendinis dissecti extrema posse iterum adduci, & uniri sibi invicem, curationem difficilem, integram tamen, promittere poterit. Si vero hoc fieri nequeat, tuto prædicet, curato vulnere indicis erectionem abolitam fore semper, nec ulla arte restitui posse. In similibus præfagiendis cautum imprimis esse oportet & Medicum & Chirurgum, quia omnia mala, quæ post entationem vulneris remanebunt, illis adscribentur, nisi antea præmonuerint, hæc certo remansura, vel saltem metuenda esse.

§. 175. **P**Hænomenon autem ( 148. 159. ) causa patet perito actionum vitalium, & animalium. Vid. Morb. Solid. & fluid. in genere præmissos.

Omnia hæc in paragraphis citatis ad singulos numeros explicata fuerunt, summam tantum hæc repetere sufficiet. Patuit enim quod illa vis, quæ coherabant partes unitæ, pergens agere retrahat utrumque extremum; hinc necessario augebatur vulneris hiatus, eo magis, quo firmior fuerat antea partium cohesio: hinc in robustis & exercitatis hominibus vulnorum labia omnium maxime a se mutuo recedunt. 2. Minuta causa diffidentem vasa, per liberum sanguinis effluxum ex iisdem vulneratis, propria contractilitas vasorum prævalebat sensim magis & magis, donec integre fere clauderentur. 3. Sanguinis autem nostri talis indoles est, ut extra vasa dimissus cito concreascit, unde a sanguine extravasato, dispersa simul liquidissima parte, crusta talis sanguinea vulneris

cavo innascebatur. 4. Contractis autem vasorum discissorum aperturis, crassissima pars retineretur, tenuior adhuc pergit effluere; unde liquor dilutus rubellus effluit, postquam sanguinis fluxus definit. 5. Cum autem vasa sanguinea discissa sic contrahantur, ut non amplius sanguinem rubrum dimittant, idem fiet in serosis, lymphaticis, & aliis decrefcentium vasorum seriebus; unde nascetur horum vasorum obstructio, & vitali impetu a tergo urgente in obstructos vasorum fines, fiet horum dilatatio, & omnia quæ inde sequuntur, ut inflammatio, dolor &c. Interim laxa pinguedinis membrana, cutis coercentis vinculo libera in vulneris loco, sponte assurgit in vulneris fundo, dilatabitur, & prominebit, labia vulneris retrahet &c. 6. Si autem vulnus fuerit alicujus momenti,

a do-



a dolore & inflammatione fundi & laterum orietur febricula, quæ suppuratoria. Chirurgis dicitur: quæ si non nimis vehemens fuerit, semper boni ominis est. 7. Hinc runc labia & fundus vulneris antea sicca & inflammata sub hac febricula incipiunt humescere, tenue liquidum fundere, quod mora & calore mutatum, distillata parte liquidissima in blandum, spissum, cremoraceum quasi humorem transit, pus dictum. 8. Simul extrema vasculorum inflammatorum officina, una cum immeabili liquido, obstruente, separantur, una cum humoribus effusus miscetur, & pus constituitur; sic vas iterum liberis redditus, separato

omni illo, quod vitali humorum circuitui resisteret, liber fit humorum transitus; calor, dolor, tumor &c. cessant, vel minuantur plurimum. 9. Puris sic redditus per supurationem fundo & labiis vulneris, natura, quæ sibi sola sufficit, a fundo sursum, ab ambitu versus centrum extendit vasorum extrema, occurrentibus aliis unit, sicque restituit illa, quæ in vulnere de corporis substantia perita erant. 10. Incipiunt dein margines vulneris album subcarnulecentem colorem induere, sicari, cicatricem facere, quæ ab omni ambitu centrum versus aucta quotidie, tandem vulnus claudit: tunc sanatio perfecta est.

§. 176. **T**unicæ arteriarum exteriores, illæ interiori, punctæ, sectæ, tussæ, distrahæ, erose, impetu sanguinis dilatantur, saccum formant, qui ad ovi sæpe magnitudinem crescit; callosos parietes accipit; pulsatur; colore rubello splendet; compressus evanescit; laxatus redit; suam arteriam ampliatur; vicina vasa comprimendo angustat. Aneurisma verum vocatur (180.), cujus causa, signa, effectus sponte cernuntur. Atque eo quoque refertur cordis aneurisma, ejus ortus, signa, & effectus.

§. 159. & 160. dictum fuit, quænam sequantur mala, quando arteria integre dissecata est, vel quando vulnus in cavum utque arterie penetrat, licet illam integre non discederit. Hac paragrapho expenduntur illa mala, quæ metuenda sunt, quando arterie sic vulnerantur, ut vulnus non penetret in illarum cavum, sed tantum tunicas exteriores dividat. Constat enim ex Anatomicis, arterias, majores imprimis, satis crassas habere tunicas, quarum exterior plerumque communis membranz, cavum corporis, per quod arteria pergit, investientis propago est; cui cellulosa tenuis subjacet, per quam vasa plurima, arteriarum nutritioni inservientia, decurrunt: hinc glandulosa dicta supponitur, forte prioris pars: tunc sequitur muscularis tunica, crassa & fortis, in plures lamellas separabilis, orbicularibus fibris constans: ultima, internum arterie cavum constituens, tenuis est, fibris longitudinalibus constata.

Dum sanguis vi cordis in arterias semper plenas pellitur, observatur manifeste illas dilatarî per totum ambitum æquabiliter: firmitas tunicarum arteriam constituentium resistit nimis dilatationi; & cessante cordis actione vi orbicularium imprimis fibrarum contrahuntur iterum in præstitam dimensionem. Si jam in quodam

arterie loco, separata cohesione imprimis fibrarum orbicularium (nam læsio tunicæ externæ & cellulose videntur minus periculose) minuarur firmitas laterum, causa dilatarens manens eadem illo in loco plus dilatabit arteriam, marabit æquabili figuram conici canalis, expandet locum illum debilitatum in saccum: tunc vocatur *Aneurisma verum*, propria vocabuli vi designans tantum dilatationem arterie.

Causa ergo aneurismatis est omne illud, quod cohesionem tunicarum in quodam arterie loco minuit: & observata docuerunt, hoc imprimis accidere dum arterie sunt *punctæ vel sectæ*, uti sæpius constat. Dum enim venâ secatur, accidit aliquoties, ut adjacens arterie ramus lanceolæ cuspidæ simul vulneretur: paucis diebus postea incipit tunc emergere tumor cutim elevans, pulsans manifeste, auctus quotidie, nisi in initio circumductis fasciis & splenio applicato compescatur.

**Tussæ.** Et hoc observatum fuit, validam contusionem arterie produxisse aneurisma. Homo 45. annorum sanus & fortis, cum per publicam viam incederet, fortuito a quodam ex ludentibus sphaera buxæ vehementer percussus fuit in læva dorsi parte; domum redux partem læsam diligenter observari curat; præter contusionis

indicia nihil mali invenitur, sed manifest per quatuor annos leviter molestus tantum in loco percussio sensus. Post tantum temporis intervallum, incipit congeri de profunda pulsatione in illo loco, sensim aucta, quæ cordis ictibus respondet: paucorum mensium spatio elevatis & corollis costis, cum dolore acerbissimo luctabatur æger. Audacissimus Empyricus speruassit mifero, profundum latere abscessum, aperuit locum, undatim profuso sanguine illico mortuus est (*Lancisius de motu cordis & aneurismatibus pag. 275.*). Similem casum vidi, ubi a sola contusione aneurisma ortum fuerat. Homo pulsatæ staturæ, vesperi per tenebras incedens, palo impingit validissime dextrum pectus; acerbum dolorem se in suprema pectoris regione sensisse testabatur, qui tamen brevi postea cessabat. Post aliquot menses insolitam pulsationem incepit sentire sub dextra clavicula; sensum auctam; a minimo corporis motu anhelabat, imo sub finem vitæ fere suffocabatur: sic per annum languens subiro periiit. In cadavere, vidi arteriam subclaviam dextram in saccum ingentem dilatatam, sic ut aneurismatis huius membrana chartæ tenuitatem superaret, & per illam pellucidam contentus sanguis conspici posset: levi vulnere inflicto, ingens copia sanguinis congeri erupit.

**DISTRACTÆ.** Plurima talia occurrunt apud Observatores exempla, dum post validos nixus, pondera ultra vires sublata, stentationem, tussim validam &c. arteriæ distractæ in Aneurismaticos saccos degeneraverint. Unicum exemplum adduxisse sufficiet. In venatu homo subitissime caput in dextram partem flexit, & non nisi magna cum difficultate illud potuit reducere; ab illo momento languit semper, & deslutione, & respiratione multum impeditis. Post quindecim menses elapsos moritur: in cadavere reperitur aorta admodum dilatata, & ingens saccus aneurismaticus in arteria subclavia dextra (*Acad. des Sciences l'an 1700. Hist. pag. 50.*). Equi illi, qui in magnis Emporiis trahis illis tam magna pondera vehunt, & per acclives pontes soleis ferreis, eminentibus aculeis donatis, tanta vi ascendere coguntur, sæpissime in cruribus posterioribus habent aneurismata, & varicosos venarum tumores. Simile infortunium & in bajulis frequenter observatum fuit.

**EROSÆ.** Novinus, in morbis adeo degenerare posse humores, ut acerrimi facili durissimas etiam partes corporis erodant. Scorbuto durissimi eroduntur dentes; lues venerea maxima & fortissima etiam corporis ossa in cariem convertere potest; cancerum virus vicina somnia dira rabe peredit. Sic in scorbuto videmus toties, exfessis vas, effusum sub corporis integumentis sanguinem lividas illas maculas facere; imo toties lethales inde factas hæmorrhagias notant Auctores. Intelligitur hinc facile, tunicas majorum arteriarum sic erodi posse, ut in saccum aneurismaticum extendantur. Bina talia habentur apud Lancisium (*De motu cordis & aneurismatibus pag. 256.*) exempla, ubi tumor Veneris claviculam occupabat, & vicina arteria subclavia erosa aneurisma nascebatur.

A quacunque jam ex narratis causis arteria in quodam loco debiliore facta fuerit, illo in loco plus cederet dissidenti sanguini, & expandetur, cumque singulis cordis ictibus causa illa dissidens applicetur de novo huic loco debilitato, augebitur aneurismatis capacitas, unde in immanem molem sæpe aneurismata expanduntur, imprimis si in magnis arteriarum truncis fiant. Sic vidit Ruyschius (*Observat. Anatom. Chirurg. Observ. 38.*) hominem, qui in pectore gerebat sponte factum aneurisma tantæ magnitudinis, ut pulvisar mediocre, quo in sedili utimur, (demis quatuor angulis, rotundum enim erat,) æquaret. In cadavere apparebat, aortam tribus digitis transversis supra cor, in tam magnum aneurisma degenerasse. In maximis aneurismatibus sæpe apparuit, membranas extensis talis sacci esse crassissimas, cum potius videretur distracta membrana tenuiori fieri debere. Hoc autem videtur fieri, quia sanguis in dilatatum hunc saccum aggestus in polyposas concrevit massas, quæ applicatæ tunicæ arteriæ dilatatæ illius crassitiem immanner possunt augere: sic in ingenti illo aneurismate vidit Ruyschius, innumerabiles tunicas, crassas, carnosas, satis tenaces, & ibi invicem impositas auxisse crassitudinem membranæ, sic ut inter has tunicas sanguis copiosus & coagulatus delitesceret: exterior tamen tunica, quæ aortæ dilatata membrana erat, straminis rarum crassitiem habebat, omnis reliqua moles a concretioibus illis polyposis pendebat.

Quæ-

Queritur quam maxime, quibus signis cognosci possit, & ab aliis tumoribus distingui, Aneurisma? cum observata plurima docuerint, satis ceteroquin peritos hic turpissime erravisse, & imprudenter persuaso aneurismate pro remedio mortem intulisse. Cognoscitur adesse, si causæ memoratæ prægressæ fuerint, tumor diu oriatnr in tali loco, ubi per Anatomen novimus magnam arteriam adesse; si pulsus manifestus in tali tumore percipitur; si leni pressione evanescat vel minuiatur plurimum, mox redeat ad pristinam magnitudinem, ubi pressio cessat. Notandum autem, colorem cutis raro murari ab aneurismate, nisi diu duraverit, & nigrum valde fuerit; tunc enim erosa, vel per distractionem attenuata cute, color ruber conspicitur. Præterea pulsus in Aneurismate incipiente & parvo semper adest, ubi iam maiorem molem excrevit, sæpe pulsus non animadvertitur: partim ob crassiores factas aneurismatis tunicas; partim quia impetus sanguinis a corde propulsi non adeo valide agere potest in magnum Aneurisma, ut illud elevetur singulis cordis ictibus. Dum autem comprimitur aneurisma, imprimis si magnum fuerit & cordi vicinum, nisi lenissime & sensim fiat, summum discrimen est, ne subito suffocetur æger; dum concretus sanguis ex aneurismatis cavo expressus, sanguini ex corde per arteriam pulso sic resistit, ut cordis motus suffocetur subito: nec magnum Aneurisma compressum manu simul & semel liberandum est, sed sensim, aliter in animi deliquium cadunt, sanguine subito in vacuum hunc saccum ruente. Ideo compresso aneurismate maiori, statim ægri de intolerabili oppressione circa pectus conqueruntur. Ubi autem Aneurisma in interioribus latet, difficiliter cognoscitur. Causæ tamen cognitæ si prægressæ fuerint, insolita pulsatio percipitur ab ægro; cordis motus turbetur, & aucta sanguinis velocitate per motum muscularem, vel aliam quamcumque causam, suffocetur sere; admodum probabilis suspicio habetur, Aneurisma in interioribus corporis partibus latere.

Mala autem producta ab Aneurismate pendent inde, quod tumore suo vicina comprimendo illorum actionem turbet vel impediatur, quod arteriæ cavum mutet, & æquabilem sanguinis circuitum per illam tol-

lat; unde & cordis actio tandem multum impeditur. Hinc apparet, diversissimos morbos ab Aneurismate posse fieri; omnia tamen mala inde orta semper eo pejora fore, quo Aneurisma majus, & cordi magis vicinum fuerit.

Altera malorum, ab Aneurismate factorum, origo pendet ex eo, quod liquidum in sacco Aneurismatico contentum incipiat degenerare. Sanguis enim in Aneurismate majore sere quiescit, saltem tardius movetur: hinc minus atteritur, minusque calet; sicque nascitur dispositio ad illam sanguinis degenerationem, quæ fit a minuto motu & calore. Incipiunt nempe nasci polyposæ concretiones; quæ semel natæ habent vim associandi sibi ex sanguine affluente similes partes ad augmentum prioris massæ, ut dictum fuit (§. 52. Nr. 2.). Unde in majoribus Aneurismatibus detectis sæpe non invenitur multum sanguinis, sed mira sæpe textura polyposæ ex sanguine stagnante natæ, quæ debilem hunc arteriæ locum suæ substantiæ applicatione sic firmat, ut non tam cito rumpatur, sic ut sæpe diu vita adhuc sustineri possit. Tandem illud ex sanguine concretum, una cum sanguine inter lamellatam polyposam substantiam stagnante, incipit corrumpi, acrimoniam solventem acquirere adeo mirabilem, ut vasa vicina, membranas, cartilagineas, ossa durissima consumat penitus. Historiæ Medicæ plenz sunt talibus observatis. Ruyfchius in observatione paulo ante memorata invenit, ab ingenti illo Aneurismate, omnes sere costas, & sterni os, in nihilum fuisse quasi redacta. Dum autem sanguis corruptum illud, in sacco expansi Aneurismatis hærens, continuo præterlabitur, incipit putrida cacochymia nasci; unde febris hectica sensim corpus depascent oritur. Talem enim habuisse exitum magna Aneurismata, constat ex observatis Medicis; nisi suffocata circulatione, vel rupto Aneurismate, perierint ægri, antequam contenta in hoc sacco ad illam malignitatem pervenerint.

Subitanæ tamen mortis periculum instat, a ruptura talis sacci Aneurismatici, sic enim minuto temporis pereunt, ubi minime cogitatur. Memorabilis talis habetur casus (*Acad. der Sciences* *Pan* 1733. *Memoires* pag. 153.). Militi post violentam tussim tumor oriebatur in parte inferiori, &

anteriori colli, immediate supra sterni emarginatione: mollis erat, rotundus, sine colore cutis mutato; pulsabat, cedebat digito prementi, mox rediens ablata pressione. Per sex septimanas tantum gesserat hoc Aneurisma, inopinatò undatum prorumpente per os sanguine intra spatium unius minuti horæ perit. Post mortem omnis tumor colli evanuerat, & inveniebatur Aneurisma, trachææ adhaerens, per foramen inter sextam & septimam cartilaginem asperæ arteriæ patulum, sanguinem in cavum trachææ effudisse.

Dum Aneurisma in interioribus corporis partibus hæret, ubi non datur manibus accessus, angusta spes curæ est: totum quod fieri potest, est ut debilitata vita per venæ sectiones, & tenuem dietam, minuatur circulationis impetus & velocitas, sic enim Aneurismatis incrementum prohibebitur, quantum fieri poterit; summa simul quiete corporis & animi imperata ob eandem causam. Ubi manibus accessus datur, si nondum in formidabilem magnitudinem increverit Aneurisma, a prudenti compressione aliquid sperari potest: ubi tunc notandum, quod maxime conducatur arteriam supra Aneurisma pariter modice comprimere: sic impetus sanguinis per hanc arteriam minuitur, & compressio Aneurismate non tam facile sanguis regurgitabit cor versus. Ubi a compressione nihil sperari potest, vel frustra jam adhibita fuit; sola Aneurismatis extirpatio sperest, quam feliciter institui posse, docuerunt observata. Talem casum narrat Ruyschius, ubi felix eventus fuit, licet brachium jam gangræna correptum esset (*Observat. Anatom. Chirurg. Centur. Observ. 2.*).

ATQUE EO QUOQUE REFERTUR CORDIS ANEURISMA, EJUS ORTUS, SIGNA, EFFECTUS. Cordis Aneurisma vocatur præternaturalis dilatatio cavitatum ejus: qui morbus satis crebro occurrit, licet forte non adeo exactè descriptus fuerit. Facile conaipitur, quod omnia illa mala possint & cordi contingere, quæ arterias reddunt Aneurismaticas, tunicis illarum exterioribus per vulnera, contusiones, distractiones, erosiones, destructis vel labefactis. Observationes enim, in cadaveribus factæ, docuerunt, vulnera huc penetrasse, inflammationes, suppurationes, erosiones &c. h. c. inventas fuisse. Nauta post febrem continuam, hæmoptysim, difficilem respirationem, tandem post diras toleratas anxietates moritur. In cadavere invenimus

pulmones pure crasso infarcti; Pericardium sanguine grumoso sic distentum, ut dimidium thoracis spatium expleret. Cordis substantia exterior ubique exulcerata, & quasi a vermibus profunde exesa. Imo cor adeo defiguratum apparuit, ut nec auriculæ inveniri, nec vasa egredientia majora facile discerni potuerint (*Acta Physico-Medica &c. Tom. II. pag. 47.*). Sed præter has causas, alia adhuc occurrunt, a quibus frequentius nascitur cordis dilatatio præternaturalis. Cordis enim actio in hoc consistit, ut receptum ex venis in cava sua sanguinem valida contractione urgeat in arterias totum, sic ut singulis cordis contractionibus integre evacuentur cordis cava. Debet ergo cordis vis superare posse resistentiam arteriarum: si autem a quacumque causa auctæ fuerint hæ resistentiæ eo usque, ut cordis vires superent, non poterit cor evacuari integre, accumulabitur sanguis sensim in cordis cavis, quæ inde dilatantur. Sed in corde observatur illa mirabilis proprietas, quæ etiam post mortem, aqua tepida vel statu solo per venas pulsas in ejus cava, excitatur in contractionem: ideo sanguine non integre expulso ex cavis ejus, irritatum cor frequentius contrahitur, ut expellat contenta, uti evidenter apparet in ultima illa mortis lucta, quando cor non amplius valet in arterias sanguinem expellere, tunc enim celerrime palpitat, donec tandem insuperabili victum obstaculo quiescat. Dum autem validis illis & frequentissime repetitis nixibus cor superare tentat has resistentias, fibræ constituentes latera cavorum cordis distrahuntur validissime, dum contentum cavis fluidum, non potens exprimi, compressum instar durissimi corporis resistit: hinc debilitatur fibrarum nimis distractarum cohesio, unde augebitur dilatatio cordis in suis cavis.

Apparet ergo, quod non requirantur adeo magnæ causæ ut cor Aneurismaticum fiat, dum enim cordis vis potest superare resistentias arteriarum, manet æque magnum in suis cavis; simul ac prævalent resistentiæ hæ cordis viribus, incipient dilatarî ejus cava.

Potest jam hæc cordis dilatio fieri vel in solo dextro cavo, impedito libero transfluxu sanguinis per arteriam pulmonalem: vel poterit hoc fieri in corde sinistro, posito impedimento quocumque in arteria aorta: vel dum bina hæc simul concurrunt, dilatatio fiet in utroque cordis cavo simul. Notandum

tamen hoc est, quod, impedimento nato in pulmonari arteria, cor dextrum solum præternaturaliter distendi possit, corde sinistro non mutato in sua capacitate: ubi vero cor sinistrum non valet expellere suam sanguinem, non poterunt venæ pulmonales depleri in cor sinistrum; hinc nec arteriæ pulmonales tradere possunt suam sanguinem venis pulmonalibus: augebitur hinc resistentia cordi dextro, unde & illud ab iisdem causis poterit dilatari. Accedit, quod cor dextrum, longe debilius sinistro, cedat facilius causis distendentibus; unde, & cæteris paribus, frequentius dilatabitur, & in maiorem capacitatem poterit distendi.

Plurima jam observata docuerunt, in cadaveribus cor sic dilatatum inventum fuisse: pauca annotasse sufficiet. Puer jam a quinto ætatis anno asthmate correptus laboraverat, plurimis incassum adhibitis usque ad decimum quartum ætatis annum miseram protraxit vitam, tandem suffocatus periit. In cadavere cor invenitur accretum Pericardio, & cavum utrumque cordis immaniter auctum (*Medical. Essays* vol. 2, pag. 323.). Juvenis post enormes cordis palpitaciones moritur, sinistrum cavum cordis invenitur triplo majus dextro cavo (*Abridgement Tom. V. p. 229.*). Ibidem & ex Dionysio habetur, quod auricula dextra inventa fuerit adeo dilatata, ut recens nati infantis caput æquaret. Homo 34. annorum post validas & diuturnas palpitaciones cordis moritur, invenitur cordis ventriculus immaniter dilatatus, & in sua substantia tamen æque crassus, ac naturaliter esse solet. Aorta erat ossæ facta in ipso egressu ex ventriculo cordis sinistro (*Academ. des Sciences l'An 1735. Histoir. pag. 29.*). Vir 25. annorum, cursor, pallidus, anhelosus, subita laborat angina, a qua sanatur quidem, sed manet spirandi difficultas, & cordis palpitatio sæpe recurrens, imprimis cum citato gressu procederet: tandem subita morte exstinguitur. In cadavere invenitur cor triplo majus, quam naturaliter esse solet; ablato Pericardio, & expresso omni cruore libras duas cum dimidia in lance pendens (*Lancetis de subitaneis moribus pag. 127. 128.*): tamen in hoc homine sinistrum cor dextro duplo latius erat.

Omne ergo illud, quod resistentias sanguini ex cordis cavis pullo augeat, poterit præternaturalem cordis dilatationem producere. Nimia humorum copia in plethoricis; aug-

mentum velocitatis in morbis acutis; immeabilitas sanguinis per arteriarum fines a diathesi inflammatoria, polyposa, atrabilaria &c. vitia arteriarum, per quæ liber sanguinis transitus per illas impeditur, uti sunt illarum nimia callositas, degeneratio in cartilagineam, imo ossæam substantiam, Aneurysmata &c. præcipue causæ sunt, a quibus cava cordis ultra naturalem suam dimensionem dilatantur. Inter rariores autem causas meretur referri; quod aliquando aer in cordis cavis repertus fuerit, immaniter illa distendens. In muliere subito mortua reperitur cor suspende magnitudinis, ab ære, quo plenum erat, absque ulla fere sanguine; id quod palam factum fuisse cunctis, eo enim adueto tam subito subsedit cor, ac versa aorta repleta, & cuspidis cunctis attacta (*Ruyssch. Epist. Problem. 16. pag. 11.*). An forte calore aucto, per velocissimum animale motum, vel & per morbos, sanguis aerem contentum dimittit, quia in cavis majoribus collectus & rarefactus distendit omnia?

Malum hoc præiens, vel saltem metuendum esse, novimus, si continuæ palpitaciones cordis adsint; si signa docuerint, pulmonem impeditum esse sic, ut libere non transmittat sanguinem: si pulsus durus valde & plenus cum anxietate intolerabili ad motum auctum adsint; tunc in aorta obstaculum tale hærere non sine ratione concluditur.

Turbatur tunc miris adeo modis circulatio, oriuntur tam varia & tam stupenda phenomena, ut naturæ leges superare videantur: pulsus vacillat omni modo, nunc deficiens, nunc iterum validissime insurgens; respiratio difficillima fit; terribiles sæpe convulsiones oriuntur, dum cor quiescit, & paulo post validissimo spasmo contrahitur: sic enim uno momento sanguinis motus per arterias encephali cessat, mox velocissimus fit, unde turbatur tam mirifice spirituum secretio & motus. Omnes sæpe sensus externi & interni turbantur, intolerabilis anxietas, & frequentissima fit lucta vitæ cum morte; donec tandem hæc tantis malis finem imponat.

Simul apparet, quare post asthma diu toleratum, & morbos inflammatorios validos pectoris &c. sæpe tam luctuosa mala super-

Ubi natum fuit hoc malum, nihil fere boni sperari potest, semel enim nata debilitate cordis, necessario augeatur difficultas removendi obstaculum, unde crescit atrox ma-

malum, & augentur omnia symptomata, imprimis si vita fuerit actuosior.

Totum, quod ars efficere poterit, est, ut mali incrementum differat aliquatenus, & tolerabilem nagis vitam reddat miseris. Hoc fiet, si vita instituatut adeo quæta, ut non fiat major motus cordis, quam qui ad vitam continuandam omnino est necessarius: absoluta hinc mentis & corporis quies requiritur. Debet ingeri magna copia potus te-

nuissimi, serum lactis, hydrogala mellita, aquæ spadaneæ cum lacte, præcipua sunt. Cibus parvus, blandus, tenuis, repetitis vicibus parca quantitate exhibeatur, ut parum blandi chyli sanguini misceatur, & omnia stimulantia evitanda sedulo. Medicamenta dentur talia, quæ diluant sanguinem, aperiant vasa, lubricent vias; ut expeditissima fiat humorum dilutorum per vasa lubricata & aperta circumductio.

§. 177. **SI** ab iisdem causis, similiter vulnerata arteria, curata debilius firmatur, eadem fiunt. (176.)

Dum in ardentissimis morbis, pertinacissimis & chronicis (maxime capitis) doloribus, arteriam temporalem secant Chirurghi, maximam semper curam adhibent, ut arteriæ vulnus, postquam debita copia sanguinis effluerit, imposita lamella metallica vel simili quocumque sic firmetur, ut sanguinis impetus, arteriam singulis cordis ictibus distendens, non possit incipientis cicatricis rudimenta extendere ultra æquabilem arteriæ dimensionem, & Aneurysma facere: quæ compressio arteriæ vulneratæ si negligatur, fere semper lethale malum fiet. Frequenter hoc observatum fuit, dum infelici casu in flexura cubiti una cum vena pertunderetur arteria vicina, nec idonea pres-

sione firmaretur hoc vulnus: quod etiam multo difficilius hic fit, quam in temporibus, ubi arteria læsa ad durum calvariam sic premi potest, ut nullus maneat Aneurismatis futuri metus. Unde fatis tuto in hoc imprimis observatis demonstravit SEVERINUS (*Marci Aurelii Severini de efficaci Medic. Lib. I. part. 2. pag. 40. &c.*). Videantur & illa, quæ dicta sunt de Aneurysmate ex hac causa nato in commentariis ad §. 160.

§. 178. **U**BI ab iisdem causis (166.) omnes tuniæ simul ruptæ liquorem effuderint in partes vicinas distentas, nec excurrentem, sit collectio extravasati cruoris, continenter auclæ, & sine mensura, mollis, vix pulsans, livida, compressu vix evanescens, brevi putrescens, hinc gangrenam vicinorum creans. Aneurisma spurium est, (160.) cujus causa, signa, effectus ex ipsa hac descriptione cognoscuntur.

Si jam arteria sic læsa fuerit, ut, soluta cohsione laterum, contentus arteriæ cavo sanguis possit exire; cutis tamen integra, vel ejus vulnere per pinguedinem, aut sanguinenti coagulatum oculo, coarctatur effusus ex arteria sanguis; ille viam sibi faciet in panniculo adiposo, quem replebit, & in maximum sæpe tumorem attollere poterit; sanguine enim continuo expulso per arteriam ruptam, augebitur distensio, donec cutis cedere amplius nequeat, vel vicinæ partes impendant ulteriorem sanguinis in panniculo adiposo collectionem; vel coagulati sanguinis thrombus arteriæ læsæ aperturam claudat. Post validas contusiones sæpe maximi tales tumores oriuntur, lividi, imo se-

pe omnino nigri, a sanguine extravasato & coagulato per cutim pellucente. In scorbuticis, erosis vas, similia sæpe mala apparent: sed cum in minoribus arteriis hoc plerumque fiat, non adeo in tumorem attollitur pars, sed maculæ planæ nigricantes nascuntur. Quam enormes autem inde nasci possint tumores, unico exemplo demonstrasse sufficiet. Juvenis septemdecim annorum vulnerabatur sclopeti globulo femur penetrante, ad octo digitorum transversorum distantiam ab inguine. Mox aderat valida hæmorrhagia, quæ apparatu Chirurgico imposito coerceretur: sequenti die apparebat ingens tumor cum pulsū tam validū, ut ambas manus impositas attolleret: sanguis interius per

per vulnus ad tres vel quatuor uncias saepe effluebat; dein sponte iterum sistebatur. Sic ad quadragesimum usque diem ab inflicto vulnere res se habuit. Communi tunc consilio, licet febris & collapsæ vires ægri summum indicarent periculum, conclusum fuit locum affectum apeririendum esse, & arteriam vulneratam ligandam, ut coerceretur hæmorrhagia. Inciso loco, ingens grumosi sanguinis moles in conspectu venit, quam propriis manibus SEVERINUS abstulit, pondere sex libras æquantem: mox arteria vulnerata, hoc pondere comprimente liberata, cum saltu sanguinem emisit. Peritissimus Chirurgus femilaceram arteriam ligavit utrimque, & post sex hebdomadas vulneratus integre sanatus fuit, sic ut femur vulneratum nec mole minus, nec robore debilius manserit (16. pag. 51.). Docet hæc historia, quam immani copia sanguis possit colligi in panniculo adiposo, & quam longo tempore extravasatus sine corruptela maneat, modo aeri non derur liber aditus.

Quia jam tumor talis quædam habet communia signa cum Aneurismate proprie dicto, ideo vocaverunt eodem nomine; ut tamen distinguerent, dixerunt *Aneurisma spurium*. In vero enim Aneurismate tunicæ arteriæ debilitatæ quamvis, manebant tamen coherentes, & sanguinis impediabant exitum; in spurio autem ruptæ tunicæ sanguini liberum concedebant. Vocabulo minus ambiguo utebantur Veteres, dum tale malum appellabant *inxyuasis*, quam plerumque una cum contusione & ruptione incidere dixit Galenus (Method. Med. Lib. I.º cap. 1.º, Tom. X. pag. 79.) quamvis & per anastomosin, diapedesin, & anabrosin aliquando fieri moueat. Tumores minoris molis, ab effuso sub cute integra sanguine, hoc nomine adhuc hodie solent vocare Chirurgi: si a maiori arteria lacerata tumor insignis molis fiat, imprimis si aliquis pulsus in tali tumore percipiatur, solet Aneurisma spurium vocari.

Aneurismatis mentio non fit apud Hippocratem, quantum novi: sed definitio Aneurismatis, quam Galenus habet (De Tumoribus præter naturam cap. 21. Tom. VII. pag. 319.) potius conveniret spurio hodie dicto Aneurismati. Dicit enim: *Arteriæ autem aperte affectus Aneurisma vocatur: sic autem, quomodo illa vulnerata ad cicatricem quiddam, et vasis circumposita cutis, manus tantum*

*vulnus arteriæ, nec coarctans, nec cicatrice obductile, nec carne obstruitur. Signa tamen, quibus hunc affectum distinguit ab aliis tumoribus præter naturam, potius Aneurismati vero conveniunt. Addit enim: Dignoscuntur huiusmodi affectus pulsibus, quos edunt arteriæ; sed & quæ comprimuntur, tumor omnis delitescit, substantia, quæ ipsum efficit, in arteriis recurrende; quam alibi ostendimus, tenuem esse & flavum quemdam sanguinem tenui & copioso spiritui permixtum: hic vero sanguis longe calidior est illo, qui in venis continetur, & vulnerato Aneurismate erumpit, ut vix sisti possit.*

Causa ergo Aneurismatis spurii poterit esse omne illud, quod continuatim laterum canalis arteriosi solvit, integra interim manente cute; vel saltem sic obturato cutis, si addit, vulnere, ut si sanguinis effluentis liber prohibeatur exitus: unde in cellulosam tunicam aggestus tumor distendit partem.

Maximi autem momenti est distinguere Aneurisma spurium a vero: unde signa illa accurare cognosci debent. Novimus Aneurisma spurium adesse, ex causis prægressis, imprimis validis contusionibus, quod longe velocius fit tumoris incrementum in Aneurismate spurio, quam in Aneurismate vero. Deinde quod tumor non ita distinctis limitibus circumscribitur, quia per tunicam cellulosam quaquaversum dispergitur: in Aneurismate vero autem dilatatæ arteriæ tunicis limitatur tumoris ambitus. Præterea Aneurisma verum, saltem in initio antequam in formidabilem molem excreverit, manifestum pulsum, arteriæ pulsibus respondentem, habet; Aneurisma spurium non adeo manifestum, licet tamen hoc aliquando fallere possit, uti in Historia ex SEVERINO modo allegata patuit. Aneurisma verum, nisi jam maximum fuerit, si prematur, omnis tumor evanescit, sanguine pulso in arteriæ cavum: hoc in Aneurismate spurio non ita fit, illud enim pressum cedit quidem, sed tumor tunc in vicinia augetur. Deinde color cuius in Aneurismate vero, saltem in initio, raro vel nunquam apparet mutatus, in Aneurismate spurio sanguis, sub cute effusus, alieno colore cutim derurpat.

Efectus Aneurismatis spurii precipui sunt, quod effusus sanguis mole sua aliena loca occupans vicinarum partium actionem impediatur, & tandem mora correptus talem possit

possit acquirere acrimoniam, qua inflammationes, gangrænas, & erosiones pessimas faciat. Si autem aeris accessus prohibeatur, diu incorruptus manere potest effusus san-

guis, imprimis si talia applicentur fomenta, quæ putredini quam maxime resistunt. De his autem, & de cura similium malorum dicitur §. 334. & seq.

§. 179. **A**lli effectus arteriæ dissectæ majoris (161.) ex physiologia sponte intelliguntur, ut & phænomena (162.) primo nervi dissecti.

Omnia hæc explicata sunt in commentario §. 161. 162.

§. 180. **U**T vero clara causâ habeatur mirabilium effectuum, qui in nervis punctis, vel partum dissectis apparent, juxta dicta (163. 164. 165.) sequentia consideranda ex Anatomicis, & Theoreticis.

Nihil magis mirabile habetur in observatis Medicis, quam quod in homine fanissimo levis punctura nervi turbet omnia in toto corpore sic, ut nihil de pristina sanitate superet. Immanis enim dolor, acutissima febris, deliria, convulsiones, inflammationes, suppurationes molestissimæ, gangræna, mors ipsa sequuntur aliquando leve adeo vulnusculum. Sed & tota historia Medica docet, mutatione levissima nervi inducta, aliquando turbati mirifice omnes corporis actiones.

Titillatio v. g. ad plantas pedum quantas potest inducere mutationes! subsiliunt illico omnes fere muscoli, & tendines totius corporis, invito risu extorquetur, resolvuntur statim omnes vires; atque etiam

convulsiones, & mortem ipsam, a ram levi causâ secutam fuisse constat. Imo semel hanc molestiam experto titillationis minigentatæ similia producunt. Simplex agitatio pluvulæ in naribus, vel faucibus, vermium reptario in ventriculo, pituita ibidem fluctuans, levi tantum mechanica mutatione nervis hic dispersis inducta, totum corpus adeo mirifice turbant.

Quamvis ex fabrica corporis, quatenus hodie cognita est, non possint explicari omnia illa mirabilia, quæ a nervis mutatis fieri in corpore observantur; multum tamen lucis illius cognitio affundet illis malis, quæ nervos vulneratos sequuntur. Unde ex Anatomicis & Theoreticis hæc consideranda sunt.

§. 181. **N**ervus omnis visibilis est fasciculus minorum nervorum, membranulis nexorum, arteriolis, venulis, lymphaticis intertextis, una dein communi membrana vestitus.

Per omnia hæc vascula, nervum componentia, perpetuo fluit liquor suis canalibus proprius a corde, cerebro, cerebello, & medulla spinali. His omnibus vis contractilis facis magna semper adest.

**NERVUS OMNIS VISIBILIS &c.** Agitur enim hic tantum de illis nervis, qui oculis lustrari possunt. In illis autem, ut dictum fuit in commentario ad §. 162. invenerunt Anatomici, quod possit separari in minores alios, qui singuli iterum aliorum nervorum, sed longe minorum, fasciculi sunt. Leeuwenhoekius nervalum, pilo porcino non crassiores, invenit ad minimum constare triginta aliis minoribus, qui singuli propria iterum membrana vestiebantur; idem postea & in longe tenuioribus vidit (Tom. III. Epist. 36. pag. 350. & alibi pluribus locis.). Præterea vidit & vascula tenerrima sanguinea inter medias has fibrillas

decurrentia. Anatomicæ injectiones, in junioribus imprimis corporibus factæ, docuerunt, vasa numerosissima per totam nervi substantiam decurrere. Nervi ergo omnes visibiles minimam partem suæ molis debent substantiæ nervosæ propriæ dictæ, quæ medullæ cerebri & cerebelli, in oblongatam & spinalem dictam medullam collectæ, originem debet. Vaginalæ investientes minores fibrillas, necantes membranales, vasa omnis generis per has dispersa, præcipuam partem nervi visibilis constituunt. Sic defenduntur tenerrima illa, & omnem captum fugientia vascula, & deducuntur tuto ad illa corporis loca, ubi crassiores.



fiotibus involucris depositis nervi munere fungi debent. Nervus opticus, membranis investientibus ab utraque cerebri meningi donatus, in suo decursu tenax & firmus apparet; ubi depositis his involucris in oculi fundo in tunicam retinam expanditur, tam molliis est, ut, nisi equabili pressione ambientis liquidi sustineatur, collapsus informis mucii speciem exhibeat. Per mediam tamen tunicam retinam numerosissima vasa arteriosa dispergi, docuerunt evidenter Anatomice injectiones.

PER OMNIA HÆC VASCULA &c. Omnia hæc vascula, quæ nervum visibilem constituunt, accipiunt liquida, proportionalia vi cordis & arteriarum polsa: de illis autem vasculis, quæ tunicas investientes fibrillas nerveas constituunt, nihil videri esse dubium, cum injectiones Anatomice doceant, arteriosos ramos impulsu liquidum huc deducere. Sed ipsos proprie dictos nervos pervios esse, & perpetuum tenuissimi liquidi per illos motum fieri, non potest ad sensum demonstrari. Si tamen consideretur, medullam cerebri & cerebelli, corrici vasculoso continuatam toram, impendi constitutendis fibrillis nervosis, & in illas continuitatis porrectione abire; tantam copiam purissimi sanguinis arteriosi ad cerebrum ferri; destructa vel compressa me-

dulla cerebri & cerebelli omnem functionem nervorum inde ortorum tolli; nervis in suo decursu ligatis omnem perire actionem sub ligatura, illam vero integram manere supra ligaturam; patebit satis evidenter, nerveas fibrillas subtilissimum fluidum, cerebri & cerebelli fabrica secretum, recipere, & deducere toto vitæ tempore per distinctissimos canaliculos ad singula corporis loca: ut motuum & sensuum adeo distinctæ operationes perfici possint.

Omnis ergo nervus visibilis læsus non patitur tantum, quatenus est nervus, sed etiam quia omnis generis vascula habet, quorum integritas & inde pendens actio per vulnus læditur.

Quia autem in sua origine ex medulla encephali distinctissime fibrillæ nerveæ, in decursu propriis investiantur membranulis, sicque manent separata a vicinis; & totus fasciculus nervorum constituens nervum visibilem involvatur communi tunica savis crassa, patet, quare omnis nervus visibilis tenax & durus appareat, licet illud, quod proprie nervus dicitur, molliissime encephali pulpæ propago sit. Totæ ergo nervi visibilis contractilitas, qua discissi extrema resiliunt, a tunicis nerveas fibrillas investientibus, & vasis per has dispersis, pendet.

§. 182. ERGO partes nervi integre dissecti a loco vulneris versus firmas partes, quibus nectuntur, retrosiliunt, sub solidis ambientibus se recondunt, eorum vi comprimuntur, officia claudunt sua, & suorum vasculorum, adeoque præter dicta ( 162. ) nihil damni

Si jam nervus talis, descriptus præcedenti paragrapho, integre discindatur, tunicæ investientes singulas fibrillas, uti & involucrum regens omnes simul collectas, elasticitate sua & nexu cum vicinis partibus, retrahentur utrimque. Cum vero arteriæ satis etiam notabiles discissæ, retractæ, vicinorum pressione, sub quibus occultantur, & propria contractilitate sic clau-

dantur, ut nihil sanguinis transmittant; patet satis, tenerrima nervosa vascula, uti & illa quæ per horum tunicas investientes feruntur, ilico claudi, nec amplius humores aliaros transmittere posse. Omnes ergo functiones, quæ ab integritate horum vasculorum pendebant, erunt abolitæ; sientque illa mala, quæ §. 162. enumerata sunt.

§. 183. SI sectus, vel punctus ita sit, ut nonnulli nervulorum dissoluti sint, qui uniti majorem componunt, partes solutæ retrocedentes ( 182. ) trahent minimas fibrillas, quæ nectebant nervulos inter se & vascula ( 181. ) unde fiet in his perpetua, lenta laceratio; adeoque dolor ingens, acutus, continuus. Partes vero adhuc coherentes sustinebunt nunc sola omnem vim, quam ante simul, ergo plus distrahentur, & lacerabuntur, adeoque acutissime dolebunt, & distractæ comprimuntur, ut transitus impediatur. Dum una pars soluta, altera pohrens, ita afficiuntur, vascula intermedia comprimuntur; ergo sanguis, lymphæ,

lyphi-

spiritus sistuntur, urgentur, accumuluntur, unde circa partes inflammatio cruenta, lymphatica, & spirituosâ.

Inde nervi vicini, tendines, horum & nervorum vaginæ, muscoli, vasa, tenduntur, stringuntur, convelluntur, hinc cerebri, cerebelli, medullæ spinalis meningē trahuntur, vellicantur, cerebri actio turbatur.

Ex quibus sequitur series omnium phænomenon (163. 164. 165.) naturali necessitate.

Si jam nervus visibilis, constans plurimis nervulis sibi mutuo accumbentibus, proprio involucri vestitis, & una communī membrana tectis, sic lædatur, ut quædam ex his nerveis fibrillis, sua adunatione majorem nervum constituentibus, discissæ fuerint, quibusdam integris relictis, peribunt omnes functiones, quæ ab integritate fibrillarum, nunc a cohesione separatarum, pendebant. Præterea ex dictis §. 158. Num. 1. separata hæc fibrillarum extrema recedent plus a se mutuo, sed hoc non poterit fieri, quin membranae necientes fibras nerveas sibi mutuo accumbentes distrahantur, & lacerentur; sicque acutus & continuus dolor oritur. Fibrille autem integræ relictæ sustinebunt nunc solæ omnem illam vim, quam antea unitæ sere debebant, dum vario musculorum motu, articulorum flexionibus, extensionibus, articularum pulsu &c. mutatur situs partium: necessario ergo magis distrahentur, unde iterum ingens dolor nasci poterit. Si enim concipiat nervus integer constare centum fibrillis nerveis simul collectis in unum fasciculum, & quod per vulnus factum quinquaginta fuerint discissi, reliqui integri duplo plus distrahentur ab iisdem causis, quia dimidium cohesionis, qua resistebant causis distrahentibus, ablatum est. Demonstratum autem fuit §. 112. Num. 3. omnem causam, quæ vasa distrahit & elongat, minuire eorundem capacitatem, hinc obstructionem facere posse: unde iterum sequi possunt infinita mala. Sic incipimus videre, quænam mala fiant a nervis vulneratis, nec integre discissis tamen: discissæ enim partes resiliētes utrimque contrahent officina dissectorum vasculorum, & liberum humorum transitum per illa impediē: eohærentes adhuc fibrillæ minus poterunt resistere causis distrahentibus; hinc elongabuntur, & minuent suorum vasorum diametros: unde & ab hac causa impediatur liber circuitus fluidorum per hæc vascula,

& inde impetu vitalis liquidi a tergo urgente in loca obstructa fiet inflammatio, non tantum in majoribus sanguineis vasculis, sed etiam in reliquis decrefcentium ferrierum vasculis ad ultima subtilissima usque nempe nervosa, idem obtinere poterit. Quam enormes autem inde fieri possint dolores, docent Podagra, Rheumatismus; Arthritis, in quibus morbis tēerrima vascula inflammata exquisitos adeo cruciatus faciunt. Sed natam inflammationem sequi poterunt varii ejus exitus: qui iterum adeo diversi sunt, prout inflammatio in majoribus vel minoribus vasculis hæret. Post phlegmonem blanda suppuratio sequitur; Erysipelas exulceratum, in minoribus vasculis hærens, tenue ichorosum liquidum fundit, Rheumatismus verus suppuratur nunquam; Podagra in subtilissimis nervosis vasculis hærens consumit partes etiam solidissimas in calcem &c. unde iterum immensa mala oriri possunt.

INDE NERVI VICINI &c. Sic factum invenimus corpus humanum, ut unico nervulo læso partes vicinæ, imo aliquando & satis distitæ, afficiantur. Dum dentis adamantina crusta fissa vel corrupta nudaverit fibrillas nerveas subtilissimas, per dentis substantiam interiorē dispersas, frigidi aeris attractus solus intolerabili dolore afficit non tantum dentem affectum, sed & totum latum capitis denti dolenti respondens; & elevantur vicinæ partes sæpe in enormem tumorem: destructo nervo dolente per alcohol applicatum, vel & evulso dente affecto, cessat omne malum. Dum infortunato casu acus infixus indicis digiti ultimæ phalangæ tendinem læsit, mox dolor enormis per totam volam manus, carpum, cubitum, ad humerum usque perrexit, inflammatio sævissima, in subitam gangrænam tendens, omnia hæc loca occupavit: febris acutissima, phrenitis, convulsiones, mors tandem quarta die a tam levi vulnere secuta fuit. Similia plurima exempla apud Hildanum & alios

& alios observatores habentur, ex quibus patet, a levi punctura nervi, vel & tendinis, mox vicina omnia affici, dein corpus turbari in omnibus suis functionibus posse ad mortem usque. An autem propagatio mali in uno nervulo orti ad vicinos omnes & ad cerebrum usque fiat per continuationem membranarum investientium nervos, quæ cerebri meningum productiones habentur; an vero hoc fiat irritatione ipsius substantiæ nervosæ proprie dicendæ, quæ medullæ encephali propago est; hic non disputo: sufficit post negotiorum lesionem similia mala sequi, & forte utraque hæc causa concurrat. Sic membrana renum pelvini invadens per ureteres, vesicam, urethram, continuata propagine de-

fertur; dumque asper calculus in pelvis angustia hærens internam hanc investientem membranam vellicat, dolor sæpe in extrema sentitur urethra, & molestissima stranguria. Dum tendinea illa membrana musculos humeri & cubiti regens lanceolæ cuspidem venæ sectione læditur, dolor, inflammatio & reliqua symptomata brevi se per totum hujus membranz ambitum dispergunt.

Ex quibus sequitur &c. Qui jam confert illa phenomena, quæ §. 163. 164. 165. recensita sunt, cum illis, quæ dicta sunt hac paragrapho & binis præcedentibus, sine difficultate videbit rationem, quare nervum læsum tot. ac tanta mala sequantur.

§. 184. **E**T intelligitur, quæ, & cut punctura, laceratio, vulnus nervi adeo funesta? Item cut membranæ, tendinibus, vasisque eadem fiant.

Quo nervus magis tensus est, quo pauciores fibræ læsi nervi integræ remanserint, eo major distractio illarum, eo sæviora symptomata nascuntur, & acrior aderit dolor. Nervum autem minime tensum, vel & integrè discissum, non sequuntur tam dira mala. Membranæ autem, cum nervos per suam substantiam dispersos plurimos sæpe habeant, similia accidere, nulli mirum videbitur, uti & tendinibus, qui muscularibus fibris continuati & hinc nervorum propagines videntur esse, ut dictum in commentario §. 164. Idem jam in vasibus obtinebit, ex membranis convolutis factis, per quas nervi pariter disseminantur sensui, motui, & nutritioni inservientes.

Hactenus actum fuit de vulneris definitione, causis, & effectibus, deinde enarrata sunt fideliter illa omnia, quæ vulnere simpliciter accidit a primo momento, quo inflictum fuit, ad perfectam sanationem usque. Postea consideravimus, quænam vulnere accidunt mala ab arteriis, nervis, tendinibus, membranæ &c. læsis. Deinde tradita sunt illa signa, per quæ vulneris præsentia noscitur, & simul determinatur, quænam corpo-

ris partes per vulnus læsæ sint. Ex his tunc deducebantur illa, quæ de vulnere jam cognito erant præagienda circa vitam vel mortem vulnerati, curationem brevem & facilem, vel difficilem, & longam, & lesiones functionum post vulnus curationem superstitas futuras. Postea ex fidelissimis observatis, & cognita humani corporis fabrica, determinatum fuit, quænam vulnera lethalia forent dicenda, & quibus sub cautelis: an nempe absolute lethalia essent, destructis per vulnus partibus necessariis ad vitam requisitis, sic ut ab arte hodie cognita nullum posset auxilium expectari. An vero ex sua natura quidem lethalia, per artem tamen forent curabilia. Denique an mors secuta post vulnus penderet non a solo vulnere, sed ab aliis simul concurrentibus causis, a vulnere inflicto distinctis. Ex quibus intellectus patebant illa, quæ ad Judices renuntiari debebant circa vulneris inflicti naturam & effectus. Tandem ex Anatomicis & Theoreticis ratio reddita fuit mirabilium effectuum, qui nervos punctos vel partim dissectos sequuntur. Superest nunc, ut de vulneris cura generali agatur.

§. 185. **U**T vulnus sanetur, opus erit:

1. Aufferre ex eo illa, quæ, vel a liquidis & solidis corruptis, vel ab instrumento vulnerante, aut aliunde, ibi relicta, adunationem impeditent.
2. Supplere perditam novam regeneratione ablata.
3. Unite separata, & in adunatione retinere.
4. Cicatricem naturali cuti simillimam obducere.

Sanatio, uti dictum in commentario ad §. 4. est mutatio corporis viventis talis,

ut conditio corporis, quæ vocabatur mortuus, tollatur, & restituatur illud, quod

ablatur faciebat morbum. Sed vulnus est laesa cohesio recens & cruenta partium mollium, a corpore duro & acuto facta. Sanatio ergo vulneris erit restitutio cohaesionis naturalis partium per causam vulnerantem separataram. Sive jam simplex adhuc divisio partium antea cohaerentium, sive magna facta fuerit iactura substantiae per causam vulnerantem ablata, vita superstes in vulnerato unit separata, restituit perdita (vide §. 158. Num. 9.) inimitabili artificio. Medici & Chirurghi illa tollunt, quae salutare hoc naturae molimen impedire poterant, & suppeditant talia, quae iuvare possunt, hoc totum est, quod ars habet. Qui plus sibi sapere videntur, tentent in cadavere levis tantum vulnusculi consolidationem, applicent decantatissima balsama vulneraria, foveant calore repente sani corporis. Eventus docebit, naturam creati corporis sibi soli sufficere, sine hac nihil fieri posse per artem. Sequentibus numeris recensentur illa, quae in omni vulnerum curatione semper requiruntur.

1. Omne, quod haeret in vulnere, aliene a corporis nostri partibus naturae, nunquam poterit condescere, & impediet semper partium separataram unionem, quamdiu ibi haeret. Dum elevata cutis lanceola discinditur, & vulnere imponitur purissimo ex auro factus globulus, condescunt nunquam vulneris labia, sed manebit ulcus per annos pus quotidie fundens: si tollatur illud peregrinum, nisi penitus callosa facta fuerint jam labia a continuo attritu ad durum hoc corpus, paucis diebus consolidabitur. Non refert jam, an illud peregrinum fuerit pars instrumenti vulnerantis, an aliud quid, quod una cum hoc in vulnus penetravit; an vero effusi humores, vel solidae partes, a causa vulnerante sic mutatae, ut amiserint illas dotes, quae requiruntur, ut partibus vivis iterum uniri possint. In bellicis consiliis globi sclopetis emissi, dum vestes penetrant, saepe partem illarum simul in vulnus abripiunt; sicque talium vulnorum consolidatio per menses plurimos, imo per annos protrahitur. Nobilissimo viro sclopeti globo semur dextrum perforatur; os femoris a globo transeunte frangitur, restituebatur ab hoc vulnere sic,

ut incedere potuerit: mansit tamen per viginti annos ulcus fistulosum, exeuntibus subinde ossis fragmentis. Postquam tanto temporis spatio toleraverat has molestias, aucto dolore & fere continuo reddito, ex consilio celeberrimorum Medicorum & Chirurgorum dilatur cultro fistulosi ulceris orificium, extrahitur festuca ossis tres pollices longa, postea & tres aliae: tandem in funco ulceris invenitur portio fanni ex femoralibus una cum globo vulnus ingressa. Aliquot diebus postea prodibant tria fragmenta ferreae rubigine obducta, quae clavis, quam in saculo gestaverat aeger illo die dum vulnerabatur, partes fuisse apparebant. Tanto temporis spatio haec peregrina in vulnere latuerant, ejusque consolidationem impediverant (*Academ. des Sciences l'an 1731. Memoir. pag. 141. &c.*). Patet ergo haec tollenda esse, si fieri possit.

2. Si jam vulnus factum fuerit cum magna iactura substantiae, non poterunt labia vulneris uniri & condescere, nisi prius illud perditum fuerit nova regeneratione restitutum: nimis enim distant a se invicem, & licet vi facta per futuras vel Emplastra tenacia adducerentur sic labia vulneris, ut contigua fierent, maneret tamen sub labiis unitis cavum, in quod humores effusi colligerentur, & sinuosum facerent ulcus.

3. Notatum fuit §. 158. Num. 1. quando phazentona omnibus vulneribus communia recensentur, quod partes corporis, inter quas causa vulnerans adacta fuit, sensim magis magisque a se mutuo recedant: sed, ut vulnus curetur, requiritur, ut partes separate iterum fiant contiguae. Hic ars naturam adjuvat, uniendo partes separatas, & sic illas muniendo, ut maneat adunatae.

4. Quod tamen saepe fieri nequit, quando valida suppeditatio multum consumpsit pinguedinosae tunicae, vel magna pars cutis per vulnus ablata fuit: tunc enim semper cicatrix solidior, magis polita & splendens erit, quam vicina cutis.

Haec sunt generalia indicata in omnium vulnerum curatione, quae quomodo obrinendi possint dicetur in sequentibus.

§. 186. **F**ragmenta impacta metallorum, lapidum, ligni, vitri, globi tormentorum, thrombi cruenti, caro mortua, vel membranarum, ossa fracta, primo tollenda, si proderit.

Cafus illi in hodiernis bellicis conflictibus frequentiffimi contingunt, dum tormenta bellica lapidum & metallorum fragmentis variis onusta ( *met. Schuort geladen* ) in adversos hoies expelluntur, & difficillimæ curationis vulnera faciunt. Omnia hæc in vulnere relictæ, dum vulnus incipit tumere & inflammari, partes, quas tangunt, contundunt, callosasque reddunt, inflammationem augent, tandemque in fistulosa ulcera degenerare faciunt, non curanda, nisi per artem, vel per suppurationem in contiguis partibus excitatam, educantur. Idem verum est, si thrombi sanguinis con-

creti, vel partes solidæ corporis abscisse, & ab omni nexu cum vivis partibus liberæ, in vulnere hæserint. Si enim v. g. ossis fragmentum adhuc cohareat cum vivis partibus, spes est, quod iterum uniti possit. Semper autem advertendum est, quod si talium heterogeneorum in vulnere hærentiumeductio non possit fieri, quin metuantur gravia inde secutura mala, tunc potius hæc relinquenda sunt, & naturæ committenda est horum separatio. Quomodo autem determinetur, an tollenda sint, an relinquenda, sequens docebit paragra-  
phus.

§. 187. **C**onsiderata natura vulneris, partis vulneratæ, materiæ impactæ, roboris ægrotantis, symptomatum securutorum, tolli, an relinquere debeant, judicatur.

In periculosis vulneribus imprimis summa cautela opus est, ut determinetur, an heterogenea in vulnere hærentia tollenda sint, an vero relinquenda. Si omnibus attente consideratis appareat, quod vulneratus, his eductis, commodius vel diutius vinctus sit, tunc procul dubio tollenda sunt. Sed si vulneris ex scientia Anatomica, & functionibus læsis, talis constructio appareat, ut certa & satis subita mors timeatur, merito relinquenda sunt, ne mortis vulnus secutæ culpa imputetur Medico vel Chirurgo. Desperatos enim non attingere melius est. Si pars vulnerata non possit instrumentis, ad eductionem illorum, quæ in vulnere hærent, necessariis attingi sine periculo, relinquenda pariter: ut si v. g. circa loca admodum tendinosa, nervos majores, cerebri ipsam, hæc peregrina hæreant, non sine magno discrimine tolli possunt. Sed & quædam corpora tutius relinquere possunt in vulnere, quam alia, prout diversa constant materia. Sic innumera observata docuerunt, globos plumbeos, per vulnus ingresses, impune latuisse in corpore per plurimos annos, & miras postea sæpe secisse vias, per quas tandem exirent. Ex cupro vel ferro si constiterit, rubiginis corrupti irritassent longe plus partes, quibus accumbunt. Simul ratio haberi debet vitium vulnerati: si enim pulsus debilis, frigus extremorum, pallor cadaverosus doceant, vitale robur admodum jam imminutum esse, prudentia jubet, ut a molesto vulneris scrutinio per-

instrumenta Chirurgica abstineatur omnino. Mirabilia enim observata docuerunt, sponte postea prolisse heterogenea relictæ in vulnere, quæ sine summo periculo educi non possissent antea. Juveni vixigines annorum bregmatis os dextrum in medio transfigitur sagitta ferreo cuspidem armata: dum vulneratus tentat evellere sagittam, rumperitur lignum prope ferream cuspidem, qui in vulnere mansit. Satis bene se habuit usque ad septimum diem: tunc incisione facta inventum fuit os bregmaticum circulari foramine perforatum, & apparebat cuspis relictus sagittæ. Bis applicato trepano ingers portio calvariæ excindebatur; & dura mater discindebatur per totum foraminis facti ambitum, nec tamen poterat educi cuspis sagittæ relictus. In latere opposito vulnere fiebat paralytis, suppuratio ingens nascebatur, fungi cerebrum enascebantur. Sequenter tertio jam elapso mense specillo tangebatur in ipsa cerebri substantia cuspis ferreus, Chirurgus tentabat educere, sed convulsiones mox oræ impediabant ne pergeret. Circa finem quarti mensis sponte se offerebat in vulnere apertura cuspis ferreus sagittæ, qui tunc tenaculo prehensus educabatur facile sine ullo damno, & post viginti dies adeo periculofum vulnus cicatrice obductum fuit ( *Journal des Sçavans P. an. 1735. Avril pag. 190. &c.* ). Plura alia habentur observata apud auctores, quæ docent, melius relinquere aliquando in vulnere heterogenea, quæ postea solius naturæ beneficio excluduntur.

§. 188. **E**X iisdem ( 187. ) definitur 'instrumentum', & modus, quibus tolli queant. ( 186. )

Primo examinatur, an per vulnus factum instrumenti vulnerantis pars relicta possit educi sine dilaceratione partium, an vero illud prius dilatarı debeat, vel novo vulnere facto in parte v. g. opposita commodius possit exiri. Sic tela hamata, in vulnere relicta, non possunt per vulnus factum educi sine magna dilaceratione partium vicinarum; hinc in tali casu vulnus potius dilatandum foret: vel, si fieri posset, protrudendo telam per oppositam partem educi deberet, novo facto vulnere. Variæ nunc figuræ & magnitudinis tenacula describuntur apud auctores Chirurgicos, quibus heterogenea in vulnere relicta protrahi possunt. Tamen summa hic opus prudentia, ne simul & semel magno cum impetu hæc educantur: præstat enim prehensum tenaculo telam leniter agitare, ut sci-

ri possit, an alicubi hæreat sic, ut sine magna dilaceratione non posset educi, tunc enim potius relinquendum esset. Postquam autem inceperunt in bellicis conflictibus pulvere pyrio uti, globi plumbi, sclopetis emissi, in vulneribus hærentes, non poterant adeo commodè educi tenaculis in arte Chirurgica usitatis hætenus; hinc novas excogitaverunt machinas; imprimis spiralem terebram cavo canali occulratam, ut tuto in vulneris fundum usque posset denitti, donec globo ibi hærenti occurreret; tunc prudenter circumrorando terebram molli plumbo insigunt, donec sic hæreat, ut globus sequatur terebram dum extrahitur. De his instrumentis, & modo utendi, videri possunt recentiores Chirurgi.

§. 189. **D**Epurato sic ( 186. 187. 188. ) vulnere, si ablatum quid fuerit de corpore, id repleri debet, generata iterum materia simili perditæ. Id fit, si 1. vascula arteriosa, lymphatica, nervosa, &c. ita se habent, ut sua liquida bona excipiant, transmittant. 2. si liquidum bonum naturale debita copia, & apto impetu fertur in illa vasa.

Ablati jam omnibus heterogeneis de vulnere, considerandum est, an vulnus tale sit, ut simplex tantum facta fuerit divisio partium antea coherentium, per instrumentum vulnerans, an vero pars quædam substantiæ corporeæ per causam vulnerantem ablata fuerit? In priori casu sufficit sola unio partium separataram; in posteriori casu requiritur substantiæ perditæ regeneratio. Partes corporis resectas omnino recrecere non posse amplius, licet applicarentur illis partibus, quibus antea cohererant, vulgo semper credum fuit: quædam tamen observata docuerunt, non semper de hoc desperandum esse. Militi mordicus afferebatur fere tota pars cartilaginea apicis nasi, quæ in terram projecta conculcatur ab hoste, qui mordendo abstulerat: Vulneratus tollit nasi sui apicem, projicitque in vicinam Chirurgi officinam, tuncque ira flagrans hostem prosequitur. Redeunt postea, tepesfacto vino prius immixtus nasi apex adaptatur iterum, tenaci firmatur Emplastro sic, ut in loco maneat: sequenti die jam unionis rudimenta apparebant, & quar-

to die omnimoda unio fuit facta ( *Garengeot Operat. de Chirurgie Tom. III. pag. 55.* ). Simile habetur Exemplum, ubi index digitus dextræ manus sic intra januam, dum clauderetur, vulnerabatur, ut cutis & panniculus adiposus orbiculariter discissa circa ultimum articulum revolverentur una cum ungue sic, ut nudum fere se relinqueretur. Dum tentat reducere Chirurgus separatas has partes, videt integre ab omni cohesione cum subjectis liberæ esse: cavam tamen hanc chirothecam adaptat digito iterum, & post triduum perfecta unio facta erat ( *Ibidem pag. 57.* ).

Similia observata probant possibilitatem methodi, qua CASPARUS TALIACCIOTUS, Medicinæ & Chirurgiæ Professor Bononiensis, truncatas partes corporis, nasum, aures, labia restituebat singulari artificio excute brachii incisa, & adaptata truncis locis. Hanc rem satis fuse descripsit in libro, quem inscripsit *de Chirurgia Curatorum per insuisionem*. Parvus narrat Exemplum hominis, qui diu argentum nasi apicem gesserat, tandem pertusus hujus deformita-

tis in Italia tali methodo curatus fuit, non sine magna admiratione omnium, qui illum antea noverant ( *Liv. 23. Chap. 2. pag. 574. J.* ) Et apud Hildanum ( *Centur. III. Observ. 23. pag. 214. J.* ) habetur, quod GRIFFONIUS, Chirurgus ingeniosissimus, simili methodo, quam tamen debebat TALIACOTIO, nasum abscissum restituerit virgini, sic ut vix appareret, factitium esse nasum: uri sæpius se cum admiratione summa vidisse testatur Hildanus.

Sed hæc certe minus obvia sunt: & ubi pars quædam substantiæ in vulnere ablata est, vicina vasa elongata retentum illud, quod perditum erat, mirabili naturæ humanæ artificio. Ut autem hoc fiat, bina requiruntur.

1. Inevitabili vitæ & sanitatis effectum quotidie de corpore pereunt quædam, quæ per alimenta, in nostram conversâ naturam vi vasorum & viscerum restituantur. Est ergo in corpore sano potestas talis, quæ valet rescire ex ingestis tot & talia, quot & qualia perierant de corpore. Sed totum hoc opus absolvitur vitali motu humorum bonorum per vasa liquidis proportionalia & sana. Requiritur ergo, ut in vasis sint illæ conditiones, quibus possint recipere, deferre, & referre iterum talia liquida, qualia in sanitate per hæc vasa fluebant. Unde si nimia compressione, vel exsiccantibus fortioribus, vasa arctantur nimis; vulneris superficies sicca evadet & inflammabitur, nec vasa transmittere poterunt illa fluida, quæ in sanitate per hæc vasa movebantur. Si nimis emollientibus tractetur vulnus, laxata vasa cedent liquidis impulsis, dilatabuntur & admittent alienos humores, & vasa sic ultra naturalem capacitatem expansa cum contentis fluidis constituent carnem fungosam dictam, quæ vulnus curam retardabit semper. Felix ergo restituitur perditum in vulnere, quatenus ad vasa, pendet ab eo, ut debita firmitas concilietur vasis, quæ nec nimis resistent, nec nimis facile cedant liquidis impulsis. Cum autem vasa omnia, superficiem vulneris constituentia, elongari debeant, ut restituantur perditum, major parum, quam in naturali statu requiritur, proderit emollio & laxitas. Ideo dixit Hippocrates: ( *De locis in homine cap. 13. Tom. VII. pag. 372. J.* ) *Siquidem ulcus occludere & implere su opus, tumefacere juvat.* Et alibi: ( *De affection. cap. 10. Tom. VII. pag. 631. J.* ) *Quomodo vero*

*carnem generare voles, pinguis & calida magis conferunt.* Et Galenus ( *De methodo medendi Lib. III. c. 4. Tom. X. pag. 65. J.* ) monet, *ubi carni producenda studendum, maxime cavendum ab abstringente medicamento.* Dum autem quoridie vulneris superficiem lustrat Chirurgus, poterit videre, an major vel minor emollio requiratur ad regenerationem perditum. Si enim vulneris superficies sicca appareat, & profunde rubri coloris, & parum puris generetur, novit statim vasa in vulneris superficie patula nimis resistere liquidis impulsis, nec illa transmittere. Si vero in omni puncto vulneris æquabilis appareat humiditas, & modicus rubor, si æquabiliter incipit fundus vulneris elevari quotidie, & latera extendi in omni ambitu, videt satis, vasa habere requisitam laxitatem, ut liquidis impulsis cedere & elongari possint. Si vero vulnus nimia humiditate distuat, fundusque ejus & latera subito & inæqualiter attollantur, nimis laxata vasa esse concluditur, unde oppositis remediis opus est. Pulchre hoc distinxit Galenus, ( *De methodo medendi Lib. IV. cap. 2. Tom. X. pag. 81. J.* ) de methodo curandorum ulcerum agens; dicit enim: *Carnis autem ipsius sanabis intemperiem, si squalens & sicca videatur, aqua temperata sepius humectando, &c. Scopus tamen hujus humectationis sit, ut, quamprimum rubescat & attollatur partis moles, desinas.* Monet tamen paulo post, quod medicamentorum humectandi facultas plenior esse debeat, quam in sana carne præceptum est. *Si autem humidior, quam pro naturali habitu, caro fuerit, contraria facienda jubet.*

Hæc sunt illa, quæ observanda sunt in vulnere, quoad vasa, ut fiat regeneratio perditum: Sequenti numero dicetur, quid in fluidis requiratur ad eundem finem.

2. Debet hic recrefcere nova substantia per vulnus deperdita; sed hæc constat fluidis & solidis, sive vasis continentibus, & liquoribus contentis. Debebit ergo adferri ad vulneris locum talis materia, in qua hærent partes requisitæ ad hanc regenerationem perditum. Sed liquidum bonum naturale, sanitatis legibus per vasa motum, continet in se hæc omnia; inde enim quotidie restituantur in fluidis & firmis partibus illa, quæ sanitatis actionibus de corpore pereunt. Alimenta enim non nutriunt, nisi prius per corporis nostrum fabricam mutata fuerint in

O 3 liqui-

Tom. I.

liquidorum humanorum indolem, & deposita natura propria induerint nostram. Requiritur ergo, ut tantum de sanitate superfluit, ut ex ingellis fieri possint boni & naturales humores. Inde patet ratio, quare in cacochymicis corporibus difficillima, imo saepe impossibilis, in euchymicis autem facilis sit perditu restituitur. Præterea requiritur, ut bonum illud naturale liquidum idonea copia adsit, ut omnia æquabiliter possit replere vasa: Et inde iterum in vulneratis, qui per validam hæmorrhagiam magnam copiam boni liquidi naturalis amiserunt, curæ patet difficultas; quæ augetur adhuc, quia cruda ingesta in primis mutantur in nostram naturam a copia humorum bonorum, quibus miscen-

tur, uti demonstratum fuit in commentario ad N. 1. §. 25. Neque hæc adhuc sufficiunt, sed requiritur, ut debito motus impetu liquida naturalia serantur per vasa. Languente enim hoc motu deficit omnis nutritio, vel saltem depravatur; uti in debilibus corporibus apparet. Dum nimia velocitate humores per vasa seruntur, destruitur corpus, non reficitur; uti in nimio labore exercitatis animalibus patet, & in illis morbis, in quibus nimia circulationis velocitas peccat.

Hoc jam totum est, quod ars facere potest: nempe ut vasa talia sint, qualia in sanitate fuerunt; & per hæc bona liquida debito serantur impetu: reliquum sibi soli sufficiens natura periciet, ut dictum fuit §. 158. N. 9.

§. 190. **H**IS enim (189.) fiet canalium vulneratorum, retrotractio, obturatio, extensio, elongatio, implicatio cum vicinis, applicatio ad alia, quæ ex reicularibus plexibus propinqua, & ope boni liquidi conglutinatio.

Demonstratum fuit in commentario ad §. 159. arterias discissas, etiam satis notabiles, sensim contrahi & obrurari; hincque, nisi maxime fuerint, hæmorrhagiam sponte sisti. Patet ergo evidenter, minora vascula discissa ab iisdem causis claudi, & sic impediri humorum effluxum: unde vi vite, a tergo urgente in obstructa hæc discissorum vasculorum oscula, nascitur inflammatio & febricula, per quam majori impetu pulsati humores in fines vasorum restrictos, illos protrudunt, elongant, & aperiant; vel fines vasorum exsuccos omnino & mortuos suppuratione benigna a vivis partibus separant. Sed cutis reuaci vinculo non amplius coercita, hæc vascula ab impetu liquidi per hæc moti extenduntur & elongantur sensim, & apertis jam oculis sua demittunt in vulneris cavum liquida; unde tota puri jam vulneris superficies humida apparet, & minimis quasi papillis sensim magis & magis elevatis hirta, quæ nil aliud sunt nisi pulposæ vasculorum protuberantium extremitates: dumque hoc fit in omni vulneris ambitu æquabiliter, sibi mutuo occurrunt excrecentium vasculorum oscula, applicantur & coalescunt; sicque renascitur perditâ in vulnere substantia. Si

puro jam vulnere, mucosa illa renascentium vasculorum congeries detegitur quotidie a Chirurgo, destruitur illud, quod perditum restituere debebat; unde retardatur cura, & degenerat in ulceris sordidi naturam vulneris superficies. Totum ergo, quod ars facit ut in vulnere fiat regeneratio perditæ substantiæ, consistit in eo, ut vasa & liquida per hæc mota, habeant illas dotes, quas optima sanitas requirit; & impetus fluidi per vasa moti, nec nimius sit, nec langueat. Reliquum totum natura corporis humani perficit, uti dictum §. 158. N. 9.

Conglutinatio autem illa videtur fieri per substantiæ appositionem, non vero interpositionem succi cujusdam ferruginantis, qui glutinis instar uniret separata vasculorum extrema. Videmus enim vasa, cutis, & epidermidis tegumento libera, si contigua sunt, concrescere illico. Sic palpebrarum limbi excoriatî unice nostris spatio concreverunt ita inter se, ut lanceola dividi deberint. Imo digiti, pulveris pyrii ambusione ablata epidermide, contigui relictî concreverunt inter se quam firmissime. Tantus est vasorum extremorum & patulorum nixus, ut cum similibus concreant, ubi contigua facta fuerunt.

§. 191. **E**T, dum hæc (190.) ab omni puncto fundi præcipue, & laterum, æqua vi simul fiunt, impletur ab omni parte ad centrum cavitas vulneris materia solida & liquida, amissis simili.



Si jam omnia vasculorum extrema in fundo & lateribus vulneris aperta fuerint equalibet, motus humorum per vasa agere equali vi in omnia: hinc, si in uno loco non fuerit major resistentia quam in alio, in omni puncto fiet equalis elongatio vasculorum. Si autem in quodam loco major laxitas fuerit, quam in vicinia, magis ibi distendentur & elongabuntur vasa; sicque nascetur ibi fungosa crescentia, quæ vicinia vasa comprimendo equaliter impedit vulneris consolidationem. Dum autem sic ab omni ambitu cavi vulneris protracha vasa sibi invicem occurrunt, & ununtur, renascitur structura vasorum, quæ perditam corporis substantiam redintegrat. An autem sic renata compages eadem sit omnino, ac ante vulnus fuerat, quis dixerit? simillimam saltem esse omnia phænomena docent, & crassissima sanguinea vasa quæ ac tenuissima perspitantia sic renasci, experimenta docent. Si enim mucosam illam vasorum renascentium in cavo vulnere congeriem linteo rudius tangas, sanguis ruber exit; si leviter tantum attingas, tenuius exit liquidum; si laminam metallicam politissimam; vel speculum apponas, orietur in superficie polita talis corporis niacula humida, brevi evanescens siue ullis forilibus relictis; manifesto indicio, parere in hac congerie etiam vasa talia, quæ subtilissimum exhalans fluidum continent, & emittunt. Unde probabiliter concluditur, cum & vasa sanguinea, & minimæ exhalantia adsint, pariter hic inveniri internedias vasorum descentium series.

Tamen hæc rezeueratio perditæ substantiæ in corpore humano habet suos limites. Digtienim vel ultimum articulum abscissum nemo renatum vidit unquam. Vasa quidem in superficie vulneris concreta cicatricem faciunt, sed tota vita pars truncata manet. Hinc videtur restitui posse perditam corporis substantiam, quando ab omni ambitu vulneris centrum versus elongata vasa concurrere & uniri possunt; ubi autem simplici elongatione valorum, quæ in truncata parte superflue, deberent restitui tot partes organicæ abscissæ, deficit natura, & bona cicatrice

partem truncatam firmat. Quod tamen hominibus negatum est, illud aliis animalibus concessum esse merito mirantur Philosophi. Gammariis majoribus, & cancriis marinis fractos & separatos integre a reliquo corpore pedes renasci testabantur illi, qui maris littora habitant: ridebant hæc tanquam fabulas & rudis plebeculæ commenta Eruditi: rem tamen verissimam esse detexit perspicacissimus REAUMUR, cui tam pulchra debeamus in animalium historia.

Absciderat magnus ille vir Gammario alterum ex magris illis forcipibus, quibus prædam suam prehendere & tanta vi tenere potest; viditque post unum alterumve diem, subrubram membranulam vulnus factum tegere: paucis diebus postea incipit plana huius membranulæ superficies convexa fieri; deinde medium illius membranæ quasi centrum elevatur in conicam protuberantiam; quæ sæpe post decem dies iam tres lineas Geometricas æquat longitudinem. Membranulæ elevatæ color ruber in album mutatur, quodque in extremo ejus rubrum erat, fecedit. Sub hac membranula tunc latet renascentis partis jam observabile rudimentum: Post quatuor vel quinque septimanas membranula hæc coercescens tumescit, renata pars nuda apparet; sed mollior adhuc, paucis tamen diebus postea osseum tegmen habet, æque durum, ac habuerat pars abscissa. Nec differt renatum hoc membrum a perditio; nisi magnitudine sola, quam tantam sensim acquirere videtur; & renascitur perfecte tantum, quantum abscissum fuerat, uti repetitis Experimentis in hoc animali patuit, dum forciper, pedes, cornua in hoc animali in varia distantia a trunco corporis abscissa fuerunt (*Acad. des Sciences l'an 1712. Mémoires pag. 296.*).

Dum pars sic renata abscindebatur denuo, tamen iterum recrecebat nova prioribus ablati similis: nec hæcæus constitit per Experimenta, an hæc vis nova membra producendi in hoc animali exhauriri possit. Sic videmus, in rebus Physicis singulares observationes docere plurima, generales conclusiones autem, ex paucis observatis cognitis deductas, fallere sæpissime.

§. 192. ERgo huc (189.) requiritur: victus debitus, ut chylus, serum sanguinis, & materia nutrititia blanda, glutinosa, nec facile putrescens sit, sed facilis digestionis, & assimilationis. Decocta farinosa cruda; fermentata, Emulsiones, lac, Jura, fructus maturi cocti, olera lenissima, primaria sunt expe, at paucacopia simul, exhibita; repletionem, famem, sitim, cavendo.

O 4 r

Omne,

Omne, quod regenerabitur, deperdita substantia corporis, debet restitui per liquida ad vulnus allata. Sed liquida nostra, quæ per vasa fluunt, sunt vel cruda ex ingestis nondum penitus mutatis in nostram naturam, vel talia, quæ, vi vasorum & viscerum, deposita aliena indole, omnes dotes nostrorum liquidorum assumerunt. Ex ingestis jam alimentis per viscera chylopoietica factus chylus per multas horas una cum sanguine per vasa deferitur, uti constitit Loweri experimentis §. 80. citatis: hinc crudum illud chylosum, una cum reliquis humoribus, ad locum vulnerum etiam deferretur; & quidem magis, quam ad reliquas partes, quia minor resistentia est in loco vulneris: unde observatum fuit in latis vulneribus, totam fere materiem nutritiam exire, & hinc corpus quotidiano pabulo defraudatum lento marasmo perire. Nisi ergo bono victus regimine caveatur, ut chylus, ex ingestis alimentis natus, blandum habeat indolem, vulnus ab acriori chylo irritabitur quotidie, & difficulter sanabitur. Agitur enim hic de vulneribus alicujus momenti; levia enim vulnera tantam cautelam non requirunt. Sed præterea in vulneris cavum patulis vasorum officii multum liquidi effunditur, quod tenuiori parte resorpta vel diffusa in bonum pus convertitur: si ergo chylus cum sanguine huc allatus consistet talibus, quæ in putridam degenerationem inclinant nimis ex sua indole, effusi humores stagnatione & mora in loco calido degenerabunt in putridum ichorosum; non mutabuntur in bonum pus: Ergo & talia vitanda sunt. Cum autem vulneratis quies necessaria sit, motus vero muscularis & corporis exercitia plurimum conducant ad assimilationem crudi ingesti in naturam nostram, (vide §. 28. N. 2. & §. 43. N. 3.) patet, non posse exhiberi cibos, qui difficulter digeruntur; sed requiri tales, qui facile digerantur & assimilari possunt. Aliter cruda plurima, cocta paucæ ad vulnus deferantur: sed a coctis solis, & in naturam nostram conversis, perdit regeneratio in vulnere potest obtineri.

Recensentur jam hic talia, quæ blanda indole & facili assimilatione huic scopo imprimis intersunt. Avena, Hordeum, Fagopyrum, Oryza &c. cum aqua vel carnium jusculis decocta, blandum tale & facile subigendum nutrimentum dant, nec inte-

rim putrescunt. Ex horum farinis etiam leni fermentatione optima edulia fiunt, sic enim farinosus lentor tollitur. Panis hinc optime fermentatus, imprimis biscoctus, juscula carniū non nimis meraca, & omni pinguedine orbara, tam pulchre profunt. Emulsiones ex farinosis seminibus mollissimis cum aqua terendo factæ jam fere chyli naturam habent. Lac æquali copia aquæ dilutum hyemali tempore, æstate vero plus aquæ misceri poterit pro potu communi: idem lac cum farinosis leviter coctum blandum cibum exhibet. Fructus borzi maturi gratissimo sapore & blando refrigerio multum profunt: leviter coquantur, ut omnis ablit stultentia. Olera omnia mollissima, ut sunt Lactuca, Endivia, Spinachia, Sifari, Scorzonera, Dauci, Tragoponi, Pastinacæ radices, jusculis incocta, optima sunt.

Omnia tamen hæc, quantumvis salubria fuerint, poterunt nocere quantitate: si nimia copia simul ingerantur. Gravabitur enim inde corpus vulnerati quiescentis, multum crudi chyli sanguini miscbitur, mutabitur vulneris conditio. Si autem sis dividatur nutrimenti assumendi copia, ut omni bibioso aliquid fumatur, illud facillime assimilabitur; & humores, qui vulnus alluunt, habebunt semper fere eandem proprietates. Dum autem bis de die tantum majorem copiam alimenti sumunt, crudo chylo copioso onustus sanguis ad vulnus deferitur uno tempore; altero vero sanguis, chylo jam subacto aliam habebit indolem, unde alterna hac vicissitudine turbabitur vulneris conditio. Sed fames æque vitanda ac nimia impletio; designat enim novo tunc pabulo corpus indigere: & omnes humores, nisi novo blando chylo demulceantur, fient aciores & subputridi. Diuturnam enim inedia passorum urina acris putridula, & balitus cadaverosus, hanc degenerationem humorum docent. Sed imprimis debet caveri, ne sitiant vulnerati: sitis enim designat siccitatem corporis, vel immeabilitatem liquorum, vel acre liquidis mistum: sed omnia hæc vulneri summpere noxia, cum ad restitutionem perditæ æquabilis humiditatis vulneris in omni puncto, liquidorum facilis meabilitas & blanda indoles, requirantur omnino: Hinc victus humidus, & blandi liquidi copiosior usus requiruntur: sic enim humectabitur totum corpus in omnibus partibus, liqui-

dis dilutio major conciliabitur, & facilis  
mesibilitas, acie nociturum copioso liquido

dilutum enervabitur, & per sudoris vel uri-  
næ vias exibat de corpore.

§. 193. **C**ognita temperies ægri, tempestatis ratio, consuetudo, & natura co-  
mitantis morbi, docet quale, & quò modo præparatum ex his (192.)  
cuilibet profuit.

Omnia autem hæc, quæ de victus regimi-  
ne dicta sunt, variant pro diversa constitutio-  
ne vulnerati, unde nulla potest dari genera-  
lis regula. Et dum belli tempore in Nosoco-  
miis ingens vulneratorum numerus decum-  
bit, & omnibus idem fere datur victus, plu-  
rimi pereunt, qui aliter servari potuissent.  
Totum enim, quod hic requiritur, est, ut  
sanitas superest in vulnerato servetur, vel  
restituatur, si deficiat. Sed sanitas unicui-  
que homini privata sua est, unde diversissima  
in solidis & fluidis partibus corpora quamvis  
fuerint, tamen singula sana esse poterint:  
hæc vocatur sanitas temperiei, ad quam ergo  
quam maxime attendendum est. Calidam  
enim & frigidam, humidam & siccam, bi-  
liosam, sanguineam, phlegmaticam, atra-  
biliariam temperiem, propriis signis distin-  
guunt Medici; & varium dietæ regimen,  
imo sæpe oppositum diversæ temperiei homi-  
nibus convenire notant, ut singulis illibata  
conservetur sanitas. Sic v. g. ubi aquosum  
frigidum vulnerati temperamentum cognosci-  
tur, tenues diluentes potus vitantur; robo-  
rantia & excitantia exhibentur. Si veto hu-  
mores densi & compacti, solide partes stricte  
& firmæ fuerint, calidum & siccum tempe-  
ramentum adesse dicitur; tuncque profunt il-  
la, quæ in priori casu nocuissent. Idem in  
reliquis verum est. Carnosius, mollioribus, ru-  
bris confert, majorem anni partem sicciori die-  
ta uti; humida namque illorum natura est. Du-  
res vero, graciles, subros & nigros, humidio-  
re victu diuturniori tempore uti oportet, nam  
huiusmodi corpora sicca sunt (Hippocr. de sa-  
lubri victus ratione Tom. 6. pag. 223. 224.).

Sed varia anni tempestas in eodem homine  
etiã diversum vitæ genus requirit. Æstivis  
enim caloribus celerrimæ degeneraciones hu-  
morum sunt, hyemali frigore tardissimæ:  
carnes enim animalium hyemali frigore per  
septimanas servantur non corruptæ; quæ æsti-  
vis caloribus intra paucos dies in putridum  
defluxissent tamen. Hinc sapientes veteres  
Medici tam sollicite distinxerunt varium vi-  
vendi genus pro varia tempestate anni: hye-  
me cibum copiosum, meracum potum fere  
parcum, olera paucissima, & illa tantum,

quæ calefacerent & siccarent, obsonia assata  
omnia commendabant: Æstate vero potum  
dilutum & copiosum, obsonia elixa, olera  
molliora copiosa laudabant. Verno autem tem-  
pore sensim jubebant augeri potum, sed ma-  
gis dilutum; assis substituebant elixa, cibo-  
rum minuebant quantitatem, sensim subdu-  
cendo, ne subito magna fieret in corpore mu-  
tatio: sic pergebant ad dietam æstivam. De-  
inde iterum in autumnum cibos augebant, po-  
tus minuebant, sed meraciores dabant donec  
ad hyemalem dietam gradatim sic perventurus  
foret (Ibid. pag. 121. 222. & de victus ratio-  
ne sanorum Lib. III. c. 2. Tom. VI. pag. 479.).  
Cum autem bellici conflictus sæpius æstiva  
tempestate fiant, & miseris vulneratis tunc  
jura carniū sola dentur fere, sæpe adeo  
languent, & acidulos potus, maturosque fru-  
ctus avidissime expetunt; a quibus tamen  
aliquando prohibentur.

Atque iterum variz ætatis ratione di-  
versum indicatur dietæ regimen, ut facile  
patet.

CONSUETUDO, quæ altera natura merito  
dici solet, etiã hic considerari meretur. Du-  
rus arator, qui atro pane durissimo, & salo  
vel fumo conditis carnibus vivere consuevit,  
ut firmo corpore validos labores quotidie susti-  
nere possit, si vulneratus decumberet, & solis  
carniū jusculis uti cogeretur, deficeret brevis;  
hinc tali homini solidiores cibi concedi pos-  
sent, imo deberent. A multo tempore consue-  
ta, etiam si deteriora fuerint, insuetis minus molesta  
esse solent; sic monet Hippocrates: (Aph. 507.  
Sect. 2. Tom. IX. p. 87.) idem autem in libro  
de victus acutorum alius deduxit, monens quod  
homines cibos, quibus assueverunt, facile  
serant, etiam si natura non fuerint boni; &  
contra quod moleste ferant cibos, quibus non  
assueverunt, quamvis mali non sint: idemque  
de potu affirmat (Tom. XI. pag. 58.). Un-  
de patet, prudentiani Medicam dicere, ut  
consuetudini aliquid concedatur, quamvis  
cæteroquin artis regalis repugnet.

ET NATURA COMITANTIS MORBI. Ha-  
stenus dictum fuit de his omnibus, quate-  
nus in homine sano vulnerato dirigi debent:  
sed si notabilis cacochymia adfuerit an-  
te vulnus

vulnus infictum, vel alius morbus vulnus comitetur, tunc omnis victus ratio sic dirigi debet, ut quam maxime contraria sit illi humorum degenerationi, quæ a morbo vel cacochymia vulnus committitur metuenda est. Si v.g. putrida scorbutica cacochymia adsit, vel per validam febrem omnia in putredinem vergant: solis fere læticiis, avena, oryza &c. fructibus horæ acceſcentibus utimur: a carnibus, illarumque iusculis, ovis &c. abstinemus: si iners mucosa colluvies totum corpus obfederit, carnibus assis, vino, aromaticis &c. languentes excitamus vires.

Ex his omnibus accurate cognitis, & iuvicem comparatis, concluditur, qualia exhibenda sint in cibo & potu, & quibus præparatio-

§. 194. **A**cre, impetum nimis augens, vitandum. Salsum, Aromaticum, Acidum, oleum acre, vinum, ergo vulnere mala.

Cum blanda sit adeo humorum nostrorum indoles in sanitate, ut sanguis ipse, & omnes inde secreti liquores, (bilem & urinam exceperis, quæ tamen moræ & stagnationi imprimis natam acrimoniam debent) oculo instillati nullum dolorem faciant; & ex his ad vulnus allatis regenerari debeant perditæ, videtur quam maxime profuturum; si tantum ingerantur talia, quæ nihil acris, nihil stimulantis, in se continent, nec facile in acrem indolem mutari possunt. Nocent enim actia, quatenus ad vulnus delata cruda hæc loca irritant; uti etiam, quia stimuli actione majorem humorum motum excitant, sicque impetum vitalis liquidi interterritima vascula, in vulnere renascentia, augent; unde hæc sæpe in fungosam carnem degenerant; vel per motum auctum inflammatione genita inspersibilis fit vulneris superficies obstructis vasculis; unde iterum cura retardabitur: totum enim illud iterum debet suppuratione facta separari.

Omnia ergo stimulantia, quocumque de-

§. 195. **I**tem quæ facile putrescunt. Jura nimis spissa, herbæ alcalescentes, ergo obſunt; raphani, nasturtia, brassica, & similia.

Non solum attendendum est ad illam indolem; quam habent alimenta, dum ingeruntur; sed etiam respiciendum est ad illas mutationes, quæ ipsis calore corporis & mora contingere possunt. Uti enim ante dictum est, humores nutriti, ex ingessis alimentis nati, ad vulnus deferuntur; & pro parte parulis vasculis effunduntur in vulnere cavum. Si ergo ingesta ex sua natura in putredinem

nibus indigeant alimenta. Ingens enim diversitas ejusdem etiam cibi a varia eius præparatione nascitur. Caro vitulina recens cocta iusculum præbet, quod adhuc exhiberi potest, licet aliquis putridæ degenerationis in humoribus metus esset; imprimis si pauculo succo citri addito exhibeatur: eadem autem caro; per aliquot dies in aere aperto relicta, si coquatur, dabit iusculum longe citius putrescens. Assa autem eadem caro vitulina magis adhuc in putredinem prona est, ignis vi acrioribus redditis salibus & oleis huius carnis. Frigidis pituitosis hominibus sarinosa cruda nocent, eadem fermentata tamen concedi possent. Idem de plurimis aliis præparationibus alimentorum verum est.

nam titulo commendantur, ex sua indole nocebunt vulnere: corpus enim vulnerati sanum supponitur. Si enim v.g. putrida cacochymia simul adesset, acida ingesta prodesſent, non vero nocerent: Neque hoc tamen intelligi debet; ac si paucula salis grana vel guttula: aliquot fucis citri iusculis carniū addita nocitura crederentur: tam: levi enim copia hæc addita nimis facilem horum degenerationem in putridum poterunt præcavere; neutiquam tamen stimuli vice fungi poterunt. Nisi enim iusculis tale quid addatur, abhorrebant brevi ab his vulnerati.

Vini pariter usus ob easdem causas reprobatur; nisi languentes nimis vires, vel consuetudo aliud iubeant. Multi enim homines quotidie vino vel aliis spirituosis uti consueverunt: illi, si abstinere cogantur, languent: illico; & turbantur omnes functiones corporis: unde in simili casu moderata copia dari debet vinum, vel purum, dilutum; prout virium languor vel consuetudo requirunt.

admodum: prona fuerunt; metus est ne humores ad vulnus delati non in bonum pus abeant; sed in putridum ichorofum degenerent. Cum ergo pisces, & imprimis marini, citissime putrescant, neque ferri possint, nisi multo sale condiantur, ideo prohibentur. Iuscula carniū spissiora, gelatinæ ex cornu cervi vel eboris rasura paratæ, æstivo tempore sæpe intra viginti quatuor horas

in

in putridum liquamen dissuunt. Accedit, quod spissiora hæc iuscula ventriculū gravant, nec facile digeruntur. In quibusdam plantis, uti dictum fuit §. 76. reperitur talis indoles, ut sponte corruptæ non aceſcant, ut plurimæ aliæ, sed resolvantur in foetidum, volatile, pingue alcali; imo in quibusdam adest, sine ulla corruptela prægressa, acer, alcalinus, volatilis sal, ut in raphanis, sinapi, nasturtiis &c. omnia hæc nocent vulneri, quia in putredinem nimis vergunt, &

acti stimulo irritant. Magis autem mutantur ab his, quæ in putredinem prona sunt, quia omnes humores nostri ex sua natura in putridam degenerationem tendunt: illa vero vegetabilia, quæ ex sua natura in acidum vergunt, spontaneæ degenerationi nostrorum humorum resistunt; cum priora cum hac conspirant. In materia medica ad Sect. 76. catalogus herbarum caleſcentium habetur, quæ hic nocerent.

§. 196. **T**um quæ difficile in chylum, & sanguinem mutantur. Qualia sunt quæ sale, fumo, aere induruerunt; vel quæ pingui multo ſcatent, ut lardum, pisces pingues, item anſeres, anates, ſimiles aves piſcibus paſtæ, &c. denique viſcida: ut legumina craſſa, farinosa cruda, ova.

Qui valido labore corpus quotidie exercent, durissimos cibos avidè comedunt, illosque optime digerunt; levioribus cibis minime deſectantur, nec poſſent requiſitum ad labores corporis robur his ſuſtinere; ſed quibus oſioſa deſuit vita, a durioribus aſſumptis peſſime ſe habent: unde pro generali axiomate in dirigenda ſanorum diæta haberi poteſt, quod talis debeat eſſe cibus, qualis eſt labor. Duri enim cibi, non niſi difficile mutabiles in bonum chylum, pondus & inertiam addunt corpori quieſcenti: cum autem vulneratis quies ſit neceſſaria non poterit fieri talium bona digeſſio & debita aſſimilatio, quæ ad regenerationem perſecti in vulnere omnino requiritur. Semper tamen hic aliquid concedendum conſuetudini, uti monitum fuit §. 193. qui enim tota vita his uti aſſueti fuerunt, non ſine moleſtia poſſunt vivere ſolis mollioribus cibis.

Carnes autem animalium, & piſces ſale vel fumo indurati, vel ſiccata in aere, longe difficilior rediguntur in chylum bonum & ſanguinem, quam ſi recentia fuerint. Sed imprimis hic nocent pingua, quæ difficillimæ ſemper digeſtionis ſunt, & diu retenta in corpore rancidam acrimoniam peſſimam induunt. Si debilis homo lardum majori copia in prandio comederit, vespertino tempore ſæpe eructabit pingue oleum, quod fauces adurit, & in ſignem proſectum vividam flammam alit. Tam diu in ventriculo teneatur hoc pingue indigeſtum, nec tamen, fluidum quamvis fuerit, pyloro elabitur. Idem verum eſt de piſcibus pinguiſſimis, ut anguilla, ſulmone &c. & imprimis ſi ſeparata piſcium comedantur, in quibus

oleum tanta copia hæret, ut inde purum exprimi poſſit; & quamvis ſapori adeo placeat blandum hoc oleum, citiſſime tamen in rancidum peſſimum convertitur. Unde periti Chirurghi, ſi vulnerati talia comederint, ilico vulnētis conditionem in pejus mutatam obſervant. Oleola enim hæc ad vulnus delata minima vaſcula obſtrunt, & mora & calore acriora reddita inflammationem difficileſter reſolubilem efficiunt. Cum autem in piſcibus plurimis oleoſum illud magna copia adest, quo tranſudante externa ſuperficies corporis deſenditur; ne ab aqua, in qua vivunt, macerati diſſuant, hinc aves, piſcibus paſtæ, difficilis ſunt digeſtionis. Licet enim aſſumpta alimenta mutantur in naturam aſſumentis per naturales ſunctiones, tamen ſæpe aliquid adhuc de priori indole manet: unde adeo diverſus ſapor in carniſ animalium, prout diverſo utuntur pabulo. Anates, anſeres & ſimiles aves ſi ſolis vivant piſcibus, carnes harum avium piſcium nidorem ingratum ſpirant. Lepores, qui cicurati Braſſicæ foliis vixerunt, menſis adhibiti abominabilem fetorem ſpirant. Unde etiam a ſimilibus abſtinere jubentur vulnerati.

Præterea omnia leguminoſa craſſiora, & farinoſa cruda chylum lentiores generant, qui lentor, ſi validis exercitiis agitetur corpus, ſuperari poteſt, ſed in quieſcentibus hominibus plurima mala producit: quæ in Capitulo de morbis a glutinoſo ſpontaneo productis §. 71. 72. 73. recensentur.

Ora denique, licet merito laudentur tantum nutrimentum, debilibus corporibus reſtaurandis idoneum, (vide §. 28. Num. t.)

nempe recentia diluantur in iusculis, & imprimis illorum albumen; in putredinem quam maxime prona cum sint, hinc par-

cius usurpanda; si vero coctione induruerint, tunc satis difficilis digestionis esse observantur.

§. 197. **A**D eundem scopum (189.) conducunt medicamenta: quæ tollunt impedimenta nata consolidationi (190. 191.), & plerumque Decocti forma exhibentur. Illa ergo erunt varia pro varietate ejus impedimenti, quod tollendum erit: nec ullum utile omnibus habetur.

Hactenus dictum fuit de illis, quæ observanda sunt in diatræ regimine vulneratorum, ut liquida sana per bona vasa delata ad vulnus faciant recrefcere perditam substantiam. Sed supponebantur vulnerati cæteroquin recte valere: si vero in vulnerati corpore, vel & in vulnere ipso adfit conditio corporea, quæ impedit, non partes perditæ recrefcant, hæc tollenda est. Inquiri ergo debet, quodnam sit illud impedimentum, an in liquidis, vel solidis, vel in utrifque simul hæreat; an in vulnere ipso lateat, an in illis, quæ ad vulnus circulationis efficacia adferuntur; an nimio, vel nimis parvo impetu ad vulnus delati humores turbent vel impediunt perditæ regenerationem? Cum ergo tam varia possit esse talis impedimenti natura, imo sæpe ab oppositis causis impediatur vulnorum consolidatio; patet evidenter, nullum hic esse posse universale remedium, & inanem esse jactantiam illorum, qui hoc promit-

tunt. Dum ab acido pus in vulnere nasci male credidit Helmontius, voluit, ut omnis portio vulneraria occultum alkali, & quidem volatile, in se contineret (*Helmont, ortus Medicinæ, in Caput. Blas Humanum N. 53. pag. 153.*). Alii alia jactant: hinc tot diversæ & tantis encomiis celebratæ decoctionum vulnerariorum formulæ. Sed dum bona liquida per vasa debito motu ad vulnus feruntur, fiet illud quod requiritur. Unde ars medica tantum cognitum impedimentum idoneis remediis tollere vel emendare poterit, præterea nihil. Reliquum totum a natura fiet. Illa autem remedia vulneraria plerumque decocti forma solebant præparari, quia hac ratione medicamentorum virtus, aqua diluta, commodè sanguini misceri, & æqualiter per totum corpus distribui poterat. Quam variam autem hæc decocta materiam requirant, docebit sequens paragraphus,

§. 198. **H**inc pro re nata sumuntur ex attenuantibus, inspissantibus, mitigantibus, excitantibus, virtute singulari contrarium vitium emendantibus, aperientibus, laxantibus, adstringentibus, adeoque sæpe ex oppositis.

**ATTENUANTIBUS.** Si per signa observata constiterit, impedimentum curationis vulneris pendere a nimia spissitudine humorum, qua tollitur facilis eorum per vasa meabilitas; patet, vulneraria remedia in hoc casu esse omnia illa, quæ humores sic dividunt & attenuant, ut sine molestia transire possint per illa vasa, per quæ sanitatis legibus fluere debent. Sed §. 115. 116. 117. demonstratum fuit, a variis causis hanc fluidorum immeabilitatem produci posse; unde etiam §. 134. 135. 136. varia tradita sunt remedia, quibus hæc causæ tolli, & emendari poterant. Unde iterum nascitur ingens varietas medicamentorum vulnerariorum, quatenus attenuando agunt. Longe enim alia requiruntur, ut humorum spissitudo inflammatoria attenuetur, quam

si atrabilaria tenacitas, vel frigidus glutinosus lentor humorum immeabilitatem fecerint.

**INSPISSANTIBUS.** Si nempe liquidorum nimia peccet tenuitas, vel aquosus adfit languor: hæc autem humorum tenuitas vel habet simul comitem acrimoniam, ut in scorbutico sæpe fit, ubi tenuis acer sanguis undique vasibus suis elabitur, & ecchymosus illas scorbuticas facit, tuncque mollissima glutinosa inviscantia requiruntur: vel a minus valida actione debilium vasorum in fluida contenta non satis compacti humores nimia tenuitate peccant; tunc omnia illa, quæ vim vasorum in liquida contenta augent, sunt inspissantia vulneraria remedia: de quibus dictum in cura fibræ debilis & laxæ §.

28. Hinc iterum apparet, sub eodem hoc

ti-

# §. 198. 199. DE VULNERE IN GENERE.

221

titulo opposita laudari remedia; quæ enim in priori casu proderant, in altero nocerent omnino.

**MITIGANTIBUS.** Quæ talia sunt, ut molibus suis, & imprimis oleosis partibus, sic involvant & obtundant omnia acria, ut illa inertia reddant. Unde non sunt talia, quæ singulari vi acrimonie cuidam opposita sunt, sed molli visciditate quodcumque acre obvolvunt & mitigant. Talia sunt imprimis omnia illa, quæ emollientia vocantur in officinis, quæ omnem in fluidis acrimoniam leniunt, & solidas partes corporis emolliunt & lubricant.

**EXCITANTIBUS.** Quando nempe vis vitæ languet, frigus, inertia, pallor, & mucosa humorum indoles prædominantur, sine signis acrimonie cuiusdam comitantis; tunc omnia illa, quæ grato stimulo aromatico languentem motum augent, adeo profunt, qualia sunt aromata, vinum &c.

**VIRTUTE SINGULARI CONTRARIUM VITIUM EMENDANTIBUS.** Vitium hoc ergo primo detegendum est, antequam oppositum remedium, singulari virtute hoc emendans, cognosci possit & applicari: illud autem hæ-

rebit vel in solidis vel in fluidis, vel in utroque simul. In solidis maior vel minor cohesio peccare potest; de remediis ad hæc vitium dictum fuit in Capitalis de morbis fibræ nimis debilis vel rigide: ubi autem de humorum vitis spontaneis agebatur, indicata fuerant illa remedia, quæ singulari virtute corrigebant liquorum degeneraciones.

**APERIENTIBUS.** Sic vocantur illa, quæ liberrimam circulationem per omnia vasa faciunt, ad quam requiritur fluidorum mobilitas, & vasorum debita apertura: quæ ergo iterum varia sunt, prout in solidorum vel fluidorum agunt vitia, quæ liberum humorem per vasa transitum tollunt.

**LAXANTIBUS, ADSTRINGENTIBUS.** Pro ut nempe nimia debilitas, vel nimium robur in partibus solidis peccat. De his omnibus autem antea dictum fuit.

Ex his ergo patet, nullum posse haberi remedium generale, quod omnibus his impedimentis tollendis sufficere possit; sed singulari casibus singularia convenire remedia. In materia medica jam habentur formulæ singulis vitis tollendis idoneæ.

## §. 199. Q Uorum quid eligendum, docet cognita natura vitii in ægro, & tituli horum Medicamentorum ( 197. 198. )

Cognitis ergo vulnerati ætate, sexu, temperie, vitæ genere, morbis prægressis, vel nunc vulnus comitantibus, habetur indicatio, quæ determinat, quid agendum sit & per quæ remedia. In Exemplo res patebit evidenter. Si homo stricte temperiei in solidis, & atrabilaria tenacitate sanguinis præditus, vulneratus fuerit, vulnus siccum erit, nec bonum pus funder: si jam æstivus adsit calor, sitiat valide, caleat, urinam parcam rubram olidam reddat; decocta avenæ, boraginis, buglossæ & similium mollissimum demulcentium cum sero lactis vel aqua pura facta, additis syrupo florum violarum, succo citri, rob sambuci &c. si magna copia potenter, & panni similibus emollientibus decoctis madidi applicentur parti vulneratæ, brevi mutabitur vulnus conditio, siccitas nimia emendabitur, diluti humores per vasa laxata libere movebuntur, & obtinebitur felix vulneris curatio. Sed si jam alius vulneratus decumbat hyemali tempore, qui pallidus & frigidus laxitate solidorum & mucosa frigida humorum inertia totus tumet, & orosam egit vitam, vulnus pallidum fri-

gidum & leviter tumidum apparebit, & manebit fere in eodem statu. Si tali homini darentur eadem ac in priori casu, peior multo redderetur & vulneris & totius corporis conditio, si vero huic detur radicum caryophyllatæ, imperatoriz, helenii, angelicæ, contraiervæ, serpentariæ virginianæ &c. infusum vel leve decoctum, addita aliqua erian vini copia, paucis postea horis incipiet plus calere toto corpore & sudare; vulneris color pallidus mutabitur in magis rubicundum, nova vita quasi redibit in flaccidis his partibus, resenerabitur perditum & consolidabitur vulnus. Si jam ingens febris, magnusque calor vulnerato adsint, missio sanguinis, decocta tamarindorum, trifolii acetosi &c. proderunt. Ubi autem non adeo evidenter cognoscitur latens impedimentum, interinque vires vitæ sunt satis valide, ut inessam horum decoctorum copiam movere possint, decocta radicum chinæ, sazzaparillæ, scorzonæ, filari germanorum &c. dantur: hæc enim remedia diluant, attenuant, solvant sine impetu, vasa laxant & aperunt: sic-

que

que aquabilissimam circulationem reddunt; urinae & sudoris viis multa eliminant de

corpore, quae retenta nocere possent. Hoc tunc totum est, quod fieri poterit.

§. 200. **A** Eris puri semper, ab exhalante putri liberi, saepe renovati, temperies sicca cum calore temperato optima.

Dum in nosocomiis in eodem loco plurimi vulnerati decumbunt, putridis exhalationibus repletur aer; unde fere omnes pessime se habent, & plures moriuntur, qui aliter ferveri possent, quapropter haec loca apertis fenestris perscrutari sapienti debent, ut renovetur aer, & dissipentur putrida illa in aere haerentia. Solent ad hanc rem & sustumigia laudari; sed aeris renovatio plus reficit decubentes. Omnium autem maxime nocet capitis vulneribus aer non renovatus saepe, uti observata docuerunt. Temperies autem aeris requiritur talis, ut blando tepore verno quasi resocillet; frigidus enim aer vulneribus semper nocet, partes enim, per vulnus involvitur tegentibus nudae, illico frigore sentiunt non consuetum, & ab illo male afficiuntur. Hinc dixit Hippocrates (*Aphorism. 20. Sect. V. Tom. IX. pag. 205.*) *Ulcus frigidum mordax, cu-*

*tim obdurat, dolorem non suppurantem facit, nigrescens, rigores febiles, convulsiones & tetanos facit.* Sed simul cum calore requiritur aeris siccitas; aer enim calidus & humidus quam maxime in putredinem pronus est: tali enim tempestate carnes maculatorum animalium brevi tempore corrumpuntur, & in putridum tabum dissolvuntur. Possimus jam per artem aerem, in quo versantur vulnerati, pro lubro temperare: largo enim accenso foco, imprimis ex lignis aromaticis, aeris frigus minuitur, & corrigitur nimia ejusdem humiditas. Si nimis calida & sicca fuerit tempestat, pavimento saepius de die aqua frigida persperso, vel florantibus sambuci arboris, tiliae, vel salicis ramis aquae immeris, gratum possumus facere aeris refrigerium. Theriacoplia autem & Hygroscopia demonstrabunt aeris requisitam temperiem.

§. 201. **A**lvus servetur laxa usu emollientium, laxantium; & non perstricta.

Non agitur hic de illis, quae valida vi alvum ducunt; illud enim hic non requiritur. Sed tantum hoc obtineri debet, ut vulnerati sine valido nixu & molimine alvum exonerent. Videmus enim homines, qui magna cum difficultate duras faeces alvo expriment, retento per validum nixum aere in pulmone, aciem habere tenentem & rubram imo saepe lividam; unde saepe Haemorrhagia in vulnere recrudescere posset, & iterum dilacerari illa, quae recrefcere inceperant; imprimis si vicinis ano locis vulnus infectum fuerit. Unde prudenter illis, quibus ob calceni educationem, vel ani fistulam, vicinis ano locis vulnus insiguit, aliquot diebus ante operationem perficiendam leni purgante & clystmatibus crassa intestina evacuantur sic, ut nullae faeces remaneant; deinde per aliquod tempus solum carnis jusculum illis datur, quod vitam sustinere poterit, interim vix faeces in intestinis relinquit; unde perfecta operatione diu sine alvi evacuatione commode vivere possunt. Hinc monuit Hippocrates (*Lib. 1.*

*de morbis cap. IV. Tom. VII. pag. 535.*) quod vulnerato alvus resiccata noceat.

Alvus autem sine magno molimine exoneratur, si faeces molles fuerint, & fistula intestinalis lubrica facile dilabi patiatur descendentes faeces. Hinc strictis illis & macilentis corporibus adeo dura saepe alvus est: in illis enim valida vi intestinorum omne solubile ex faecibus emulgetur: unde siccissimae, compactae & durae evadunt, & simul molli sinuante non satis obducta intestina difficilem faciunt faecibus transitum. Juscula hinc pingua, molliissima olea, emollientia decocta, blanda olea pressa, emolliendo faeces, & lubricando vias huic scopo satisfaciunt. Similia clysmatis forma injecta eundem faciunt effectum, & imprimis profunt, si jam durae faeces in ultimis intestinis haerent; tunc enim illico juvant, dum reliqua assumpta longiori tempore indigeant, antequam ab hac loca deferri possint: & saepe metuantur, ne, subito temefino deponendi alvum orto, cogatur vulneratus valido nixu duras faeces exprimere. Possunt.



Postquam hæc emollientia & lubricantia exhibita fuerunt, vel & sæpe una cum illis, dantur talia quæ leni stimulo sæcum alvinarum excretionem promovent, nec interim corpus turbant, vel liquidas excretionem faciunt: observatum enim est post purgantia data alvum semper adstringi. Illa autem medicamenta, quæ hoc periciunt, vocantur ecoprotica, quia solas fœces crassas intestinis contentas expellunt: horum Catalogus habetur in Materia Medica ad hunc numerum. An autem talia remedia habeantur stricta hujus vocabuli significatione solum sterco educuntia, dubium videtur: omnia enim illa, majori dosi data, liquida per alvum ducunt. Sic enim recentes horarum fructuum succi, & multa inde facta, manna, Cassia, mel, Tamarindi &c. majori copia, vel repetito usu, non tantum educunt per alvum illa, quæ intestinorum cavo hærebant, sed efficacissima vi fundunt humores, fusosque per alvum evacuant. Illa autem proprie purgantia vocantur. Antiqui Medici jam hæc probe distinxerant. Asclepiades enim erat in illa opinio, purgantia corpus colliquare (*ευντίνυν το σῆμα*) deinde liquata educere, quæ antea non præexistant (*Galen. de natural. facult. Lib. I. cap. 13. Tom. V. pag. 21.*). Et Thessalus, uti ex propriis ejus verbis a Galeno citatis (*Galen. adversus Julianum libellus cap. 8. Tom. IX. pag. 391.*) patet, concludit, a purgante medicamento materiam in corruptionem permurari: deinde externi vel sursum per vomitum vel deorsum per alvum: illudque probat exemplo Athletæ bono habitu præditi, & qui secundum naturam se

habebat, cui datum purgans admodum corrupta eduxerat, quæ procul dubio in sano & robusto hoc homine non præexistierant. Galenus, qui credebatur purgantia attrahere illa, quæ talia præexistierant in corpore, acerrime quidem in hanc sententiam invehitur, nec tamen videntur ejus argumenta sufficere, ut hoc improbet. Certe scamoneum, etiam sanissimo homini datum, fundit sanguinem in putridam aquam, quæ alvo educitur, potestque totum corpus emaciari penitus repetito ejus usu: sic ut pallor, collapsa vasa, & debilitat vires satis doceant, noneducta fuisse corrupta, quæ præexistierant, sed virulenta vi pharmaci corruptos fuisse &eductos de corpore bonos humores.

Cum ergo omnia illa, quæ ecoprotica dicuntur, majori copia data purgandi vim habeant, & plurima purgantia, minuta dosi data, leni stimulo sic irritent, ut contentæ tantum intestinis fœces expellantur; patet hunc effectum obtineri posse, si minori dosi dentur, ut corpus non multum turbent, nec humoribus magnam mutationem inducant, interim tamen alvum laxam servant, quod in hoc casu tantum requiritur.

Sollicite etiam solius Hercores educationem a purgatione distinxit Hippocrates, (*In Prognostico N. 52. Tom. VIII. pag. 646.*) postquam enim de spūitū regit, dicit: *Quicunque enim dolores ex his locis non cessant per spūitorum expurgationes, neque per alvi dejectionem, (πεδερὲν τῶν κατὰ τὴν αἰχμὴν ποτὶ) neque per vena sectionem, & dietam, & purgationes, (καθαρμίας) supurationem concitantes esse, secundum est.*

## §. 202. Somnus conciliandus anodynus, victu humido, narcoticis.

Subtilissimi liquidi defectum, spirituum nempe, natura reparat unico tantum modo, per motum nempe vitalem solum, existente omni animali motu, id est per somnum tranquillam. Dum validis laboribus lassatus, vel meditationibus exhaustus homo, optimos cibos sumit, nisi simul blandum somno corpus refecerit, torpere mentem, gravari corpus sentiet. Sed post bonum somnum quanta sentitur in corpore agilitas, quam pacata redit menti serenitas: quam facilem sentiunt mentis perspi-

caciam, qui bono somno refecti maturinis horis meditationibus indulgent! Hinc licet ex cibo & potu ingerantur talia, quæ restituere poterunt illa, quæ vitæ & sanitatis inevitabili lege quotidie pereunt de corpore, somni tamen tempore illa imprimis perficiuntur, ut apta evadant succedere in locum perditorum. Respiratio enim fortior, cordis & articularum actio validior & magis equalis, somni tempore humores omnes sic perficit, ut optima inde possit fieri refectio perditæ, dum causæ mutant, applicantes & con-

& consolidantes, tanta cum libertate agunt. An hoc voluit indicare Hippocrate (*De Insomniis cap. 1. Tom. VI. pag. 511.*) dicens? *Animam enim vigilat, & quam quidem corpori subministrat, hanc ipsa sibi vacat, sed singulis corporis partibus quandam partem subministrat, sensibus nimirum, visui, auditui, tactui, ambulationi, alimen, omnique corporis cogitationi, ipsa vero mens sui officii non est. Quomodo vero corpus quiescit, anima movetur, & in corporis partes subiciens demum suam gubernat, omnesque corporis actiones ipsa obit.* Patet ergo, quam noxie sint vigilie protracte vulneratis, quam necessarius sit somnus ad regenerationem perditæ & consolidationem vulneris. Si ergo somnus deficit, ille conciliandus est, quod fit ANODYNIS, quæ dolorem tollunt: vigilie enim, in vulneratis imprimis, a dolore molesto sunt, quamvis & mordaces curæ & validi animi affectus vigilias inducere possint. Illa autem quæ dolorem tollunt, triplici modo possunt hoc efficere; vel enim agunt tollendo causam illam corpoream, quæ talem mutationem facit in corpore, ut inde in mente nascatur molesta illa perceptio, quæ dolor vocatur: vel partem corporis, cui causa dolorem faciens applicatur, sic disponunt, ut non vel minus valide afficiatur ab eadem causa: vel denique non ablata causa doloris, & manente eadem conditione partis affectæ, tollitur doloris sensus. v.g. dum pars inflammata dolet, causa doloris est sanguis inflammatoria densitate immeabilis hærens in vasis, cum impetu vitalis liquidum magna vi urgente in vasa obstrueta: omne ergo illud, quod poterit sanguinem impactum reddere sic meabilem, ut fluat libere per vasa antea obstrueta, tollit dolorem, sublata ejus causa. Sed si mollissimis applicatis cataplasmatibus vel fomentis sic laxentur partes solidæ, ut facile cedere possint dissendentibus causis sine rupturæ periculo, licet maneat eadem densitas inflammatoria sanguinis, & æque validus impetus a tergo urgens, aberit tamen, vel saltem plurius minuetur dolor. Denique si nihil ex modo dictis factum fuerit, sed remanserit doloris causa, & eadem conditio partis affectæ, & detur granum unum aut alterum opii homini non assueo, nullus erit doloris sensus, licet causa dolorem excitans pergat agere. Hic generaliter nomine omnia remedia, quæ uno ex tribus his modis dolorem tollunt, dicere-

tur anodyna. Obtrivit tamen usus, ut illa tantum sic vocarentur, quæ vel doloris causam tollunt, vel partem dolentem sic mutant, ut non afficiatur, vel saltem minus valide ab eadem causa. Illa vero, quæ doloris tantum sensum tollunt, non mutatis doloris causa vel parte affecta, vocaverunt narcotica, id est, stupescientia. Olim tamen stupescientia vocaverunt etiam anodyna. Sic enim Cælius Aurelianus de dolore dentium agens dicit: *Multi autem veterum Medicorum accessionis tempore ea medicamina adhibenda jusservnt, quæ anodyna Greci vocaverunt; nos indolores dicere poterimus, quæ ajunt nocturno tempore adhibenda, profecto sensum, non dolorem auferentia* (*Morbos. Chronicor. Lib. II. cap. 4. pag. 373.*). Sic & Celsus dixit: *Anodyna vocant, quæ somno dolorem levant. Quibus uti, nisi nimia necessitas urget, alienum est* (*Lib. V. cap. 25. pag. 278.*).

Præcipuæ jam doloris causæ sunt in vulnere distractio partium adhuc coherentium, dum vulneris labia utrinque retrahantur: tensio fibrarum nervearum, a truncis majoribus discissis tetrotractis, & laterales nervos minores trahentibus, vel &, semidiscissis vel punctis nervis tensis, distractio fibrillarum adhuc integrarum: inflammatorius tumor fundi & labiorum vulneris: humores effusi in cavum vulneris acres facti, hinc irritantes crudas has partes. Anodyna ergo erunt omnia illa, quæ diluendo, laxando, humectando, acrimoniam natam emendando vel obrundendo, denique tumores distendentes resolvendo, tollunt doloris causam, vel partem affectam sic mutant, ut a doloris causa non afficiatur ita, ut in mente nascatur ingrata illa perceptio, quæ dolor vocatur. Hæc omnia in Materia Medica rediguntur ad proprios titulos.

VICU HUMIDO. Omnia femina farinosa tusa possunt valida pressione oleum fudare satis copiosum: Eadem hæc trita cum aqua dant Emulsiones sic dictas, in quibus blanda olei indoles manet sine rancidæ corruptelæ metu. Ex his ergo, vel horum farinosorum decoctis cum aqua, lacte, jusculis, habetur victus humidus, in quo aqua prædominatur, sed sic adherens farinoso horum lentiori, ut non facile dilabatur de corpore, sed diu maneat. Talis victus diu continuatus pertinacissimos etiam dolores lenit, laxatis solidis, & blandissima facta omnium humorum indole.

NAR-

NARCOTICIS. Si jam præcedentibus auxiliis non cedat, nec remittat dolor, vel adeo sævus sit, ut non possit ferri sine magno damno, donec doloris causa tolli possit, tunc dantur in arte talia remedia, quæ, non sublata doloris causa, tollunt ejus in mente conscientiam. Summa enim causa doloris potest esse in corpore sine ullo doloris sensu, uti patet in Apoplecticis, qui ne quidem vivi ignis applicati vim sentiunt. Plurima quidem habentur, in quibus hæc vis obtinet, ut Hyosciamus, Solanum, Datura &c. quorum tamen omnium suspensus usus est, imprimis si interne sumantur, quia mentis actiones adeo mirifice turbant. Tumor longæ, & innumeris Experimentis probatus Papaveris usus. Europei Papaveris minor efficacia majorem dosim postulat: Asiatici Papaveris succus, Opii nomine in officinis adeo notus, si prudenter, & debita quantitate usurpatur, pulcherrime doloris sopit; reditum tamen, si causa doloris maneat, post aliquot horas, ubi vis remedii cessat. Frigida intemperie nocere papaveris succum voluit Galenus, (*Method. curandi Lib. XII. c. 3. Tom. X. p. 290. & alibi plurimis locis.*) & post illum plurimi alii: hinc vel trepide usurpaverunt, calidissimis admittis metuendum illud frigus corrigere tentantes, vel damnaverunt omnino tanquam deleterium pharmacum. Qui calidum amarorem opii semel gustavit, facile credit, male frigidam opio noxam ascribi. Adhæsit tamen optimo remedio diu huius infamiae nota, sic ut plurimi Medici abhornerint ab ejus usu: unde Paracelsus non exiguam partem suæ celebritatis opio debuit, dum Laudano suo tam mira faciebat in morborum curationibus. In Asia quotidiano usu opium & magna quidem copia sumunt impune; imprimis illi, quibus Religio vini usum verat. Imo illi, qui maxime damnabant opium, utebantur sine ullo metu magnis illis compositionibus Officinalibus, Theriaca, Mitridatio, Philonio &c. in quibus magna copia opii adest. Alii turpis lucri causa alii tectum remediis clam dabant opium, quod publice damnabant, ut viderentur aliis arcanis perficere, quod soli debebatur opio. Verum quidem est, quod plerique Medici fuerint in illa opinione, ac si vis medicata Mitridatii, Theriacæ, & similium non penderet a conspiciantibus viribus omnium ingredientium, sed

Tom. I.

ex unione tot diversorum nasceretur novum quoddam & penitus singulare remedium, cuius vis medicata non foret adhibenda collectis ingredientium viribus, sed ex omnium unione nova proflus & efficacissima exurgeret; unde laudabant antiquam Theriacam, & præferebant recens paratæ. Licet prima fronte speciosum videatur hoc ratiocinium, rem tamen consideranti apparebit facile, magis his compositionibus vim calidam aromaticam inesse, præcipuum tamen virtutem pendere ab opio. Mitridatium enim Damocratis, reliquis antiquius, ex tot universis componebatur, ut Plinius dixerit (*Lib. XXIX. c. 1.*): *Quo Deorum perfidiam istam monstrante: humanum enim subtilitas tanta esse non potuit: essentia artis & portentosa scientiæ venditatio est.* Andromachus autem, qui Netonis tempore vixit, & inter ejus medicos primus erat, Mitridatii Damocratis, paucis dentis, omnia ingredientia retinuit, quadam addidit, imprimis viperarum carnes, sicque novum fecit antidotum, quam Theriacam dixit a viperarum carnibus additis. Libellum Græcis carminibus scriptum Neroni dicavit, in quo theriacæ suæ recensebat descriptionem, quam & γαλαμ, id est, tranquillam vocavit. Nec mirum certe, calidus enim Andromachus triplum opii suæ Theriacæ addidit, unde incepit obsolescere Mitridatii Damocratis celebritas; sola Theriaca extollebatur innumeris laudibus, & per, tot secula tanti nominis famam retinuit; evidenti argumento, opii usum fuisse quotidianum & salutarem etiam illis temporibus, quibus damnabatur ab omnibus fere Medicis.

Omnia hæc ex papaveris floribus, foliis, succo, parata remedia, quæ in officinis prostant, possunt sic adhiberi, ut vel levissime sensuum acumen obtundant, vel aucta dosi somnum inducant satis profundum; imo imprudenti usu lethalem possent facere apoplexiam. Sic sæpe accidit, minori dosi hæc data dolorem quidem compescere, nullo indulto tamen somno, sed pacatissima menti & corpori nascitur quies, quam ne verbis quidem describere se posse mirantur gratum hoc solamen experti. Non omnibus tamen hominibus eodem effectus facit hoc remedium, eadem quamvis exhibitum copia: dum ergo Medicus ignorat peculiarem ægri circa usum hujus remedi idiosyncrasiam, præstat aliquot grana opii idoneo diluente

P

veh-

vehiculo, & cochlearim dare, v. g. omni quadrante horæ, donec percipiatur doloris levamen. Verum tamen eadem quantitas opii majorem effectum præstat simul & semel exhibita, quam si detur divisa dosibus. Qui sæpius sumierunt, nisi augeatur sensim hujus remedi copiam, non amplius inde levantur: sine noxa tamen, sensim aucta dosi, ingentem opii copiam quotidie sumpsisse homines plurimos, illisque certissimis, observatis constat. In materia medi-

ca jam habentur variz formulæ, quibus hæc remedia pro re nata exhiberi possunt sic, ut majorem minoremve effectum probitu præstent. Hoc incommodi habent semper, quod alvum adstringant; sed lenè clystima facile tollit hoc malum.

Sed & similia remedia externe loco dolenti applicata levamen luminum faciunt: unde Cataplasmata & fomenta ex emollientissimis herbis parata, adhaeris simul hyoscyami, papaveris hortenſis &c. solus, tanti usus sunt.

§. 203. **A** Nimis sit hilaris. Venus vitanda, quies commendanda est.

Validi animi affectus omnes, cum miris adeo modis corpus mutare, & in omnibus suis functionibus turbare possint, nocebunt semper vulneratis: sed pacata illa mentis serenitas, qua nullius mali conscientia nihil adversi meruit, & omnia prospera sperat, hic imprimis convenit. Profusum gaudium aque noceret, ac alii magni animi affectus. Saucioribus, & alii, qui de statica medicina scripserunt, observarunt hilaritatem corpus quam maxime perspirabile reddere, & leve ad sensum. Sed hoc designat liberrimam per omnia vasa circulationem, & expeditissimam excitationem omnium functionum, id est, optimam sanitatem.

**VENUS VITANDA.** Nihil enim magis movet totum systema nervosum, quam Veneris usus: hinc communi omnium Medicorum consensu vulneribus noxiis habitus fuit; & tristes casus docuerunt funestum eventum: Tale exemplum §. 127. N. 2. habetur, ubi seminis emissio sine coitu pessima symptomata, & mortem ipsam produxit. Hinc in vultu vulneratorum vitanda omnia, quæ

tentiginem Veneriam irritare possunt, ut ostrea, cancri, gammarii &c.

Quietem autem vulneratis necessariam esse, sponte patet: motu enim tenerissima illa vascula, quæ informis muci specie in vulnere recreſcunt, destruuntur.

Binæ requirebantur conditiones, (vide §. 189.) ut fieret regeneratio periti in vulnere: nempe, ut liquidum sanum debita copia & apio impetu deferatur ad vulnus; deinde ut vascula excipientia humores allatos habeant illas vires, quæ requiruntur, ut exsiperent & transmittere possint talia liquida, quæ secundum sanitatis leges per hæc vascula fluere debeant. Hæcenus a §. 192. hac usque imprimis actum fuit de illis, quæ in vultu & remediorum usu observari debent, ut bona fiat humorum indoles, qui ad vulnus deferrentur. Sequitur nunc, ut agatur de canalium transmittentium in vulnere dispositione tali, quæ requiritur, ut fiat perditæ subtilitatis restitutio, & separatorum unio.

§. 204. **U**T canales in debita conditione (§. 189.) maneant, nec liquida in vulnere corrumpantur, sicque hædant actionem (§. 189. 190. 191.) descriptam, aer arceus, vulnus totum fovendum balsamicis vulnerariis lenibus, implendum carptis, ad æquabilem pressionem, nervisque amicis medicamentis.

Post vulnus inflicti, discissorum canalium extrema retrorahuntur, angustantur, & resistunt liquidis per illos pulsus: incipit tunc inflammatio nasci in labiis & fundo vulneris, & post hanc puris sequitur confectio: dumque hoc fit, ex fundo cavi vulneris sursum, & ab omni ambitu centrum versus, protruduntur sensim vasculorum hiantium extrema, quæ tenerum mucum referunt. & ex hac materia sic renata fit regeneratio periti in vulnere (vide §. 158.). Patet er-

go, requiri ad hanc rem, ut canales illi pulposi debitam retineant molliem, & humores effusi per patula vasorum oscula in cavum vulneris blandam retineant indolem; si enim spontanea degeneratione acrimoniam acquirant, destruetur illud pulposum renascens. Utrique autem scopo satisfiſcit, si aer arceatur. Constat enim ceratissimis observatis, animalium partes diutissime servari posse incorruptas, si omnis aeri accessus prohibeatur; cum e contra paucis sepe diebus putrescant,

cant, si aperro aeri exponantur. Carnes caprinæ & gallinæ affatæ, in particulis distictæ, bytiro liquefacto immerse, in dolio exacte clauso conservatæ fuerunt ultra sex menses in navi ex Indiis reduce, intensissimo quamvis sub aeris calore, sic ut pristinam saporis gratiam perfectissime retinuerint (Boyle de utilitate Philosophiæ Experimentalis Exercit. pag. 184.). Præterea aer libere ad vulnus allabens tenerrima illa vasculorum renascentium extrema exciscando destruit: unde ab his mortuis sordes in vulnere antea puro nascuntur, quæ iterum separari debent, antequam consolidatio fieri possit. Ob hanc causam crediderunt multi, aliquid venenari in aere hære, cum viderent tantas mutationes vulnorum a libera aeris admisione. Ideo etiam raras vulnorum deliquationes adeo commendaverunt peritissimi Chirurghi.

Debet ergo tegi superficies tota vulneris sic, ut ab aere defendatur. Hoc omnium optime fit per Balsama, vulneraria dicta; & imprimis per Balsama nativa, quæ omnia spissa unctuositate hærent, blandum aroma in se habent, & simul acidum, quod putredini omni resistit, sic tamen obvolutum pingui, ut non noceat sua acrimonia. Chemica enim Analysis ex omnibus balsamis natis aridum liquorem, & fragrans tenuis aromaticum oleum educit, in fundo matente tenaci resinosa parre. Dum hæc modica copia, leviter calefacta, ut æquabilis distillant, vulneris superficiem applicant, sequuntur tenerrima hæc vascula, æreum pinguedine sua arcent, omnemque ex-

siccationem impediunt, & simul humores effusos a putredine præservant. Ex his liquet, parcam tantum Balsamorum copiam ad hos usus requiri, & male agere illos, qui magna copia horum vulnera insarciunt: sunt enim corpora heterogenea in vulnere, quæ concretionem partium interpositione suæ molis impediunt. In materia medica jam ad hunc numerum plura recententur nativa Balsama & artificialia, quæ omnia fere simili modo arunt & profunt.

His factis cogitandum est, quod cutis æquabile tegumentum ablit in vulnere; hinc vascula illa pulpola recrefcentia, molli balsamo tella & humido calore tota, facile cedent liquidis distendentibus, augebuntur omni dimensione, & dilatare admittunt alienos humores; hinc tota vulneris superficies degenerabit in flocculentam substantiam, quam carnem fungosam vocant Chirurghi. Hoc impiedietur, si tam moderata pressio vulnere incumbat, ut cutis antea coercentis defectus suppleatur: quod fiet, si lintreis carptis mollissimis siccissimisque, leviter inunctis leni balsamo illa parte, quæ vulneris superficiem tangunt, vulneris cavum impleatur: deinde Emplastro vel fascia circumducta sic firmentur hæc, ut lenissima pressione nimiam vasculorum dilationem coerceant tantum, cavendo interim, ne nimis premendo destruantur tenerrima hæc vascula, vel suffocetur vitalis liquidi motus per has partes. Simul blanda tali compressione cavebitur, ne membrana pinguedinosa, undique in vicinia cutis tegmine coercita, affurgat in vulnus, & ibi degeneret fatis cito.

§. 205. Quibus (§. 204.) in vulnere retinendis Emplastra profunt, vix aliud huic scopo præstantia, quam tenacitatem, non lædentem.

Non facile hoc credunt Chirurghi, qui felices vulnorum curationes plerumque suis solent adscribere Emplastris, & singali fere hic sua jactant arcana. Si tamen enarratæ præcedentibus paragraphis conditiones vulneri adjuerint, sanatur, quæcunque demum imponatur Emplastrum: modo nihil continetur in se, quod nocere possit, inceptum naturæ opus turbando, vel conditiones requiritas ad regenerationem perdit in vulnere intendendo, nimis stimulo v. g. vel alia quâunque ratione. Quod autem hæc res sic se habeat, patet inde, quod licet unusquisque fere sibi soli cognitum, & reliquis omnibus præponendum, Emplastrum adhibeat, tamen

omnes æque feliciter curent, si reliqua auxilia eodem modo vulnere adhibita fuerint. Verum quidem est, quod Emplastra cuti externæ applicata, præter tenacitatem requisitam, possint continere talia ingredientia, quæ calore corporis, cui applicantur, mota & actus reddita se infinuant vasibus bibulis, sicque non solum agant in partem illam, cui applicantur, sed etiam totum corpus efficacissime mutare possunt: uti v. g. Emplastra vesicatoria, Mercurialia & similia plurima: sed de hæc res hic non agitur: requiritur enim tantum in hoc casu, ut vulnere applicata retineantur in loco, unde sola tenacitas hic sufficit ad hunc scopum.

pum. Hinc plumbata illa Emplastra, quæ ex plumbo vel ejus calcibus variis in oleo coctis ad requisitam tenacitatem fiunt, tauti sunt usus: dum facillime feruntur etiam ab illis, quibus a pingui fere quocumque

applicato cutis inflammatur. Talia sunt Emplastrum de Minio, Diapalma, Diaporpholygos, de Cerussa, Defensivum rubrum Vigonis, & plurima similia, quæ eundem præstant effectum in hoc casu.

§. 206. **L**iquida ad vulnus allata, in vulnus effusa, fibræ semimortuæ, canales obstructi tumefactique, creant in vulnere pus, ichorem, fordes, carnes spongiosas.

Singulis vulneris deligationibus accurate vulnus lustrandum est, ut videatur, an aliquid occurrat mutati in tota superficie, quod perditæ substantiæ regenerationem, & vulneris consolidationem, impedire possit. Si enim omnia rubra, nitida, & humida æquabiliter fuerint, novimus vasa & humores habere debitas conditiones, ut fiat sanatio: si vero sicum apparuerit, vel fœdum vulnus, certo scimus, non posse consolidari illud, nisi prius iterum fordes illæ ablatur sint, & vasa æquabiliter humores transmittant in omni puncto superficiei vulneris. Hæc autem impedimenta nascuntur, vel ab humidis effusis, degenerantibus in alienam indolem: vel a vasibus obstructis & tumefactis, vel ab utroque simul. Plurimæ enim partes possunt in vulnere esse pro parte discissæ, sanis quidem partibus coherentes adhuc, omni tamen vitali influxu orbæ: unde emoriuntur, & separari debent; & quandiu ibi adhuc hærent, heterogenei corporis instar, impediunt consolidationem. Postquam autem vasorum officina in vulneris superficie incipiunt effundere humores, illi collecti stagnando, calore loci, tenuissimeque partis distillatione, mutantur in unctuosum blandum liquidum, pus dictum, quod semper bonum est, uti dictum §. 158. Nu. 7. nimis tamen diu relictum in vulnere nocere possit; tunc enim corrumpitur & acre fit. Si vero vulneris superficies maceat tenui ichore, non bono pure, nunquam fiet bona consolidatio, quandiu hoc adest. Hoc autem intelligitur, si talis tenuis sanies in vulnere appareat, postquam per duodecim vel plures horas idoneo apparatu tectum mansit vulnus: nam si omni pure ablato post horam unam aut alteram denudetur vulnus, non aderit pus, sed longe tenuius liquidum, quod tamen ibi relictum in pus mutabitur. Sed ichoris nomine hic intelligitur tenue liquidum, pierumque simul acrioris indolis, quod mora in vulnere nunquam tamen in bonum pus convertitur, sed semper acrius fit. Talis autem ichor vel fit

a liquidis effusis, non murandis in bonum pus; vel fit etiam ab optimo pure nimis diu in vulnere relictio; tunc enim iterum attenuatur & acre fit. Dum enim pars corporis suppurata, & undique emollita, debito tempore lanceola pertunditur, bonum & crassum pus exit: si vero talis locus nimis diu clausus maneat, contentum pus attenuatur iterum, & tunc apertura facta loco boni puris tenuis effluet sanies.

Sordes autem nascuntur in vulnere vel a semidiscissis partibus; vel a mortuis nondum a vivis partibus separatæ; vel a vasibus dilataris & liquido immeabili distentis; tuncque vulneris superficies non apparet pura & rubra, sed alba fere instar lardi: & nisi harum sordium fiat separatio a vivis partibus suppositis, in colorem flavum, immo fuscum mutantur, & eo pejorem degenerationem norant, quo color ab albedine in fuscum magis declinat.

Carnes autem spongiosæ tunc inprimis nascuntur, quando superficies vulneris non comprimitur æquali vi, ac cutis integra premit vicinas partes: unde panniculus adiposus assurgens tumet, & cito degenerat in fungosam dictam carnem, uti dictum fuit §. 158. Num. 5. omnium maxime si per ferbrim natam impetus & velocitas circulationis augetur: tunc enim dilata vasa cito assurgunt, si debita compressio non impederit. Videmus autem ubique fere in toto corpore, ubi æquabilis pressio coercens ablata est, partes in locum minus resistentem assurgere. Sic in vulneribus capitis, vel post trepanum applicatum, calvaria tegmine ablato, si simul dura mater discissa fuerit, cerebri substantia in mirabiles fungos excrescit. Discissis per vulnus abdominis tegumentis, integro tamen manente peritonæo, nisi firmetur ligatura idonea locus, paulo post contenta abdominis pressa in locum minus resistentem, dilatato peritonæo, herniam facient. Carnium ergo fungosarum origo in vulnere est tantum naturalis sequela diminutæ æquabilis pressionis.

Sed

Sed omnia hæc in vulnere, quamdiu adsunt, impediunt consolidationem: heteroge-

nea enim sunt; hinc auferenda: quomodo hoc fieri debeat, docebit sequens paragraphus.

§. 207. **Q**Uæ ( 206. ) digerente, abstergente, corrodente, exsiccante auxilio tolli solent, sæpe & comprimendo.

Quando vident periti Chirurgi, vulneris superficiem sic degenerare, ut non ubique humida & rubra sit, sed sordes albz, flavæ, vel fusæ appareant; noverunt, optima etiam balsama non sufficere. Natura quidem sola per bonam suppurationem nititur separare hæc corrupta, sed vasa viva supposita, foridibus his incumbens & adherentibus impedita, non valent hæc removere tam facile; unde hæc jam semimortua diutius hærentia corruptuntur, & in pejorem indolem degenerant. Applicant tunc talia remedia, quæ emolliant quidem hæc sordida, sed simul saponacea vi solvant, & leni stimulo irritant vivas partes suppositas, ut fiat facilior separatio harum sordium a vasibus vitalibus, quibus adherent. Hæc vocantur digerentia termino chirurgico a ventriculi digestionem desumpto. Sumunt v. g. balsamum quodcumque nativum ut terebinthinum, & cum vitello ovi terunt, ut oleosa balsami tenacitas frangatur sic, ut in aqua dilui possit, addunt deinde mellis aliquam copiam, quod saponacea sua vi plurima concreta dividit & solvit. Tale medicamentum plumaceolis exceptum vulneris superficiei sordidæ applicat: emollitæ sic sordes, & vi saponacea solutæ, pure bono facto separantur a partibus sanis, & redditur purum vulnus. Pulcherrime talium remedium usum, ubi impura vulnera sunt, indicavit Hippocrates, dicens: *Pinguia inflammatis non conferunt, neque fordidis, neque putrescentibus. Verum ad inflammata prosunt frigida, ad sordida vero & putrescentia, acida, & quæ morsum quemdam excitando purgant* ( *De affectionibus* cap. 10. Tom. VII. pag. 631. ). Et alio in loco docet, humores bonos per vasa ad vulnus delatos avertere his remediis emollitis & facilius separandas sordes: *siquidem ulcus occludere vel implere opus sit, tumefacere juvat &c. Cibis enim recreata caro illam, quæ a medicamento compuitur, propellit, & una cum natura debellat* ( *De locis in homine* c. 13. Tom. VII. pag. 372. ).

**ABSTERGENTES.** Hæc remedia parum acriora sunt digestivis dictis. Si ergo præcedentibus addantur aloë, myrrha, sapo-

Tom. I.

nis Veneti paululum; habetur medicamentum abstergens, quod a digerente tantum gradu paulo majoris stimuli differt.

**CORRODENTE.** Illa jam prioribus longe acriora sunt, & partes, quas tangunt, e-mori faciunt; hinc crustam vulneris superficiei, cui applicantur, inducunt: sub qua vasa vitalia suo motu & allatis liquidis sensim illud mortuum separant & expellunt. Hæc autem omnia faciunt quidem, ut omni vitali influxu priventur sordes ille adherentes vasibus vivis, sed nunquam per hæc sola separatio mortui obtinere poterit, quod sola natura per suppurationem bonam perficit. Hunc autem usum habent, quod vasa obstructa & dilatata, in vulnere sordes facientia, quæ lenioribus abstergentibus pertinacius resistunt, uno momento, & ipso quasi attractu, faciant omni vitali influxu humorum privati: hinc gangrenosam quasi crustam superficiei vulneris obducunt, cui deinde applicantur mollissima digestiva, ut escharæ illæ per corrodentia factæ, horum applicatione emollitæ, vasorum vivorum subjacentium actione separentur a vivis partibus, quibus cohererent, sicque vulneris superficies reddatur pura. Unde apparet, prudentem horum usum requiri, nec sæpe repetitum, nisi deciduis jam escharis vulnus adhuc impurum appareat: Male ergo agere illos, qui credunt, solis corrodentibus depurari posse vulnus, cum tantum sordium augmentum impediunt, his in mortuum escharam convertis, quæ postea emolli, & suppuratione facta separari debet: Imo nimis repetita applicatione partes vivæ puræ similiter afficiuntur; unde sordes augentur tunc, non minuantur. Pulchre hoc notavit Galenus, narrans, Medicum sordido ulceri rodens medicamentum adhibuisse quotidie, & maxime miratum fuisse, quod sordes augerentur, non vero minuerentur, unde augebat imprudens applicati remedii efficaciam, sed nialo eventum. Quippe quantum ille intendebat medicamenti acrimoniam, tantum caro subiecta colluabatur, & sordes augebat ( *Galeni Method. Medendi Lib. III. c. 6. Tom. X. pag. 68.*  ).

P 3

In

In Materia medica recensentur jam hæc corrodentia, pro vario acrimoniæ gradu in varias classes distincta. Efficacissima imprimis sunt illa, quæ ex acido fortissimo, glebæ metallicæ unito, constant; & inter illa Lapis infernalis dictus summum usum habet: constat enim concentratissimo nitri spiritu & argento purissimo unitis; & cum forma solida habeatur hoc corrodens, & in quamvis figuram possit formari, potest fere omnium totissime applicari. Reliqua enim vulnere adhibita in totam ejus superficiem agunt æqualiter: lapis autem infernalis singulis punctis potest applicari, & momentaneo actu escharam facit: unde major vel minor hujus effectus est, prout citius aufertur, vel diutius applicatus manet: & cum sæpe non omnes partes superficiei vulneris aque crassis sint oblectæ sordibus, hinc non æque validam corrodentis actionem requirant; omnium pulcherrime hoc moderamen adhibito lapide infernali observari poterit.

Escharæ autem per corrodentia factæ dein lenissimis applicatis remediis debent emolliari, ut a vivis partibus subjectis possint cito separari; & illis deciduis tunc apparet, an repetita corrodentis applicatio necessaria

sit: an vero lenioribus digestivis, vel abstergentibus, vulnus purum reddi possit.

**EXSICCANTE.** Quando nempe plurimo, & nimis tenui humore, vulnus madet, tunc illa, quæ liquida absorbent, & vascula roborant, imprimis profunt. Tales sunt terrestres bibuli pulvisculi in pollinem impalpabilem triti, ne asperitate suarum partium crudum vulnus irritent, quales sunt v. g. ossium combustorum cineres, mastiche, olibanum, sarcocolla &c. quæ simul roborant.

**SEPE ET COMPRIMENDO.** Imprimis predest compressio, si sordes a dilatatis vasis in fungosam excrecentiam degenerantibus nascantur: licet enim corrodentibus abstergeris spongiosam illam carnem, nisi debita compressione firmaveris has partes, brevi renascetur similis excrecentia; uti in fungis cerebri toties renatis docuerunt observationes. Unde periti Chirurghi tunc sæpe foliis linteis carptis secis vulnus replent, & modica ligatura coercent; vel & aliquando crassum plumaceolum, balsamo vulnerario inunctum averfa parte imponunt, sic ut pars siccæ plumaceoli vulneris superficiem tangat, pars vero superior balsamo inuncta aerem arceat.

§. 208. **I**lla ( 207. ) adhibenda, donec pus album, blandum, viscidum, leve, æquale, inodorum, adsit, sub quo sordes abstergantur, contusa & tumida consumuntur, corrupta ab aere separantur, cava implentur, conglutinantur separata.

Omnia illa, quæ præcedenti paragrapho recensita sunt, possunt compescere nimis facile distendenda vasa, possunt seminovæ partes una cum parte vivorum vasorum convertere in escharam gangrenosam, sed non valent separare hanc crustam a vivis partibus suppositis; hoc enim sola natura per suppurationem facit, nec ullus modus alius superest, quo hoc fiat. Sed suppurationis indicium est puris confectio, de quo dictum §. 158. n. 7. ubi ergo pus bonum apparet in vulnere, novimus vasa sic disposita esse, ut transmittant debita liquida; & simul hæc liquida habere illas dotes, quæ requiruntur ad sanitatem. De illis, quæ requiruntur, ut humores ad vulnus allati boni sint, dictum fuit antea: hoc loco tantum agitur de illis impediuntis, quæ in ipso vulnere hærent, & regenerationem perditæ, bonæque consolidationem, impediunt. Quamdiu enim hæc sordes in vulnere hæserint, æque ac ullum aliud heteroge-

neum corpus, impediunt sanationem. Ubi autem per debita auxilia adhibita in vulnere nascitur bonum pus, tunc novimus per hoc separari posse a vasis vivis omne illud, quod vulneris sanationem impediret. Sed pus illud non tantum debet habere omnes conditiones hic recensitas, sed debet in omni vulneris superficie idem & æquale nasci: accidit enim sæpe, ut non omnis superficies vulneris sordibus oblectatur; sed tantum quædam ejus pars; tunc pura loca bonum pus dabant, reliqua aliud diversæ indolis liquidum fundent; ergo pus non erit ubique æquabile, sed varium in variis vulneris locis, tuncque hæc loca sordida sola requirunt medicamenta paragrapho præcedenti enumerata, quæ vivis & puris vulneris partibus non conveniunt.

Sub hoc pure, quicquid semilacerum vivis coheret, & omnes obstruclorum vasculorum fines, una cum materia obstruente, solvantur & separantur; & vasa libera tunc humo-



humores sine impedimento transmittunt : hinc omnis tumor laborum vulneris ab impedito libero humorum traiectione ortus diffundere incipit, quæ contusione, vel aeris admissione, corrupta fuerant, secedunt, tenerima vascula bono pure tanquam blando & naturali balsamo tectâ elongantur, vicinis

§. 209. **T**um ea, quæ carnem generare dicuntur, applicanda, quæ sunt digerentia leniora.

Hæc remedia sarcotica dicuntur apud Chirurgos : sed unicum tantum vere sarcoticum dicendum est, nempe ipsa natura, sub blando pure renasci faciens perdita : quam rem Galenus tam pulchre expressit dicens in loco antea citato, (§. 158. n. 9.) quod generandæ carnis materies sit sanguis bonus; opifex vero & auctor natura. Reliqua omnia remedia, quibus carnis generandæ vis ascribitur, tantum auferunt impedimenta, & addunt adminicula; & nulla alia sunt, quam quæ pressione debita coercent vasa, & sic disponant, uti solent esse in sanitate: quod faciunt aerem arcendo, fovendo partes, & humores effusos sic coercendo, ut debita mora in bonum pus mutari possint.

Purum enim jam vulnus ab omni acro-

occurrunt, & uniuntur, novamque valorum texturam faciunt; per quam regeneratur perditum in vulnere, & separata uniuntur.

Totum ergo, quod arte fieri potest, est, ut tollantur illa impedimenta, quæ boni puris in vulnere generationem prohibent : reliqua natura sibi semper sufficiens perficit.

ri applicato læditur; destruantur enim tenerima illa vascula, quæ incipiunt renasci, novæ sic ab his emortuis nascentur fordes, quæ iterum separari debent; unde sola hæc tantum conveniunt remedia, quæ §. 204. laudata fuerunt. Bene autem procedere vulneris puri curam novimus, si color addit in vulnere subrubellus (ruber enim nimis color inflammationem nam denotat) si pus debita copia & bonum addit; si fundus & latera vulneris æquabilissime excrecant, nihilque ultra æquabilem superficiem attollatur, & labia vulneris non superent altitudine vicinam cutim, sintque æqualia, nec exesa appareant, & in margine vulneris incipiat color pallidus subcrescens nasci, qui cicatricem fieri indicat.

§. 210. **S**i autem, peractis, quæ primo scopo (§. 185.) satisfaciunt (§. 186. 187. 188.), nihil ex substantia corporis ablatum deprehenditur, labia unienda ita sunt, ut partes naturaliter unitæ iterum sibi mutuo applicentur, atque ita retineantur.

Generalia indicata, quæ in omni cuiuscumque vulneris curatione requirebantur, §. 185. sunt enumerata; & quodem ibidem primo numero dicebatur, debere auferri omnia illa, quæ heterogenea ab instrumento vulnerante, vel partibus fluidis aut solidis corruptis, relicta possent impedire unionem partium separatarum §. 186. 187. 188. dictum fuit, quomodo, & per quæ, & quibus cum cautelis, hæc heterogenea tolli debebant. Si ergo his peractis appareat, quod aliquid de substantia partium ablatum fuerit, illud restituendum primo est, antequam possit fieri unio partium separatarum. Quomodo autem hæc restitutio peracti obtineri possit, dictum fuit a §. 189. huc usque. Si autem simplex tantum fuerit facta divisio partium antea coherentium per causam vulnerantem, sine substantiæ iactura, sine ullo heterogeneo corpore relicto inter partes separatas; habetur tantum simplicissima indicatio, nempe, ut labia vulneris, sponte semper a se in-

vicem recedentia, (vide §. 158. n. 1.) sic applicentur sibi mutuo, & applicata retineantur, ut partium omnium situs sit talis, qualis fuerat ante divisionem. Unionem partium sic dispositarum sola natura perficiet satis cito etiam in maximis vulnibus, si conditiones modo dictæ adfuerint. Optima etiam balsama vulneraria labiis talis vulneris interposita tunc nocent; sunt enim heterogeneum corpus, quod nunquam cum corporis partibus concrefcere potest: sed requiritur tantum applicatio partium separatarum ad se invicem, nullo alio interposito remedio.

Quam facile enim partes corporis vulneratæ concrefcant, non tantum cum illis, quibus unitæ fuerant naturaliter, sed etiam cum aliis vicinis, cum quibus antea nunquam cohererant, docent plurima observata. Nobili juveni ense vulnus infictum fuerat, quod non tantum oculi sinistri palpebram penetraverat, sed etiam simul adnata oculi tunicam, & ipsam corneam le-

viter læsaret. Imprudenti cura palpebra concreverat cum adnata & cornea; unde palpebra aperiri non poterat, & continua fiebat irritatio & dolor, dum oculo sano moto non poterat impediri, quin etiam alter oculus moveretur. Ingeniosissima methodo molestim hoc malum sustulit Hildanus (Centur. VI. Observ. 7. pag. 503.). Mulieris pudenda Venereo ulcere erosa concrevisse inter se incuria Medici ex Benivenio recenset Schenckius (Obs. Medic. Lib. VI. Obs. 23. p. 814.).

Rem hanc etiam confirmat Chirurgia curtorum dicta, per quam partes corporis ablata restituantur: de qua dictum §. 180. & jam monuerat Celsus, quod exulceratio digitorum sæpe, nisi magna cura prospeximus, læuiscendo eos jungat (A. Corn. Cels. Medic. Lib. V. cap. 28. pag. 332.). Si ergo hæc concretio tam facilis fiat in partibus, quæ antea nunquam naturaliter cohererant, longe magis exspectanda erit, quando partes, quæ prius unitæ fuerant, iterum contigæ fiunt.

§. 211. **H**Orum prius absolvitur 1. situ conciliato parti illo, qui quiescenti aderat: 2. leni & æquabili partium ad se invicem compresse, ut in omni superficie contigæ sint, & quiescant.

1. Maximæ utilitatis est cognoscere, qualis sit situs partium in homine quiescente, & imprimis in homine sano dormiente; tunc enim omnis motus voluntarius flet, & partes corporis sibi reliquæ omnium maxime naturali situ disponuntur. Apparebit tunc, nullum articulum corporis extensum esse, sed omnes leviter flecti. Nunquam enim in sano homine dormiente digiti extensi sunt, nunquam tibia cum senioris offe in lineam rectam porrigitur, sed semper omnes illi articuli leviter inflexi sunt: idem de reliquis verum est. Musculi eam, qui articulos flectunt, plerumque extensoribus fortiores inveniuntur; hinc ubi neutri agunt vi musculari, tunc propria contractilitate partium flexores musculi prævalent extensoribus, & ideo semper leniter inflexi apparent in quiescente articulo. Apparet hoc etiam evidenter in paralyti perfecta partium corporis; tunc enim omnis actio muscularis voluntaria cessat. Si enim v. g. totum brachium paralyticum fuerit, digiti semper inflexi inveniuntur, & sic manet: unde sæpe post curatam paralytin non possunt extendi digiti, rigidis factis ligamentis articularum, & muscularis flexoribus, tanto temporis spatio non elongatis, hinc propria contractilitate brevioribus redditis: unde extensores digitorum hæc obstacula superare non possunt. Hippocrates, qui tam sollicite naturalem habitum partium corporis observavit, ut posset cognoscere, quantum morbi inde recederent, & hinc distinguere eorundem variam magnitudinem, hoc pulchre notavit, dum de decubitu optimo ægri agit, dicens: oportet autem ægrum a Medico deprebendi decumbentem in dextram aut sinistram latum,

& manus & collum & crura parum inflexa habentem, & toto corpore biumentem, sic enim plurimi sanorum cubant (In Prognostico Tom. VII. pag. 600.). Dum hoc negligitur in vulnerum curatione, concrevissent inter se partes alio in situ, quam naturaliter habebant, & turpis sæpe nascitur a distractis partibus difformitas, vel motus naturalis partium depravatur sæpe plurimum. Sic puero, cui sexto mense ætatis dextra manus misere combusta fuerat, ab imperitis neglecta hac cautela, digiti omnes, excepto pollice, cum cute metacarpi concreverant, unde pessima difformitas orta, & omnis usus membri perierat; artificiosissima curatione, sed operosa tamen, correxit hanc difformitatem & usum partis restituit Hildanus (Centur. 1. Observ. Chirurg. Observ. 83. pag. 60.).

In prima autem deligatione vulneris ad hoc attendendum est; nam partes crude unitæ citissime conglutinantur: unde non poterit error commissus corrigi, nisi crudeli cura discedantur iterum illa, quæ jam concreverant.

2. Partes corporis per vulnus separatæ propria contractilitate sensum plus recedunt a se mutuo, uti dictum §. 158. n. t. Sed ut agglutinentur iterum, requiritur, ut maneant contigæ: hinc artificiosa pressio debet superari illa vis, quæ a se mutuo recedere conantur. Quam maxime autem notandum, quod debeat hæc unio partium fieri in tota vulneris superficie, si enim profundius vulneris labia contigua fiant, & interim partes suppositæ dehiscant, cavum manebit in vulnere, in quo effusi humores colligentur, & in sinuosum ulcus facient degenerare vulnus. Hoc autem perficietur, splenis appositis & idoneis ligatura vicinas partes sic premendo,

ut labia vulneris æque in fundo quam in cute ipsa fiant contigua. Requiritur tamen ut hæc compressio moderata sit, ne fiat in partibus compressis nimia vasorum angustatio, unde inflammatio & omnia, quæ inde sequuntur mala, possent oriri. Simul tunc requiritur perfectissima quies partis vulnera-

tæ, unde sic firmandum est membrum vulneratum, ut immobile maneat; sæpe enim in somno, vel vulnerati incuria, mota parte vulnerata mutatur situs partium, separantur vulneris labia & dilacerantur illa, quæ jam concreverant; unde curationis pulcher eventus tollitur.

§. 212. **R**etinentur in adunatione. 1. Emplastris tenacibus, digitatis processibus, al. fines anatis, utrimque a latere vulneris appositis, & per fila adducendis. Quæ locum habent in longis scissuris tranversis cutis, vel partium laxarum.

Varii jam requiruntur modi pro vulnere diversitate, ut partes contiguæ factæ maneant in debita unione. Hoc fit

1. Per suturam secam dictam Chirurgis, ut distinguatur a suturis acu tactis. Sumuntur tenax quodcumque Emplastrum, quod cuti sanæ validissime adhærere potest; vel commune fabrorum gluten, Ichtyocollam, vel aliud quid simile, non refert sere quale fuerit, modo debitam habuerit tenacitatem: illud deinde extendunt supra lintreum fortis texturæ, ne facile cedere possit; applicant utrimque ad aliquam distantiam a labiis vulneris, leviter calefactum, ut eo sortius adhæreat; tunc adducunt binæ hæc Emplastra anulis instructa, ut filis transmissis attrahi de se mutuo pro lubitu possint. Cutis adhærens his Emplastris utrimque sic attrahitur, ut vulneris labia contigua fiant; & cum hæc Emplastra non tegant ipsum vulnus, commode potest videri, an naturale situm habeant labia vulneris unita; & si aberraverint ab hoc situ, poterit illud facile corrigi. Pro ut jam vulnere variat magnitudo, varia figura & numerus horum Emplastrorum requiruntur. Minoribus vulneribus, nec admodum

hiantibus; digitata talia Emplastra sine anulis sufficiunt; maioribus autem vulneribus, & quorum labia magis ab invicem recesserunt, tutius applicantur sinilia Emplastra, quæ habenulis per anfas transmissis adduci possunt. De his Emplastris & vario illorum usu videatur Heisterus, (*Instituta Chirurg. Tab. IV. pag. 109.*) ubi illa delineata habentur.

Sed, uti facile apparet, sola cutis tantum per hæc Emplastra adducitur, subiecta pinguedo, si profuundo vulnere læsa fuerit, mobilis admodum & laxa non sequetur cutini adductam; unde sere tantum locum habent, ubi cutis sola per vulnus divisa est, & partes factis laxæ facile sequi possunt. Hinc in vulneribus faciei non nimis profundis, & integumentorum capillis imprimis usum habent; uti etiam in vulneribus non alte penetraantibus reliquarum corporis partium.

Vulneris dein labiis, per Emplastrum tenax unitis, imponitur plumaceolum balsamo quodam vulnerario inunctum, ut aer arceatur, & relictis Emplastris quotidie vulneris externa superficies lustratur, ut pateat, an omnia recte se habeant.

§. 213. 2. **C**ircumductu Fasciarum, & appositu Spleniorum, ut partes dehiscentes (158. 1.) æquabiliter appresse maneant, & coeant; quod determinato pressioni modo facile fit. Convenit vulneribus insiatis juxta longitudinem partis vulneratæ.

Vulnera superficialia his non indigent, sed tantum profunda, in quibus requiritur, ut partes in fundo vulneris æque contiguæ fiant, ac superficies extrema, ut bona curatio fiat. In his autem rite applicandis Chirurgi peritia & dexteritas imprimis cognoscuntur. Fasciæ circumductæ omnem ambitum, quem involvunt, premunt

æquabiliter, sed splenis applicatis potest fasciæ compressio, eadem licet maneat, plus agere in quædam loca, quam in reliqua; hincque pro lubitu determinari pressioni vis, ut omnia puncta superficiei vulneris contigua fiant. Facile patet autem, hanc methodum nullius usus esse, nisi partes vulnere vicinæ molles fuerint, & hinc cede-

cedere possint: si v. g. femori juxta longitudinem partis vulnus profundius infictum fuerit, utrumque a latere splenis appositis & fasciis circumductis possunt æquabiliter molles partes sic premi, ut divisæ in vulneris tota superficie partes iterum contiguz fiant. In aliis locis minus carnosus non adeo facile hoc fit; sed etiam talibus locis raro tam profunda vulnera contingunt, quæ hoc requirant. Hippocrates, ubi de vario deligationum usu agit, hanc methodum indicare videtur (*De Medici Officina Toni. XII. pag. 68.*). *Ass ubi, quæ expansa sunt, contrahere oportet, in cæteris quidem eodem modo. Ex longinquo tamen quorundam intervallo contractio, & sensim progressu facto compressio facienda est, primo quidem minimum, postea magis, maxime compressionis terminus sit mutui contactus.*

§. 214. 3. **S**uturis per acus chalybeas, rectas in minori, curvas in majori profunditate vulneris, acuta acie, cauda cava filum cera obductum abscondente, ad sufficientem a vulnere distantiam infixas, ad fundum usque adactas, sic pariter in altero labio eductas, quarum filo adstricto unita prius labia re tineantur, dein levi splenio superductum filum colligeret: id repetitur a medio, vel ab angulo vulneris, ad fines ejus, pro necessitate. Hinc balsamo labia linienda, superpositisque levibus splenis supra nodos, Emplastro tegendum est vulnus.

Hæc methodus uniendo vulnere separatas partes vocatur futura cruenta, five vera, cum illa alunariorum partium per emplastra tenacia facta suturæ nomen vix mereatur. Imprimis hic requiritur, ut fiat hæc unio cum minimo dolore & irritatione partium: Dum enim nimis ruditer hæc fiunt, sæpe valida inflammatio sequitur, quæ unionem partium adductarum impedit. Ad hanc rem requiruntur acus chalybeæ satis fortes, nec tamen nimis rigidæ, ne frangantur. Conica figura in his acubus noceret, quia sensum aucta crassities facit, ut difficilior adigantur per partes: hinc sumuntur tales quarum anterior pars prismatica acutis lateribus facile transit, & viam facit commodam reliquæ parti, quæ conica vel cylindrica est. In minus profundis vulneribus rectæ tales acus sufficerent; in profundioribus autem requiruntur incurvæ, ut ad fundum vulneris usque protrusæ facilius versus superiora emergant. Varia ergo acuum curvatura requiritur pro diversâ vulneris profunditate. Nisi jam cauda harum acuum utrimque crenam insculptam habuerit, quæ filum abscondere possit, dum acus protrahitur, ejus cauda cum

Quamvis hæc methodus omnium felicissimo successu adhibeatur vulneribus infictis secundum longitudinem partis vulneratæ, tamen videntur & locum habere posse aliquando in transversis partium vulneribus. Memorabilis ille casus in Commentariis ad §. 164. recensitur hoc docet, ubi nempe saltu validissimo utriusque pedis magnus tendo, qui Achilles dicitur, integra cute rumpebatur, sic ut trium digitorum transversum amplitudine distaret a se mutuo tendinis rupti extrema; tamen idonea positura partis attente, & artificiosa pressione per splenia & fascias circumductas, potuerunt adeo distare partes in mutuum contactum adduci, & concretere perfectissimi me. Pater ergo, si in tam difficili casu hoc per artem fieri poterit, multum etiam ab hac methodo sperari posse aliquando in transversis partium vulneribus.

filo utrumque prominente non posset sequi sine dilaceratione partium. Filum autem cera obducitur, sic enim lubricum factum transit facile, nec humores imbibit, unde fila tumefacta partes, per quas transeunt, comprimerent: præterea humores filo repositi, mora & calore acriorum reddiri, irritare possent partes. Acus tunc filo instructa ad sufficientem distantiam a vulnere infigitur, ne fiat postea dilaceratio partium, si nimis propinquo vulnere loco inhereretur. Debent autem acus adigi ad fundum vulneris usque, deinde sursum protrudi, ut per oppositum vulneris latum iterum ad sufficientem distantiam a vulnere exeant. Nisi enim ad fundum vulneris usque penetraverint, superiores partes adiacentur quidem, sed inferiores dehiscunt, & cavum relinquunt; in quod effusi humores, stagnando corrupti, fistulosum uleus facient ex puro vulnere: unde postea debebunt iterum solvi illa, quæ unita fuerant.

Filis jam transmissis blanda manuum compressione, quæ cutis ducentem quasi sua sponse subsequitur, (*A. Corn. Cels. Lib. V. cap. 26. pag. 293.*) contigua fiant vulneris labia,

bia, & deinde filiis adstrictis in hac unione retineantur. Ut autem dolor & dilacerationis metus, quantum fieri potest, evitentur, splenis ex linteo imprimis lacerato, (ne humoribus imbibendo noceat) impolitris prius, constringuntur nodi. Prout jam maior fuerit longitudo vulneris, vel figura ejus magis minuse angulosa, plures, vel pauciores requiruntur tales suturæ; futura enim, si nimis rara est, non continet, si nimis crebra est, vehementer afficit, quia, quo sæpius acutus corpus transiit, quoque plura loca injectum vinculum mordet, eo majores inflammationes oriuntur, maxime æstate (Ibidem). Plumaceolum leni balsamo vulnerario inunctum vulneri imponitur; deinde idonea ligatura, vel Emplastro superimposito, retinetur totus apparatus.

Si non oriatur valida inflammatio, vel magnus dolor, relinquatur vulnus sic per duos treise dies, deinde ligatura vel Emplastro

remotis attenditur, an aliqua corruptela odore detegatur ab humoribus effusis, tunc enim plumaceolum prudenter removeri debet, & novum, simili balsamo inadjidum, applicari; aliter paucae guttulæ balsami insillantur plumaceolo relicto. Ubi jam apparet, labia vulneris concrevisse satis firmiter, siia prudenter leviter trahuntur, ut sciatur an commodè educi possint; plerumque enim hoc satis facile fit, & vulnuscula hæc relicta satis cito coeunt.

Si vero valida inflammatio, dolor ingens, tensio partium magna sequantur futuram sciam, præstat illam dissecidere, & vulnus tunc sine futura curare. Nisi enim hoc fiat, pessimorum symptomatum caterva ingruet, quæ ferro coget facere illud, quod in tempore factum magis profuisset.

Varia jam futurarum genera, & diversæ has perficiendi methodi apud auctores habentur, qui de operationibus Chirurgicis scripserunt.

§. 215. **C**onvenient (214.) recenti, cruento, a magna tamen hæmorrhagia libero, simplici, pleno, puro, transverso, obliquo, anguloso vulnere.

Noceat (214.) copiosum cruorem stillanti, antiquo, sanioso, purulento, sordido, confuso, substantia propria orbatò, crassis obducto, vasi magnis laxis periculofo, nimis profundo, valde inflammato, venenis infecto, in parte necessario mobili hærenti vulnere.

Determinatur hac paragrapho, quibus vulneribus futuræ cuni fructu applicari possint, quibus vero noceant.

**RECENTI, CRUENTO.** Si enim vulnus jam aliquo tempore infictum fuerit, & imprimis si aer libere accesserit, extremi vasorum fines in superficie vulneris jam erunt mortui; hinc debebunt separari per suppurationem a vivis, nec poterunt invicem concrecere; frustra ergo per futuram unio fieret.

**A MAGNA TAMEN HÆMORRHAGIA LIBERO.** Quia sanguis effusus distrahet labia per futuras adducta: unde dilaceratio, dolor, inflammatio, & reliqua, quæ inde sequuntur mala.

**SIMPLICI.** Cui nempe nulla confusio simul adest ullius momenti. Unde Hippocrates dixerat in loco citato §. 158. N. 7. acuto relo facta vulnera sine suppuratione curanda esse; si vero confusio adesset, tunc ita modo idem esse, ut celeriter suppurentur: carnes enim confusas putrescere & in pus veritas contabescere necesse est.

**PLENO.** In quo nempe tantum facta fuit cohesionis divisio sine ulla substantiæ jactura.

Si enim quid ablatum fuerit de vulnere, non poterunt partes separatæ contiguæ reddi, quin distrahantur ex situ naturali, unde semper turpis cicatrix, & læsio functionum violentam talem adductionem sequuntur.

**PURO.** In quo nihil heterogenei a causa vulnerante relictum fuit, nullæ sordes, nec grumi sanguinis, nec caro fungosa adsunt: omnia enim hæc prius separari & educi debent, antequam consolidatio expectari possit.

**TRANSVERSO, OBLIQUO, ANGULOZO VULNERI.** Quia in his casibus nec Emplastra tenacia, nec artificiosæ fasciarum & spleniorum applicationes sufficere possunt, ut partes contiguæ fiant, & retineantur adunatæ.

**NOCEAT COPIOSUM CRUOREM &c.** Imperiti Chirurgi, dum nullo habito discrimine quævis vulnera futuris uniunt, quam gravia sæpe miseris intulerunt damna! Quid juvabit unire separatas partes si unitæ nequeant concrecere; vel effusi humores, unitis labiis vulneris retenti, educi debeant postea futuris discissis? Turpe tale exemplum enarratum fuit §. 172. N. 3. ubi rudis Chirurgus pectori infictum vulnus in cavum

pe-

penetrans futura univerat, unde in summum vitæ discrimen deducebatur vulneratus, toto pectoris cavo sanguine repleto, qui per clausum vulnus exire non poterat. Et petiisset certissime miser homo, nisi Pareus futuris discissis sanguinem eduxisset cavo thoracis contentum. Nisi ergo pura fuerit & sana vulneris totius superficies, nihilque fuerit ablatum de substantia partium, futuræ nocebunt semper. Præterea si vulnus fuerit inflictum tali corporis parti, per quam magna vasa sanguinea, vel notabiles nervi decurrunt, quis audebit acus profunde per talem partem adigere, nisi talis, qui scientiæ Anatomicæ partium ignarus periculum non novit? Idem discrimen adest, si nimis profundum vulnus fuerit, unde tendines & membranz tendinosæ facile per acus ladi possent: a quibus læsæ tam læva solent sequi symptomata: accedit, quod profundo nimis vulnere divisæ partes non poterint adduci ad se invicem, ut in omni puncto superficiei contiguz fiant, nisi fila transmissa attrahantur valida vi; unde dilacerationis, inflammationis validæ &c. magnus metus est. Si vero jam inflammatio vulneratam partem occupaverit, ruditer tractata parte per futuras, augebitur inflammatio sæpe in gangrænam usque: & blanda suppuratione inflammatorum vasculorum fines obstruendi una cum materia obstruente debent solvi & separari, antequam vulneris superficies pura & unioni apta evadere possit.

Si vero instrumentum vulnerans veneno in-

fectum fuerit, & anomala symptomata maligna virulentia produxerit, tota spes curæ in eo est (nisi cognita sit antidotus veneni vim destruens) ut effusis humoribus per vasa discissa, suctione, vel cucurbitulis aucto affluxu humorum ad vulneris locum, ablatur & expellatur hoc virulentum; vel vivo igne pars infecta uno destruat momento, ne labem conceptam reliquo corpori communicet. Patet ergo evidenter, per futuram vulneris retineri hoc virulentum, quod expellendum quam ocyssime ars jubebat.

Patet etiam evidenter, quod requiratur absoluta quies partium per futuras unitarum: si enim moveantur hæ partes, idem fiet, ac si fila transmissa traherentur continuo, unde irritatio perpetua, dolor, inflammatio, &, quæ ex his sequi possunt mala, fient. Possimus jam omnes motus, qui a voluntatis imperio pendunt, compescere; illi vero motus, qui absolute ad vitam continuandam requiruntur, pergent semper. Hæc est ratio, quare vulnera thoracis futuras non admittunt, imprimis si convexæ maxime costarum superficiei inflicta fuerint: singulis enim inspirationibus dilataro Pectore distraherentur summo cum dolore partes unitæ. Ideo etiam, dum per futuram uniunt abdominis vulnera, ne contenta viscera per vulnus exprimantur, fasciis sic abdomen firmitur, ut vulneratus immoto fere abdomine respiret. Damnanda ergo quam maxime quorundam Chirurgorum imperitia & temeritas, qui quævis fere vulnera sine ullo discrimine laceri panni instar consuunt.

§. 216. 4. **A**Cn manente vulnere per labia eius transfixa, filoque ei ita circumducto, ut horum retroitum impediatur, sed retineat unita. Convenit magnis, hiolis, pendularum partium vulneribus.

Prior futura fiebat filis transmissis per foramina acu facta, & deinde adductis filorum constrictione vulneris labiis: sed in hac methodo acus non educitur ex partibus perforatis, sed ibi relinquatur, & deinde filum utrimque sic circumducitur, ut labia vulneris acu transfixa, & ad se invicem adducta, maneant contigua. Methodus hæc imprimis adhibita fuit curando *Labio Leporino* dicto, quando nempe pars illa labii superioris, quæ gutturum illud sub naso constituit, fissæ est: postea etiam pulchro successu magna & admodum hiantia partium penicularum vulnera sic univerant. Quia au-

tem in labio leporino fuisse fuerunt a-nativitate hæ partes, hinc utrimque fornice abscinditur callosa superficies, uti & in angulo superiori leve vulnusculum fornice fit, ut partes uniendæ crudi vulneris naturam acquirant; si enim quid callosi relictum fuerit, nunquam fiet ibi bona unio partium. Rite tunc sibi invicem adaptatis labiis vulneris, acus ad quatuor lineatum distantiam a vulnere infigitur, & per mediam laborum substantiam transadigitur, donec in opposito latere ad similem distantiam a vulnere acus emergat, quæ tunc in vulnere relinquatur, & decussatim circumducto filo in situ retinetur.

tinentur partes unitæ. Pro varia jam magnitudine vulneris plures vel pauciores acus sic transfiguntur, ut in omni puncto partes separatz fiant perfecte contiguae. Ne autem acuti cuspides acuum relictarum lædant, absconduntur forfice, & extremis acuum supponuntur spongiozæ, quæ longe melius se accommodant figuræ partium, quam spleniolæ. Ut autem cito & sine vacillatione possint transadigi acus, aproprehenduntur manubrio, quia folis digitis Chirurgi prehenso, acus non tam firmiter transadigi possent. Præterea ut evitentur illa mala, quæ ab acuum acutis extremis relictis fieri possent, (non potest enim dura chalybis forfice abscondi nisi magna vi adhibita, unde sæpe hoc concussu partium unitarum in situ fieri posset mutatio) adhibuerunt acus chalybeas

quidem, sed quarum posterior pars ex puro argento facta erat; transixis tunc acubus partem argenteam relinquabant in vulnere, acumen chalybeum una cum parte argentea quadam adhærente abscondere poterant longe minori vi adhibita; Idem etiam pulcherrime perficitur acubus chalybeis paulo maioribus, hinc firmius tenendis sola digitorum ope, quarum cauda fissa tenet aciculam argenteam utrimque obtuso capitulo instructam, quæ tunc in vulnere relinquitur, & filis circumductis firmatur. Videatur de his *Garangeat (Traité des Operations de Chirurgie Cr. Tom. III. pag. 18. Cr.)*.

Ubi jam adunatz partes firmiter concreverunt, eductis aciculis illis argenteis, vulnuscula hæc satis facile consolidantur.

§. 217. **U**ltimus scopus (185. 4.º) attingitur, curando ut pars parti sic respondeat, quemadmodum olim in sanitate, & sicque retineantur ut nimis nec premantur, nec laxentur; adurentia, sliptica, adstringentia vitando, imprimis vero curando, ut in omni parte æquabiliter prematur vulnus. Quæ omnia obtinentur peractis, quæ descripta ab (186. ad 206.), & dein imposito leni desiccante medicamento, denique cicatricem spirituosus ablundo.

Indicationes generales illorum quæ ad curam vulnerum perficiendam requirebantur, enumeratz fuerunt §. 185. quatuor ibi numeris comprehensæ. De tribus prioribus huc usque dictum fuit: ultimum, quod fieri debebat, erat, ut restitutus illis, quæ perierant de corporis fabrica, & adunatis jam partibus, quæ per causam vulnerantem fuerant separatæ, obduceretur tegumentum naturalis cuti quam simillimum. Si enim simplex divisio partium acutissimo instrumento facta fuerit, & mox partes divisæ in situ naturali iterum fuerint unitæ, concreverint sic, ut nullum vestigium vulneris inflicti relinquantur, tuncque vulnus sine cicatrice sanatur. Cicatrix enim vulneris inflicti post sanationem integram relicum vestigium dicitur, quo pars illa integumentorum, ubi vulneris hiatus fuerat, distinguitur a cute vicina. Omnium ergo perfectissima sanatio vulneris est, ubi nullum vulneris facti vestigium manet: ubi autem hoc obtineri non potest, tota curæ pulchritudo in eo consistit, ut illud vestigium relictum in loco, ubi vulnus fuerat, quam simillimum fiat cuti vicine. Dum enim per causam vulnerantem, vel per supurationem vulnus secutam, aliquid ablatum fuit de substantia corporis, debet rena-

sci aliquid novum, quod ante non fuerat; illudque numquam habebit omnino eandem dotes, quas pars ablata habuerat; unde poterit distingui a vicinis partibus.

Pulchritudo autem cicatricis pendet a tribus imprimis sequentibus. 1. Si curerur, ut partes unitæ sint in eodem situ, quem obtinebant ante vulnus inflictum. 2. Si cicatrix non emineat ultra æquabilem cutis vicinæ superficiem. 3. Si cicatrix non sit cava. Primum obtrinerur, si attendatur, ut labia vulneris per Emplastrâ renacia, suturas, vel idoneam ligaturam sic respondeant sibi invicem, quemadmodum in sanitate. Secundum fiet, si moderata pressione cutis coercentis defectus suppleatur, ne vasa hoc tegmine orbata, a liquidis suis distenta, ultra æquabilem superficiem emineant: dum enim hoc negligitur, vel nimis emollientibus vulnus tractatur, emiciens zona sordida cicatricem efficit. Tertium cavebitur, si bona facta fuerit restitutio perditæ. Cava autem cicatrix plerumque fit ideo, quia vicinæ cutis pressio panniculum adiposum in vulneris locum premit, & facit assurgere, qui ibi in sordes & fungosam carnem dictam degenerans supuratione facta consumitur, nec renascitur

tur postea: unde deprimitur cicatrix molli pinguedine fulciente destructa, & cava manet. Unde patet, sæpe caveri non posse, quo minus cicatrix profunda, & cava relinquatur, si nempe per causam vulnerantem, vel per validam suppuratorem securam, pinguedo destructa fuerit. Monuit Hippocrates: ( *Aphorif. 45. Sect. VI. Tom. IX. pag. 277.* ) *Ulceris annus quemcumque fuerint, aut longius tempus habuerint, os abscedere & cicatrices curas fieri necesse est.* Et alibi ( *De ulceribus cap. 4. Tom. XII. pag. 132.* ) *si ergo undecumque os abscesserit, sive ultum sive sectum, sive alio quocumque modo, horum ulcerum cicatrices magis curas sunt.* Quam tutes & profundæ cicatrices relinquuntur, postquam per ulcera venerica subiaccens panniculus adiposus consumtus fuit, satis notum est.

Apparet hinc facile, quare **ADURENTIA**, **STIPTICA**, ET **ADSTRINGENTIA** viranda sint, si pulchram cicatricem facere velit Chirurgus. Per hæc omnia enim vasa viva vel destruantur, vel sic constringuntur, ut fluida non transmittant, sed suppuratone facta mortui vel obstructi vasorum fines debebant separari; unde fiet substantiæ iactura, pinguedinis confusio, & cava nascetur plus minusve Cicatrix. Simulque patet, quantum possit contribuit ad cicatricis elegantiam æquabilis pressio, quæ impedit, ne vasa nimis distenta emineant.

Cicatricis autem nascentis signa hæc sunt. **Margines vulneris vel ulceris** jam consolidandi incipiunt magis albi & solidi fieri, sensimque hæc albedo centrum versus ex omnibus ambitu protenditur: interim in superficie aperta vulneris similis albedo hinc inde spar-

sa incipit nasci, quæ æquabili superficie cum marginum limbo si concurrat, optima cicatrix nascitur. Vultus quoque purum, antea in omni superficie puncto humidum, in illis locis, ubi illud album cicatricis radimentum apparet, siccatur. Unde omnia illa remedia, quæ cicatrificatoria vel & Epulotica dicuntur, semper laudantur talia, quæ leviter exsiccant, & roborant. Hinc ex plumbo vel ejus calcibus parata Emplastra; Colophoniz, Olibani, Sarcocollæ &c. tenerimi polysculi vulneri vel ulcери in cicatricem tendenti tanto cum fructu solent applicari: quæ omnia in Materia Medica ad hunc numerum recensentur.

Patet hinc inanitas iactantia illorum, qui se omnia vulnera sine cicatrice curare posse arcanis suis remediis gloriantur. Prudentes certe & periti Chirurghi, post magnam substantiæ iacturam, vel diuturnam suppuratorem, nunquam pulchram fore cicatricem prædicent: & de hac re vulnerati semper præmoneri debent, ne cicatricis deformitatem curantis incuriæ adscribant temere.

Cicatricis locum deinde spiritu rotisמרין, Matticali, vel simili fovere sæpius convenit: omnibus enim illis spiritibus hæc vis inest, ut partes animalium thermiores reddunt. Debilius enim ille locus manet, tenui tantum pellicula tectus; hinc facilius lædendus, quam vicina loca: Unde sene convertit, ut vel leni plumbato Emplastro, vel mollißima aluta tegatur diu adhuc locus jam consolidatus, ne vestitum attritu, vel aeris injuriis, recrudescat sanatum vulnus.

## HÆMORRHAGIA.

§. 218. **SI** cruor manat ex vulnere multus per suas (150. 160.) causas, sistitur. 1. Causis ignitis. 2. Corrosivis. 3. Adstringentibus. 4. Circumstricto filo. 5. Dissectione integra. 6. Fasciis & splenio pyramidalibus compressibus.

Petrææ illius, quæ ad curam vulnorum generaliter pertinent, antequam ad singularem observanda in curatione vulnorum capitis, thoracis & abdominis pergatur, primo consideranda sunt quedam Symptomata, quæ vulneribus accidunt, & sæpe tam gravia sunt, ut in summum vitæ discrimen adducant vulneratum: unde requiritur, ut hæc prius tolli, vel saltem multum minui possint, antequam vulneris cu-

raz prospici possit. Primaria talia Symptomata sunt Hæmorrhagia, Dolor, Convulsio.

Hæmorrhagia propria vocabuli significatione copiosum sanguinem cum impetu effluxum notat; postea tamen etiam obtinuit, ut pro quocumque sanguinis effluvio sumeretur. *Αἱμορραγία* enim videretur optime derivari ἀπὸ τοῦ ἁνῶτος δι' ὀφθαλμοῦ, quod vocabulum ex Galeni sententia apud Hippocratem idem significabat, quod ἀδρῶνος ὀφθαλμοῦ.



*ἐκταῖν*: cum impetu & confertim prodire. Dum enim sanguis modicus & sensim effluit, *ἐκταῖν* vocavit Hippocrates, vel lenne succiduum dixit *εὐαδὲν*. (Goraei de *Medic.* p. 16.) Ubi autem Hæmorrhagiæ nomen simpliciter occurrit apud Hippocratem, non addita parte corporis, ex qua erumpit, tunc intelligi illam, quæ per nares fit, sanguinis eruptionem, monet Galenus ( *Commentar.* l. in *Lib. I. Epidem.* Tom. IX. pag. 18.).

Post vulnus inflictum sequens copiosus & cum impetu sanguinis effluxus notat semper, vasa maiora, sanguinem vitalem rubrum gerentia; læsa esse: in primis autem arteriosa, quia venæ, nisi maximæ fuerint, vel ligaturæ apostropha tumeant, raro multum sanguinis faciunt, & nunquam tanto cum impetu, quanto ex arteriis læsis sanguis prorumpit. Si ergo tanta fiat sanguinis iactura, ut sanguis merito inde timeatur effectus; nec locus sit, debilitata vita, vel contracta arteria, sponte lissi posse, tunc recurrimus ad illa auxilia, quæ in arte cognita sunt, ut impediatur sanguinis eruptio: Pleraque tamen hæc auxilia, quæ sanguinis eruptionem commovent, vulneris curam retardant: destructi enim vasorum fines per ignem, corrosiva, ligaturas, compressiones &c. debent prius separari, antequam vulneris consolidatio obtineri possit.

Varie autem nunc hodi adhibita fuerunt ad compescendas hæmorrhagias: omnes tamen hæc vel agebant constringendo vasis discissi orificium; vel, coagulando inducendo sanguini effluenti, impediabant ulteriorem effluxum; vel denique utrumque simul perciebant.

1. Præsentissimum remedium hæmorrhagias sistens habetur, si candenti ferro vas sanguinem fundens tangatur; illico enim in densam, nec resolvendam amplius massam, comburitur sanguis, siquæ obturat vas aperti orificium: simul ipsum vas ignis actione crispatur & constringitur; unde utroque hoc effectu conspirante sanguis sistitur. Diu hæc methodo usi fuerunt Chirurghi: unde in exstirpationibus artuum, & similibus operationibus, in quibus valida movebatur Hæmorrhagia, semper parata habebant cauteria variaz figuræ & magnitudinis, ut comburendo sisterent sanguinem.

Sic apud Græcos recentiores & Arabes, Paulum Æginetam, Avicennam &c. ferro ignito post exstirpationes membrorum sup-

primebatur Hæmorrhagia. *Guido de Cauliac* eo, & post illum alii, oleo servido utebantur in eundem finem. Vesalius ( *Chirurg. magn. Lib. V. cap. 12. pag. 1082.* ) in exstirpatione membrorum candenti ferro jubet secari carnes, ut simul sic sanguinis effluxus impederetur. Sed hæc methodus plurima habet incommoda, unde vix adhibetur amplius. Difficile enim est requisitum caloris gradum ferro ignito conciliare; si nimis candescat, sæpe simul aufertur illud, quod combustum est; si non satis caleat, non sistitur Hæmorrhagia. Præterea dolorem ingentem, inflammationem validam, & quæ inde sequi possunt mala, cauteria faciunt; & omne illud, quod combustione sic destructum fuit, debet postea suppuratione facta recedere a vivis partibus & separari; unde maximum periculum est, ne decidua eschara redeat post paucos dies Hæmorrhagia, quæ tunc difficilius adhuc compesci poterit, quam in initio. Vas enim combustum, eschara decidua, brevius erit; hinc non poterit, vel saltem difficilius, apprehendi & ligari; unde crudelis hæc cauterii applicatio repeti deberet, superflue semper aequali periculo, ne recrudesceret hæmorrhagia, postquam & hæc de novo facta eschara deciderit. Ideo, postquam artificiosa compressione aut vasorum ligatura tam pulchre noverunt sistere sanguinis effluxum periti Chirurghi, cauterii rarior usus fuit. Imo Galenus jam damnaverat Escharoticorum usum, tanquam minus tutum in sistendo sanguine. *Quantum enim parvi in crustam adustum est, tantum profecto ipsi de naturali carne deperditur. Id itaque omne parti decedit, dum crusta cadit; atque ob eam rem nulla & sine carne apparet, multoque, postquam crusta decidit, profusus sanguis, quæ ego suppressi potuit, supervenit.* ( *Method. medicendi Lib. V. cap. 4. Tom. X. pag. 110.* ). Unde non nisi in summa necessitate voluit adhibenda esse, & in primis usum habere dixit, ubi ex erosione alicuius putrescentis sanguinis profluvium oriebatur; sic enim & sanguis sistebatur, & seorsus putridum vivi ignis actione destruebatur illico.

2. Dum vivus ignis per metalla candescita vel ebulliens oleum applicabatur corporis partibus, vocabant hæc remedia Cauteria simpliciter, vel & Cauteria actualia. Sed dantur acerrima quædam remedia, quæ partes, quibus applicantur, sic destruant & in escharas comburant, ac cesset ignis applicatus. Hæc

a similitudine effectuum vocabantur Cauteria: sed quia actu ignem non continent, dicebantur Cauteria potentialia. Vocantur & Corrosiva, quia partes corporis, quibus applicantur, rodendo consumunt, & destrunt. Sed etiam escharæ, per horum applicationem factæ, debent separari & decidere; unde idem periculum novæ Hæmorrhagiæ nascitur, ac a cauteriis actualibus applicatis. Præterea omnia hæc acerrima cum sint, vicinas partes nerveas vel tendinosas sæpe pessime irritant, unde tam sæva mala oriri notum est. Laudatissimum imprimis fuit ad hoc usus Vitriolum Cyprinum dictum, quod in globulum rasum, vel in pulverem tenuem tritum, & linteis carpiis exceptum, applicabatur orificio vasis discissi. Sanguis ipso attractu fere vitrioli illius coagulatur in thrombum, qui operculi instar vas dissectum claudit, simul & constringit vas ipsum & in escharam combinat vitriolum. Sed non potest globulus ex vitriolo factus applicatus manere orificio vasis discissi, nisi idonea firmiter ligatura, quæ sola posset sufficere, uti statim patebit.

¶ Dictum fuit §. 28. N. 4. de adstringentibus, quatenus fibrarum solidarum corporis nimis debilem cohesionem redderent fortiorum, sed hic adstringentium usus tantum est, ut sanguinis fluxum compescant. Hoc autem efficiunt, vel constringendo orificium vasis discissi; vel coagulando sanguinem effluentem, qui tunc vasis orificium obturat; vel denique utrumque effectum simul præstant. Sunt & præterea alia remedia, quæ, licet nec sanguinem faciant adeo concretum, nec vasa constringant, tamen sanguinis effluxum cohibeant; unde hoc respectu tantum adstringentium nomen merentur. Talia sunt v. g. farina volatilis molitorum, gyphi pulvis & similia bibula corpora, quæ liquidum quodque, quod attingunt, absorbent, & cum liquido absorpto concreverunt in duram satissimam, quæ vas discissum obturare & sic effluentem sanguinem sistere poterit: sed si maior arteria discissa fuerit, torrente sanguinis erumpentis averterentur hi pulvisculi; hinc minus his confidere possumus: unde post magnas extirpationes, dum applicabant vulneris superficiei bibula hæc corpora Chirurgi, simul noctes diesque famuli adfidentis manu curabant premi sic apparatus totum, ut firmiter manerent applicata. Hinc iterum patet, parum ab his sperandum esse in validis Hæmorrha-

giis, nisi idonea simul accesserit compressio.

Inter illa vero, quæ coagulo inducto sanguini, vel constrictione vasis agebant, maxime laudabatur alcohol, si calidum imprimis applicaretur: Illud enim statim ipsum etiam sanguinis serum adeo fluidum in scissilem massam convertit, & simul satis valide solidas partes corporis contrahit; unde animalium partes molles in alcohole servatæ indurescunt, & mole minuuntur: utroque hoc effectu conspirante Hæmorrhagias compescere efficaciter poterit. Sed extremum vasis discissi, per Alcoholis applicationem contractum & induratum, separabitur postea, thrombus sanguinis, per alcohol induratus, secedet vel sponte, vel imperu sanguinis a tergo impulsus prorudetur; unde iterum recrudescet Hæmorrhagia, nisi idonea ligatura & pressione retineatur thrombus ab Alcohole factus in vasis discissi orificio. Præterea calore corporis fugacissimum Alcohol statim dispergitur, unde fere momentanea ejus actio est, nisi continuo de novo applicetur, & velica oleo inuncta circumposita impediatur ejus nimis subita exhalatio. Patet ergo & hujus usum, sine compressione simul adhibita, minus tutum esse.

Vidi enim sic, etiam parva arteriola lęsa, non potuisse sisti sanguinem Alcoholis applicatione. Evulserat homini dentem molarem Chirurgus; sanguis jugi stillicidio ex alveolo dentis evulsi exibat; frustra vitrioli pulverem, imo & acerrimum vitrioli oleum applicuerat Chirurgus, ut hanc hæmorrhagiam compesceret. Vocatus sincerum alcohol calefactum, & plumaceolis exceptum, cavo alveolo imponi jussi eo usque, ut eminentia hæc plumaceola clausis maxillis satis firmiter apprimerentur, sed sine successu, licet aliquoties hoc repeteretur. Tandem repleto sicis plumaceolis alveolo, per tres dies & noctes, digito adstantis famuli comprimebatur locus assiduo, nec postea rediit Hæmorrhagia; sed post paucas septimanas pars alveoli offesi, tot acribus applicatis omni vitali humorum influxu privata, excidit sine ullo alio malo. Cum ergo tam parvæ arteriæ læsæ Hæmorrhagiam sistere non potuerit Alcohol, facile apparet, quod in majoribus arteriis discissis etiam sæpe fallere possit.

Oleum autem terebinthinæ, nisi calidum fuerit, vix sanguinem sistit. Molles quidem animalium partes, oleo terebinthinæ submersæ, indurescunt, sed lenta tantum moræ. Olea vero longe majorem caloris gradum requi-

requiritur, antequam ebulliant, quam aqua; hinc oleum terebinthinæ calefactum comburendo solida, & coagulando sanguinem, Hæmorrhagiam compellere poterit, tuncque instar caustici actualis aget, de quo dictum fuit. Accerrima autem illa acida fossilia, uti spiritus nitri, sulphuris &c. coprosiva sunt, de quorum usu dictum pariter fuit. Reliqua autem adstringentia miora, ut sanguis Draconis, granatorum cortices, flores &c. non videntur habere tantam efficaciam, ut ab illis solis multum sperari possit in compescendis Hæmorrhagiis.

Simul apparet, quid credendum sit de tot arcanis stupris remedij, quæ jactantur a multis. Minores arteriæ, ano & sæpe satis magnæ, integre discissæ, sponte clauduntur, imprimis debilitata vita per magnam sanguinis jacturam: Plurima ex illis jactatis specificis erant acria corrodentia; alia miora fortî ligatura apprimabantur ad vas læsum; unde sæpe sanguis sistebatur sola compressione potius vasis læsi, quam efficacia applicati remedij. Dumque circa finem elapsi sæculi plurima experimenta, arcanis his remediis facta, observaverat aptissimum in his rebus judex PETITUS, vidit leviores Hæmorrhagias his aliquando sisti potuisse, sed amputatione membri facta promissis non respondisse eventum ( *Academ. des Sciences l'An. 1735. Mém. pag. 594.* ). Unde pater, similia jactantibus non temere fidem adhibendam esse.

4. Si manus accessus detur ad arteriam discissam, sic ut ligari possit, certissime sistetur Hæmorrhagia vinculo circumposito. Methodus hæc sanguinem sistendi a Galeo jam commendata fuit. ( *Method. v. dendi Lib. V. c. 3. Tom. X. p. 107. 108. & ibid. c. 5. pag. 112.* ) Postquam enim varia auxilia ad compescendam vulnerum Hæmorrhagiam receperat, dicit: *Quippe de genere obturantium quoddammodo est & vinculum ipsis vasis sanguinem effundentibus circumpositum, ipseque nostri digiti, dum ea committuntur & constringunt.* Videtur autem tantum hac methodo usus fuisse in vulneribus, membrorum enim, sphacelo corruptorum, extirpationem, quantum memini, non descripsit. In magnis etiam extirpationibus, ubi adeo periculosa est Hæmorrhagia ex majoribus vasis discissis, nulla fit mentio ligaturæ vasorum apud Celsum ( *Lib. VII. s. ult. p. 498.* ) qui tamen alibi ( *Lib. V.*

*c. 26. Nu. 2. p. 290. 291.* ) dicit, ubi curationem profusionis sanguinis ex vulneribus describit, quod si alia anxilia incaustum adhibita fuerint, *venit, que sanguinem fundunt, apprehendende, circaque id, quod islum est, duobus locis deligenda intercedendeque sunt, ut & in se ipse coram, & nihilominus ora præclusa habeant.* Post Galenum reliqui omnes Medici & Chirurgi Hæmorrhagiam, post artuum extirpationem, causticis compellerebant; imo & Vesalius ( *Chirurg. Magn. Lib. V. c. 12. p. 1082.* ) hanc operationem describens, novacula ignita jebet carnem incidere ad os usque, & postea fermentis ignitis magna vasa comburi. Paræus, cum horret crudelium hanc methodum, & observaret plurimos sic tractatos perire, paucos evadere post summas molestias tolerantes, primus fuit, uti ipse testatur, ( *Lib. XII. c. 35.* ) qui vasa discissa ligavit post amputationem factam, forcipe illa protrahens, & duplicato filo ligans una cum parte circumpositæ carnis; si vero decidua ligatura recrudesceret Hæmorrhagia, transigebat acu partes carnosas vasi discisso vicinas, & filo supra spleniolam impositum constructo claudere vasis discissi orificium. ( *Ibid. c. 33.* ) Postea, sere omnes, relicto usu cauteriorum actualium & potentialium, ligatura usi sunt. Fecerunt autem hoc duplici modo: vel enim extremam arteriæ discissæ protraherent forcipe, & dein filo circumducto ligabant: sed si filum fortiter adstringeretur, sæpe sensim discidebat arteriam, extremum ligatum cadebat nimis cito, & recrudescerebat Hæmorrhagia jam periculosior, quia difficilior vas, brevius redditum, poterat nova ligatura claudi: unde Dionysius nodo jam constructo jubet, ut alterum filii extremum acu munitum per ipsam vasis substantiam transigatur, & sic caveatur, ne ligatura decidat nimis cito. ( *Dionys. cons. d'Operations de Chirurg. &c. Demonstr. neuvieme p. 509.* ) Tamen & hæc methodus tanquam nimis difficilis postea repudiata fuit. Si vero laxior ligatura nude arteriæ injicitur, tunc sanguis, continuo urgens locum ligatum, sensim protrudit ligaturam & decidere facit. Unde prævaluit illa methodus, quam Paræus descripsit, ligandi nempe arteriam una cum parte carnis vicinæ ambientis: sic enim clauditur optime arteriæ extremum, nec periculum est, ut ligatura tam facile decidat.

Patet evidenter, quod ligatura præferenda sit combustioni vasorum, si considerentur sequentia. Dum igne vivo vel causticis potentialibus adurit vasis extremum, & coagulat sanguis effluxurus, partes combustæ elicharam faciunt, quæ operculi instar vasis discissi tēpēt orificium; huic operculo cohaeret thrombus coagulati sanguinis, discissæ arteriæ cavum replens: decidua elichara thrombus solus in cavo vase hærens sustinet sanguinis impulsu inipetum: sed vasis extremum, decidua elichara patulum, facile transmittet thrombum; qui ergo expelletur, & liberam viam sanguini erupturo faciet. Dum vero ligatura clausum fuit vas, connivēt; hinc thrombus pone ligaturam hærens apice angusto ligaturam tanget, & latiori basi cavum vasis obturabit: decidua ergo per suppurationem parte ligata & filo ligante, licet nondum penitus consolidata fuerit arteria, tamen thrombus a parte sua postrema latior non poterit transprimi per angustum connivētis arteriæ extremum; angustior apicis thrombi pars exibat forte, reliqua pars crassior obturabit vas & sistet hæmorrhagiam. Pulcherrime hanc rem explicuit, & figura addita thrombi elucidavit PETITUS (*Académie des Sciences* t. 1731. *Mémoires* pag. 127. &c.).

Securior longe ergo præcedentibus hæc methodus est, quanvis non omnino careat incommodis. Sæpe enim magnus dolor & valida inflammatio sequuntur, dum una cum vicina carne ligantur arteriæ; imprimis si simul nervi discissi ligatura sic intercipientur: unde sæpe inviti & convulsivi motus oriuntur in parte truncata, quibus ligatura solvi posset & redire hæmorrhagia.

5. Imprimis hoc locum habet, ubi arteria non nimis magna, nec cordi admodum vicina, vulnerata est, non tamen integre discissa; tunc enim hæmorrhagia perget, quia retroractis propria elasticitate fibræ vulneris arteriæ ampliatur: si vero eadem arteria integre discissa fuerit, tunc demonstratum fuit in Commentario §. 159. quod extrema arteriæ resiliant & recondantur sub solidis partibus vicinis, & propria contractilitate, & vicinorum pressione claudantur integre, siquæ sistatur sanguis. Ubi ergo nūq̃ filicidius sanguis de vulnere fluit, tunc locus vulneris, unde sanguis exire videtur, scarificatur scalpello, ut sic integre discindatur læsa arteria. Hac methodo se-

feliciter usum fuisse Galenus narrat: (*De Curandi ratione per vene Sectionem c. ultim. Tom. X. pag. 451.*) *Hominī cuidam ex vulnere in malleolo inflicto lacerata fuerat arteria, nec sanguinis effluxus quievit, donec Galenus vocatus totam rescueret*: Addit deinde, quod sipe Aneurismate coratū fuerit vulnus, quod aliter metuendum est in tali vulnere arteriæ, dum debilior cicatrix a sanguine extenditur in faciem talem dilatatum.

Sed apparet facile, tuto non posse sic integre discitari arteriam, nisi mediocris tantū magnitudinis fuerit, nec in loco cordi valde propinquo, nam tunc non cessaret hæmorrhagia, licet arteria penitus discissa foret, sed deberet ligatura vel alia methodo obturari vas discissum.

Tamen constitit, arteriam vulneratam, non verò integre dissectam, moderata pressione sic firmari posse, ut sanguis siliretur, non enim tunc semper requiritur tam fortis arteriæ compressio, ut integre aboleatur ejus cavum: sufficit talis, quæ liberum sanguinis effluxum per arteriæ vulnus impedit, & thrombum sanguineum intra vulneris labia continet, qui præcipuum sanguinis effluxui impedimentum est, & postea margini vulneris firmissime accrescens integritatem vulneratæ partis restituit; uti in cadavere hominis subita morte extincti patuit, cui ante bimestrem spatium brachii arteria vulnerata cohaeret. Apparet enim evidenter, vulneratæ arteriæ margines non coivisse inter se, sed thrombum undique accrevisse vulneris circumferentiæ (*Acad. des Sciences Paris. 1735. Mémoires* 592. &c.).

6. Compressio vasis discissi omnium optima & maxime naturalis methodus est, qua hæmorrhagia sisti potest, & quam omnes homines sponte adhibent, dum sanguinem de vulnere erumpentem vident, digitis nempe comprimendo partem vulneratam. Sed hæc compressio potest agere vel perpendiculariter in superficiem patulam abscessi vasis, vel poterit applicari a latere vasis, & sic parietes ejus contiguos sibi mutuo reddere. In priori casu impeditur quidem sanguinis effluxus, sed thrombus a concreto sanguine natus ejusdem magnitudinis cum orificio vasis discissi cum sit, dum remittitur compressio, ab impetu sanguinis a tergo urgentis facile expellitur; unde debet in hoc casu pressio agere in vas discissum tandiu, donec thrombus coagulati sanguinis

gignit

guinis concreverit cum ipse lateribus vas discissi, quod non fit tam cito: sed valida talis compressio & diu applicata multa potest facere mala; inflammationem nempe, & omnes ejus sequelas.

Si vero causa commotiva agat in partem lateralem vas discissi, convivent parietes vas, & sibi mutuo contigui facti latera superficie concreverunt; thrombus coagulati sanguinis, pone compressum locum hærens, cum cylindricus fere sit, non poterit pelli per compressa latera vas, licet nondum perfecta unio facta fuerit. Patet ergo facile, quantum præferenda sit hæc methodus reliquis omnibus. Si enim vas aperta claudatur tantum, cessat Hæmorrhagia: sed hoc fit pulcherrime per talem compressionem, & contigua facta vas latera brevi concreverunt, absque eo quod requiratur aliqua separatio partium mortuarum, uti post caustica actualia vel potentialia applicata, imo post ipsam ligaturam vas, fieri debet. Accedit, quod ligato vase unio laterum fiat tantum in parva superficie, ubi filum hæsit; sed laterali pressione complanati vas latera majori superficie uniuntur; hinc firmitus hærent & plus resistunt sanguini erupturo. Nunquam autem citius & melius concreverunt partes inter se, quam ubi recenti vulnere divisæ fuerunt: fulcitur enim tunc partium separatum unio, reliquum natura perficit. Hoc autem perfectissime fit hæc methodo, dum crudo vulnere, nullis rodentibus, vel ligamentis veat, applicatur tantum talis compressio in locis illis, ubi magna vasa hiant.

Ut autem feliciter & sanguis sistatur, & simul vulnus curetur, requiritur imprimis, ut pressio agat tantum in vas discissi latera, non adeo in reliquam vulneris superficiem. Ideo ex charta diu dentibus masticata vel ex lineis carptis Chirurgi parabant globulum, quem applicabant loco vulneris, qui comprimi debebat, huic alium paulo majorem imponebant, tunc tertium iterum majorem, & sic porro, donec satis emineret ille apparatus, ut fascia circumducta consueode posset apprimi ad vas dissectum. Sicut enim quasi pyramis inversa nascebatur, cuius apex vas lateri applicatur pressionem fasciæ basi circumductæ communicabat tantum illi loco vulneris, ubi requirebatur. Pulcherrimum autem instrumentum descripsit, & tabula expressit PETITUS, cujus applicatione tutissime pote-

rat comprimi vas discissum, & simul arteriæ truncus supra vulnus locum angustari pro lubitu, dum vulnus deligatur; simul & compressio vas discissi pro re nata augeri & minui poterat ejusdem instrumenti usu. (*Acad. des Sciences l'An. 1731. Mem. p. 124. &c.*) Ibidem memorabili exemplo & hujus methodi certitudinem & instrumenti usum confirmat. Nobili enim viro extirpatio cruris supra genu facta, & ligatura vasorum ex arte instituta fuerat: omnia bene succedebant, donec vigesimo primo post membri amputationem die, soluta ligatura vasorum ægri imprudentia, recrudesceret Hæmorrhagia, quæ sistebatur feliciter, applicato vitrioli globulo ad orificium vas apertum, & idonea ligatura firmato: sed post undecim dies decidua eschara regebatur Hæmorrhagia. Periculosa hoc statu sola videbatur superesse compressio vas, ut servaretur æger: causticorum enim infusum usum eventus docuerat, vas intra die & brevioris redditu ligatura non sine magna difficultate fieri poterat. Applicatum hoc instrumentum pulcherrimo successu Hæmorrhagiam compescuit, & integra sanatio tam periculoso vulnere secuta fuit.

Patet ergo, artificiosam vas compressionem compescere periculosissimas etiam Hæmorrhagias, licet alia remedia frustra adhibita fuerint; illamque solam sufficere in omni casu, cum reliqua auxilia tantum in quibusdam casibus ulum habere possint. Omnium autem optime agit hæc compressio, si a latere vas discissi applicata comprimat parvulum orificium; licet tamen & in difficillimis casibus pressio perpendicularis in superficiem vas dissecti Hæmorrhagias compescuerit aliquando felicissime. Hujus rei pulchrum exemplum habetur in Academia Regia Scientiarum. (*L'An. 1731. Mémoires pag. 536. &c.*) Homini, ante octiduum mense fracturam compositam ossum tibiae & fibulae passio, continuu consilio Chirurgorum extirpabatur crus sub genu articulo: sed nec tornavilis ligatura, trunco arteriæ applicata, compescere poterat Hæmorrhagiam; nec ligatura vasorum discissorum poterat adhiberi, quia arteriæ penitus osseæ comprimi non poterat, hinc pleno rivo summoque cum impetu sanguis pergebat effluere, sed lineis carptis applicatis per splenia gradatim incrementa appressis feliciter sistebatur tam periculosa Hæmorrhagia.

adeo ut quarta post extirpationem factam die, dum omnis apparatus removebatur, ne guttula quidem sanguinis efflueret. Aliquando etiam contingit in cruris extirpatione, ut arteria, quæ tibiz os in parte superiori & posteriori perforat, & sæpe pollicis longitudine per ipsam ossis substantiam decurrit, dissecta pergat continuo sanguinem fundere, si nempe in illo canali osseo hærens dissecetur, ubi os ferra dividitur. Patet facile, ligaturam hic

nullius usus esse; sola compressio per lineæ carptæ, orificio vasis discissi appressa, superavit anceps hoc malum. (*Ibidem* pag. 139.)

In similibus tamen calibus compressio fortior requiritur, quam si laterali pressione complanati vasis latera contigua facta fuerint, quia vasis discissi amplitudo eadem manet, hinc facile thrombus conereti sanguinis vas discissum obturans expelli posset, nisi valida pressione retineretur.

§. 219. **R**evulsio hic (218.) nihil iuvat, nisi vascula læsa (159.) parva, & plethota addit. Eadem de victu, potu, & internis medicamentis vera sunt: quæ autem de hæmorrhagia dicta, eadem & fluxui ichoris applicari queunt; licet auxilium hic summum in balsamicis crassioribus.

**REVULSIO HIC NIHIL JUVAT &c.** Galenus methodum tradens, quæ sanguis ex vulnere fluens sisti posset, dicit hoc fieri, *abstrato quidem, quod perruptum est, averso autem atque aliorum translatum, quod per illud ferebatur.* (*Method. med. Lib. V. cap. 3. Tom. X. pag. 106.*) Sed circulationis sanguinis, qualem hodie novimus, ignarus cum fuerit, non mirum est, illum fuisse in hac opinione, quod revellentia in compescendis Hæmorrhagiis vulnere multum prodesse possent. Sed si magna arteria discissa est, quid juvabit Venæ sectio in alia corporis parte? certe omnis sanguis ruet potius per patulum arteriz vulnus, ubi resistentia nulla est, ad mortem vel saltem animi deliquium usque. Vidi, repetitam etiam Venæ sectionem non potuisse sedare Hæmorrhagiam, quæ post dentem evulsam sequebatur: quid ergo proderit, ubi major arteria dissecta est, si sanguinis fluxum ex tam parva arteriola impedire non potuit? Nec poterit a revellentibus aliis, quæ frictione vel irritatione quacumque partium distitarum a loco vulnerato agunt, quid boni sperari; cum potius noceant, quia motum prius in parte, dein in toto corpore augent.

Ubi vero ingens sanguinis copia adest, nec satis illa minuta fuerit per Hæmorrhagiam, Venæ sectio prodesse possit, si vascula læsa parva fuerint, ut nempe minuta copia & impetu sanguinis vascula læsa minus disenta se contrahere possint.

**EADEM DE VICTU, POTU &c.** Ubi hæmorrhagia sedata est per remedia precedenti paragrapho descripta, in cibo & potu semper sollicite vitantur talia, quæ copiam vel impetum sanguinis nimis subito

augere possent, donec vas læsum optime consolidatum fuerit: hocque respectu debitum victus regimen multum boni facere potest. Sed facile patet, nihil inde sperandum esse, ut cohibeat sanguinis effluxum ex patulo vase vulnerato: præsens enim auxilium poscit valida sanguinis iactura. Et licet daretur, cibum & potum aliquid huc facere posse, nimia requiritur mora, antequam chylus ex ingestis factus ad vulnus venire posset. Idem verum est de medicamentis interne sumtis, quibus talis efficacia adscribitur, ut sanguinem ex vulnere imperuose erumpentem sistere possent. Patuit enim ex modo dictis, ne quidem fortissimâ adstringentia posse sic cohibere periculosam Hæmorrhagiam, ut illis confidere tuto liceat, quamvis magna copia ipsi vasi discisso applicentur. Quid ergo sperandum foret ab iisdem, dum interne sumta, sanguini mista, mutata jam per corporis vires, circulationis actione ad locum vulneratum pauca copia deferuntur? una enim cum sanguine elabentur per hians vas discissi vulnus. Præterea omnia auxilia, quæ Hæmorrhagiam compescere possunt, hoc faciunt vel confixito vase, vel coagulando sanguinem effluxuro, vel utroque hoc effectu conspirante agunt. Si ergo hæc remedia, dum sanguini mista per vasa fluunt, has vires haberent; an non prius constringendo pulmonis vasa minima, vel coagulando sanguinem, mortem inducerent, impedito sanguinis per pulmonem transitu, antequam ad locum vulneratum pervenire possent? Dum minores arteriæ discissæ propria contractilitate, & minuto sanguinis impetu ob sanguinis iacturam factam, claudun-

duntur spante, ut dictum §. 159. tunc similibus remediis adhibitis tribu ebatur. Hæmorrhagiæ sedatio, quæ longe aliis debebatur causis. Plurima jaclantur talia, quorum multa impune quidem exhiberi possunt cum nec noceant nec prosint; nemo tamen prudens his confidet, & interim, efficacioribus auxiliis neglectis, summo discrimini vulneratū exponet.

EADEM ET FLUXUS ICHORIS APPLICARI QUEUNT &c. Accidit aliquando, ut vulnera etiam leviora sequatur ingens tenuis lymphæ effluxus, vasis arteriosis lymphaticis majoribus laxis, uti videtur, ex venosis enim lymphaticis dissectis vix videtur tanta copia lymphæ effluere posse, cum venæ sanguineæ læsæ, nisi maxime fuerint, parum tantum sanguinis eruant, nisi ligatura vel aliud quodcumque obstaculum inter cor & venæ vulnus ponatur. Distingui tamen maxime debet ichoris effluxus, qui a vasis lymphaticis, vulnere laxis, oritur, ab illo, qui post nervi vel tendinis puncturas, & scissimam inflammationem secutam, fit: longe enim alia auxilia requiruntur in tali casu, uti dictum fuit §. 163. Sed hic tantum agitur de fluxu ichoris, qui a vasorum per vulnus facta læsione, oritur; tuncque illa, quæ Hæmorrhagiis compescendis conveniunt, prodesse poterunt. Dictum fuit in precedenti

paragrapho, artificiosam vasis compressionem tutissimam & simul efficacissimam remedium esse ad compescendas etiam maximas Hæmorrhagias; & constitit, idem hoc auxilium ichoris effluxum tollere.

Chirurgus Bubonem Venereum, nondum perfecte maturum, aperuerat lanceola, & mala fortuna vas Lymphaticum dissecuerat, unde ingens lymphæ copia quotidie de vulnere profluebat. Consilii experti Celeberrimo Ruyschio indicavit hunc casum, qui plenius ex linteo complicato applicatis, & fibula vaside compressis, tam feliciter sustulit hoc malum, ut sequenti die jam onnis lymphæ effluxus cessaret. ( *Ruysch. Observ. Anat. Chirurg. Centur. Observ. 41.* ) Ubi vero post nervi puncturam ichoris ille effluxus sequitur, compressio talis brevi in gangrænam faceret transire partes inflammatas. Pulchrum etiam effectum habuerunt balsama omnia nativa, imprimis crassiora, quæ oleoso lentore vasculi talis vulnus obstruere possunt; & interim vulneratis partibus amica & salutaria observantur, ac in tendinum & nervorum puncturis tantum usum habent. Dumque hæc satis calida applicantur vulneri, ut plerumque solet fieri, forte etiam tenera hæc vascula calore majori contrahunt & claudunt.

## DOLOR.

§. 220. SI fibra nervosa, cerebro orta, ita extenditur, vel alio modo disponitur, ut dissolutionem minuetur, fit Doloris idea.

Dolor est in mente perceptio rei molestæ; quam adeo detestatur natura humana, ut omni molimine vel invitus homo conetur tollere illud, quod causam illius ingratæ perceptionis esse credit. Sanus enim homo habet in se facultatem percipiendi quasdam ideas occasione mutatorum nervorum quorundam, quam a se remove nequit ullo modo. Profundæ meditationi totus quasi immergitur Philosophus, si ferum ignitum parti corporis applicetur, mox habebit mutatam cogitationem, & orietur in ejus mente ingrata illa perceptio, quam dolorem vocamus. Quid autem sit in mente illa perceptio, impossibile est verbis explicare; solus ille novit, qui dolorem patitur. Non enim oritur aliqua representatio rei diversæ a cogitatione, sed adest affectio percipiens: nemo enim cogitat, dum dolet, quod

extra illum sit aliquid simile illi dolori, sed omnes dicunt, quod sint ipsi dolentes.

Doloris idea jam non relinquit sui memoriam, qui enim dolorem passus fuit, & momento post liber est, memor quidem est, quod illud molestum adfuerit; sed nullam habet amplius doloris ideam, nec potest ullo modo facere, ut illa renascatur in mente, nisi nova doloris causa accesserit, quæ, mutato prius corpore, mentem in sua cogitatione mutaverit.

Quænam vero sit illa mutatio in corpore, & quibus in partibus corporis fiat, a qua nascitur in mente doloris idea, possumus cognoscere per Experimenta. Demonstratur enim, solis nervis a cerebro orundis hanc facultatem inesse, ut ab illorum affectione nascatur in mente doloris idea. Si enim nervus, qui solus ad partem quamdam

dam corporis tendit, destruat, poterit pars talis secari, uri &c. sine ulla doloris idea in mente excitata, licet reliquarum omnium partium integritas maneat. Sed omnes nervi in toto corpore oriuntur a medulla oblongata, quæ medullam cerebri & cerebelli in se continet; vel a medulla spinali, quæ medullæ oblongatæ continuatio est, & præterea medullarum substantiam a proprio cortice ortam continet. Tamen folios nervos a medullari cerebri substantia ortos doloris ideam in mente excitare, patet inde, quod in omnibus illis morbis, in quibus cerebri actio per nervos tollitur, nullus sentiatur dolor. Summa ebrietate sepulti, ut & apoplectici perfecti, ab effusis in cranio humoribus, nullum sensum doloris habent, licet vivus ignis partes corporis comburat: Idem in Epilepsia exquisita tristibus exemplis toties conficit. Unde apparet, solis nervis a cerebro oriundis hanc inesse facultatem, ut ab illorum mutatione exciter in mente doloris idea. Quænam jam est illa mutatio nervi a cerebro orti, quæ in mente doloris sensum facit? Videtur esse talis dispositio, quæ, si diutius durat, vel magis intenditur, faceret nervi in continuitate solutionem. Si enim homini fanissimo, cui nullus dolor in una parte corporis adest, in quo nullum in fluidis vel solidis corporis partibus vitium invenitur, tenuissima acicula sub unguem digiti manus vel pedis adigatur, mox oritur enormis dolor, qui totum hominem convelli faciet, tantum a mechanica tali mutatione papillæ nervosæ. Nec refert, qualiscumque causa sit, & quocumque modo agat: modo fibræ talem nervosam a cerebro oriundam sic disponat, ut rupturæ proxima sit, nec rumpatur tamen, (destruendo enim nervo, dolor cessat) excitabitur in mente ingrata illa perceptio, quam dolorem vocant omnes.

Sed ut hæc mutata conditio nervi ideam doloris faciat nasci in mente, requiritur, ut nervi huius in cerebrum, & cerebri in nervum, libera maneat actio, non interrupta ullo obstaculo: si enim nervus in suo decursu ligatus fuerit, licet ejus extremum trahatur, laceretur &c. non erit in mente doloris sensus. Idem erit, si nervo manente libero in toto suo decursu, ipsum cerebrum in functionibus suis læsum fuerit. Patet ergo per hanc mutationem nervi aliquid mutari in ipso cerebro, tuncque ab

hac mutatione cerebri nasci in mente doloris ideam. Videtur ergo admodum verosimile, posse doloris ideam nasci aliquando in mente, licet nulla mutatio in nervis acciderit: si nempe cerebrum a quacunque demum causa talem accipiat mutationem, qualem accepisset, si fibra nervosa quædam in aliqua corporis parte sic disponeretur, ut dissolutionem minitaretur. Hanc rem confirmant observata Medica: Sepe enim accidit, ut illi, qui per bellicalamitates aut alia infortunia cruribus truncati fuerant, de dolore digitorum pedis abscessi conquerebantur; imo in quibusdam observatum fuit talis doloris sensum fuisse signum imminens convulsionis, cerebro, omnium nervorum sentientium origine, mutato. (*Miscellan. curiosa decur. 1. Ann. 2. pag. 32. Hildan. Observ. Chirurg. Centur. III. Observ. XV.*) Nec tantum hoc fiebat parvo post extirpationem factam temporis intervallo, sed etiam diu postea. Dum ergo quibusdam hominibus primum illud originale sensibus & motibus inserviens, a quo oriuntur omnes nervi, facilius afficitur, quam in aliis, erunt obnoxii plurimis morbis & doloribus, quos externis causis adscribunt; qui tamen totam suam originem debent nimis facili mobilitati ipsius sensorii communis.

Hinc Sydenhamus videns, quod Venam secando, purgando &c. nihil proficeret in miris illis morbis, qui a turbato spirituum motu oriuntur, conclusit tandem, quod uti homo quidam exterior conspicitur, ex partibus sensui obviis compaginat, ita procul dubio & interior est quidam homo, e debita spirituum serie & quasi fabrica constans, sub rationis lumine contemplandus. Hic vero cum temperie corporis intimius conjunctus & quasi unitus, tanto ægrius faciliusve de statu suo deicitur, quanto major est minorve ea, quam a natura sortitur, principiorum consistentium firmitas. (*Sydenham. Dissert. Epistolæ. pag. 496.*) Unde in talibus morbis, dum dolores varias corporis partes obidentes distinctissima simulabant mala, merito solam spirituum animalium ætæxia, inculcabat & inordinatos motus, hisque compendens tantum omnem navabat operam; per experimenta probe edoctus, omnes illos tunc sopiri dolores, & omnia illa tunc sedari symptomata, quæ tanta varietate in mirabili hoc affectu distinctissimos mentiebantur morbos. Confirmabat hanc rem quod



quod sola animi perturbatio in mobilibus illis corporibus tot malorum catervam producere poterat, licet momento ante nihil in solidis vel fluidis partibus nutatum detegeretur.

Si ergo supponeremus, omnia puncta sentientia in corpore manere, aboleri autem omnia puncta non sentientia, haberetur imago illius hominis interioris Sydenhami. Sed quam multa sic tollerentur de corpore. Totum cor in morbis ardentissimis adeo agitatum, inflammatum &c. non dolet, sed anxietatis sensus molestissimus oritur; tutus pulmo sæpe parulenta labe consumitur sine dolore: sic & renes, cum tamen pelvis, & ureterum membrana interior male affecta tam enormes dolores faciant: totum hepatis abscessus consumitur sine dolore, sed si exterior hepatis membrana afficiatur, dolor intensus adest &c.

Doloris ergo idea in mente sequitur talem dispositionem fibræ nervosæ in corpore, quæ dissolutionem minatur; sic tamen, ut admodum probabile videatur, posse et-

iam excitari doloris ideam, licet nulla mutatio nervis acciderit, sed tantum fuerit mutatum illud, a quo nervi hi suam originem ducunt, nempe cerebrum ipsum. Neque hoc tantum in nervis illis apparet, qui fidei custodia cavent, ne corpus destrueretur, & ubique dispersi doloris sensu monent hominem, ut tollat vel evitet omne illud, quod pergens agere, ut nunc agit, partem destrueret; sed videmus, idem certissime fieri in aliis nervis, a quorum mutatione in mente oriuntur distinctissimæ idæ, quod nempe illæ fieri possint æque vividæ, licet nullum objectum externum egerit in sensuum organa, sed tantum per morbos mutatio inducta fuerit ipsi sensorio communi. Sic phrenitici quam mira vident phantasmata, quam horrendos sæpe fragores audiunt &c. licet nulla causa externa adfuerit, quæ has ideæ excitaverit mutatione nervis inducta. Idem in Melancholicis deliriis & Maniacis furoribus contingit.

§. 221. **Q**ui eo acrior, quo fibra rupturæ propior; eo autem mitior, quo naturalis est tensioni propior.

Cum ex præcedenti definitione doloris patuerit, dolorem tunc percipi, quando fibra nervosa sic disponitur, ut dissolutionem minuitur, sponte sequitur, illum eo acriorem esse, quo causa dolorem excitans nervos plus distaxerit, modo adhuc cohesio maneat: hac enim sublara, cessat dolor. Et vicissim eo mitior erit doloris sensus, quo minor fuerit nervi distractio. Patet hoc in tormentis, quibus utuntur iudices, ut in vitis maleficis criminum confessionem expriment. Suspensio enim manibus homini alligant pedibus pondera, sensum aucta, unde majori facta partium distractione per gradus augeretur dolor ad summam acerbitatem usque. Simulac aufferuntur pondera, minuitur dolor. Nervi plurimi in nobis sunt satis laxi, hinc sine dolore extensionem ferunt; sed ubi per periosteum v. g. dispersi supra ossa tenduntur, minimum tensionis augmentum tam acerbos cruciatus efficit; hinc summi illi dolores in Lue Venerea, dum osseï tumores incumbens periosteum

sensim distendunt & dilacerant. Inde & acerbissimum illud tormenti genus, quod adhibent Carnifices, dum spinæ tibiz cochleæ impositæ Periosteum, adeo acuti sensus, ad durum os conterunt, sensum aucta pressione. Ob eandem causam & acerrimi dolores in minimis nervis sunt; majores enim nervi minimam partem suæ molis habent vere nervosam dicendam: hinc facile fieri potest; ut talis major nervus distendatur, nec tamen adhuc fiat distractio in minimis nervosis fibrillis, sed tantum in callosis vaginis has fibrillas tegentibus. Sed quando nervus est exiguus, & tensus, & imprimis his involutis nudus, tunc summi doloris etiam a levissima causa sunt: Docet hoc dentium dolor, ubi crusta adamantina dentis erosa, minimi nervuli, per dentis omnem substitutionem internam dispersi, vaginulis suis nudi, ab ipso aeris actu tam intolerabiles cruciatus faciunt, non sedandos sere, nisi nervulus affectus destruat aucta distractione, vel applicatis remediis, vel eradicetur dens.

§. 222. **U**nde Dolor summus in eadem parte brevis, mitior diuturnus esse, & intendi potest, & remitti.

Cum dolor supponat illam conditionem nervi, quæ rupturam, id est dissolutionem continuitatis, minuitur; & ille eo acrior

sit, quo fibra nervosa rupturæ propior est, patet, dolorem summum tunc adesse, quando fibra nervosa jam jam rumpitur: sed fi-

bra nervosa rupta, cessat omnis dolor, qui ante ab hac fibra nimis distracta fiebat. Dolor ergo summus, mox rumpendam fibram nervosam designans, brevis erit, quia rupta fibra desinet. Sic dum acutissima novacula vulnus inligitur, momentaneus sentitur dolor, sed mox evanidus. Et in Podagra observatur, eo citius deservescere paroxysmi tævitiem, quo acrior urserit dolor. Dum dente carioso facto nudantur nervuli, per eius insubstantiam dispersi, aliquando fugendo trahitur talis fibrilla nervosa, & oritur tam immanis dolor, ut ne quidem per pauca momenta ferri posset vel a robustissimo homine; sed rupta hac fibrilla, cessat brevi. Dum dens evellitur, summus dolor est; dente evulso, statim cessans. Summus ergo dolor cito destruet nervum dolentem; vel sic afficiet cerebrum, ut omnis doloris perceptio cesseret, tuncque simul plerumque syncope fit, sive abolitio omnis motus vitalis. Nec ultra possunt etiam acerbissima tormenta procedere: sic enim affecti cadaveris instar nihil amplius sentiunt, uti plurimis exemplis constat, quod malefici, ad torturam damnati, aliquando statim quasi exanimis fiant, nec postea vel exquisitissimos cruciatus sentiant.

Videtur huic sententiae repugnare, quod acerbis sepe dentium dolor per plures dies, imo & septimanas, homines torqueat: Sed ratio est, quod nervulus, dentis substantiam

ingressus, in minimas fibrillas divisus, per omnia puncta distribuatur; hinc licet summo dolore destruat una talis fibrilla, idem malum ad reliquas fibrillas pergens poterit diu continuare lævos hos cruciatus.

Cum vero minor dolor leniorem nervi dolentis tensionem supponat, hincque minus periculum rupturæ; patet facile, talem dolorem longe diuturniorem esse posse: & cum inter naturalem nervi tensionem & summam distractionem, rupturæ proximam, innumeri gradus intermedii possint concipi; apparet, tales dolores diu manere posse sine destructione nervi affecti, & pro majori vel minori distractionis gradu posse intendi & remitti. Illi autem dolores, qui oriuntur in partibus corporis cordi satis vicinis una cum valida febre, brevi cessant, destructa parte dolente; sed in locis a corde admodum remotis, & sine magna humorum agitatione, diuturni dolores, & sepe recrudescentes, tolerari possunt sine partium dolentium subita destructione. Terribilis adeo Iliacus dolor inflammatoris robustissimum hominem sepe paucorum horarum spatio necat: Podagra vero sepe viginti annis repetitis paroxysmis cruciatur, antequam in calcem destruxerit partes dolentes; tuncque minuitur in extremis dolor Podagricus, vel & aliquando cessat: sed ad interna desertur hæc materia, quæ prius in artus detonabat, & pessima mala producit.

§. 223. **C**ausa Doloris ergo omne id est, quod talem extensionem, vel dispositionem, ( 220. ) facit.

Generali ergo causæ doloris nomine comprehenditur omne illud, qualecunque fuerit, quod nervum, non dolentem antea, sic distrahit, vel alio quocunque modo disponit, ut rupturæ periculum sit: nec refert, an hoc premendo, distrahendo, rodendo &c. fiat; effectus erit semper idem: nempe nascetur in mente doloris idea. Intensitate vel & duratione poterit differre do-

lor a diversis causis excitatus, ceteroquin effectus erit idem.

Pater hinc, quam multiplex possit esse causa, quæ in corpore etiam sanissimo dolorem excitant. Ut autem ordine posset indagari a Medico latens doloris causa, & cognita tolli, ad quasdam classes debent redigi causæ doloris hæcenus observatæ, quod fit sequenti paragrapho.

§. 224. **Q**UO refertur 1. vis naturalis contractionis praviorebus fibris sustentata, dum quædam soluta sunt ( 183. ) 2. quod vas fibris nervosis contextum nimis replendo distendit; eo obstructio; plethora, cachymia abundans, auctusque motus circularis, spectat 3. quod vi distrahit, ut luxatio, tumor, vis externa. 4. omne vulnerans, & rodens.

1. De hac re dictum fuit §. 163. & §. 183. In Paronychiæ pessima specie, in qua tendine flexorum digiti affecto tam immanis dolor oritur, hoc apparet: excidit enim

sepiissime ultimus phalange digiti ossiculum post enormes toleratos cruciatus. Sed ut hoc fieri possit, debet tendo affixus huic ossiculo prius inde separari: quod non simul

mul & femel, sed lenta tali distractione fit. Nulli enim fere parti corporis tam exiguae molis tam validi assignantur musculi, quam digitis; & in hoc morbo musculis illis contractis, digiti semper flexi apparent. Dum ergo incipit tendo separari ab officulo, reliquae fibrae sustinent totam vim musculi contracti, & lenta, sed continua laceratione, ab osse distrahuntur, qui cohaerent; unde immanis dolor saepe totum cerebrum sic turbat, ut acutissima phrenitis, convulsio, & mors saepe ipsa sequatur: Omnem humanam patientiam evincunt haec tormenta, quibus vivis offibus coherentes partes sensum lacerantur. *Philotas, quamquam hinc ignis, illinc verbera, jam non ad questionem, sed ad parvam ingeriebantur, non vocem modo, sed etiam genitus habuit in potestate; sed postquam intumescens corpus ulceribus, flagellorum ictus nudis offibus incussus ferre non potuit, si tormentis adhibitis modum essent, dicturum se, quae scire expetere, pollicetur* &c. (*Q. Curtii Lib. VI. cap. 11.*).

2. Demonstratum fuit in commentario §. 39. vasa majora constare ex convolutis membranis, quae omnia vasorum genera in se continent, etiam minima totius corporis, nervos nempe: omne ergo illud, quod distendit vasa majores latera, distrahet pariter nervos per hanc dispersos; sed ab hac distractione nascebatur in mente doloris idea, uti dictum est. Dubitari posset, an omnia vasa corporis habeant in suis membranis nervos sentientes? cum in §. 220. dictum fuit, plurima viscera (quae tamen vasorum congeriem esse ex Anatome hodie constat) saepe consummi sensum & destrui fere sine dolore: Unde hoc tantum verum erit, quatenus vasa constituentes membranae habeant per suam substantiam dispersos nervos a cerebro oriundos & sensui dicatos. Hoc autem in plurimis vasis obtinere patet, quia tenuissimae aciculae apice in superficie corporis nullum punctum laedi potest, quin effluat ex vasis laxis consentus humor, & simul percipiantur doloris sensus. Causae autem, quae vasa fibris nervosis sentientibus instructa distendunt, praecipuae sunt sequentes.

OBSTRUCTIO supponit semper obstruccionem canalis, per quem liquidum vitali motu transfluere debet, hinc necessario sequitur, ut liquidum appulsam ad locum canalis obstructum, nec penetrare potens, dilatat vasa latera, illaque attenuet, & tandem

solvat, uti demonstratum fuit in Commentarii §. 120. patet ergo, fibris nervosis vasis obstructi latera constituentibus tensis summpere, & tandem ruptis, posse excitari dolorem: & quidem vario intensitatis gradu pro varia distractionis mensura. Dum in pleuritide obstructa arteriae sanguine immedicabili in locis intercostalibus distenduntur a vitali liquido a tergo urgente, quam immanis nascitur dolor, semper eo acerbior, quo majori impetu sanguis pellitur in loca obstructa; unde debilitata vita per Venae Sectionem cessat vel minuitur dolor. Hinc obstructio proprie loquendo doloris causa non est, sed liquidum a tergo urgens dilatando vas obstructum dolorem excitat.

PLETHORA. Probatum fuit §. 106. 8. nimiam copiam boni sanguinis distendere vasa, imo & rumpere posse, hinc omnes gradus doloris, qui praeternaturalem tensionem vasorum ad rupturam usque sequi possunt, ab hac causa sola excitantur. Docent hoc saepe molestissimi capitis dolores a sola nimia plenitudine orti, sanguinis missione tam feliciter tollendi: Mulieres etiam, antequam fluxu menstruo evacuebatur nimia plenitudo, saepe ab hac causa dolores in variis partibus corporis sentiunt, qui evanescent, dum per uteri vasa dilatata elapso sanguine tollitur nimia ejus copia.

CACOCYMYA ABUNDANS. Omnis humorum nostrorum degeneratio ab illis conditionibus, quae requiruntur in sanitate, hoc nomine vocatur. Potest ergo & nimia vasorum distensio fieri aequae ab alienis humoribus aggestis, quam a nimia copia boni sanguinis; unde & dolor excitabitur a distractis fibris nervosis vasorum membranas constitutibus. (Non agitur jam hoc loco de majori acrimoniaquam liquida degenerantia acqui rere possunt, & per quam rodendo & irritando dolorem excitare valent.) Dum iners aequalis colluvies in panniculo adiposo aggesta, in crurum Anaxaga, curim incumbem distendit, ab hac sola causa dolor nascitur.

ACUTUSQUE MOTUS CIRCULARIS. Demonstratum fuit §. 100. solam auctum motum sanguinis per vasa calore aucto facere majorem rarefactionem liquorum; unde sequitur vasorum major distensio, & a liquidis crassioribus, dilatata vasa ingressis, obstructio & destructio, inflammatio &c. Sed haec omnia fieri nequeunt sine distractione & dilaceratione fibrarum nervosarum

per vasorum membranas disperfarum; unde satis patet, dolorem ide excitari. In febris a solo aucto motu capitis dolor & artuum fieri poterit: minuta vel sub lata febre, iterum cessans.

3. Omne illud, quod vi distrahit partes nostri corporis, minuit earundem cohesionem, ergo continuatis solutionem inducere poterit, si pergat, vel augeatur hæc distractio; sed ex definitione doloris §. 220. illa conditio nervi, quæ dissolutionem continui minuitur, doloris ideam in mente facit. Distractio ergo partium, fibris nervosis præditatur, dolorem faciet, a quacumque demum causa fiat. Unde dum luxata ossa, cavis suis, quibus naturaliter continebantur, elapsa, ligamenta articulos necitèta elongant, tam acris dolor nascitur, qui, osse reposito, statim cessat, nisi distracta per luxationem ligamenta, vel vicinæ partes presse, jam inflammata fuerint: manifesto indicio, dolorem post luxationem ortum tantum ab hac distractione ligamentorum fieri. Unde Hippocrates monuit, quod illis, qui post humeri luxationem restitutam omni dolore carent, partibus vicinis nulla inflammatione affectis, & ideo nulla cura sibi opus esse arbitrantur, cavendum sit quam maxime, ne repositum os iterum prolaborur: & ideo jubet, ut Medici hoc præfagiant, quia longe facilius luxatio redit in his casibus, quam si nervi inflammatione tentantur. ( Hippocr. de Articulis textu 29. Tom. XII. pag. 308. ).

Facile jam patet, eundem effectum esse, si tumor, natus a quacumque causa, distra-

bat partes. In arthritide enima inflammatoria, vel & per alios morbos, ut spinam ventosam, exostofim &c. distracti nervi, per ligamenta articulorum dispersi, tam acerbos cruciatus faciunt. Quantus autem dolor a sola vi externa distrahente fieri possit, docent tormenta maleficorum legam auctoritate facta, in quibus, vel ponderibus appensis, vel trochleis, distenduntur corporis partes.

4. Omne vulnus, uti ex eius definitione §. 145. patet, est soluta cohesio partis molliis: sed dum instrumentum vulnerans partes antea unitas dividit, fit illa conditio nervi, qua dissolutionem minuitur; nascitur ergo dolor: sed statim evanidus, si ceteri actione instrumenti vulnerantis separantur partes; tamen illo momento dum vulnus infligitur, dolor est. Ille autem dolor, qui aliquo tempore post vulnus infligitur nascitur a distractione partium, per vulneris labia ab invicem secedentia, pendet; unde ille dolor vulnus quidem infligitur sequitur, sed non a vulnere ipso, ut causa immediata, sed a mutatione vulnere induta per contractilitatem partium, oritur. Nervus enim rupturæ proximis doloris ideam in mente facit; nervo autem rupto dolor cessat: unde dum vulnus fit, dolor nascitur, vulnere facto, cessat dolor.

Rodentia autem omnia, corpori applicata, & calore corporis actuosa reddita (in cadavere enim vix agunt, si ignem solum exceperis) disceperunt minutis & numerosissimis vulnusculis partes & destruant; unde dolor satis intensus & diuturnus simul oritur, uti evidenter patet.

§. 225. **I**nde Doloris ( 220. ) in vulnere ( 145. ) causa multiplex ( 214. ) cognoscitur.

Si jam omnia hæcenus dicta applicentur vulnere, apparet, magnum posse numerum & varietatem causarum dolorem excitantium in vulnere obtinere. Ipsam enim instrumentum vulnerans illo momento, dum vulnus infligitur, doloris causa est: partes instrumenti vulnerantis relictæ in vulnere dolorem facere possunt: Labia vulneris, a se mutuo secedentia, nervi semidivisi, nervi majores divisi retracti, & ramulos vulnere superiores distrahentes, summos dolores excitare possunt. Dum labia vulneris postea inflammantur, tument, & retor-

quentur, & simul febricula orta augeatur fluidorum celeritas, iterum novæ causæ doloris adsunt. Dum effusi in vulnere cavum humores in acrem degenerant indolem, illi rodendo & irritando dolorem iterum faciunt; idem & ab acerbis quocumque titulo applicatis fiet. Quando per suppurationem sensum separantur obstructa vasculorum extrema a vivis partibus, pariter dolor nascitur; qui, pure facto, cessat. Omnia hæc sollicite distinguenda sunt, ut cognita doloris causæ in vulnere debita auxilia possint adhiberi.

§. 226. **E**t effectus, inquit, jactatio, vigilia, febris, calor, sitis, siccitas, convulsio, gangæna, intelliguntur.

Quan-

Quando dolor adest in corpore, sequuntur ejus effectus, qui imprimis observati fuerunt sequentes.

**INQUIET ET JACTATIO.** Dum percipiuntur ideas, oritur in mente nostra mutatio quædam, quæ grata vel ingrata est; vel & aliquando penitus adiaaphora: sic dum cogito circulum bisariam per diametrum dividi, hoc nec placet, nec displicet. Sed si manus frigida apponitur igni moderato, omnes dicent, hoc placere; si vivus ignis applicetur manui, omnes testabuntur, hoc displicere. Quomodo hoc fiat, non potest forte explicari; unusquisque tamen in se ipso hæc deprehendit. Illud autem gratum & ingratum, quod comitatur ideam perceptam, fecit in nobis effectus quosdam, quos nequidem summa ratio potest vincere, quidquid dixerint superbi Philosophi. Voluntas enim omnibus viribus nititur, ut illud gratum menti præsens maneat, ut illud ingratum deleatur; & tunc sequuntur motus corporei, non a mente præscia determinati, sed vere automatici & spontanei dicendi, quibus conamur tollere vel evitare illud, quod in mente excitaverat ingratum illum sensum. Hæc est humanitas nostra, quam non possumus exuerre. Dum profundis meditationibus penitus immerfus hæret Philosophus, si subito acicula pungatur ejus digitus, ipso momento manum retrahet, licet nulla sit illius motus excitati in mente conscientia. Unde doloris sensus fidelissimi custodis instar monet, ut tollatur illud, quod corpus destrueret. Hinc videmus, homines dolentes varia postura partium corporis, & continua sæpe agitatione moliri, ut forte talem situm inveniant, quo tollatur, vel saltem minuat, doloris sensus: & inde illa inquietudo & jactatio in magnis doloribus. Ubi vero a minimo motu corporis augetur dolor, tunc immobiles hærent homines: uti in sævissima podagra, & dolentissimo Rheumatismo fit.

**VIGILIA.** Sanissimus homo, sopitis omnibus sensibus, naturali somno dum fruatur, excitatur ab omnibus illis, quæ sensuum organa valide afficiunt: multo magis ergo impeditur somnus nondum præsens a dolore tam efficaciter cerebrum afficiente. Ideo veteres Medici in morbis soporosis pilos de naribus evelebant, urticis cadebant membra, acria applicabant corporis partibus, ut doloris sensu excitatis tolleretur nimia somnolentia.

**FEBRIS.** Fere semper magnos dolores sequitur; etiam in illis morbis, qui ex sua natura minime in febrem vergunt: uti in Podagra, Lue Venerea &c. patet: Dum enim acerbis talis dolor torquet, fere semper aliqua febris adest.

Hinc & Hippocrates inter febrium causas etiam dolores merito agnovit pluribus in locis. Sic dixit. (*Prænot. Coacar. N. 75.*) *Ex vehementibus doloribus abortit febris diuturn.* (*Ibid. N. 31. & Lib. I. prærbet. Tom. VIII. pag. 738.*) *Febris ex hypochondriorum doloribus maligne &c.* ubi humeri articulus versus posteriora elabatur, dicit, omnium dolentissimum hoc esse, & summas excitare febres &c. (*De Fracturis Tom. XII. pag. 267.*) Et, nisi luxatus articulus quicumque cito restituatur, a dolore febris sequitur etiam in sanissimo corpore.

Cum ergo febris dolorem majorem sequatur fere semper, facile intelligitur, & calorem, aucti motus per febrem effectum, & diffatis liquidis per majorem motum siccitatem a dolore fieri. Ubi autem siccitas adest in corpore, & major calor, sitis semper cogit, ut potu copiosiori remedium fiat his malis: uti in Capitulo de siti Febrili dicitur postea.

**CONVULSIO.** Imprimis in illis, qui totum genus nervosum mobilissimum habent. Ideo infantibus, ob tormina intestinorum ab acido, toties convulsiones accidunt. Vidi hysterica puellam, quæ odontalgie ob cariosum dentem obnoxia cum esset, convulsam frequentissime toto corpore, dum dolor recrudesceret. In se ipso sensit convulsionem instare Galenus, dum immanem dolorem pateretur a distractione nimia humeri, quem luxatum credebant; uti dictum in Commentariis ad §. 164.

**GANGRÆNA.** Definitur, quod sit illa partitis mollis affectio, quæ, abolito vitali influxu & effluxu humorum, in mortem tendit. Unde respectu nervi dolentis in magno dolore est ille status, quo in mortem tendit, dum nempe integre rumpetur brevi, jam summo opere distractus. Dum validissima Pleuritis immani dolore urget, nisi succurratur subito, vel impedita respiratione ob doloris vehementiam suffocetur æger, macula livida in affecto loco orta gangrænam lethalem designat. In Ileo inflammatorio, post summos dolores intra paucas horas gangræna nascitur, cessante tunc dolore, sed brevi mors sequitur. In Paronychia pessima paucis sæpe horis

cum intolerabili dolore sic pars afficitur, ut corruptæ partes molles postea in gangrænosum tabum dissolvant, ipsumque digiti affecti ossiculum sideratum cadat. Omnium maxi-

me gangræna post dolorem nascitur, si inflammatione & valida febris simul adsint; tunc enim citissime aucto circulationis impetu destruuntur partes.

§. 227. **T**um Anodyni diversitas, pro varietate causæ, scitur.

Una tantum est causa proxima doloris, nempe talis dispositio fibræ nervosæ, cerebro orta, ut dissolutionem minuetur; omne ergo illud, quod tollit illam dispositionem nervi, doloris remedium erit. Quia vero illa nervi conditio a tam diversis causis pendere potest, ideo tanta etiam requiritur varietas Anodynorum, dum singulis causis tollen-

dis distincta debeant adhiberi remedia. Requiritur ergo prius, ut doloris causa singularis cognoscatur, antequam determinari possit, quid causam hanc enervare vel tollere possit. §. 224. enumeratae fuerunt, & in distinctas classes redactæ, doloris causæ: sequens paragraphus adæquata his causis remedia proponit.

§. 218. **D**oloris causa tollitur ergo 1. laxata distenta fibra. 2. resolutione concreti. 3. minuto motu & materia distendente. 4. ablata tractione inæquali, & violenta. 5. lenito acri. 6. discusso eodem. 7. educto, quod solvit fibras.

1. Sola distractio rupturam productura dolorem facit: si nunc ars facere valet, ut fibra possit distrahi sine rupturæ periculo, dolor cessat, vel saltem plurimum minuitur, licet causa distrahens fibræ nervosæ pergat agere. Si ligam. rigidum & aridum flectere velis, rumpitur: si aqua maceratum fuerit diu, flecti poterit sine ruptura. Sic lentum de salice vimen torquetur, nec rumpitur; idem arefactum, si flectatur, frangitur. Unde in dolentissimis morbis ab omni ævo semper adhibita fuerunt talia remedia, quæ laxarent solidas corporis nostri partes. In Ileo balneis foveri corpus, & oleo illiniri Hippocrates suavit: in Pleuritide mollissimis applicatis & tepidis latus affectum regi iussit; similia & interne adhibenda voluit. Galenus in se ipso (vide §. 164.) dolorem summum, & convulsiones inde metuendas, sedavit, dum curaret, ut oleo calido perfunderetur continuo. Dum Phlegmone, inflammatorio tumore panniculi adiposi subiecti, cutim distendit, nervisque cutaneis distractis dolorem facit, licet irrasolubilis omnino in suppurationem vergat, ideoque maneat imo potius augeatur causa distendens; si Cataplasmata ex emollientissimis continuo applicantur, mitigabitur dolor, sic laxatis fibræ nervosæ, ut distrahi possint sine rupturæ periculo aut facilius solvantur. Mollissimi olei pressi cuiuscunque larga copia sumta dolores Iliacos, Colicos, Nephriticos tam pulchre lenit. Aquæ tepidæ vapor omnia adeo emolliens & laxans, dolentissimis locis

tanto cum levamine adhibetur. Ubi a nervi punctura immanes illi dolores oriuntur, periti Chirurgi emollientissimis remediis nocet, & dies foveat partes affectas. Hinc universale remedium ad dolores omnia emollientia & laxantia exhibent, quia ipsam causam proximam doloris, nempe rupturæ periculum, in fibra nervosa tollunt; dum reliqua auxilia tantum in causas remotas doloris agunt. Et licet ignoretur causa, fibras nervosas sic disponens, ut doloris sensus nascatur; tamen hæc semper tuto & cum fructu possunt adhiberi. Simul hoc boni habent hæc remedia, quod pluribus doloris causis remotis tollendis sufficiant, nec noceant tamen illis causis, quas tollere nequeunt. Vasis enim laxatis, distendens illa innumerable liquidum facilius transit, & simul omnis acrimonia demulcetur iisdem. Omne autem illud, quod solidarum partium corporis robur & contrahilitatem augeat, si maneat eadem causa distendens fibras, semper simul faciet doloris augmentum. Sic pleuritis longe acerbior in exercitatis & robustis corporibus observatur, quam in debilibus & laxis hominibus. Multo facilius & minori cum dolore articuli laxati restituantur in similibus, quam in strictæ temperiei hominibus: imo in quibusdam tam facilis elongatio ligamentorum fit, ut sine ullo dolore prolabantur articuli. Dum carnes in tormentis summa vi distraherent omnes fere corporis partes, aspersa aqua frigida dolorem immixtè augeri non videntur.

verunt. Ubi ergo laxantium & emollientium efficacia ad locum dolentem pertingere potest, nunquam deerit effectus. Si enim v. g. in dentis media substantia fibrilla nervosa tensa doleat, non poterit ille dolor laxantibus leniri: idem verum est, si a medulla ossis affecta intolerabiles illi dolores oriantur: uti & dum in pessima Paronychia sub cartilagine illo scuro, tendines musculorum flexentium digito tegente, malum hæret. Aliquando etiam contingere potest, ut, licet dolor magnus urgeat, alia tamen Symptomata mali laxantium & emollientium ulum prohibeant, v. g. si a cancro tecto, vel jam ulcerato, fumus dolor oritur, emollientia nocent; quia & putredinem, & fungosam illam cancri excrecentiam, augent summopere. In reliquis autem omnibus casibus fere universalis est laxantium usus ad dolores leniendos.

2. Dum calculus ureteribus impactus hærens dolorem facit, qui solvere posset illud concretum calculosum, tolleret dolorem: Omnia illa, quæ concretum inflammatoria densitate sanguinem resolvere possunt, pleuriticos dolores sedant. Idem in omnibus aliis casibus verum est, ubi obstruens immeabile vasa Infarciens, vel tumores, ex aggestis concretis nati, vicina præmunt & distendunt. In capitulo autem de obstructione actum fuit de variis modis, quibus liquidorum nostrorum moleculæ, antea separatæ, concrefcere possunt (§. 117.) & ibidem tradita fuerant talia remedia, quæ sua efficacia poterant dividere concreta (§. 132. 133. 134. 135. 136.). Unò prius indagari debet indoles concreti; deinde ex antedictis inveniri poterit remedium, quod resolvendo illud concretum tollet dolorem inde ortum.

3. Omnis dolor supponit vitam superfluentem: & si ab immeabili humore, distendente vasa obstruunt, oritur, semper erit eo acrior, quo vita ætiosior. Hinc in pleuritide, dum simul valida febris adest, dolor intolerabilis nascitur; quia magno impetu urgentur humores in locum obstruunt, & vasa dilatant, fibras nervosas horum vasorum texturam facientes magna vi distrahunt. Omne ergo illud, quod minuit impetum & velocitatem circuitus humorum, sedabit dolorem: uti quotidiana observata docent. Venæ sectio enim, ad animi deliquium usque instituta, illico sæpe tollit, vel saltem plurimum levat, acutissimæ etiam pleuritidis do-

lores. Hinc a Veteribus Medicis in vehementissimis doloribus commendabatur Venz Sectio ad lipothymiam usque: uti in locis antea jam allegatis (§. 121.) patet. (Galen. *Continuat. I. in Aphor. Tom. IX. pag. 40. & libro de Curandi ratione per Venæ Sectionem cap. 12. Tom. X. pag. 441.*) Et in se ipso, uti alia occasione dictum fuit (§. 133.) dolorem diuturnum fixum in illa maxime parte, quæ hepar septo transverso committitur, curavit Galenus, dissecta arteria inter indicem & pollicem dextræ manus, & sanguine effluente, donec sponte sisteretur. (Ibid. cap. 23. Tom. X. pag. 431.) Ob eandem causam summam quietem imperabant Venteres in morbis acutissimis, in quibus sæpe semper ingens capitis dolor adest. Nec tantum prodest tunc Missio sanguinis, quatenus debilitando vitam minuit motum, sed etiam quia educto sanguine minuit copiam humorum distendentium. In Pleuriticis molestissimi capitis dolores sæpe adsunt, licet sedatus penitus sanguinis motus sit, imo sere suffocatus, ob nimiam copiam humorum movendorum: simulac vel spontanea Hæmorrhagia per nares, vel per artem facta sanguinis subductio larga minuerit sanguinis copiam, illico cessat dolor; sublata materia distendente vasa nimis plena.

Sed imminutio vitalis motus non tantum prodest in illis casibus, ubi nimia velocitas vel nimia distensio vasorum dolorem faciunt, vel ab alia causa factum augent; sed præterea summum usum habet in leniendis doloribus, qui ab acriori humorum indole nascuntur. Acria enim, per vim vitæ & calorem corporis actiuosa reducta, lædere possunt; in cadavere, ubi omnis motus cessat, & calor tantum communis Atmospheræ adest, nihil fere agunt. Sic cantharides, cadaveri applicatæ, nullum præstare effectum, post Helmontium docuit PETIT: imo & Cauterium potentiale, cuti cadaveris applicatum, fere nihil effecit spatio quindecim horarum: dum vero lenteis calidis applicatis foveretur locus, cui applicatum erat cauterium, cutim dissolvit & partem subiectæ pinguedinis. (Académie Royale des Sciences l'An 2732. Mem. pag. 314. &c.) In morbis, in quibus acrimonia degenerantium humorum dolores excitat, observatur semper, aucto motu vel & majore calore (qui etiam auctum motum sequitur) illos ingravescere. Dolores illi nocturni, qui tanta cura

crudelitate Lue Venerea laborantes affligunt, calore leſti ſæpe augmentur adeo, ut miſeri cogantur ſingulis noctibus ſurgere, ut frigefacto corpore miniatur dolor. Dum febris acuta peſſimo ſcorbuto infectum hominem corripit, dolores augmentur immittitur; imo ſæpe, ſtraſus ſubito vaſis, per auctum imperum acrium humorum, ſanguis quatuorverſum erumpit. Sic etiam aeris calidioris peſſimum ſcorbutum exacerbari quam maxime obſervatum fuit. (*Académie des Sciences P. An 1699. Memoir, pag. 235.*) Idem plurimis aliis obſervari poſſet demonſtrari; hæc tamen ſufficere poterunt.

Quoniam & per quæ auxilia morus fluidorum per vaſa minui poſſit, dictum fuit §. 102. 103. 104. 105. Diſtendens autem materia ſolis evacuantibus tolli poſſe.

4. Dum luxatione facta os articuli ſui cavo excidit, diſtrahit ligamenta, & premit partes vicinas; unde dolor; qui brevi ceſſat, vel ſaltem inſigniter minuitur (aliquis enim dolor ſæpe remanet poſt luxationis reſtitutionem ob magnam diſtractionem, quam paſſa fuerunt ligamenta, unde ſæpe inflammantur) ſimul ac os in ſuo loco repoſitum fuerit. Idem verum eſt, dum partes tendines ſemilaceræ inæquali tractione continuo elongatæ acerrimum dolorem creant: ſi enim tunc idoneo ſibi partis aſſectæ, ſplenis & ligatura debita impediatur inæqualis illa tractio, dolor ceſſat; uti conſtitit in Hiſtoria §. 164. enarrata: ubi homo rinerat illam partem tendinis Achillis, quæ Gaſtrocnemio musculo continuatur, integra manente illa parte ejuſdem tendinis, quæ Soleo musculo originem debet. Poſt ſedaram enim inflammationem repetitis Venæ Sectionibus, per idoneam ligaturam inæquali tractione ſublata, ceſſabat dolor. (*Ibid. P. An 1728. Memoir, pag. 334.*) Si autem vis illa diſtrahens tolli nequeat, ut dum v. g. luxatum os ob tumorem & validam inflammationem reponi non poſſe; tunc ſola emollientia & laxantia profun- de faciunt, ut ſine rupturæ periculo fibræ nervoſæ elongari poſſint.

5. Ubi ſine majori motu humorum, ſine ullis ſignis diſtentionis majoris partium a liquidis concretis vel accumulatis, ſine ulla vi diſtrahente externa, dolor naſcitur, tunc intermiſis de acrimonia cogitamus, quæ ſæpiſſime inſcuſatur facere dolorem, qui ab aliis cauſis naſcitur: Raro enim magna acrimonia in ſanguine invenitur: deſtruerentur enim

cito tenerrima encephali vaſa, ſi acres humores per illa fluarent. Unde ſæpe ſemper tantum in primis viis acria inveniuntur, vel ubi humores ſtagnantes vel extravasa in loco corporis quocumque hærentes acres fiunt; ſive ex propria ſua indole, ſive ex peculiari cacochymia, ut in Lue Venerea, ſcorbuto &c. Hinc ſæpe ſemper topicum tale malum eſt. Si ergo conſtitit, acrimoniam doloris cauſam eſſe, paret facile dolorem tolli vel mitigari, ſi leniatur lædens acrimonia. Hoc autem fiet vel ſpecifica modela oppoſita cognite acrimonie, ut v. g. dum acilum acie in primis viis hærens terreſtribus abſorbentibus, vel ſalibus alcalinis enervatur, & miſce redditur: vel ſiet generalibus auxiliis ad qualemcumque acrimoniam: diluentibus nempe, obtundentibus, inviſcantibus &c. Per hæc enim omne acie iners redditur, uti probatum fuit, dum de ſpontaneis humorum de generationibus agebatur, ubi de his remedia dictum fuit.

6. Dum in Lue Venerea peſſima omniſibus inſidet malum, ab eroſione lenta, & tumore omniū arteſtorum diſtendente ſenſu adeo exquisito præditum Perioſteum, tam noleſti dolores oriuntur. Dum autem in his caſibus repletur corpus magna copia decoſti Guajaci, & deinde, ſudore per accenſum viniſpirium excitato, moyetur illud decoctum per omnia vaſa; detergitur latens hoc virus, & diſſilatur de corpore, cum levamine ſummo, vel & integra abolitione doloris. Idem fiet, ſi cacochymia notabilis, v. g. ſcorbutica acris, in corpore vulnerati obtinuerit: tunc enim humores ad vulnus allati, cito degenerantes in maiorem acrimoniam, dolorem excitare poterunt. Molliffimis & ſimul leviſſime diaphoreticis remediis, qualia ſunt ſere omnia decoſta vulneraria dicta, larga copia exhibitis, abluitur & enervatur illud acie irritans.

7. Quamdiu v. g. fragmenta instrumenti lædentiſſi, vel fragmenta oſis læſi, vel aliud tale quid, in vulnere hærent, quæ acuta ſua figura & rigiditate partes lædere poſſunt, tamdiu manebit dolor; imprimis quia partes continuo irritatæ inflammantur & tuentur: hinc appreſſe alieno huic reſiſto in vulnere lacerantur magis; donec educatur hoc heterogeneum per instrumenta Chirurgica, vel ſuppuratione circumquaque nata expellatur. Quomodo autem hæc tolli debeant de vulnere, & quibus cum cautelis, dictum §. 186. 187. 188.



§. 229. **D**oloris sensus tollitur, manente ejus causa (224.). 1. nervo inepto ad sensum reddito compressu, dissectione, vel exsultione. 2. Sensorio communi obtuso per vim narcoticam: atque his tolluntur nonnulli effectus (226.) ex Doloris sensu oriundi.

Omniuni perfectissima doloris cura est, si ejus causa tollatur: aliquando tamen etiam in summis doloribus cause latent: scilicet etiam, licet cognite fuerint, tolli nequeunt. Interim gravissimus ille sensus lenimen postulat, & per effectus, qui dolorem sequuntur, jaculationes v. g. vigilias, febres &c. sic mitigabitur corpus, ut gravissima possint inde sequi mala. Tunc tantum hoc superest in arte, ut sensus doloris tollatur, licet maneat ejus causa. Sensus autem doloris fit, dum liberum est commercium inter cerebrum & nervum affectum, & dum cerebrum integritate suarum functionum valet. Omnia ergo illa remedia, quæ sensum doloris tollunt, non causam ejus, agunt vel in nervum dolentem, vel id cerebrum ipsum.

1. Constat certissimis observatis, nervo destructo, qui unicus ad partem quandam corporis tendit, omnem sensum in illa parte tolli, (vide §. 162.): illa enim mutatio, quæ in nervi extremo facta sensorium commune sic afficit, ut doloris idea nascatur in mente, per nervi affecti integritatem cerebro communicatur: omne ergo, quod nervi integritatem destruit inter cerebrum & locum illum corporis, cui causa dolorem excitans applicatur, tollit doloris sensum omnem, licet doloris causa maneat, & agere pergat etiam summa cum vehementia. Qui luxura spina dorsu compressam habet modulum spinalem, ne quidem vivo igne crucibus applicato dolorem sentiunt. Nec refert jam, an compressione valida impediatur commercium inter cerebrum & partem compressam nervi, an vero dissecando, vel urendo, destruat nervi connexitas. Dum in artuum extripationibus ligatura archissime circumposita vasa comprimunt, ut compescere possint Hæmorrhagiam, simul & nervis compressis stupor oritur & insensibilitas in parte, quæ dolorem multum minuit. Empyricus Amphelodamentis quondam dolorem dentium curabat, dum digitos suos capillis implicabat, & deinde pollice sub auriculæ lobo validissime appresso contundebat nervum ibi hærentem, qui ramos ad maxillam superiorem dat. Idem effectus erat, dum nervus sub

dente molari primo maxillam inferiorem utrimque ingrediens comprimeretur. Savissimam odontalgiam compescunt omnia illa, quæ dolentem nervulum in dente destruant: hinc, si eroso dente pateat via, stylo ferreo canefacto illum comburant, cum doloris presentissimo levamine, modo ad nervulum dolentem calor igniri ferri pervenire possit. Hanc methodum in dentium dolore jam commendaverat Hippocrates, (De Affectionibus cap. 2. Tom. VII. pag. 631.) dicens: *In dentium apertis doloribus, si dens erosus fuerit & vacillet, eximatur. Si neque erosus fuerit, nec vacillet, assione rescicandus est.* Alii eodem effectu acerrima olea stillatitia Caryophyllorum, Origani &c. denti cavo imponunt, quæ statim nervum, quem tangunt, ignea vi destrunt. Plurimis aliis doloribus, qui pertinaciter aliorum auxiliorum efficaciam eludebant, vivum ignem adhibuit, vel & scarificationem, Hippocrates; utroque modo nervos dolentes destruendo doloris sensum tollens. Sic postquam ad Capitis dolores multa commendavit remedia, addit: *Ac si diuturnus & validus capitis morbus evadat, neque capite purgato tollatur, aut hujus caput scarificare, aut venas in circuitu adurere oportet: ex ceteris enim ab hoc dantur sanum fore spes est* (Ibid. pag. 620.) & alibi. (De locis in homine cap. 14. Tom. VII. pag. 373.) *In capitis dolore sanguinem ex venis detrabito; quod si non cesset, sed diuturnus sit, venas inurito, & convalescit.* Similia de capitis dolore curando per inunctionem, & in aliis locis habet. In molestissimo morbo Ischiadico jubet, *quancunque partem dolor occupaverit, balneo, fomentis, linimentis emolliere, & alvum subducere, levato dolore purgant exhibere, post hæc lac asinum potare &c. si in unum aliquem locum irruerit dolor, & constiterit; nec medicamentis expellatur, inurito, quocunque in loco fuerit.* (Hippoc. de Affectionibus cap. 8. Tom. VII. pag. 629.) Et alibi in eodem morbo, post varia tentata auxilia, si non levetur dolor, multis & profundis crustis partem inurendam jubet, in ossis quidem partibus por fungos, in carnosius per serratenta. (Hippoc.

pec. de internis affectionibus cap. 52. Tom. VII. pag. 677.) Idem & in Aphorismis (Aphorism. 19. & 60. Sect. VI.) & aliis locis commendat.

Ideo & in Asia tantus usus Moxæ in doloribus Arthriticis tollendis, imo & in ipsa Podagra; dum Arrenisæ obsoleta folia contrita, & ab omnibus fibrosis partibus durioribus depurata, sicque in mollem lanuginem conversa, in pyramidales turundas contorquent, quæ basi sua dolenti loco imponuntur; dein incenso apice sensim descendens ignis partem urit, non adeo crudeli cura, cum & centies viderit Kaempferus, pueros hanc unctionem admisisse, absque eo, quod ullo signo vel ejulatu doloris sensum testarentur. (Kaempfer. Amant. Exerc. pag. 592. Or.) Hinc adeo familiaris Moxæ usus ibi est, ut fuitatis præservandæ gratia singulis sex mensibus plurimii sibi corporis loca quadam Moxa comburi pellantur; imo æterno carcere damnaris prodire permiffum est, ut hoc beneficio fruantur.

Quia tamen nervo sic destructo pereunt omnes functiones, quæ ab ejus integritate pendebant; ideo hæc methodus dolorem sedandi non adhibetur, nisi quando doloris adest summa acritas; & illa auxilia, quæ paragrapho præcedenti recensita sunt, jam frustra adhibita fuerint, vel conditio loci dolentis talis sit, ut illa remedia applicari nequeant sic, ut sua efficacia causam doloris tollere vel emendare possint.

2. Ubi jam causa doloris tolli nequit, & non conducit, vel impossibile omnino est, nervum dolentem destruere sine læsione partium, quarum integritas sine periculo vel magno incommodo tolli nequit, tunc unicum illud superest, ut sensorium commune sic mutetur, ut non sentiat. Possè enim esse in corpore summi doloris causam sine ullo sensu doloris, licet nervorum integritas manserit, docent Apoplectici, & summa ebrietas sepulti, qui omni sensu carent. Habentur jam in arte talia remedia, quæ doloris in mente conscientiam tollunt pro quodam tempore, licet nullo modo auferant vel emendent doloris causas: hæc a stupore, quem inducunt, narcotica vocantur (vide de his §. 202.). Princeps inter hæc opium, quod mira nec facile explicabili virtute doloris sensum tollit, dum in ventriculo hæret. Granum enim unum aut alterum opii deglutitum, resino-

sa tenacitate sua non adeo facile dissolubile, in ventriculo hæret diu, & doloris sensum per octo horas ad minimum solet compescere; & quod mirabile est, sæpe sequenti mane opii nondum dissoluti pilula vomitu excutitur. Unde non videtur agere, quia solutum & humoribus mistum circulationis lege ad cerebrum deferretur, sed quia interiori ventriculi superficiei applicatum mappet, & nervis hic dispersis quandam mutationem inducit, quæ valet obtundere cerebri vim sentientem. Quantam enim vim habeant nervi per ventriculi fabricam dispersi in sensorium commune, docebant postea morbi plurimi, in quibus omnes actiones cerebri pessime turbantur, licet materialis causa omnium horum malorum tantum in ventriculo hæreat. Corrupta bilis in ventriculi cavo hærens epotimes capitis dolores, vertigines, deliria &c. facit; vomitorio excussa hac saburra cessant omnia hæc mala. Idem confirmant venena plurima, quæ, dum in ventriculo hærent, adhuc, totum corpus tam mirifice mutant; simulac excutiantur de hoc loco, pacantur omnia. Exemplum, quod hanc rem pulcherrime probat, habetur apud Wesperum (Cicut. aquat. histor. & noxæ pag. 5. Or.). Bini pueri & sex puellæ Cicutæ aquaticæ radicem comederant in pratis inventam; domum reduces ambo pueri diris convulsionibus misere perierunt, nihil autem per alvum vel vomitum prodierat. Puellæ omnes evaserunt, veneno ingesto per vomitum satis cito excusso. Omnium citissime convalescit una ex his puellis, cui jam convulsæ, dentibus vi deductæ, pater insusum tabaci aqua fontana factum ingesserat, unde mox radices comestæ violentissime evomuit: in lectum dein reposita quievit, & post brevem admodum temporis moram cibum petit, & bene se habere dixit. Pater reliquias veneni ventriculo adhuc contineri suspicatus iterum tabaci insusum porrexit; unde mucum & bilem evomuit, tota nocte dormivit; mane læta surrexit, obambulavit, & postea sanissima vixit. Postea & in canibus experimenta instituta fuerunt, quibus constitit, omnia illa dira symptomata sedari statim, si vomitu ejiceretur ingestum venenum. Ex his omnibus patet, simplici attractu interioris superficiei ventriculi venenum illud terribile tanta mala facere, non verò permissione virulentæ succi cum vitalibus humori-

moribus ; aliter enim vomitu excussis radicibus his non tam cito sedata fuissent : illud enim , quod jam humoribus mistum fuerat perperisset corpus turbare .

Admodum ergo verosimile videtur , Opium etiam in ventriculo hærens solo attractu , mutatis nervis hujus visceris , talem mutationem producere in sensorio communi , ut , manentibus doloris causa & nervorum integritate , tamen non fiat in mente doloris idea . Videturque Divina Misericordia hæc auxilia hominibus concessisse , ut dolores enormes , quorum causæ tolli nequeunt , vel non nisi longa temporis mora enervari possunt , sopiri possent pro tempore . Unde Sydenhamus , plurimis experimentis convictus , concludit , quod absque his auxiliis manca sit & claudicet Medicina : addiditque , iactatissimas etiam preparationes Opii non augere ejus vires , vel corrigere illam , quam falso credebant infelice multi , malignitatem . ( *Dysenter. part. anni 1699. Græc. pag. 230. Græc.* ) Certe prudenter adhibitum opium debita dosi , licet etiam per menses continuetur ejus usus , omni noxa caret . Unde non immerito dixit Eruditissimus Joannes Terentius Lynceus in notis suis ad *Francisci Hernandez Rerum Mexicanarum novæ Hispaniæ Thesaurum* , quod , cum universus Oriens & Meridies impune & æ quotidie utatur Opio , Datura , Banguæ & similibus , dolendum sit , infinitos mortales dolorum cruciatibus perire unius hujus remedii ignorantia , qui orco eripi possent , si Medici , totius orbis consensu persuasi , eo sæpius uterentur ( *Hernand. Rerum Mexican. novæ Hisp. Thesaurus pag. 114.* ) . Prosper Alpinus , licet venenatum damnaverit opium , tamen cogitur fateri , Ægyptios quotidie fumentes nullam inde noxam sentire , licet aucta sensum quantitate ad trium drachmarum pondus aliqui sumperint . Si vero dudum assueti hujus usui subito illum intermittant , syncopen & alia gravissima symptomata patiuntur ; donec iterum opium sumperint , vel larga copia vinum Creticum , quod generosissimum est , una cum aromatibus potaverint ( *Prosp. Alpin. Medic. Ægypt. Lib. IV. cap. 1. pag. 255. Græc.* ) .

Negari quidem minime potest , imprudentem opii usum in magna quantitate deliria , convulsiones & lethalem apoplexiam produxisse : sed plurima remedia , quæ de-

bita dosi rursus quotidie usurpantur , nimia copia exhibita nocent . Memorabile tale Exemplum habetur ( *Academ. des Sciences Paris 1735. hist. pag. 6.* ) , quo constat opii virulentia ; dum magna dosi dabatur non assueti . Juvenes Cophæ , ut in computationibus vincerent quemdam ex sodalibus , qui reliquos omnes se superare posse gloriabatur , inter pocula infuso drachmam opii vini cyatho dissolutam propinnaverant : aliquot horas postea miser ille delirabat pessime , post profundo somno sepultus jacuit . Sequenti mane dum inviserent miserum , ut victo nempe insultarent , invenerunt jacentem sine pulsu , lividum & moribundum ; paulo post , frustra tentatis quibusdam etiam satis vehementibus remediis , expiravit , quindecim horis elapsis post opium assumptum . Tumores lividi , infantis quadrimensis caput magnitudine æquantes , brachia & femora cadaveris deturpabant cum fetore intolerabili : centeni feles ex vicinia turmatim accurrebant , & cadaver lingebant cum aviditate tanta , ut certissime devorassent , nisi cautum fuisset .

Hoc mirum Exemplum probat quidem , enormi quantitate datum opium non assueti pessima producere mala & mortem ipsam ; imo venenata vi corrupti inde fluida corporis humani . Tarum tamen esse remedium , si debita prudentia adhibeatur , innumera experimenta evincunt . Nec ideo vilipendendum est , quia doloris sensum tantum , non vero ejus causam tollit , Magnum enim quid est in morbis dolorem sedare posse : nihilque impedit interim aliis remediis doloris causam cognitam tollere , dum narcoticis doloris sensus obtunditur . Non tamen satis inculcari potest , quod , licet nullus sensus doloris adsit tunc , pergat tamen doloris causa corpus destruere . Dum enim in dolentissimis morbis inflammatoris , pleuritide v. g. narcoticis compescitur dolor , sævissima inflammatio , pergens vasa affecta destruere , gangrenam facit , & evigilans a somno suo homo moritur sæpe subito . Funestus talis eventus tunc adscribitur his auxiliis , cum tantum inde factus fuerit , quod ægri querelis non admonitus Medicus male crediderit lenitum morbum esse , cum tamen equali , imo majori forte aliquando violentia , post hæc remedia exhibita pergat . Dum enim suppresso omni motu animali sic profundus somnus indu-

citur, vitales motus augentur: sed in morbis inflammatoris jam peccabat nimia velocitas vitalis motus; unde nunquam tutus videretur esse in his Narcoticorum usus, nisi validis evacuationibus præmissis per Venę Sectionem &c. jam fractus fuerit nimius morbi impetus. Hanc rem sollicite monuit etiam Sydenhamus, qui tamen frequentem usum in plurimis morbis salutarem narcoticorum vim tam bene noverat, & illis tam audacter utebatur. (*Sydenham.*

*febris contin. an. 1661. Erc. pag. 81. 82. )* Quomodo autem, & quibus cum cautelis narcotica tuto exhiberi possint, dictum fuit in Commentariis ad §. 202.

Per hæc autem remedia tolluntur omnes illi effectus, qui a sensu doloris fiunt; in quies nempe, jactatio, & vigilia imprimis; reliqui autem effectus, qui pender a causa doloris, quatenus nititur destrui per vos dolentes, pergunt, sopito licet doloris sensu.

## CONVULSIO, &c.

§. 230. **V**iolenta, invita, & alterne repetens, contractio musculi Convulsio vocatur.

Agitur hoc loco de convulsione, quæ a vulneri ut causa nascitur: postea enim §. 710. peculiari capitulo dicitur de convulsione febrili, quæ a longe aliis causis oritur; hinc & aliam medelam requirit.

Omnis convulsio est affectio musculi: & quia musculis agentibus tendines eorumdem trahuntur, dumque hoc alternis vicibus fit, tendines nunc trahuntur, nunc laxantur iterum; hinc & subsultus tendinum aliquando vocatur ille affectus apud Medicos, dum pulsus explorantes convulsis brachii musculis tendines subfiliare percipiunt. Cumque & tendines sub nervorum generali nomine complexi fuerint Veteres, (*Nūps* enim vocaverunt ligamenta & tendines, æque ac cerebri & spinalis medullæ propagines (*Galen. de usu part. lib. 15. cap. 1. Tom. IV. pag. 676. )*.) Ideo nervorum distensionem vocavit *Celsus* illam affectionem, quam hodie communi usu convulsionem vocare solent Medici.

In omni autem convulsione adest contractio musculi; quæ, si per voluntatem fieret, non esset morbus: hinc additur in definitione, quod sit invita contractio musculi. Præterea requiritur, ut hæc contractio sit violenta, aliter enim nulla distinctio foret inter convulsionem & tremorem, in quo præter voluntatem musculi contrahantur & relaxantur quidem alternis vicibus, sed tamen debiles sunt illæ contractiones; in convulsione vero violentæ. Deinde additur in definitione, quod alternis vicibus repetatur hæc musculi contractio, cessans brevi, mox renascens iterum.

Notandum tamen, quod si causa illa,

qualiscumque demum fuerit, quæ absque voluntatis imperio musculi contractionem efficit, pergat agere, sine alterna intermissione, tunc musculis perpetuo contractis manet, quamdiu illius causæ actio durat. Malum hoc ad convulsionem referendam esse satis patet, quia eadem causæ occasionales nunc alternas illas & invitas musculorum contractiones, nunc stabilem eorundem, invitam tamen, obtingescentiam faciant. Apparet in Epilepticis: in quibus, dum paroxysmus adest, nunc adsunt alternæ illæ convulsiones, paulo post instat statuz sæpe obrigescent, contractis sere omnibus totius corporis musculis; mox iterum convelluntur. Spasnum (*σπασμός*) vocaverunt Veteres Græci illud malum, quod hodie convulsio Medicis dicitur; tetanum (*τρίαις*) autem, quando præter voluntatis imperium musculi valide contracti obrigescent; quod mali genus *Celsus* rigorem vocavit; spasnum vero distensionem nervorum dixit (*A. Corn. Celsi Medic. lib. 2. cap. 1. )*. Convulsionis enim nomen apud recentiores tantum Medicos hac significatione reperitur: Quamvis tamen apud Aretæum, (*Aret. Cappad. de causis & signis morb. acut. lib. 1. cap. 6. )* ubi de tetano agit & de eius differentiis, occurrat vocabulum *Ενάλει*, quod satis apte convulsionis nomine in versione exprimitur: tamen videtur ptomiscue & spasmi & tetani nomine usus fuisse, ut eundem designaret affectum; uti in eodem Capite satis evidenter patet. Et *Galenus* (*Comment. in Sect. IV. Aphorism. N. 57. Tom. IX. pag. 171. )* dixit, quod *tetanus sit convulsio*: sed

*sed in utramque partem convelli non videntur, quod æque antrosum ac retrosum tenduntur.*

Unde concludi posse videtur, quod licet hodierno usu convulsionis nomen adhibeatur, ubi invita, violenta, & alterne repetita musculi contractio adest; tamen generali magis significatione posse etiam hoc nomine intelligi contractionem invitam & violentam musculi, quæ diu manet sine alterna remissione; cum & quondam promiscue hoc factum fuerit, & omnia hæc mala sepe ab eisdem causis nascantur, & eisdem partes occupent, nempe musculos. Illam autem

convulsionis speciem, quæ dissensit in membris muscularibus fit, dividentur in tres Classes, veteres dixerunt, quæ neutram in partem detortus homo, & inflexilis distenditur; *imperturbatam* vero ubi versus anteriora corpus inflexum obrigescit; *distortam* autem, si versus posteriora incurvetur corpus simili modo. Præterea tetanus potest esse vel universalis, dum omnes musculi corporis sic affecti obrigescunt uno momento; vel potest esse particularis: uti dum v. g. sic spasmo contractis maxillæ muscularibus, os pertinacissime clauditur &c.

§. 231. C Ujus causa id, quod liquidum nervosum vi alterna in musculos convulsos pellit.

Observatur in homine mitta hæc proprietas, quod possit ad voluntatis nutum, per musculos voluntatis imperio subditos, motum excitare, illumque sustinere & dirigere, augere & minuire, motumque excitatum suppressere iterum, atque suppressum renovare denuo. Et illi motus adeo sensibiles in corpore excitati, tanta vi mechanica mutantur alia corpora, in suo principio vix videntur corpore; omnesque fiunt sine cogitatione causæ vel instrumentorum, quæ hoc requiruntur. Nam peritissimus Anatomicus non melius hos motus perficit, quam innocuus puer. Omnium maxime mirabile est etiam, quod in his moribus excitandis nulla appareat mutatio Physica in corpore præter rem mutatam; & suppresso demum ex voluntatis arbitrio motu, nullum supersit tante mutationis vestigium. Omnia autem hæc fieri possunt sine ulla fere observabili successione temporis; dum enim quis brachium vult elevare, jam elevatum est. Requiritur tantum ad hanc rem, uti ex Physiologicis patet, ut liberum sit commercium inter cerebrum & musculos, per nervos ex cerebri medulla ad musculos voluntarios delatos. Cum ergo convulsio ex definitione data sit alterna talis motus excitatio, & excitari suppressio; & possimus ex voluntatis arbitrio hoc imitari, ( uti

mandici Epilepticos mentientes satis noruat ) patet, convulsionem excitari posse ab omni causâ, quæ invito homine per nervos talem mutationem muscularibus inducit, qualem voluntatis imperio efficere posset homo sanus. Cumque modus, quo per voluntatem motum excitamus, non lateat, sed tantum observemus effectum; etiam poterit æque latere mutatio illa ultima sensorii communis, per quam convulsio nascitur. Totum, quod ars potest, est, ut observet illas corporis mutationes, quas sequitur invita talis muscularum contractio; & deinde has mutationes cognitâs tollat, vel emendet: licet minime intelligatur, quâ ratione mutationes illæ corporis aticiant sensorium commune; siue illud cerebri locum, ubi hæret mutabilitas cogitationis a mutato corpore, & vicissim mutabilitas corporis a mutata cogitatione.

Quia autem ex observatis Medicis constat, plurima talia accidere posse corpori, per quæ convulsionem excitantur; hic autem tantum agatur de his malis, quatenus vulnus factum sequuntur ut causam præcipuam; hinc videndum, quanam sint observata in vulnere ipso hære, a quibus convulsionem factæ fuerunt. Illa autem recenturur seq. §.

§. 232. A Deoque in ipso vulnere hære potest, siue sit materies aliena irritans, siue ipsa nervi lassi ( 163. 164. 165. 183. 184. ) conditio, si ve evacuatio cruoris nimia prægressa.

MATERIES ALIENA IRRITANS. Tenerimus illud pulpsum, modicus cerebri pro-

ductum, quod proprie dictam substantiam nervi constituit, quod tunc involacris mu-

R 2

natur

nitur in nervis majoribus, uti tuto deferri possit ad loca debita; si irritetur a quocumque acri, vel alio corpore, quod mechanica figura & duritie suarum partium lædere & destruere poterit mollissimam hanc pulsam; poterit convulsio inde nasci. In vulnere jam poterunt hære nervi & tendines discissi, vel involucris suis sic nudati, ut ad intimum illam pulposam substantiam, adeo facile irritabilem, acria pertingere possint. Imo nervi nudi si tantum tangantur a non confueris liquidis, enormes dolores & convulsiones ipsas inde sequi constat. Dum carie dentium erosa fuit crusta illa durissima, nervulos tenuissimos per dentis substantiam dispersos regens; aer frigidus allabens, sacchari particula, mole butyrum &c. applicata his nervis nudis, convelli faciunt totum hominem præ doloris acerbitate. Simplex attactus nudi suis involucris tendinis uno momento tetano universali obrigescere facit hominem, uti dictum §. 164. cum tendines, suis vaginis mucosis vel pinguedinosi recti, patiantur se protrahi, elongari, confui &c. sine magno malo. Cum ergo in vulnere sensilissimæ illæ partes nudentur sepiissime, poterit instrumenti vulnerantis pars relicta, fragmenta ossium vel simile quid in vulnere hærens, irritando has partes, sævissima mala producere. Idem fiet ab humoribus in vulnere cavum effusis, ibique in acrem indolem degenerantibus; uti & ab acribus vulneris applicatis remediis tirulo; uti in paragrapho modo citato exemplum ex Hippocrate allatum confirmavit.

**IPSA NERVI LÆSI CONDITIO &c.** In numeris citatis demonstratum fuit, punctos, vel semilaceros nervos, & tendines, convulsiones & alia sævissima symptomata producere; & pluribus observatis Medicis hujus asserti veritas confirmata fuit.

**EVACUATIO CRUORIS NIMIA PRÆGRUA.** Simulac tanta copia subducuntur humores de corpore, ut residuum, cordis vi per vasa pulsus, illa æqualiter replere nequeat, deficit pressio in arterias cerebri, unde & spirituum motus per nervos cerebri cessat: hinc omnium musculorum paralytis; & a cerebello, similiter affecto, animi deliquium: unde omnia liquida ner-

vosa & arteriosa incipiunt quiescere. Interim frigore majori corporis, morus imminuti sequela, contractæ partes venosum sanguinem versus cor derivant; quod repletum contrahitur, & summa velocitate per vacuas arterias sanguinem mover, cum nihil resistat sanguini impulso. Tunc ergo validissimo impetu sanguis per cerebri vasa movetur: unde spirituum motus in musculis velocissimus fit, sed mox desinens; rediturus iterum, quando cor sensim impletum se contrahet. Uno ergo momento validissima causa motus muscularis applicatur, quæ iterum sequenti momento desinit; unde æterna violenta & invita musculorum contractio, quæ convulsio dicitur.

In mactatis animalibus quotidiana observata hanc rem evincunt. Dum virtutis, ovibus, porcis &c. discissi arterie carotidibus pleno rivo sanguis effluit, circa mortem incipit cessare sanguinis fluxus, per intervalla tantum rediens, ob causas modo dictas; tuncque semper valide convelluntur animalia, donec moriantur. Dum per abortum, vel post partum, patulis uteri vasis omnis fere sanguinis copia exit, toties convelluntur mulieres, & sæpe subito pereunt. Idem observatur, dum hypercatharsis per alvum nimia copia liquidorum de corpore subducitur.

Ideo monuit Hippocrates: *copioso sanguine fluente, convulsio aut singultus accedens malum* (Apbor. 3. Sect. 5. Tom. IX. pag. 195.). Et alibi (Apbor. 39. Sect. VI. Tom. IX. pag. 273.), *convulsionem fieri & a repletionem, & ab inanitione dicitur*. Sic & nimia purgationi succedere convulsionem & singultum asserit (Apbor. 4. Sect. V. Tom. IX. pag. 196.). Similia plurimis aliis in locis habet. Designat enim hoc malum, post nimias evacuationes ortum, tantam fuisse factam subductionem liquidi de corpore, ut vasa vacua collabantur, & sanguis, corde pulsus, non possit propagare motum acceptum per vasa plena, sed libere ruat in vasa vacua: unde deficit requisita pressio æqualis in encephali vasis, a quibus tota vita, & humanitas pendet; Hinc patet, quantum tunc adit periculum, si ab inanitione nimia oriatur convulsio.

§. 233. **Q**uin & effectus ejus, perturbatio omnium Actionum, cognoscitur. Effectus

Effectus convulsionum mirabiles sunt & innumeri; nihil enim in toto corpore manet non turbatum, sive solida sive fluida species, sive actiones ipsas, quæ ab his pendent. Dum enim altera hac & violenta contractione nunc rigent muscoli, nunc flaccescunt iterum, sanguinis per musculos transitus impeditur uno momento, altero momento per flaccidos musculos liberrime & cum impetu summo transit: venæ, musculi convulsis vicinæ, citissime deplentur; hinc venosi sanguinis impetus cor versus acceleratur; unde maxime turbatur æquabilis sanguinis receptio in cor, ejusdemque expulsio ex corde. Respiratio miris sæpe modis turbatur, laboriosa fit & non perticienda nisi summo molimine: aliquando & vehemens strangulatio accedit, ut pulchre notavit Aretæus, ubi tetani effectus describit. (*Aretæus Cappad. de causis & signis morbor. acut. Lib. I. cap. 6. pag. 4.*). Nec minor perturbatio in actionibus animalibus observatur. Musculorum enim illi enormes motus non determinantur ex voluntatis imperio, sed invite vel & inscio sæpe ægro fiunt: sæpe omnes sensus externi & interni abolentur penitus, vel turbantur mirifice: nec mirum, cum convulsiones testentur affectum esse illud organum corporum, cerebrum nempe, unde tota humanitas pendet. In naturalibus actionibus pariter miræ observantur mutationes. Maxillæ sepiissime sic constringuntur, ut ne cuneo quidem deduci possint; deglutitio im-

possibilis; Ventriculi & intestinorum mirabiles inflationes abdomen sæpe ad crepantiam usque distendunt. Alvus & vesica nunc penitus intercepta nihil demittunt; aliquando, inscio ægro, clam fœces & urina elaborantur &c. Uno verbo ut totam rem complectamur, mutatur singula & universa in toto corpore aliquando per convulsiones tam enormiter, ut nihil de pristina sanitate superfit, & ne quidem a familiaribus agnoscantur miseri; Quæ omnia acerbissime notavit Aretæus in loco modo citato, & conclusit: *vultum adstantibus, prius impium, nunc bonissimum efficitur, ægrum vitam desunt, quo una cum vita doloribus & acerbis malis liberetur.*

Sæpe enim, si evaserint, luctuosissima mala superant, a distortis membris, musculis distractis, functionibus cerebri deletis &c. Tristes enim casus docuerunt frequentissime, Paralytes, Atrophias, stultitiam &c. post convulsiones validas toleratas, tota vita mansisse incurabiles.

Tandem & abolitio omnium actionum vitalium, animalium, naturalium, mors nempe, convulsiones aliquando sequitur, & tantis malis finem imponit. Dixit Hippocrates (*Aphor. 2. Sect. V. Tom. IX. p. 195.*) *Vulnere accedens convulsio, lethale.* Et Aretæus in eodem loco modo citato de convulsionibus agens dicit: *nam ob vulnera fieri solem, membrana, aut musculus, aut nervus punctis, ex quo plerumque moriuntur. A vulnere enim convulsio lethalis est &c.*

§. 234. **S**anatur. 1. Ablato irritante (186.) arte Chirurgi (187. 188.) 2. Acri lenito, vel dissipato. 3. sublata nervi conditione (232.) per remedia (228. 229.) descripta. 4. repletionem per lene, amicum, liquidum alimentum assiduo perca copia ingestum. 5. sedata simul hæmorrhagia. (218. 219.)

Ingens farrago habetur apud auctores remedium antispasmodicorum: sed cum a distinctis adeo, imo sæpe oppositis, oriatur causis, patet facile unicuique, nullum universale remedium ad convulsiones dari; sed indagata prius causa determinari debere auxilium, quod causam hanc cognitam tollere vel enervare possit. Cum autem convulsiones post vulnera oriuntur, vel ab irritante quocunque in vulnere hærente; vel a nervis, tendinibus, vel membranarum punctis vel semidiscissis; vel denique a sanguinis nimia jactura; ideo ad tria hæc indicata omnis curationis scopus dirigitur.

Tom. I.

Unde primo & secundo numero hujus paragraphi agitur de modis quibus irritans quodcumque tolli vel leniri potest; tertio vero numero agitur de illis, quæ nervi affecti vel tendinis conditionem descriptam tollunt: ultimis binis numeris indicantur auxilia, quibus sanguinis jactura compesci poterit, & restitui illud, quod jam perditum fuerat.

1. Si spina loco nervoso infixæ hæreat, sub ungue v. g. nudas nerveas papillas lædens, post summos dolores sæpe convulsio sequitur, non tollenda facile, quamdiu hæc spina ibi hæserit. Unde, quantum fieri potest,

R 3

test, in prima vulneris deligatione inquirendum, an tale quid hereat in vulnere. Quomodo autem hoc fiat, quibusque cum cautelis hæc tolli debeant, dictum fuit in numeris hic citatis.

2. Rarius acrimonia in vulnere ex allatis humoribus nascitur, nisi ingens cacochymia in corpore prædominetur, vel in victu acria plurima ingerantur. Longe frequentius ab applicatione acriorum remediorum hoc fit, dum Arsenicum, vel alia rodentia, imprudenter locis nervosis vel tendinosis vulneratis adhibentur. Hæc autem cognita tollenda sunt, vel enervanda talibus, quæ opposita virtute cognitam acrimoniam corrigere valeat. Unde iterum nihil universale hic determinari potest, sed singulari acrimoniæ conveniens medela applicanda est. Mollissima interim Balsama semper profunt, quia defendunt partes, ne rodantur ab acribus; & simul obvolvendo acria lenissimo pingui, quo scatent, illa enervant. Vide & §. 228. N. 5. & 6.

3. Causa convulsionis a vulnere frequenter erat nervi talis læsio, qua partim defectus distrahebatur in fibris adhuc integris relicta; unde dolor enormis, convulsio, & reliqua, quæ §. 163. & 183. recensentur, oriuntur mala. Omnia autem hæc a lenta & continua distractione fibrarum nervosarum sunt, quam semper dolor, uti ex ejus definitione §. 220. patet, comitatur. Ergo illa remedia, quæ dolorem tollunt, sanabant etiam convulsionem ab hac causa ortam. Hæc autem remedia agebant vel in ipsam doloris causam, vel nervum reddebant ineptum sensui, destruendo commercium inter nervum affectum & cerebrum; vel denique sensorium commune ipsum sic obtundebant, ut non perciperet illam nervi mutationem, quæ a causa dolore excitante fiebat. Omnia autem hæc convulsionibus sanandis adhibita fuisse cum fructu, mox patebit.

Inter illa enim, quæ §. 228. ad doloris causam tollendam laudabantur, præcipuum locum obtinebant, & maxime universalem usum habebant, omnia laxantia & emollientia dicta; quibus adhibitis fibræ nervosæ sic disponebantur, uti dissendi possent sine rupturæ metu: Eadem autem ab omni tempore ad convulsiones tollendas fuerunt adhibita. Ad curandum Tetanum laudat Hippocrates (De morbis Lib. III. cap. 12,

Tom. VII. pag. 587.) jusculum gallinaceum pingue & calidum, fomenta, tepefactoria humida & pingua in vesicis, & utriculis undique, sed præsertim ad partes dolentes admoia; calidi olei copiosas & crebras inunctiones pariter jubet. Et alibi (De internis affectionibus cap. 54. Tom. VII. pag. 678.) ad Tetanum ex vulnere factum pinguium inunctiones ante focum, fomenta, tepefactoria, sudores tepide perfusione excitatos, aque mulsæ tepide potum, si quidem bibere posset æger, si non, ejusdem per nares infusionem commendat &c. Præterea, ubi calidi utilitatem recenset, (Aphorism. 22. Sect. V. Tom. IX. pag. 207.) dicit, quod sit dolorem sedans, rigores, convulsionem, tetanos mitigans: & contra (Ibid. Aphorism. 20. pag. 205.) frigidum convulsionem & tetanos facere asserit. Calor enim omnia laxat, ut distrahatur & flecti possint sine rupturæ periculo; frigus omnia reddit fragilia & contrahit, uti obviis ubique experimentis patet. Eadem & Celsus (Lib. IV. cap. 3.) commendat, qui sic affectos toto corpore in oleum calidum descendere jubet; vel in aquam calidam, in qua oleum græcum decoctum sit, & adjecta illi pars tertia. Galenus, uti in loco §. 164. allegato paruit, in se ipso a valida distractione ligamentorum imminentem convulsionem continua olei calidi perfusione evitavit, quam statim instare sensit, simul hæc olei assuio intermitteretur. Similia & apud Aretium in cura tetani commendantur (De Cusat. morbo. acutor. Lib. I. cap. 6. pag. 85. &c.). Unde apparet, antiquos Medicos unanimi consensu mollissima remedia, quæ tam pulchre omnes fere dolores leniunt, ad convulsionem curandas commendasse.

Facile etiam patet, quod si nervus, cuius læsio totum sensorium commune turbat, possit destrui sine ineri graviore mali per dissectionem, compressionem, causticam &c. nullum amplius convulsionis adit periculum, quia omne commercium inter cerebrum & nervum ipsum sublatum est. Docuerunt hanc rem imprimis observata Medica in curatione cujusdam speciei Epilepsiæ, in qua in quodam corporis loco, v. g. in digito majori pedis (qualem causam vidi) sentitur titillatio quædam, ac si formicæ repere per partem; ascendit ille motus per crur, femur, abdomen ad



præcordia usque, tuncque mox cadit convulsus toto corpore. Si subito, dum sentiret in digito pedis incipiens malum, ligatura sub genu archissime stringeret omnes partes, liber erat a Paroxysmo. In similibus casibus toties profuit locum illum, unde primo incipit mirus ille motus, castico profunde inungere, ut destrueretur ille nervulus, cujus affectio tam miris modis totum corpus urbare poterat. Hujus rei vestigium habetur apud Celsum dicentem: *Quod si musculus laesus videbitur, præcidendus erit. Nam percussus mortiferus est; præcisus sanitatem recipit* (Lib. V. cap. 26. Num. 22. pag. 291.).

Illam autem, quæ sensorium commune vi narcotica sic obdundunt, ut tollatur doloris sensus, mira efficacia turbolentos illos motus convulsivos compescunt sæpe, uti in Hystericis convulsionibus imprimis toties apparet. Apud veteres Medicos tamen non invenitur adeo frequenter fuisse in his casibus horum auxiliorum usum. Hippocrates tamen in eura Terani laudat inter alia remedia etiam semina Hyoscyami vino infusa, cui dein equalis olei copia misceretur, ut his calefactis dein caput & corpus ungeretur (Hippoc. de internis affectionibus c. 54. Tom. VII. pag. 678.).

4. Pro generali regula in morborum curationibus Hippocrates statuerat, *quod morbis a plenitudine oris mideretur evacuatio, illis vero, qui ab inanitione fiunt, mideretur repletio* (Aphor. 22. Sect. 2. Tom. IX. pag. 63.). Quando ergo vas sanguineis discissis ingens facta fuerit sanguinis jactura, sic ut æqualis pressio in vasa encephali inde turbetur, convulsionem inde facta pro causa sua habent nimiam inanitionem: curabuntur ergo repletione. Decantatissima illa Antispasmodica, spiritus Cornu Cervi, ferici crudi, succini tinctura & oleum, Castorei yirus, olea pulcherrima stillatitia aromatica &c. quæ in aliis casibus tam pulchre compescunt inordinatos illos in systemate nervoso motus, hic nocent suo stimulo, quo augendo sanguinis motum pauculum illud, quod in vas adhuc superest, sanguinis ex discissis vasis expellunt ad mortem usque. Tota curatio consistit in eo, ut novo & bono liquido distendantur iterum collapsa per nimiam inanitionem vasa. Verum satis magna hic difficultas occurrit: nam ingesta viscerum, & vasorum actionibus conspirantibus, & miscela

cum bonis humoribus maxima copia præexistentibus, assimilantur in naturam nostram, & requisitas in fluidis humanis dotes acquirunt (vide §. 25. N. 1.). Post magnam autem sanguinis jacturam deficit illa copia humoris boni, quæ in sanitate pauculum crudum per ductum thoracicum in subclaviam venam deductum absorbet & quasi disparere facit: simul & debilitatur ab eadem causa omnium vasorum, & viscerum actio, unde binæ illæ efficacissimæ causæ, quæ crudum mutant in coctum, hic deficient, vel saltem languent. Totum ergo, quod fieri potest cum fructu, est, ut ingerantur talia liquida, quæ, sanis humoribus simillima, nihil stimulantis acrimoniæ in se continent, & sine molestia a corpore debili ferri, & superflue adhuc vasorum & viscerum actione, licet languida, subigi possunt. Omnia itaque illa proderunt, quæ §. 28. N. 1. laudata fuerunt; & inter illa imprimis carniū juncula, in quibus humores, in corpore sani animalis elaborati, in aqua ebulliendo solvantur, imprimis si pauculum succi citri addatur, quod nimis facilem degenerationem horum junculorum in putredinem corrigit. Eandem ob causam & acetosæ pauculum his junculis incoquitur: adduntur & oryza, hordeum, avenæ & similia Cerealia mollissima. Omnia hæc dantur parca copia simul & sæpe repetita, ne graveretur ab ingestis debile corpus, & ut fiat sensum talis vasorum repletio, quæ vitam sustinere possit, sed tam debilem, ut vulnerata vasa consolidari possint, nec ullus metus sit, ne nimis subita impletione vasorum, vel aucto motu laceantur iterum illa, quæ jam inceperant crescere. Nisi enim fidissima observata docuissent, vix credi posset, quam parca sanguinis copia vita adhuc sustineri possit. Memorabile Exemplum hanc rem confirmavit: legatum fuit in Commentariis ad §. 161. Et in foemina, quæ sæpe per abortum omnem fere sanguinem amittunt, & convelluntur, felix successus hanc methodum probavit: dum pro mortuis jam fere habitæ, sensim sic repletis vasis, ex ipsis orci fœcibus evaserunt felicissime.

Pulcherrima habetur apud *Leuwenhoek* (De corde pag. 70. 71.) observatio, quæ docet, quantum expectari possit a carniū junculis, ubi magna sanguinis jactura facta fuit. A Medico fide dignissimo dicit se hanc histo-

riam accepisse. Adolescenti sexdecim annos nato, cum magna sanguinis copia per biduum continuo erumperet, neque medicamentis, aut arte ulla cohiberi poteris, iussulis eum reficere amici & desistentes curarent, cumque ea valde aride exspectaret, atque assumeret, fluxus subito concitatus factus est, & tandem res eo devenit, ut, massa sanguinis fere tota efflueret, quidquid jam efflueret, dilatum & pallidum, sanguinis neque naturam, neque speciem prae se ferret, ipsi iussulo, quod toties hauserat, quam sanguini similis; atque eadem forma per diem unum aut alterum duravit hic aequus fluxus, constante interim cordi motu suo, donec fluxus demum cessavit, juvenis paulatim integra sanitati restitutus est, & exinde in virum robustum & quadratum excrevit.

5. Quomodo compesci possit vulneris Hæmorrhagia, explicatum fuit in numeris hic

§. 253. **T**umor, & Inflammatio levis vulneri bona; si augeatur, mala: balnea, torus, anodyna, antispasmodica, loco læso, & toti applicata ægro, profant; de quibus in historia & curatione inflammationis.

Dictum fuit in §. 158. N. 5. quod post vulnus factum alicuius momenti sequatur secundo vel tertio die in labiis & fundo vulneris maior calor, dolor, rubedo, & tumor, & quod hæc omnia symptomata acciderent semper vulneri etiam in corpore sanissimo. Levis ergo talis inflammatio, cum comite tunc fere semper febricula, nunquam mala est. Abscissa enim vasorum extrema contracta resistunt liquidis impulsis, unde obstructio nascitur; & a vitæ viribus, febricula tunc comite, urgentibus majori impetu obstructos vasorum fines, levis fit inflammatio; quam blanda sequitur suppuratio separans obstructa extrema vasorum una cum immodico liquido, & liberam humorum circumductionem restituens per totam vulneris superficiem, per quam fit regeneratio perditæ & unio partium separatarum. Ibidem tunc hoc & Hippocraticis observationibus consistit, qui naturæ ductum ubique sequens tanquam ingens malum damnaverat, si in gravibus vulneribus tumores non apparerent; in alio vero loco laxos in vulneribus tumores laudabat, crudos vero damnabat, utpote nimis validæ inflammationis signum. Pulcherrime hanc rem expressit Celsus dicens: *nimis vero tumescere vulnus, periculosum: nihil intumescere periculosissimum est. Illud indicium magne inflammationis: hoc, emorui corporis est, &c. At ne febris quidem torere debet;*

citatis. Paruit tunc, artificiosa methodo plurimas Hæmorrhagias sedari posse. Ubi vero nullus datur manibus accessus ad vas læsum, uti dum in corporis interioribus vasa vulnerata sunt; tunc imprimis prodest ligatura brachiis & femoribus circumducta tam firmiter, ut compressis venis impediantur, ne sanguis ex his partibus ad cor tam facile redeat: sic impolietur saltem pro tempore hæmorrhagia, & forte nascetur occasio, ut vasa læsa contrahi & consolidari possint; sedata autem Hæmorrhagia non simul & semel fere sensum sunt laxanda hæc vincula, ne recrudescat hoc malum. Summa si sit quies nientis & corporis, & debilissima tantum si sustentetur vita, nullisque cardiacis refocilletur vulneratus, magna adhuc spes etiam in periculosissimis casibus manet.

*si in magno vulnere, dum inflammatio est, permanet. Illa pernicio est, que vel levi vulnere supervenit, vel ultra tempus inflammationis durat, vel delirium movet &c. (A. Corn. Cels. Medic. Lib. V. cap. 26. pag. 295. 296.).* Ubi vero valida obstructio nata circa vulnus, auctore admodum motu per febrim exortant, dolor, tumor, rubor, & calor augentur valide, novimus facile, longe majorem jam hic esse inflammationem, quam requirebatur ex observatione phenomenon communium omni vulnere. Hæc ergo si pergeret, destrueret partem gangrenosa corruptela; vel saltem longe validior postea sequeretur suppuratio separans inflammatum non resolvable a reliquis partibus vivis; quod fieri nequit, quin multum pereat de substantia corporea, & imprimis de cellulosa tunica, in qua præcipua suppuracionis sedes videtur esse: unde tardior consolidatio vulneris, turpior cicatrix, & reliqua omnia mala oriuntur, quæ a consumtis nimis valida suppuracione partibus sequi possunt. Requiritur ergo, ut idoneis auxiliis tollarur nimis valida inflammatio: quod fiet, laxatis vasis, & solutis fluidis, quæ inflammatoria tenacitate coiverant. Unde balnea, fomenta, &c. ex mollissimis verbis parata tanti tunc usus sunt. Simul tunc attendendum, an causa inflammationis nimis in ipso vulnere.

re hæreat, an vero febris excitata nimio impetu, vel diathesis inflammatoria sanguinis accusari possint. Priori in casu topica medela sufficeret sæpe; posteriori vero universalis medela motum auctum compe-

scens, vel solvens inflammatoria spirituum dinem, requireretur. De his autem parte dictum fuit in capitulo de obstructione, & postea adhuc agetur in Historia & Cura inflammationis.

§. 236. Sanguis in cava corporis per vulneris delapsus inde ocyus educendus situ corporis, suctu per fistulam, si recens, vel dilutus primo, apertura vulneris dilatata, vel nova.

Præter illa loca corporis, in quibus humores a sanguine secreti accumulantur in usus requisitos; vel ut collecti excernantur de corpore, vix reperiuntur cava loca vacua in corpore. Certe tota calvaria plena est, thorax plenus, abdominis cavum pariter: vulneribus enim hæc cava penetrantibus exprimuntur contenta, simulæ patet liber exitus. Sanguis tamen discissis vasculis effluens potest sic comprimere partes contentas his corporis cavis, ut locum jam occupet, quem naturaliter tenebant viscera in his cavis locata. Lædet ergo sanguis in hæc cava effusus actionem viscerum contentorum comprimendo; & postea corruptus acrimonia acquisita poterit rodere & corrumpere illa omnia, quæ tangit; dumque simul attenuatur, dum putrescit, resorptus venis bibulis, ubique in superficie corporis interna, & externa patentibus, poterit totam sanguinis massam putrida labe inficere, & pessima mala producere. Hippocrates (*Aphor. 20. Sect. 6. Tom. IX. pag. 259.*) dixerat, uti §. 172. n. 1. iam habetur, sanguinem in ventrem præter naturam effusum necessario suppurari: & Galenus in Commentariis suis ad hunc locum per *καὶ ἡ σπυγὴ* quancumque cavitatem præter naturam intellexit; & simul monuit, suppurationis vocabulo hic intelligi quancumque aliam sanguinis degenerationem. Non adeo tamen videtur absonum intelligere per vocabulum *σπυγή* non suppurationem proprie dictam, sed quod sanguis extravasatus, & cavo præternaturali contentus, viam sibi faciat per loca suppuratione facta, licet sanguis ipse extravasatus non convertatur in pus proprie dictum.

Præter hæc cava corporis corporis motum est, sub cute inveniri, & ubique inter musculos poni, tunicam dictam cellulosam, vel pinguedinosam; quæ facillime dilatabilis cedit sanguini effuso, & distendi potest in molem sæpe immanem, uti Anæurismata spuria, & fugillationes post vali-

dam contusionem docent. In his cavis præternaturalibus hærens sanguis poterit pariter pressione, & corruptela nata, plurima mala facere; unde indicatio iubet, educendum esse cito, si commode fieri possit. Tamen hoc videtur notandum esse, quod sanguis effusus diu manere possit incorruptus, si nullus aeri detur accessus; & quod aliquando diluentibus & solventibus remediis applicatis sic possit attenuari, ut per vasa bibula resorptus evanescat sensim. De hac re autem dicitur in capitulo de contusione.

Ubi ergo sanguis extravasatus in cavo corporis hæret, nocens compressione partium, vel si metuetur ejus corruptela, & nulla spes sit, sanguinem effusum dissipari posse, tunc per artem educendus est. Hoc autem fiet

SITU CORPORIS: qui talis tunc requiritur, ut sanguis extravasatus propria gravitate per vulneris orificium exire possit. Multum ad hanc rem facit, si cognoscatur corporis positura, quam habuit vulneratus illo momento, dum vulnus accepit: in eodem enim situ corporis tunc reponendus est, quantum fieri potest: aliter enim sæpe membrana pinguedinosa vulnus cutis occludit sic, ut nihil exire possit. Simul tunc orificium vulneris in declivi cum maxime situ ponatur, ut sanguis exire possit. In abdominis cavo v. g. si sanguis effusus hæreat, pronus in ventrem decubitus proderit. Elevatis pedibus, capite demisso, sanguinem in pectoris cavo hærentem eduxit Paræus, & ab instanti mortis periculo liberavit vulneratum; uti dictum fuit §. 172. n. 3.

SUCTU PER FISTULAM. Hoc locum habet, quando sanguis in cavo abdominis, & imprimis in cavo pectoris effusus hæret. Sumunt tunc fistulam ex plumbo flexili, vel ex corio vel balæne ossæ, obtuso semper apice instructam, ne lædat partes; per hanc cavo corporis immisam vel fugendo, vel & applicata antria extrahi potest sanguis extravasatus. Ubi vero sanguis sub cute in cellulis membranz pinguedino-

sz aggefus hzret, patet facile, hanc methodum nullius usus esse.

Sed nec idoneo situ corporis, nec suctu per fistulam educi poterit sanguis extravasatus, nisi fluidus sit: si vero jam in grumos concreverit, tunc prius sic dilui debet, ut per vulneris orificium, vel fistule aperturam, transire possit. Sumitur tunc aqua cum melle vel saponis Veneti parca copia: additur aliquid salis marini, & pauculum vini: tepidus talis liquor injicitur, leni conquaassatione vel & ipso respirationis motu agitur cum sanguine concreto, quem diluit & solvit: deinde situ corporis, vel suctione, iterum educitur injectus liquor: illudque repetitur tamdiu, donec injectum liquidum purum & nullo sanguineo colore tinctum redeat. Simpliciter sic hordei decocto cum melle residuo in thoracis cavo sanguinis grumos eduxit Paræus in Exemplo modo allegato: dumque sequenti die Centaurei, absinthii & aloes infusum injiciebat, ut magis mundaret hæc loca, mirabatur vulneratum amarorem ingratum percipere & nauseare. Facile patet hæc tentari non posse, quamdiu Hæmorrhagie merus adhuc superest.

**APERTURA VULNERIS DILATATA, VEL NOVA.** Si angustum nempe nimis vulnus fuit, vel panniculus adiposus, in vulnere

§. 237. **S**i vulnus inter firmas partes corporis descendit, via paranda foridibus pressione, lotione, ligatura, apertura vulneris nova vel dilatata.

Aliquando fit, ut instrumentum vulnens profunde adactum descendat inter partes corporis per panniculum adiposum imprimis: liquida tunc ex vasis discissis in vulnere cavum effusa, & pus collectum ibi hærebunt; & propria gravitate descendente in facile dilatabili membrana pinguetudine augebunt vulnere profunditatem: nec facile exire poterunt per vulneris orificium altiori loco situm. Imo sæpe collecta materies miras sibi & maxime sinuosas vias faciet per panniculum adiposum inter musculos, unde postea summa oritur in curatione difficultas. Hoc omnino optime exploratur, si vulneris orificio per siphonem leni vi immittatur aqua tepida: copia enim aque immissa major vel minor determinabit vulnere profunditatem, & latentis cavii amplitudinem. Si enim specillo immisso indageretur vulnere facti profunditas, sæpe, dum hoc radius perficitur, specillum ger. membranam adiposam transiens novum

aperturam pressus, obstruxerit orificium, tunc dilatio requiritur. Aliquando etiam accidit, vulneris aperturam altiori loco hære, sanguinem vero effusum [declivi loco situm non posse evacuari per vulneris orificium, nisi inverso situ corporis, quem sine molestia diu ferre non posset vulneratus: sic dum vulnere superiori thoracis parti inflicto, vasis discissis, sanguinis copia magna in pectoris cavo accumulatur, ille versus posteriora thoracis, profunde descendens diaphragma thoracis capacitatem multum augeat, hærebit, nec poterit facile exire per vulneris aperturam, nisi capiti insisteret vulneratus; unde potius versus posteriorem & inferiorem partem thoracis in latere affecto, nova apertura facta, sanguis educitur. Idem verum est, dum v. g. vulnere circa lumbos inflicto sanguis in abdominis cavo hæret, qui gravitate sua anteriorem & inferiorem abdomen prominenti partem occupabit, unde longe facilius, paracentesi in hoc loco inflata, poterit educi, quam pressione abdominis & murato situ corporis per vulneris aperturam exprimi. Pariter etiam nova apertura vulneris requiritur, ubi sanguis effusus in panniculo adiposo descendendo viam sibi læcerit versus declivem locum.

cavum efficit, unde postea major curæ difficultas. Apud Hildanum (*Observat. Chirurg. Centur. IV. Observ. 84. pag. 358.*) habetur tale exemplum: Rustico in singulari certamine vulnus acuto gladio infligitur in coxam dextram & regione fere articuli: barbitonfor advocatus stylo exploratorio immisso vulnus sursum versus os sacrum ascendere invenit. Cum vero circa tertium diem dolor ingens, inflammatio, febris & alia gravissima symptomata adessent, Hildanus vocatus, immisso stylo per vulneris aperturam, invenit vulnus pergere per mediam natem versus anum.

Facile nunc intelligitur, acuto gladio inflicto vulnus non potuisse adeo diversâ directione penetrasse eodem ictu, sed alterutram viam styli immisione factam fuisse. Unde apparet, suspensa manu & magna prædientia explorationem vulnere stylo immisso perfici debere, & longe tutius hoc fieri aqua per siphonem immissa; modo.

do hoc non fiat magna vi: tunc enim & aqua ipsa sic valido impetu injecta posset panniculum adiposum dilacerare, & viros sinus facere.

**PRESSIO, LIGATURA.** Ubi per aquam tepidam immixtam confiterit, vel etiam prudentissima per stylum exploratione, quo usque penetraverit vulnus; tunc illi loco apponitur splenium, quod deinde ligatura circumducta apprimitur: sic impeditur, ne collecti humores in vulneris cavo magis descendant. Sensim dein singulis deligationibus mutatur situs splenii, ut magis magisque versus aperturam vulneris pergat, lente sic ab inferioribus ascendendo: interim apertura vulneris liberissima relinquitur, ut contenta in vulneris cavo facile exire possint; unde ligatura sic dirigatur, ut tantum premat fundi vulneris intimam partem, liberum autem relinquat vulneris orificium, quod ob eandem causam nunquam turunda obturari debet. De hac autem methodo, & pulcherrimis ejus usibus, dicitur postea in *capitulo de Fistula*.

**LOTIO.** Dum effusi humores in cavo vulnere stant, & diu ibi hærent, non facile exeuntes ob acclivem orificii vulneris situm, mora & calore loci corrumuntur, & in acrimoniam fatis malignam possunt degenerare. Ipsum blandissimum pus, in vulnere nimis diu retentum, ichorosum, tenue & acre fit. Tota ergo vulneris superficies inde male afficietur, & sordida fiet: sed quamdiu nondum pura est vulneris superficies, nunquam poterant recrescere & uniri partes, licet idonea compressione & ligatura contiguz factæ fuerint. Requiritur ergo prius depuratio vulneris per digestiva dicta remedia apud Chirurgos: sed hac non possunt applicari omni vulneris superficiei, nisi diluta prius sic fuerint, ut per vulneris aperturam immixta per omnia vulneris loca penetrare possint: illa ergo, quæ §. 207. laudata fuerunt ad depuranda sordida vulnera, hic convenient; sed diluta in aqua vel simili

vehiculo, ut per omnia penetrare possint. Aloe & myrrha vitello ovi subacta, addito pauillo salis ammoniaci & melle, dein aqua diluta, præcipua hic sunt.

**APERTURA VULNERIS NOVA VEL DILATATA.** Postquam per aliquot dies tentata fuit pressio & ligatura vulneris profundum comprimens, uti & post injecta depurantia illa digestiva dicta; si nondum in melius tamen mutata fuerit vulneris conditio, de aliis cogitandum est. Si vulneris orificium admodum exiguum fuerit, ut non possint exire de cavo vulneris aggesta siquida, tunc illud dilatandum est: si vero vulneris apertura talem situm habeat, ut contenta in vulneris cavo liquida nec propria gravitate, nec mutato situ corporis facile exire possint, tunc cogitandum est de apertura nova facienda, per quam commodius & sponte elabi possent omnia illa, quæ retenta in vulnere nocerent. Ut autem hoc fiat, turunda clauditur vulneris orificium, ut nihil exire possit, aggesti tunc humores colliguntur sponte in infima parte fundi vulneris, & ibi tumorem faciunt, qui indicabit locum, ubi nova apertura facienda est. Idem fieri poterit, si per siphonem aqua injecta promineat extrorsum vulneris infimus fundus; uti & si specillum immixtum per vulneris aperturam ad infima usque perringere possit sic, ut ejus apex digito Chirurgi sentiri possit: turo enim tunc supra specilli apicem discinduntur integumenta, ut nova apertura fiat. Si vero vulnus inter partes crassas musculosas profunde descendere, sic tamen ut fundus vulneris non versus cutim hæreat, sed in interioribus delitescat, longe difficilior est novam aperturam cum fructu facere: optimum tunc est, clausa vulneris apertura, ad illum locum, ubi vulneris fundus hæret creditur, applicare mollißima cataplasinata hac spe, ut emollitæ partes externæ facillime cedere possint liquidis in vulneris cavo aggestis, sicque inveniri locum, qui pertendi debet.

§. 238. **D**ilatatio fit cultro, linteis, carptis, spongia, radice Gentianæ & similibus siccis immixtis, filo alligato, absorptu humoris tumentibus, sicque dilatantibus.

Omnium optime vulneris dilatatio per cultrum fit: dolor quidem acutus adeit, dum dissecantur partes vivæ, sed uno momento desinit, dum reliqua, quæ dilatan-

do vulnere inserviunt, lenta distractione latis acutum & diuturnum simul dolorem excitant, & una margines vulneris continent: quæ loca contusa postea per suppurationem

rationem debebunt separari. Unde, qui vano metu sectionem cultro faciendam horrent, majoribus torquentur doloribus.

Ut vero fiat sine Sectione vulneris dilatatio, intruduntur ejus orificio lintea carpta vel similia corpora bibula siccissima, quæ humores affluentes absorbendo distenduntur; sicque dilatant orificium vulneris nimis angustum. Nec parva hæc vis est, qua corpora sicca bibula, dum madefiunt, remouent a contactu partes, quibus coercentur. Adest enim in aqua nitibilis hæc proprietas, certis experimentis cognita, quamvis difficillime explicanda, qua distendit corpora, quibus se insinuat, in majus volumen; tanto quidem cum effectu, ut sola hæc vi enormia pondera eleuentur, & durissima faxa fundantur cuneis siccissimis ligneis intrusis & postea humectatis; uti solent facere operarii, ut enormes illas massas lapideas, unde molares lapides conficiunt, separent a rupibus (*Acad. des Sciences Par. 1730. Mem. 391. Boyle de utilitate philos. Experim. pag. 555.*). Nec hæcenus limites immanis illius potentie novimus: sufficit scire, quod summa etiam obstacula superet. Lintea ergo carpta siccissima contorta in turundam, radicis gentianæ adeo fungosæ frustulum, vel & spongiam compressam vulneris orificio intrudunt: dein vel tenaci Emplastro, vel ligatura idonea, hæc sic retinent, ut non possint exire, dum affluentibus humoribus resorptis tumere incipiunt: sic tota illa vis, qua distenduntur hæc bibula corpora, impenditur dilatando vulneri. Inter illa autem, quæ dilatandis hac methodo vulneribus adhibentur, nullum est, quod in tam parvum spatium comprimi potest, & tamen ab humido resorpto postea tam immaniter tumet, quam spongia; unde solet reliquis præferri: imprimis si artificiosa præparatione augeatur adhuc spongiæ ad hoc usus efficacia. Solebant quidam spongiæ frustulum circumducto filo validissime constringere, deinde vulneris orificio immittere, sic ut nodus circumducti fili extra vulnus hæreret & fornice abscindi posset: sed non sine difficultate hoc potest perfici, & longe melius fit methodo sequenti. Resinam cum cera & pauco oleo liquant, ut fiat inde Emplastrum satis tenacis consistentiæ; huic deinde Emplastro igne liquato spongiam puram, siccissimam, &

fatis magnam immergunt, ut undique penetretur hoc emplastro soluto: deinde validissima actione præli, inter duas laminas ferreas modice calefactas, ex spongia exprimunt omne pingue, quantum fieri potest, & sicque in prælo relinquunt, donec omnia penitus refrigerint. Tunc habetur spongia in minimum volumen compressa, densa fere instar ligni, & quæ in quasvis figuras scindi poterit. Illud, quod post validam expressionem remansit in spongia Emplasticum, sicæ spongiæ partes sibi mutuo applicatas retinet, nec tamen impedit, quo minus aqua & aquosa omnia in bibulam spongiam rapiantur, illamque in pristinam dimensionem extendant. Cum ergo spongia validissima pressione in angustissimum spatium redacta, vulneris orificio immittitur, ab humoribus affluentibus distendatur in maximam dimensionem, quam acquirere potest; pater, quam enormis dilatatio hac methodo fieri possit. Præterea hoc commodi habet spongia sic præparata, quod possit in minima ramentula scindi, quæ angustissimis etiam vulnerum vel fistularum orificiis immitti possunt: quod linteis carptis vel gentianæ radice aut aliis similibus fieri minime posset.

Omnibus autem illis turundis, sive ex spongia sive ex aliis similibus fiant, applicatur filum, ne forte se subducant in latius vulneris cavum, & ibi plurima mala faciant; dum non possent sine molestia inde educi sine hac cautela.

Sic hæcenus ordine pertractata sunt illa, quæ ad generalem historiam & curationem vulnerum pertinent, simulque actum fuit de illis symptomatibus, quæ vulneribus accidunt (quandoque, & ob periculum vel summam molestiam peculiarem medelam requirunt. Sequitur nunc ut dicatur de vulneribus, quæ corporis partes illas occupant, in quibus viscera reconduntur; ideoque, præter generales in omnium vulnerum curatione indicationes, multa adhuc alia observanda requirunt. Solent plerumque hæc considerari in tribus illis magnis corporis cavis, in quibus nobilissima organa illa continentur, a quibus omnes functiones corporis sani pendunt: unde apud auctores Chirurgicos (scilicet semper solent tractari Vulnera Capitis, Thoracis, & Abdominis. Primo nunc agetur de vulneribus Capitis.

VUL-

## VULNERA CAPITIS.

§. 239. **V**ulnera Capitis lædunt vel sola externa communia; vel periosteum; vel cranium; vel duram Matrem; vel piam simul; vel Cerebri vascula, substantiam, corticem, medullam, ventriculos.

Distinguuntur vulnera capitis, quod vel lædant externa, inter quæ & ipsum calvariz os numeratur; vel quod penetraverint ad contenta in calvariz cavo. Externa autem hæc iterum bifariam solent dividi: vel enim sunt communia externarum partium corporis tegumenta; vel sunt talia, quæ soli capiti propria habentur. Integumenta communia sunt Epidermis, cutis & panniculus adiposus: quæ quidem ubique in toto corpore externo sere adiunt, tamen in plurimis locis diversimodum habent indolem. Longe enim alia Epidermis apparet in dorso pedis quam in planta; multo crassior cutis plerumque in dorso quam in abdomine; longe alia indoles panniculi adiposi in cervice, v. g. quam in aliis partibus corporis. Sic etiam in capite cutis satis crassa, loculis sebaceis copiosis fatis magnis instructa; cellulosa tunica huic subiecta, satis tenuis, vix multum pinguis habet; unde diversitas communium integumentorum in capite patet. Præter hæc alia sunt capiti propria integumenta. Expansio enim tendinea, sive aponeurosis, totum caput sub membrana cellulosa tegit, quæ per collum pergens ad humeros sere usque descendit; in parte superiori capitis omnium fortissima est hæc Aponeurosis, duplici ad minimum strato fibrarum, se mutuo decussantium, conflans; descendens postea sensim attenuatur, ubi collum ambit, & circa claviculas quasi evanescit (*Winslow Exposit. Anatom. pag. 690.*). Huic membrane supponitur Periosteum cranii, binis lamellis, acriter sibi invicem unitis, conflans: interior lamella, ossi applicata, a quibusdam Periosteum proprie vocabatur; exterior, in quibusdam lo-

cis, ut circa musculos temporales, ab interiori secedens, a multis Pericranium dicitur. Sub hoc Periosteo cranium ipsum sequitur ex ossibus variis, miro artificio unitis, conflans, binis tabulis ossis, intermedium diploen continentibus, compositum. Huius ossis internæ superficiæ artissime accrescit membrana, dura mater dicta; quæ & internum Periosteum cranii vocatur. Dura matri supponitur pia mater dicta, cui tamen adhuc tenerissima Arachnoidea incumbit. Per hanc piam matrem omnes arteriæ, quæ ad cerebrum tendunt, omnesque venæ, quæ inde redeunt, decurrunt, & in illa ordinantur. Pia matri immediate unitur cerebri ipsius substantia corticalis; unde medulla oritur: quæ collecta fornici instar cava relinquit, quæ cerebri ventriculi dicuntur: in quibus plexus, Choroidæ dicti, mira vasorum sanguineorum congerie constantes, locantur.

Ad omnes has partes vulnera, capiti inflicta, pertingere possunt; semper eo periculosiora, quo causa vulnerans profundius adacta plures partes ex modo enumeratis læserit. Omnium ergo minime periculosa, cæteris paribus, erunt illa vulnera, quæ sola integumenta communia lædunt; licet tamen, uti postea patebit, aliquando pessima mala etiam ab his læsionibus oriri possint.

In omni ergo vulnere capitis sollicite prima deligatione inquirendum, quo usque penetraverit instrumentum vulnerans, & quas partes læserit; ut possint prælagiri mala, quæ merenda sunt, & idonea his præcavendis auxilia applicari. Quibus signis jam cognoscatur, sola externa communia læsa esse, docet sequens paragraphus.

§. 240. **S**ola externa læsa, scitur. 1. ex causa vulnerante, ejus figura lædente. 2. vi ejus parva. 3. loci vulnerati conditione, quoad figuram inprimis 4. levitatem symptomatum. 5. conspectu. 6. specillo.

1. Sic si cultro discissa fuerint integumenta, poterit satis magnum vulnus esse, nec tamen profunde penetrare: si vero punctum culter adactus fuerit, non poterit aliquis longitudinis vulnus esse, quin pro-

funde penetraverit. Sic si acinace incurvo vulnus inflictum fuerit, non poterit illud in longitudinem aliquam excurrere; quin in medio satis profunde descendat; uti satis patet.

2. Sa-

2. Satis evidens est, instrumentum vulnerans eo minus penetrare, quo minori vi adigitur. Hoc autem cognoscitur ex vulnerati ipsius, vel aliorum, qui adfuerunt, relatione.

3. Calvaria utcumque ad spheroidream figuram accedit: in illis ergo locis, ubi maxima convexitas habetur, non potest magnam vulnus esse, nisi satis profunde adactum fuerit instrumentum vulnerans: uti v. g. circa anteriorem & maxime prominentem ossis frontis partem, & circa mediam partem utriusque ossis bregmatis; longe minus adhuc in illo loco, ubi os frontis circa tempora cum osse sphenoidali concurrir; ibi enim eminent angulatis superficies est. In aliis locis, ubi planam magis superficiem calvaria habet, poterit satis longum vulnus sine magna profunditate infligi.

4. Ille depravationes functionum, quae post vulnus infligum sequuntur, vocantur vulneris symptomata: quo ergo haec plura fuerint, & quo graviora, eo maior metus erit, plures partes, illasque magis necessarias ad sanitatis integritatem, laesas esse. Cum autem in capite haereat aethorum animalium origo & fons, imprimis inquiritur, an in his aliquid mutatum fuerit post vulnus infligum. Vertigo, tinnitus aurium, bilis vomitus, somnolentia, sensuum omnium, vel quorundam saltem, abolitio vel depravatio &c. mali hinc semper omnis. Si nullum horum apparuerit, vel tantum levissimum fuerint & statim evanida, magna spes est, causam vulnerantem non adeo profunde penetrasse. Sollicite monuerat Hippocrates, praeter illa, quae oculis subiciuntur, etiam haec inquirenda esse. *Etenim magis aut minus vulnerati haec sunt indicia. si eper alto sopore dormitus fuerit, aut tenebra oculis efflue, aut si vertigo prebenderit, aut ipse conciderit* (Hippocras. de capit. vulner. cap. 15. Tom. XII. pag. 121.). Farendum tamen est, aliquando gravissima etiam capitis vulnera, in cerebri substantiam usque penetrantia, non statim supata fuisse adeo malignis symptomatibus. In memorabili enim illo casu §. 187. memorato usque ad septimum diem satis bene se habuit vulneratus, licet cuspis ferreus sagittae profunde in ipso cerebro haereret, post quartum mensis inde feliciter eductus; subsequente integra sanatione adeo periculosi vulneris. Unde & Hippocrates, & post illius peri-

tissimi Medici longe majus suspicabantur malum, si graviora symptomata, non initio, sed post aliquot dies ab infligto vulnere apparerent. Sic monet Hippocrates: *optimum quidem esse, illum, qui vulnus in capite habet, non febricitare, neque sanguinem ipsi eruisse, neque inflammationem, neque simul ullum aliquem dolorem accepisse: si vero quid horum apparuerit, securissimum est, ut in principio sit, & ex paucis temporibus permaneat* &c. *At incipere febrem in capitis vulnere quare aut septima die, aut undecima, valde lethale est* (Hippoc. Procrbat. Lib. II. cap. 15. Tom. VIII. pag. 818. 819.). Unde & Jacotius in Eruditissimis commentariis in Coacas Praenotiones pro generali axioma posuit, quod illa, quae in vulneribus mox a principio apparent, minus terere debeant, quam quae perseverant, vel postea superveniunt; siue febres sint, siue alia symptomata. Et ideo suspendere indicium jubet, licet gravissima symptomata apparuerint in initio, donec constet, an illa perseverent an non (Hippoc. Coaca praefacia cum interpretatione & Commentariis Jacobi Hollerii & Desiderii Jacotii &c. pag. 904.). Patet ergo, non posse absolutam Prognosin deduci ex symptomatum levitate vel vehementia, sed simul & alia signa requiri. Tuto quidem moneri potest, pessima quaeque metuenda esse, si graviora symptomata statim adsint: non tamen penitus desperandum est, etiam in gravissimis malis; nec temere confidendum, licet in initio nihil fere mali appareat.

5. Capitis enim vulnera, si externa solazesa fuerint, satis oculo patent: unde abrais in loco vulnerato capillis, & abluto sanguine tepido vino cum aequali copia aque diluto, prima deligatione omni cura inquirendum est, quo usque vulnus penetraverit, quas partes laeserit; ut inde Prognosis & indicatio curatoria tuto deduci possent. Inter illa autem signa, quae conspectui offeruntur, & quae docent, an os laesum fuerit, an vero tantum communia integumenta, recenset & Hippocrates (De vulneribus capitis. cap. 12. Tom. XII. pag. 120.), quod debeat animadverti, an capilli telo praecisi & in vulnus impacti fuerint: hoc enim si appareat, tunc os nonnisi acceptissime afferendum est. Dum enim instrumentum vulnerans, licet satis acutum fuerit, mollia tantum integumenta capitis penetrat, sequan-



sequuntur capilli telli impressionem, nec discinduntur; ubi vero ad durum os capilli in vulnus prostrusi applicantur, non amplius cedere possunt, sed discinduntur.

6. Leniter diductis vulneris labiis immittitur specillum, ex molliissimo plumbo vel argento purissimo, quod molle semper & flexile est, paratum, apice obtuso:

§. 241. **H**æc (240.) licet levia videantur, sæpe ex propinquitate musculorum, tendinum, suturarum, periosteï, cranii, nervorum, vasorum, cerebri, periculosa sunt; tam quoque a vi contractili partis læsæ.

Licet jam omnibus rite exploratis constiterit, sola externa communia læsa esse, tamen non vilipendenda sunt hæc capitis vulnera, cum innumera obsevata docuerint, levissima etiam in hac parte vulnera pessimos produxisse effectus: neque hoc tantum, quando interiora capitis a valido ictu v. g. læsa erant, licet in externis partibus nihil fere mali appareret; sed etiam in illis casibus, ubi nulla internarum capitis partium læsa fuit, & vulnus sola externa communia penetrasset. Hæc autem mala sunt

**EX PROPINQUITATE MUSCULORUM, TENDINUM.** Quanta sæpe ex læsione tendinum & musculorum oriantur mala, dictum fuit §. 162. sed validissimi calvariæ insiguntur musculi, imprimis circa occiput, ubi splenii, cucullares &c. hærent. Sed & magni temporales musculi lata basi calvariæ accrescunt. Involucrum tendineum forte totam calvariam tegit, uti dictum §. 239. Si ergo vulnus has partes læserit, quamvis os cranii minime denudetur, periosteio illeso; sæva tamen possunt sequi symptomata: *Quibus tempora secantur* (dixit Hippocrates) (Caec. Premot. n. 398.) *convulso in opposita sectioni parte contingit*; & in Epidemico loco §. 163. allegato, vulnus exiguum, nec alte penetrans, acuto iaculo circa occipitem indictum, opisthorono corruptum necavit sequenti die.

**SUTURARUM.** Per has efficitur, ut cranii ossa crescere & extendi possint, manente eadem figuræ capitis æquabilitate. In junioribus omnium manifestissime apparent, æque in externa convexa quam in interna concava ossium cranii parte: In etate proventus in interiori parte non amplius dentatæ illæ ossium unitorum promissentæ apparent, sed simplex linea, quæ in summo semio obliquerat sæpissime. Observatur jam in illis locis, ubi suturæ sunt, duram, ma-

suspenſa manu leviter pertentando exploratur totus fundus vulneris. Si enim os alicubi nudatum fuerit, resonabit specillum; si nullibi aliquid scabri vel asperi appareat, omnia mollia sentiantur, & nullus audiatur sonus, certi sumus, calvariam nec nudatam, nec læsam esse in vulneris loco.

trem firmissime adherere, & vasis emissis uniti Pericranio, quod etiam in futuris fortissime adhæret: unde patet, mala, quæ circa suturas sunt in externis cranii partibus, posse communicari internis continuitate subſtantie.

**PERIOSTEI, CRANII.** Quod vasa ad ossa cranii deferunt, & vicissim ex illis recipiunt, & per hæc necitur ossibus; unde vitalis influxus & effluxus humorum in ossa cranii, & imprimis in tabulam externam, ab integritate periosteï pendet. Hoc periosteio ergo affecto, malum communicabitur ossibus cranii facillime, & duræ matri, imprimis circa futuras, ubi emissis vasculis inter binas illas membranas manifesta communicatio obtinet; uti modo dictum est.

**NERVORUM.** Qui a quinto nervorum pari orti, & a dura portione paris septimi, numerosissimis & satis insignibus ramis per externas capitis partes distribuuntur. His ergo nervis punctis vel pro parte discissis, omnia illa metuenda sunt, quæ §. 163. memorantur. Imprimis si attendatur, satis tenfos hic esse, dum per cranii integumenta decurrunt, nervos, & adeo vicinos suæ origini.

**VASORUM.** Arteriæ enim satis notabiles per externa hæc integumenta decurrunt, quarum læsione insignis aliquando post hæc vulnera Hæmorrhagia sequitur.

**CEREBRI.** In quibusdam enim locis cranii os tam tenue est, sicut in mundata calvaria pelluceat: hinc integumentis discissis semper metus est, ne cerebrum tam vicinum afficiatur. Hoc autem imprimis fiet vel a nervis læsis, vel ob continuitatem periosteï externi & duræ matris; vel quocunque vitio post vulnus externarum partium nate, quod calvariam ipsam incurrere, & deinde ad contentum cranio cerebrum pertingere possit.

**ALI-CONTRACTILI PARTIS LÆSÆ.** Commune

mune phenomenon est in omni vulnere, uti dictum §. 158. n. 1. quod partes firmæ, per vulnus divise, sensum magis a se mutuo fecerant: sed hoc semper fiet tanto magis, quanto validiori vi contractili partes gaudent. Cutis capitis densa & fortis est, æqualiter circumtensa cranio, & mobilis admodum, hinc facillime cedens; cui supponitur membrana cellulosa: ideo, divisa per vulnus cute cranii, brevi magnus

hiatus vulneris nascitur, unde magnæ cicatrices toties post vulnera fronti inflicta manent. Si iam nervi semidifici fuerint, & tanta vi secedant a se invicem vulneris labia; omnia symptomata, quæ nervum fæcile sequuntur, erant longe violentiora. Accedit, quod quo plus hiant hæc vulnera, eo major superficies suppositarum partium insolito aeris frigori exponitur; unde plurima iterum mala sequi possunt.

### §. 242. **M**axime, si contusio simul adest.

Licet leve fuerit vulnus, si simul contusio adfuerit, multa mala metuenda sunt: ubi enim obtusum corpus, motum vel appressum partibus corporis, vasa plurima minora destruxerit, contusio adesse dicitur, quam ergo semper comitantur vasorum laceratio, humorumque ex laceris vasis effusio, eorumdemque stagnatio & corruptio. Cum autem externis integumentis capitis durum calvarie os supponatur, nisi instrumentum lædens acutum omnino fuerit, contusio semper aliqua aderit, & quidem magis in capite ob hanc causam, quam in aliis corporis partibus. Quia vero cutis capitis est densissima, panniculus autem adiposus succumbens tenerimus & facillime dilatabilis, inferius autem durum os resistit, effusi humores, mora corrupti, facile viam inveniunt per panniculum adiposum non resistentem, & descendunt gravitate sua; sicque poterunt ad posteriora capitis delapsi magnos illos occipitis ossi insertos musculos irritare, & pessima mala producere. Eodem modo & ad latera capitis ad temporales musculos, & in fronte ad oculos, & radicem nasi descendere, ibique eadem mala facere poterunt. Facillime autem per capitis membranam cellulosa delabi sic extravasata liquida certis observatis constat: Quoties enim non fuit visum, contusione in capitis verrice facta, sequenti die frontem & palpebras ipsas tumere & livescere, a sanguine extravasato hæc declivi via delapsa? Merito hinc damnavit Hippocrates vulnera capiti inflicta obtusis telis: *carnem enim conton-*

*dunt, maturant, & lacerant. Et sub hujusmodi telis vulnera ad latera & in orbem aliquantulum cava & purulenta magis redduntur & humida, & longiori tempore repurgantur. Carnes enim contusæ & laceratæ necesse est in pus versas transire* ( Hippoc. de cap. vulner. cap. 14. Tom. XII. pag. 121. ). Alterum, quod inde meruit malum, est, si periosteum vel os ipsum contusum fuerit, vel a liquidis extravasatis male affectum; unde ossis corruptio, & reliqua, quæ inde sequuntur mala, expectanda sunt. Contusum enim os cranii esse potest, licet naturaliter se videatur habere, & læsio per contusionem facta potuit plus minusve ossis substantiam penetrasse, licet varia magnitudo mali oculis judicari non possit, uti prudenter monuit Hippocrates ( *De Renunciat. vulner. Sect. II. cap. 1. pag. 136.* ). Unde patet, quam suspecta merito prudentibus Chirurgis habeantur capitis vulnera, si contusio simul adfuerit, cum sæpe longo temporis intervallo postea pessima sequantur mala, dum omnia salva esse credebantur. Inter plurima observata Medica, quæ hoc docent, adfert ex *Pavio* tale Exemplum *Bobnius* ( *Ibid. cap. 7. pag. 118.* ). Quidam a computatore in bregmatico os dextrum poculo stanneo percussus fuit, nec aliquid fissi in osse fuit deprehensum: pancreas valuit, & obambulavit, donec post decimum mensem inter anubandum verrigine correptus ceciderit, & brevi post obierit. Aperto cranio in ictus loco, os plane putridum foetidumque cum meningibus apparuit.

### §. 243. **A**ut, si sub parva apertura lata læsioordes colligit.

Accidit sæpissime post lapsum ex altiori loco, vel aliam quancunque læsionem ob-

tuso instrumento factam, leve vulnusculum cuti capitis infligi, licet locus satis magnus

gnus confusione læsus fuerit. Vilipendunt plerumque hoc tanquam leve malum & vulnerati, & sæpe etiam minus periti Chirurgi; postea tamen pessima mala a tam levi vulnusculo oriri mirantur. Nec mirum, cum collecta materies, angusto nimis vulnusculo exire non potens, augeatur, & novas sibi vias per membranam cellulofam querat; vel & mora corrupti humores subiectum pericranium, vicinos musculos &c. pessime afficiant.

Vocabar aliquot jam elapsis annis ad fabrum lignarium febre decumbentem; & quia nihil commune habebat morbus cum Epidemico tunc grassante, nec sollicito examine ullam causam invenirem; symptomata tamen adefsent plurima, quæ aliquid mali latere persuaderent, hærebam omnino. Dolor capitis aderat satis intensus, frontis & palpebræ utriusque oculi tuebant & rubebant, tensionem in nucha se senti-

re conquerebatur æger, somnos admodum turbatos &c. Rogavi, an externa quadam causa caput læsum fuerat: negavit æger, licet iterato monerem, me simile quid suspicari. Famulus præfens bona fortuna reminiscitur, ante osfiduum regulam, sed ex parva altitudine, in caput decumbentis delapsam fuisse: rem sic se habere annuit æger, sed vix illum dolorem se inde sensitse, nec aliquid mali postea percepisse affirmabat: unde æger permittebam, ut locum illum capitis examinarem. Inveni vulnusculem, quod vix majoris aciculæ caput superabat, sed confusionem tam latam, ut ejus diameter pollicem æquaret. Jussi, ut illico discinderentur integumenta loci affecti; & sequenti die febris jam remissior, & omnia symptomata longe leviora erant: benigna suppuratione depurabatur locus, & feliciter sine ullo graviore malo evasit.

§. 244. Collecta enim materies (242. 243.) miros tumores, erysipelas, cedemata, dolores, convulsiones, ossis & periosteii putredines, febres, mortem, creat. Aer cava albens, incaute appositu emplastrorum ibi coarctatus, impressus, mira emphysemata facit.

**MIROS TUMORES.** Dum calida confusione, imprimis cute integra, vel parvo tantum in loco aperta, plurima vasa franguntur, effusi humores collecti, cuti integra coerciti, illam in immanem tumorem extendunt; & satis subito quidem: cranium enim subiectum cedere nequit, hinc omnis liquidi effusi moles cutim extrorsum distendit & elevar. Et hæc est ratio, quare in aliis corporis partibus a confusione raro tam magni tumores, nec adeo subito oriuntur. Memini, quod in domo, quam habitabam, ancilla de scalis delapsa fronte pavimento lapideæ summa vi impigerat; dum ipso momento accuro, ut succurrerem miseræ, jam tumor ovum gallinaceum æquans frontem occupabat. Notum est, lustrantes pueros toties capite in dura obacula impingentes, ilico habere tales tumores in capite. De mira illa intumescencia, ab elastico aere in membranam cellulofam penetrante & ibi retento, statim dicetur.

**ERYSIPELAS.** De Erysipelate, ejusque differentia a phlegmone, postea dicetur in historia inflammationis §. 380. Sufficit hic notare, quod hoc nomine intelligatur in-

Tom. I.

flammatio superficialis, & in ipsa tantum cute fere hærens ( si exquisitum fuerit Erysipelas, solius cutis est affectus (Galen. Method. Med. ad Galenum. Lib. II. c. 1. Tom. X. pag. 368. 369. ) ) rubro flavescentis coloris; in vasis minoribus, quam sunt vasa sanguinem rubrum vehementia, pro maxima parte locum habens: Nullibi frequentius occurrens, quam in capite & facie, & fere semper in capitis læsionibus aliquid maligni latere demonstrat. Unde ab ossis denudatione Erysipelas dixit Hippocrates ( Aphorism. 19. Sect. VII. Tom. IX. pag. 301. ), & Galenus in commentariis suis in hunc locum, monet in fine hujus Aphorismi subintelligi debere malum: quia non semper ossibus denudatis Erysipelas supervenit, sed ubi his malis accedit Erysipelas, pravum semper symptoma est. Præterea constat plurimis locis Hippocratis, ossis ( ὀστέου ) vocabulo frequentissime intelligi calvariam, uti inter alia loca plurima etiam demonstrat Aphorismus 24. Sectionis septimæ. Facile jam intelligitur, compressis cutis vasis ab effusis humoribus distendentibus, vel & irritatione ab acri degeneratione eorundem, posse nasci hic tale malum.

S

OE.

**ŒDEMA.** Generali significatione quicumque tumorem designat; & imprimis tumores molles & frigidos, uti dictum fuit in Commentariis ad §. 112. Hic autem non intelligitur talis tumor frigidus, & lentus, sed longe diversum mali genus. Frigidum enim talem tumorem distinctionis causa optime nunc vocant œdema œdematodes. Ubi vero talis tumor, pellucens quidem & albus, cum magno calore simul comitante, adest, tunc vocaverunt œdema Erysipelatodes. Illud malum adeste dicitur, quando vasa tam parva, ut nec flavos nec rufos humores admittant, sed pellucidos tantum, inflammantur: de quo postea §. 280. dicitur. Solent & vocare Erysipelas bullatum, quia partes, quas occupat, valido tumore distendit, & imprimis palpebras & totam faciem, si circa caput hæreat. Ab isdem causis oritur in capitis vulneribus ac Erysipelas, & plerumque pro peiori symptomate habetur.

**DOLOR.** Quia materies collecta cutim distendens nervos distrahit, vel stagnando acrior facta pericranium, adeo sensile, vel & tendines & musculos vicinos male afficit.

**CONVULSIONES** ab isdem causis hic fieri possunt; & præterea si ad interiora calvariae malum hoc tandem penetraerit.

**OSIS ET PERIOSTEI PUTREDINES &c.** Sub membrana cellulosa hæret expansio illa tendinea, de qua dictum §. 239. sub hac pericranium, quod immediate calvariae incumbit, illique vasis emissis & receptis communicat. Dum ergo extravasati humores sub cute tenaci capitis coerciti hærent; vitium hic natum facillime communicatur pericranio: sed illud ubi læsum fuerit, vitalis humorum influxus in os tollitur, unde illa pars cranii, quæ affecto pericranio supponitur, moritur, & postea separari debet, si sanabitur malum; vel putrefacta corrumpet subiectas meninges & ipsum cerebrum: unde pessima mala, febres, imo mors ipsa sæpe nec opinantes opprimit: quale Exemplum memoratum fuit §. 242.

**AER CAVA ALLUENS &c.** Aer omnia undique alluit: ubi ergo vulnus capiti inflatum est, cutim penetrans ad membranam cellulosa usque; & imprimis si specillo sub labiis vulneris immisso multum scrutatus fuerit Chirurgus, an periosteum vel & ipsum cranium læsum fuerit; aer ingreditur membranam cellulosa: si tunc tenax in emplastro vulnus textum fuerit perfe-

ctissime, aeris recepti egressus impeditur qui tunc calore corporis rarefactus vias sibi facit per membranam cellulosa, & vicina loca tumere facit. Hoc viso plerumque adhuc curiosius scrutantur Chirurgi specillis, ut inquirant latens malum, aeremque iterum admittunt per dilatatam membranam: & emplastro iterum applicato augetur tumor, ulterius se dispergens, imprimis per frontem, palpebras & faciem: unde sequenti die aliquando miro spectaculo tota facies tumores pellucido elastico sic turget, ut oculi sepultri quasi & eminentius disparescant. Observatur enim, membranam cellulosa eo facilius distendi, quo tenerior est, & minus pinguedinis in se habet. Unde illa sub palpebris loca tam facile tument, & scroci & penis membrana cellulosa in hydropse Anasarca in tantam enormem molem distenduntur: quia in his locis membrana cellulosa nihil crassie pinguedinis, sed potius mucilaginosi quid in se continet; nisi in castratis animalibus, in quibus ingens copia pinguedinis hic colligitur. Tumores sic natos apto satis vocabulo Emphysemata vocant, sive inflationes, quas *Goræus* (Definit. Medic. pag. 197.) definitur spiritus flatuosi collectiones in inanibus corporis locis. Similiter hujus vocabuli significationem etiam Galenus (*Method. Medendi Lib. XII. cap. 7.*) habet, dicens. *Inflationes (inquæ) ex flatuoso spiritu collecto nascuntur, alias sub cute, alias sub membranis ossa regentibus, aut musculos viscerumve aliquod investientibus.* Porro colligitur aliquando non parum etiam in ventriculo & intestinis, itemque in medio spatii horum & peritonei. Postea, ut distinguat ab œdemate hos tumores, dicit, quod digitis pressi non retineant vestigium, sed sonitum, veluti tympanum reddant; sed hoc tantum verum est, quando in maiori corporis cavo collectum hæret illud flatuosum, v. g. in abdomine; tunc enim illud percussum resonat instar tympani, unde & ille affectus tympanites Medicis dicitur. Ubi vero in membrana cellulosa hæret hoc malum, pressum digitis cedere potest, quia in vicinis hujus membranae cellulas tunc protruditur illud elasticum flatulentum: in pristinum locum rediens, ubi pressio cessat. Quia autem palpebrae adeo facile tument ob laxissimam hinc & facillime dilatabilem cellulosa membranam, ideo apud

Ægi.

*Æginetam* ( *Lib. III. cap. 22. pag. 33. vers. 1.* ) definitur Emphysema, quod sit œdematodes palpebræ tumor. Tamen alibi eandem de Emphyemate ex Galeno dixit, quæ modo citata fuerunt ( *Lib. IV. cap. 28. pag. 66. vers. 1.* ).

Quam facile autem aer semel admissus in membranam cellulosam per omnia penetret, docent laniæ: qui, parvo vulnuscule curi maciari animalis inflecto, aerem inflant, ut facilius cutim sine læsione subjectæ carnis auferant. Constat etiam Medicis observationibus, aerem in panniculum adiposum ingreßum posse omnia fere corporis loca pervadere, & tumores mirabiles in variis partibus & aliquando in omni fere externa corporis superficie producere. Puellæ quinque annorum circiter, lento morbo sensim tabefactæ, triduo ante mortem nascebatur in genâ dextra tumor, qui sensum totum truncum corporis occupavit. Dum digitis premebatur tumor, subducebat se cum crepitu quodam contentus aer. Post mortem pertusa scalpello abdominis cute, statim omnis tumor subsedit, cum fetore intolerabili exhalante ( *Acad. des Sciences Par. 1704. Mém. pag. 9.* ). Robusto juveni duo vulnera infliguntur, unum prope claviculam dextram, alterum posterius inflictum prope scapulam sinistram: tumor invasit non solum tantum faciem, sed & universum reliquum corpus, velut spongia vento plena, quocumque tangebatur, palpitantibus occurrebat ( *Thom. Barrol. Hist. Anatom. rarior. Centur. V. Hist. 12.* ). Simile exemplum apud eundem auctorem alibi habetur ( *Centur. VI. Hist. 89.* ). Similes tumores videntur & posse nasci, dum humores extravasati putrescunt: tunc enim constat experimentis, per putredinem produci, vel extricari forte, latentem in corporibus materiam elasticam, quæ, si non sit aer, saltem similem vini habet, qua per calorem immaniter expandi possit. Sic cadavera submerforum, dum incipiunt putrefcere, distento toto corpore externo, & imprimis abdomine, emergunt, aucto nempe volumine: aqua jam specificè leviori facta. Cum autem collecta materies extravasata, sub cute tenaci hærens, sic degenerare possit; patet & hanc aliquando causam obtinere posse mirabilis huius mali. Forte illud factum in Exempli modo recensito puellæ illius, quæ len-

to morbo extincta paucis antemortem diebus totum corporis truncum adeo tumidum habuit.

Et apud Hildanum ( *Observ. Chirurg. Centur. II. Observ. 25.* ) tale habetur exemplum, ubi post gravissima capitis vulnera defuncti cadaver biduo post vulnera inflata terrum adeo spirabat odorem, ut nullus accedere fere auderet; & sequenti mane caput, facies, brachia, abdomen horrendum in modum intumuerant, & scrotum pariter inflatum infantis caput magnitudine æquabat.

Ubi autem tale Emphysema adeit, indicatio cruratoria jubet, ut illud distendens Elasticum iterum expellatur ex tunica cellulosa, quam distendit. Hoc autem fieri poterit, moderata pressione, vel frictionibus, derivando inclusum aerem versus vulneris aperturam, etiam dilatatam, si opus est; vel scarificationibus, usque in membranam cellulosam penetrantibus, concilietur liber exitus. Pulchrum scarificationum successum in tali casu habet Paræus ( *Lib. X. cap. 30. pag. 249.* ). Homini ense vulnus iugulo infligebatur, discendens asperam arteriam pro parte & unam ex venis jugularibus, unde ingens Hæmorrhagia & sibilus ob aerem per vulnus asperæ arteriæ elabentem: fistula uniantur vulneris labia, & remedia adstringentia applicata fuerunt. Paulo post aer se insinuans in tunicam cellulosam non tantum vicina vulneri loca, sed totum corpus miro tumore distendit. Facies sic inflata erat, ut nec oculorum nec nasi vestigium appareret. Dum miserrimo hoc statu ab omnibus pro derelicto haberetur, peritissimus Chirurgus audacter pluribus & quidem satis profundis scarificationibus eam pertudit, ut via fieret aeri incluso; & adeo felix fuit successus, ut integram sanitatem recuperaverit ex ipsis orci faucibus ereptus vulneratus.

Longè tamon sæpius hæc Emphysemata pectoris vulnera comitantur, si in cavum thoracis penetraverint, quia aer per vulnus in pectoris cavum ingressus sæpe non potest facile exire per vulnus, vel nimis angustum, vel occlusum quacumque de causa, unde rarefactus caloræ vitalium viscerum viam querit in membrana cellulosa. Si autem pulmo læsus aerem inspiratum dimiserit in pectoris cavum, facile patet, horrenda posse fieri Emphysemata, novo aere singulis inspirationibus accedente.

§. 245. *Si* sola ergo integumenta lēsi sine diēsis ( 241. 242. 243. 244. ) facilis sanatio per ligaturam libens, & curationem descriptam ab ( 185. ad 239. ), licet sepe appareant maxima: in primis vero juvat recens esse, dum incipit curari, rite uniri, raro deligari, & citissime, atque defendi cum cura a nimium humidis, aut laxantibus, & oleosis, ipsoque aere.

Ubi ergo constitit, sola integumenta communia lēsa esse, nec ulla maligna symptomata adsunt, quæ metum faciant, ne in interioribus aliquid mali lateat, nihilque deprehendatur ex illis malis, quæ paragraphis hic citatis enumerata fuerunt, felix sanatio merito expectari poterit. Ex hæcenus diēsis satis quidem constitit, nunquam capitis vulnera vilipendenda esse, cum etiam talia, quæ levissima apparebant, pessimum aliquando habuerint eventum; tamen solis integumentis communibus lēsis, maxima quamvis vulnera capitis fuerint, felicissime solent & satis cito sanari: vulneris enim magnitudo hic rarissime vel nunquam nocet; cum e contra minima vulnera, ob rationes §. 243. diēsis, ingens sepe periculum adferant, quod evitatur imprimis vulnus nimis angustum dilatando.

Quod in omnibus vulneribus obtinet, hoc præcipue in capitis vulneribus, quæ sola integumenta lædunt, locum habet; nempe eo feliciter curari, quo recentiora fuerint & adhuc sanguinolenta: omnium enim optima dispositio est tunc in partibus divisis, ut ad se mutuo adductæ iterum concrecant; uti in Cura generali vulnere dictum fuit. Omnia ergo illa, quæ ibi monita fuerunt, hic etiam convenient. Quædam tamen singularia in capitis vulneribus, licet sola externa læsa sint, observanda sunt.

Ligaturæ, quæ apparatus retinendo, vel partibus separatis ad se mutuo adducendis inserviunt, debent esse tam moderatæ, ut leviter tantum firment partes: si enim validius adstrictæ fuerint, integumenta externa premuntur ad duram Calvariam undique hic suppositam, unde compressio vasorum, inflammation, & reliqua inde sequentia mala oriuntur. Solent semper molli tantum ligatura uti Chirurgi periti in his casibus. Unio autem laborum dehiscentium non adeo fit ob eandem rationem per splenia & fascias, sed facillime obtinetur per Emplastrum tenacia, sive suturam dictam siccam; quia hæc vulnera solam fere tantum cutem dividunt, & subiecta membrana cel-

lulosa tenuis cuti adhærens facile sequitur.

RARO DELIGARI ET CITISSIME. Peritissimi Chirurgi in similibus casibus vix aliquid agere videntur, dum summa prudentia evitant plurima symptomata, quæ, minus peritorum incuria orta, postea fæpe magno artis molimine tolli debent. Totum enim, quod hic requiritur, est ut recrescant & uniantur separata capitis integumenta. Sed hoc totum, uti jam sæpius in generali vulnere cura dictum fuit, natura sibi soli sufficiens perficit; ars tantum impedimenta tollit, & addit adminicula. Ubi ergo omnia phenomena docent, recte procedere curam, quid juvabit sæpius detegere vulnus, & aeris insolito attractui exponere renascentia pulposa vascula? & vana illa depuratio vulnere, quæ detergendo pulmaceolis fit, destruet illud, quod renasci incipit. Sufficit ergo rarior denudatio vulnere. Si enim aliquid mali lateat, vel puris major copia prudentem abstersionem requirat, calor & levis pruritus circa vulnus manebunt: olfactu detegi poterit facile, si aliquid putridi adsit; symptomatum autem malignitas aucta indicabit statim, si quid magis suavis metuentum sit. *Cæsar Magatus*, qui raram deligationem vulnere solidissimis argumentis & pulchro effectu utilissimam esse adeo evidenter demonstravit, dum de capitis vulneribus simplicibus sine ossis denudatione agit, unitis vulneris labiis, & abietina lacrima cum mastiche & sarcocolla applicatis, noluit intra quadriduum solvendum esse apparatus ( illo enim tempore jam agglutinatio facta erit ); ubi vero ablata substantia, vel hiatus laborum vulnere requirebat peritii regenerationem, usque ad septimam diem solutionem vulnere differri voluit ( *Cæsar Magati de rara medicat. vulnere. Lib. II. c. 26. p. 219. &c.* ). Quotidie quidem, imo & sæpius de die, poterit accedere Chirurgus ut inquirat, an aliquis dolor, pruritus, major calor &c. percipiantur; poterit subolfacere, an aliquid putridi adsit; sed si nihil

nihil tale eveniatur, præstat relinquere apparatusum. Si vero novus apparatus apponi debeat, fiat hoc citissime, & omnia applicanda jam præsto sint, antequam detegatur vulnus. In reliquis corporis partibus vulnera, quæ sola integumenta dividunt, sæpius nudata & deterfa, præter retardatæ curæ tedia, plerumque non adeo multum mali faciunt: sed in capite, ubi vitia integumentorum tam facile subiecto peticranio & ipsi calvariæ communicantur, majus inde periculum nascitur: unde rara horum vulnorum deligatio non satis inculcari posse videtur. Ubi fractis ossibus una vulnus mollium partium incumbendum adest, restituito osse apparatus sæpe per septimanas relinquitur; felicissima tamen cura vulneris, fracturam comitantis, sequitur, licet nulla depuratio facta fuerit per artem.

DEFENDI CUM CURA A NIMIUM HUMIDIS &c. Tenerrima hic subjacet & facillime dilatabilis, membrana cellulosa, naturaliter inter densam capitis cutim & calvariam suppositam coercita: ubi ergo vulnere divisio integumentis humida & laxantia applicatur, membrana cellulosa his emollita luxuriabit, alienis liquidis implebitur, & degenerabit in fungosam molem, postea supuratione iterum separandam, quæ ubi valida & diuturna hic adest, fere semper subiectum Pericranium male afficit. Hinc communi consensu omnes periti Chirurgi horum usum in capitis vulneribus damnant, Hippocratem secuti, qui dixit: *Capitis vulnus nulla re madefaciendum, ac ne vino quidem, aut quam minimum: neque Cataplasmata &c. postulat* (Hippocr. de Cap. vulner. cap. 17. Tom. XII. pag. 122.). Et eodem in libro postea addit (Capit. XXVI. Ibid. pag. 125. 126.): *malum est, humidam in vulnere (capitis) carnem esse, & nimia uligine dissidentem (καὶ μωδαία) idque longo tempore reparari*. Et postquam monuit, a telo concisas & contusas carnes in pus verfas tabescere debere, dicit, quam celerrime vulnus ad supurationem deducendum esse: ubi vero depuratum fuit, siccius

§. 246. SI adfint vero descripta (241. pro varietate partis affectæ)

Paragrapho 241. recensebantur illæ partes, quarum vicinia periculum addebat levibus cæteroque apparentibus capitis vulneribus. Facile jam patet, circa curam

Tom. I.

debet evadere, sic enim citissime sanescet, & caro sicca & minime humida exrescet &c. Ubi ergo contusio vulnus comitans fontem requirit, vinum adhibent semper Chirurgi hodie, ne a solis aquosis nimia laxitas oriatur. Ob eandem causam omnia pingua in vulneribus capitis curandis vitantur, quæ præter nimiam laxitatem, quam inducunt, etiam oleosa tenacitate minima vascula obstruunt & faciunt imperspirabilia. Observaverant in Italia (Lud. Duret comment. in Coac. Hippocr. pag. 419.) & imprimis apud Florentinos capitis vulnera difficillime sanari, illudque latentis aeris qualitati adscribebatur: sed Autores plures animadverterunt, quod oleum rosaceum omphacinum vulnere applicent, & vicina loca etiam hoc oleo inungant (Bonet. Anat. prætic. Tom. III. pag. 341.). Atque inde moverunt vel nullos omnino, vel paucissimos tantum evadere, licet leviter tantum vulnerati fuissent. Unde & Severinus (M. Aurelii Severini trimemb. Chirurg. p. 210.) olei funestum usum deploreat, qui Neapoliti communis erat in capitis vulneribus; & dicit, quod levissimæ etiam plagæ male cederent præter opinionem, & ex centenis vix unus evaderet; cum Melitani Medici tam felici successu Oenelæo uterentur, ut ex centenis vulneratis vix periret unus: frustra nempe admissio vino oleosa tenacitate.

IPSOQUE AERE. Non quod maligna quadam indole noceat semper, licet possit aer in nosocomiis, ubi plurimi in eodem loco decumbunt, putridis exhalationibus inquinatus, cuicumque etiam vulnere obesse; sed quia insolito frigore terrerrima vascula emori facit; vel & aliquando nimis humidus simul laxando & emolliendo nocere poterit. Unde tara vulneris detectio etiam ob hanc causam laudatur; & ubi vulnera capitis delignantur, aeris temperies sicca & calida imprimis commendatur, quod igne & atomatibus accensis, ut fucino, malliche, olibano &c. obtineri poterit. Videantur & de his illa, quæ dicta sunt in commentariis ad §. 200.

utendum remediis variis (285. ad 239.) 241.). & mali.

malorum, quæ ex hac causa oriuntur, nihil universaliter posse determinari, sed prius debere cognosci partem vulnere vicinam; & deinde, quænam læsio huic par-

S 3

ti

ti per vulnus facta fuerit, vel futura metuatur, antequam aliquid certi statui possit in curandis vel præcavendis illis malis. Aliud enim requiritur auxilium, ubi vasa sanguinea arteriosa, satis insignia tæpe, una cum integumentis capitis commu-

§. 247. **C**ontusa hic ( 242. rite dirigenda his, quæ dissipate possint, vel suppurare, modo eligantur semper ea, quæ bona nervis membranisque ( 204. 207. 245. ), aut exciendenda sunt.

Contusio supponit multa vasa fracta esse, & humores effusos, qui tunc in membrana cellulosa collecti virosos sæpe tumores faciunt: & nisi instrumentum vulnerans valde acutum fuerit, fere semper aliqua contusio vulnera capitis comitatur. Requiritur jam, ut humores effusi educantur, vel disponantur sic, ut resorberi iterum possint; & vasis fractis reddatur pristina integritas. Si autem contusio levis fuerit, & liquida effusa adhuc meabilia sint, tunc tutissimum est, ut dissipentur; quod pulcherrime fiet, si foveatur locus talibus remediis, quæ concreta liquida diluere & resolvere possunt, & simul omni putredini resistunt, nec interim nimis emolliunt. Urina hominis sani, addito pauco sale marino vel ammoniaco, & vino, pulcherrimum hic remedium exhibet, quo toties felicissime dissipantur tumores a capitis contusionibus in pueris orti. Talia etiam ex ruta, scordio, & similibus parantur fomenta, quæ vi antiseptica singulari omnem putredinem arcant, & simul potentissime resolvunt concreta. Neque tantum leviores contusiones hæc sanare possunt, sed etiam satis magni tumores sic feliciter dissipantur, quibus incisio sola opem ferre posse crederetur. Mulier a curru decedens frontem humo gelu indurata sic impegerat, ut ingens statim ibidem elevaretur tumor. Chirurgus, mulierem aliquoties vomuisse intelligens, cranium impressum esse credidit, jamque cruciali incisione locum aperire volebat. Celeberrimus Ruyschius in consilium vocatus noluit incisionem fieri, sed fomentum ex optimis Cephalicis dictis herbis, vino incoctis, pannis laevis exceptum, calide applicuit, felici adeo successu, ut intra triduum tumor jam evanescere inceperit, & brevi sine ullo malo symptomate dissipatus fuerit. Additque, se sæpius profuisse illis, quorum capitis jam icapellum incisionem imminerebat

nibus discissa sunt, quam si tendinis helio funesta symptomata fecerit: sed de illis, quæ observari debent in vulnere pro lesarum partium diversitate, dictum fuit in generali cura vulnerum a §. 185. ad 239. usque.

( *Fred. Ruysch. observat. Anaton. Chirurg. Centur. obs. 60.* ).

Ubi vero frustra per fomenta talia dissipatio contusorum tentata fuit, vel magnitudo mali nullam benignæ talis resolutionis spem relinquit, tunc suppuratione blanda facta separatior illius, quod corruptum erat, sola superest. Hoc autem vocant digerere Chirurgi, quando irresolubilem materiam in bonum pus convertunt; & digerentia remedia dixerunt illa, quæ humores effusos, vel immeabiles, ad conditionem boni puris deducunt: de quibus dictum fuit in commentario ad §. 207. Sed in capitis vulneribus semper simul attenditur, ne adhibeantur talia, quæ nimia emolliitione nocere possint; hinc a cataplasmatibus abstinendum, quia nimis humectant: sed sumitur terebinthina purissima, vel aliud simile nativum Balsamum, vitello ovi addito frangitur nocturna hic oleosa tenacitas; additur deinde aliquid unguenti basilici, aurei, vel similis; inspergitur deinde aloes, myrrhæ, olivani &c. tenuissimus pulvis: sic habetur digestivum remedium, in quo simul illa sunt, quæ omni putredini efficacissime resistunt; & nervis & membranis nervosis tendinosæ amica semper observantur: hoc plumaceolo exceptum loco afflato applicatur; deinde imponitur Emplastrum aromaticum, quod pariter fovet, & levi stimulo maiorem parum motum excitat, suppurationi pronovenda semper utilem. Omnibus dein his circumponuntur lanei panni fomento penetrabili dissolvente, & simul omni putredini resistente, madidi, curando ut quam calidissime ferri possit applicetur, neque subito refrigerat. Horum omnium formulæ in materia Medica habentur, quæ pro varia vulnerati temperie, & diversâ anni temperate iterum mutari possent.

Ubi autem effusus humoribus infusa membrana cellulosa in magnum tumorem distenditur,



ditur, sæpe suffocatio hic nascitur, & fere gangrenosa facta hæc membrana una cum infarctis humoribus separatur; hæc tunc tuto excindi potest. Videmus enim etiam in aliis corporis locis nudo modo tumere posse membranam cellulosam: v. g. in dorso manus vix ulla adest pinguedo, sed tendines musculorum in tenui membrana cellulosa hærent: tamen orta hic inflammatio sæpe tumor, binos pollices crassitudine æquans, hic observatur, & totum hoc in membrana illa tenui cellulosa hæret: si tunc suffocatio, & aperto loco magnæ portiones gangrenosæ illius membranz exeunt, quæ tunc excinduntur. Idem etiam in capitis lacionibus potest contingere, & similiter membrana hæc una cum extravasatis humoribus corrupta secedit. Non autem hic intelligitur, quod confusa, quæ resolvi non possent, crudeli cura excindenda forent una cum cute regente; noceret enim summo opere tam latam plagam pericranii integumentis suis nudare, quæ non facile secretecerent, sed semper debiliior, & exter-

nis injuriis facilius afficiendus, locus relinqueretur, non sine magno incommodo. Unde sedulo monuit Galenus (*Comment. 3. in Hippocr. de fracturis Tom. XII. p. 254.*), cutim in omni ulcere & vulnere semper conservandam esse, quantum fieri potest: *Nuda enim caro, si sine cute relinquantur, ægre ad cicatricem perducitur.* Huius rei triste Exemplum vidi. Homini sano medius ætatis lata verruca circa frontis lateralem inferiorem partem prone tempora hærebat; cum frustra tentata fuisset variis remediis, peritissimus cæteroquin Chirurgus una cum cute totam verrucam excidit, nec potuit unquam ullis remediis ad cicatricem delatæ ille locus cute orbatus; sed sensim undique retracta plus cute nudabantur supposita, malignum & depascens vicina nascebatur ulcus; unde misere perit. Nec mirum, cum solum pericranium nudo ossi incumbens non videatur sufficere ut tantum perditæ substantiæ regeneret. Unde tantum hic agitur de membrana cellulosa infarsa & corrupta, quæ tuto tunc abscindi potest.

§. 248. SI adsit malum ( 244. ), dilatare cultro, & deputare opus ( 238. 207. 208. ).

Tota enim magnitas talis vulneris in eo consistit, quod effusi humores, densa capitis cute coerciti, nec potentes exire per angustum nimis vulneris orificium, viam sibi querant per tunicam cellulosam; vel morâ corrupti pericranium, & ipsum cranii os, male afficiant. Dilatato ergo vulnere exirus patebit extravasatis humoribus, & idoneis remediis poterit deputari locus. Cognoscitur tale malum adesse, si angusta vulneris sit apertura, & integumenta vicina vacillant, si digito tangantur, & tumeant, & si febris prehenderit vulneratum, cujus nulla alia causa invenitur.

Nec ullum periculum hic est, ne ledantur tendinosæ expansiones, nam omnis ille tumor in tunica cellulosa hæret, quæ tuto una cum cute discinditur: & innumera observata docuerunt, tuto non solam cutim sed & omnia integumenta ad os usque discindi posse, ubi hoc requiritur.

Hippocrates, dum recenset capitis vulnera, quæ sectionem postulant, enumerat & illa, quæ non satis idoneam habent longitudinem & latitudinem, quæ perspicui possint, numquid or a telo male afficiam fuerit &c. &

*ubi vulnera obliquam quandam cavitatem habent, carum illud late incidere oportet &c. & ubi vulnera orbiculata & admodum curva fuerint, ejusmodi quoque incidere oportet, ut circulari plaga in longum bisariam divisa vulnus longum efficiatur ( Hippocr. de vulner. capit. c. 18. XII. pag. 123. ).*

Quantum autem levamen symptomatum fiat, dum in tali casu sectio in tempore instituitur, constat Exemplo §. 247. memorato. Postquam autem dilatatum vulnus est, tunc illa digerentia, quæ paragrapho precedenti laudata fuerunt, applicari poterunt; & de vulnerum depuratione §. 207. 208. dictum fuit. Sola autem dilatio vulneris, quæ cultro fit, hic bona est: illa enim quæ spongiis, vel similibus siccis corporibus, absorptu humorum tumebatibus, perficitur ( vide §. 238. ) noceret plerumque, quia per aliquot horas obturatur his sic vulneris orificium; ut nihil exire possit: unde sæpe emphysema, & alii tumores nascerentur. Præterea confusio & inflammatio major in vulneris labiis sunt: quæ postea diutius protractam suppurationem requirunt, antequam consolidari iterum poterunt.

§. 249. **P**ericranio laeso, ut nudet diu os, vel ut putrescat, os privatur valis periossei, adeoque & suis, stagnat in his liquor, putrescens squamam separat, unde os flavum, fuscum, nigrum, tandem foliolum deponit.

Postquam actum fuit de vulneribus capitis, quæ sola integumenta communia lædunt, sequitur, ut examinentur illa mala, quæ fiunt ideo, quia Pericranium læsum est. Uti ossa reliqua in toto corpore peculiari membrana teguntur, quæ satis arcte adhæret; sic & cranii os tale involutum habet, quod Pericranium vocatur. Demonstravit injectionibus Anatomicis Ruyschius (*Theſaur. Anatomic. I. n. 3.*), innumera vasa per hanc membranam dispergi, quæ ramis emissis subiecto ossi inferuntur, illique ad vitam & nutrimentum necessarios humores præbent. Per hæc vasa emissâ arctâ fit cohesio Pericranii cum cranio; unde & hac membrana avulsa ab ossis subiecto, in vivo animali, puncta plurima rubra in osse apparent. Non poterit ergo Pericranium lædi, quin destruat magnus horum vasorum, ad os tendentium, numerus. Sed extrema abrupta vasorum, in ossis detecti superficie externa, poterunt retexere iterum similem membranam in illo loco, ubi os Pericranio suo nudatum fuit: communi lege, qua omnia perditâ vel separata in vulneribus recrevunt, ut ante dictum fuit §. 158. nu. 10. & §. 190. & 191. Ubi vero diu nudatum fuerit os, & imprimis si aer libere accesserit, teneritima illa vasorum extrema destruantur, & fiunt penitus inepta, ut retexant similem perditæ membranæ fabricam. Extrema ergo illa ossis superficies, vitali influxu liquidorum orbacha, moritur, nec unquam poterit recrescere cum partibus vivis: unde natura tunc molitur per vasa viva supposita mortui & corrupti separationem a supposita parte vitali & sana, & squamulam illam mortuam protrudit; qua separata, recrescit ex osse ipso, & vicina membrana adhuc integra, novum Pericranium. Signum autem ossis sic affecti est mutatio coloris, qui in ossibus sanis subrubescens leviter, vel & in multis locis ex albo subcæruleus habetur. Oritur tunc in loco affecto color flavus, sensim obscurior factus, & in fuscum degenerans, tandem nigrescens, & ultimo corrupti ossis squamula separatur. Quo jam ossis color a naturali magis vergit in nigredinem, eo plus

in corruptionem tendit; uti evidenter patet in dentibus: illi enim a quacunque causâ male affecti incipiunt subcærulescere, margaritarum fere æmulum colorem, perdere, & sæpe primo pallent, dein flavescunt leviter, sensim magis sulci fiunt, tandem nigrescentes frustillatim decidunt. Constat jam accuratissimis observatis, ossa cranium constituentia in sætu olim fuisse membranas cartilagineas, in quarum medio ossis primum rudimentum inchoatur, radiis ossis ab hoc centro per omnem ambitum diffusis: sicque primo interna tabula ossis cranii, vitrea dicta, producitur. Deinde radii illi ossis, sive fila illius reticuli, ab exteriori parte sensim lateſcunt, & erigunt bracteolas, inter se diversas magnitudine, figura, positu; ex quibus diploe cranii exoritur. Vertices denique harum bracteolarum quibus diploe constat, quasi retunduntur, ac deinde lateſcunt, alique super alios squamularum instar inclinati confluent in unius lamellæ inæquabilis speciem, quæ tabulam cranii anteriorem constituit. Utraque dein tabula crassior fit & solidior: nam & intumescunt radii illi ossis & bracteolæ, & novæ crustæ accedunt. Ex hac ossium cranii genesi, non ex hypothese sed ad ipsam naturam descripta a Celeberrimo Albino (*Bernard. Siegfried Albini Or. leones ossium factus Or. pag. 66 & 7.*) (quem in Anatomicis præceptorem habuisse magnam felicitatem duco; & gratus semper recordabor) patet, lamellatam fabricam esse ossium bregmaticæ, occipitis, frontis, temporum, quæ imprimis a vulneribus capiti inflicti lædi possunt; unde vitium a Pericranio læso superioribus lamellis ossis succumbentis communicari poterit, & plus minusve suppositis lamellis nocere. Et admodum verosimile videtur, inter singulas lamellas vasa decurrere, saltem in illa ætate, quando nondum adeo magnam soliditatem acquisiverunt ossa; forte postea procedente ætate, uti alia plurima in corpore vascula, sensim obliterantur. Confirmant hanc rem observata quædam, ubi partes os constituentes, per morbum omni dimensionis auctæ, exhibuerant pulposam talem & mol-

& mollem vascularem fabricam. Infantis enim trium quatuorve annorum ossa cranii fere ubique habebant septem vel octo linearem crassitatem; mollia erant, & pressis exsudabat sanguis & lymphæ satis magna copia: simul & vasa sanguinea admodum conspicua apparebant (*Académie des Sciences l'an 1734. Hist. pag. 60.*). Hanc rem pariter videtur agnovisse Hippocrates dicens: *ac totum capitis os, excepta parte infima atque suprema admodum exigua, spongiosa simile est. Et habet os in se multas carnes humidæ similes, quas si quis digitis conterat, ex ipsis sanguis prodit. Infans quoque in osse venula tenues carnes sanguine plenas.* (*Hippocr. de Capis. vulner. cap. 2. Tom. XII. pag. 116.*). Lamellæ ergo, omni vitali influxu humorum privata, separabuntur vi vasorum inter lamellas medias decurrentium; saltem si hæc jam archibus ad se compressis lamellis ossis obliterata fuerint, illa vasa, quæ ex molli illa spongiosa parte, inter binas cranii tabulas media, quam diploen vocant, in os tendunt, hoc face-

re poterunt. Inde forte senibus difficultas separantur ossæ lamellæ corruptæ, & simul utilitas methodi §. 252. describenda deduci poterit.

Licet ergo, osse Pericranio suo nudato, si finis insignis mutatio coloris apparuerit, expectanda sit separatio lamellarum corruptarum per exfoliationem Chirurgis dictam, ramen rarus casus docuit, aliquando & sine hac, (rarissime forsitan) curam absolvi. Vir ab equo in capite percussus, in terram tanquam mortuus cecidit, cum tanta ulterius ossis *Uncipitis* denudatione, ut Imperialis tegendo vix sufficeret. Hac ossis denudatio in totum nigricabat, circulo excepto, qui cuti proximus straminis latitudinem obsidebat. Hoc circulo albo de die in diem diminuto, pateris convalescit, sine ulla visibili ossis separatione, aut raspatorii usu &c. (*Fred. Ruysch. Observat. Anatom. Chirurg. Centur. Observ. V.*). Forte minima pars superficiei ossis affecta non forma squamulæ, sed minutissimis particulis separata, sensum cum pure abscessit.

§. 250. **C**ujus causa (§. 149.) interrupta vasorum continuitas, frigoris aeris constringens, & exsicicans fines vasculorum in osse; falso accusata ejus malignitate.

In generali vulnerum historia dictum fuit §. 149. hæc per vulnus omnes illas actiones, quæ pendunt a partium, nunc per vulnus separatarum, integritate, & a determinato fluxu liquidorum per vasa. Sed Pericranii usus erat vasa ad os deferre, & redeuntia ab osse accipere; quod imprimis in Peristoto satus artificiosa impletione vasorum apparet. In hac enim ætate numerosiora longe vasa in hac membrana inveniuntur, eum plurima procedente ætate occalescant, & deleantur (*Bernard. Siegf. Albin. &c. Icones ossium satus &c. pag. 160. fig. 162.*). Destructo ergo Pericranio tollitur vasorum continuitas, unde vita & nutritio partium pendet: morietur ergo illa ossis pars, quæ sic omni vitali influxu humorum privata, & separabitur a partibus vivis suppositis.

Quia autem Chirurghi semper observant, ossis superficiem, pericranio suo nudatam, non posse diu exponi aeri, quin ossis corruptio & exfoliatio sequeretur, cum e contra os, quamvis Pericranio nudum,

si ab aere statim defensus foret, sepiissime sanetur sine ulla separatione; crediderunt in aere aliquid hærrere maligni, quod ossa corrumpere. Verum quidem est, in aere posse hærrere plurima, quæ non tantum ossibus detestis, sed & omnibus vulneribus nocent; uti, dum in nosocomiis plurimi in eodem loco decumbunt, tuncque putridis exhalationibus inquinatus aer difficilem curam vulnerum reddere observatur. Sed hæc sunt ab aere proprie dicendo distincta, licet in aere hæreant. Videtur autem aer libere ossa nuda alluenti insolito frigore, & illa proprietate, qua humida attrahendo corpora exsiccat, abrupta extrema vasorum in superficie ossis sic exsiccare & constringere, ut humoribus transmittendis omnino reddantur impervia; unde reliqua omnia mala sponte sequuntur, uti dictum præcedenti paragrapho. Unde Hippocrates nullam aeris malignitatem inculavit, sed dixit simpliciter: *Frigidum inimicum ossibus, dentibus, nervis &c.* (*Aphorism. 18. Sect. V. Tom. IX. pag. 204.*).

§. 251. **E**ffectus vero, augmentum malorum (249.)

Dum superior squamula ossis, vasis suis privata, corrumpitur, vitium hoc succumbenti immediate ossis parti facile communicatur; sique per totam ossis cranii crassitiem pergere poterit ad diploen usque,

illamque corrumpere; quod malum dein internam cranii tabulam, vitream dictam, attingere; poterit, vel inter binas osseas tabulas cranii prosperpens in diploe pessima mala facere.

§. 252. **C**uratio fit. 1. os leviter parva terebra diversis, vicinisque, locis usque ad medium perforando, unde exfoliatio caveatur, periosteum inde renascitur. 2. inde arcendo pus, faniem, pinguis, aquea; aerem, applicatis plumeolis sp. vin. Mallichino imbutis. 3. raro, & citissime deligendo.

1. Ubi signa docuerunt, cranii os pericranio suo nudatum, aerisque libero accessu sic mutatum fuisse in sua superficie, ut omnis vitalis morus humorum in parte sic affecta suffocatus fuerit, necessario illud mortuum separari debet a partibus vivis, quibus cohereret, antequam tale vulnus curari possit. Sed totum hoc separationis opus per vasa viva, mortui parti supposita, perfici debet, quæ motu suo & continua quasi arietatione partem ossis mortuam separant & expellunt. Pulchre hoc notavit Hippocrates (*De Capitis Vulner.* cap. 27. Tom. XII. pag. 126.) dicens: *In capitis vero vulnere os, quod ab alio quovis osse abscissum est, sive teli vestigium in osse relictum sit, sive aliquando plurimum nudatum sit, plerumque abscedit, ubi exsurgit redditum fuerit (ἀφίσταται ἐκ τοῦ οὐλοῦ ἐξαιρούμενον) & postea addit: ideo ab alio osse vitam & sanguinem habente potissimum solvitur, & exsurgit & sicum factum a vitam & sanguinem habente valde abscedit.* Sed si hoc opus naturæ permittatur, lente admodum procedit, & quadraginta dierum, imo & aliquando longiori temporis spatio, solet perfici. Tot enim diebus observantur margines foraminis, per trepanum excisso osse confusi, separari, (vide §. 294.). Sed hoc temporis intervallo plurima possunt accidere mala tali vulnere, & vitium ossis potest subjunctis laniellis communicari, siquæ augeri malum. Imprimis in Nosocomiis publicis decubentes pessime plerumque solent affici, si diu cogantur ibi manere; uti Chirurgi fere omnes, qui Nosocomiis præfuerunt, testantur; omniumque maxime funestum hoc observatum fuit illis, qui capitis vulneribus decubebant. Unde pulchrum illud erit in arte inventum, quo poterit separatio corrupti ossis a sano accelerari.

Tentaverunt hoc scalpris radendo, cauteriis urendo &c. sed sic semper abrasa vel usta superficies iterum separari debet. Tota separatio mortui, uti dictum fuit, pendet ab actione vivæ partis suppositæ; omne ergo illud, quod viam faciet vivis subjunctis, ut emergere possint sub hoc tegmine corruptæ partis, accelerabit hanc separationem. Optima ergo methodus hæc est, ut leviter & parva terebra os nudatum perforetur minutis, & satis sibi vicinis foraminulis ad diploen usque, ubi certi sumus vasa viva copiosa & satis magna hæzere. Hoc fecerunt vel pyramidalis apicis trepani perforativi dicti; vel & pulcherrimo cum successu factum vidi, dum acus vulgaris apex in parvum cuneolum formabatur, qui apto manubrio firmatus digitiis rotando circumactus rotundum foraminulum in osse sic facit. Dumque hoc plurimis in locis satis vicinis fit, vasa viva supposita, incumbente tegmine libera; emergunt per hæc spiracula, retexunt novum periosteum, & sæpe feliciter sine ulla desquamatione sanatur tale vulnus. Præterea vasa, inter lamellas ossis media, per easdem aperturas emergere possunt elongata, & separare sic ossis squamulam corruptam incumbientem. Pulcherrimi successus probaverunt huius methodi utilitatem; & peritissimus Chirurgus, *Belliste*, cui hoc inventum debetur, vel qui saltem primus accurate descripsit, testatur, se plurimis in casibus felicissimas sic perfecisse curas, & in pulcherrimo, quem scripsit, tractatu, bina recenset exempla, quæ in Nosocomio publico coram plurimis testibus hanc rem confirmaverant.

Militi globus tormento majori bellico explosus abstulerat integumenta capitis communia, osse illaeso, sed pericranio sic confuso,

tulo, ut penitus livefceret. Unguibus laceravit pericranium, & os subjectum nudavit, dein subtilissime os leviter sic terebravit pluribus locis. Post bideum soluto apparatu os subrubescens apparebat; & post aliud bideum plus quam dimidia pars ossis nudati, renato novo Pericranio, testā apparebat; & post septimum diem tota ossis superficies jam erat testā omnino, totumque vulnus octodecim dierum spatio consolidatum fuit. Alteri militi, casum inflicto vulnere ossi bregmatis sinistro, ctanium satis amplo in loco nudatum erat: octo vel decem parvis foraminulis secunda vulneris deligatione perunditur os nudum, sic tamen ut non penetrarent ad diploen usque, reliqua fiebant omnia eadem ut in priori casu. Post bideum detecto vulnere os jam incipiebat subrubescere, & per foraminula facta apparebat jam aliquid exurgere: post octiduum jam os tectum apparebat nova membrana, & tota tam ampli vulneris curatio septemdecim diebus absolvebatur (*Le Chirurgien d'Hôpital &c. par Mr. Belloste pag. 75. 79.*).

Ex his binis casibus utilitas hujus methodi satis evidenter apparet, & patet, tantum requiri huc, ut per artem via concilietur libera vasū vitalibus suppositis, ut emergere possint. Ultimo autem exemplo constitit, non semper requiri, ut ad diploen usque os perforetur, sed, levi tantum apertura facta, vasa inter ossis lamellas media sufficere aliquando posse, ut regenerent petiticinium perditum; cum moveat in loco citato peritissimus ille Chirurgus, quod de industria hoc tentaverit, ut certus esset, an levis talis ossis terebratio ad hunc scopum sufficere posset. Ubi veto muratus ossis nudati color in flavum, vel magis fuscum, docet, corruptionem ossis profundius penetrasse, perrerebratio ossis ad diploen usque necessaria erit, ut vasorum satis magnorum hic harentium vi fiat separatio corrupti ossis, & regeneratio novi Pericranii.

An non videtur probabile, quod jam apud Hippocratem pulcherrimæ hujus methodi vestigium reperiat? dum dicit (*Hippocr. de Capitis vulner. cap. 30. Tom. XII. pag. 127.*): *Verum oportet, ubi os carne nudatum fuit, attenta mente conari distinguere, si non possit oculis videri & cognosci, num os fissum sit & collisum; an collisum tantum; vel num ad teli vestigium accesserit collisio vel*

*rima, vel utrunque. At siquid locum senserit os, exigua terebra osse perforato sanguis detrahendus est, subinde adhibita cautione, quod os juniorum tenuius sit &c.* Certe simul ac ad diploen usque penetraverit terebra, sanguis erumpet, uti notum est: & viderit satis patere, quod in hoc loco non agatur de osse excindendo pro trepanum, sed de levi tantum perrerebratione parvo trepano facta, donec sanguis exeat, id est donec ad diploen penetraverit.

2. Observata omnium Chirurgorum, qui de vulneribus capitis curandis scripserunt, in hoc conveniunt, quod omnia pingüia, omnia aquosa humectantia noceant vulneribus capitis, uti dictum fuit §. 245.

Longe magis ergo ab his cavendum, ubi os nudatum fuerit, & tenerrima vasa per hæc foraminula facta incipiunt pullulare; aquosa enim tabescere facerent adeo pulposa hæc vascula, oleosa obstruerent eadem & redderent impervia. Imo ipsum pus, ex integumentis vulneratis natum, si nimis copiosum allueret, vel diutius retentum & attenuatum acrius fieret, lædete posset tenerrimam hanc nascentium vasculorum compagem; unde prudentissime detergi debet, mollissimis linteis carptis, ne lædantur hæc tenerrima vascula. Aerem pariter arcedendum esse, ne frigore insolito vel excitatione destruat eadem hæc vascula, ex antedictis satis patet. *Belloste* in loco citato plumaceolum ex linteo carpto spiritu vini madidum applicabat ossi nudato; deinde huic imponebat leve digestivum, quod sic os non tangebatur, sed labiis vulneris integumentorum proderat. Sic aer arcebat, omnis putredo præcavebatur, & toborante vi spiritus vini impediabatur, ne in fungosam excrescentiam degeneraret pulposa hæc & tenerrima vascula. Optimo cum successu mastiches, olibani, saccolle, myrrhæ, colophoniz & firmitium tenerrimum pollicem ossibus nudatis inspergi constat, quæ crusta balsamica tegunt, nec tamen pinguedine nocent; interim pulcherrime defendunt ab aere & omnibus liquidis in vulnus affusus partes suppositas. Eodem cum fructu horum palvis in spiritu vini debiliore coctus (alcohol enim combureret illico hæc vascula) plumaceolis excipitur, & ossi nudo applicatur.

3. Nihil enim hic magis metuitur, quam liber aeris accessus, qui frigore & excitatione

tionem omnibus vulneribus, sed imprimis capiti, nocet. Unde rara deligatio adeo commendatur in his casibus. *Bellosie* in exemplis modo citatis primum apparatus per biduum relinquebat, & postea tantum singulis tribus diebus renovabat. Si ergo nullus pruritus, nec maior calor circa vulnus sentiantur, nullus adsit fœtor, nihil saniosi exeat, tunc sine deligatione relinquatur tale vulnus. Ubi vero novus apparatus applicari debet, fiat hoc citissime: mollissimis plumaculis lenissime appressis imbibatur pus, mox ap-

plicentur eadem, & regatur vulnus: curiosa enim & diuturna talis vulneris inspectio, & imprudens deterfio rudius facta, destruent mucum illum hic hærentem, qui nil nisi vasculorum renascentium compages est. Pulcherrime prodest, si, antequam detegatur vulnus, utrimque ponatur testula vivam prunam accensam continens, cui succini, mastiches, olivani vel simulum suffumigiorum pauculum inspergitur; sic tepida atmosphæra, gratissimo roborante aromatico fumo dives, undique detectum vulnus alluet.

§. 253. **Q**ua arte ex punctis fodicatis (252.) & undique, emergit nova substantia quasi camea cito, tumque reliqua (249.) sanantur, ut dicitur, (245. 246. 247. 248.).

Qua significatione ex punctis terebratis enascens substantia caro dicatur, explicatum fuit §. 158. N. 9. *Bellosie* (*Chirurg. d' Hospital pag. 78.*) qui tam nitide omnia descripsit, quæ ad hanc methodum pertinent, apta satis phrasi dicit, foramina ossis post secundum diem incipere germinare (*germer*). Incipit enim ex his foraminibus elevari sensim mucus quasi, qui microscopio lustratus tenerissima vascula exhibet; imo & arteriolarum motum in hoc muce distinguere licet. Vasculosa compages per hæc foramina emergens, simili substantiæ ex vicinis foraminibus ascendenti occurrens, reexit perditam membranam, & quidem tam cito, ut septem dierum spatium cranii partem nudatam, quæ florenti circiter amplitudinem æquaret, testam iterum observaverit *Bellosie* in exemplis præcedenti paragrapho citatis.

Quatuordecim jam elapsi sunt anni, cum in raro satis casu occasionem habui accurate examinandi pulpam illam vasculosam per facta sic in osse foramina emergentem. Homini quinquagenario, in febre acuta continua, metastasi subita unius noctis spatium siderabatur pedis dexteri pars extrema tota ad illum circiter locum usque, ubi metatarsi ossa cum tarsi ossibus contigua sunt. Pars adfecta sphacelo perfectissimo correpta erat sic, ut ad ossa usque adacto scalpello nullus doloris sensus nasceretur, nihilque sanguinis exiret. Applicatis remediis, quæ partem mortuam a putredine servarent, & viva sic moriunt, non prosperaret minax malum, tam felix fuit successus, ut dissolveretur sphacelus, & quinque diebus elapsis

ciena, vivas partes separans a mortuis, apparet, quæ curæ spem non exiguam peiora hæcenus omnia merentibus dabat. Postquam integra separatio corrupti a viva parte facta fuerat, tendinibus tenacissimis forfice resecis a dexterrimo Chirurgo, separata fuit tota pedis pars anterior & ex periculossimo morbo evasit ager hac parte mutilatus, adhuc hodie superstes. Tuncque apparebat manifeste ossa tarsi, quæ metatarsi ossibus sphacelatis contigua fuerant, contraxisse non exiguam labem. Satis enim notabilis horum pars, extra æquabilem mutilati membri superficiem prominens, nigra penitus novas parabat molestias. Tenui ferra rescissum fuit de ossibus corruptis, quantum sine læsione partium incumbendum poterat tolli. Sed & sic ossium horum superficies mortua manebat, & separari debebat, antequam bona cicatrice claudi posset vulnus.

Minutis tunc cuneolis peritissimus Chirurgus terebravit totam hanc corruptorum ossium superficiem, plurimis & satis sibi invicem vicinis locis: & jucundo spectaculo vidimus post biduum singula hæc foramina humescere, deinde microscopio infipientibus distinctissime apparuit, micare in omnibus his punctis vascula vera systole & diastole, quæ perfecte respondebant ægroti pulsibus eodem tempore in manuum carpi exploratis. Unde evidenter nobis constitit, emergentem hanc ex foraminibus factis substantiam esse veram vasculosam compagem.

Ubi autem hac methodo nova membrana os nudatum testum fuit, reliqua sanatio perficitur, uti dictum fuit in numeris hinc citatis.

§. 254. **S**i Calvaria læsa est, pro varietate causæ, fissæ, fractæ, contusæ, intro-pressæ, vel evulso fragmento spoliata erit, atque hæc vel in una, vel in utraque ejus tabula.

Postquam consideratum fuit, quid acciderit integumentis communibus & Pericranio læsis, nunc agendum est de vulneribus capitis, quæ ipsum calvariæ os lædunt; & primo recensentur hæc paragrapho varii modi, quibus cranii os læsum fuisse observatum est, pro varia figura instrumenti lædantis, ejusque majori vel minori impetu.

**FISSA.** Fissura dicitur solutio continui in osse, oblonga ut plurimum, angustissima plerumque, & cum aliqua adhuc partium cohesione. In his fissuris jam magna varietas obtinet, pro magnitudine varia, recto vel obliquo decursu, pro varia ossis cranii parte, quæ occupant: quedam enim in externa tabula hærent, aliæ vero in interna cranii tabula, quamvis externa integra appareat. Aliquando & fissura non est in loco, cui instrumentum lædens applicata fuerit, sed in alia & sæpe opposita calvariæ parte; vocatur tunc contrahissura. Qualia exempla plurima habentur apud auctores. Sic Tulpus (*Observat. Med. Lib. I. cap. 2.*) narrat, hominem sclopeto in capite ictum, frustra statim etiam perforata calvaria, sexto die periisse. Post obitum calvaria, quamvis foris illæsa appareret, ostendit tamen intus varias fissuras. Parçus (*Lib. X. cap. 8.*) binis exemplis hanc rem confirmat. Homini lapidis ictu valida contusio & tumor cum parvo vulnere in bregmatis osse dextro facta fuerat: Dilatato vulnere os subiectum apparuit integrum, & vulneratus periit vigesimo primo die post insitum vulnus. Post mortem, serra resecto cranio, apparuit oppositi lateris bregmatis os fissum fuisse. In alio Nobili viro post validam contusionem capitis, quamvis galea tecti, mortuo apparuit tabula cranii interior fracta, sic ut fragmenta abrupta cerebri substantiæ infixæ hæserint, licet externa cranii tabula omnino integra inveniretur. Hippocrates jam hoc notaverat, & postquam varios modos, quibus calvaria lædi posset, recensuit, addit ultimum, quando nempe os læditur alia capitis parte, quam qua vulnus est; & dicit, huic calamitati nullam superesse medelam, quia non potest deregi, quam in parte capitis hæreat (*Hippocr. de Capit. vulner. cap. 10.*

*Tom. XII. pag. 119.*): unde Celsus (*Lib. VIII. cap. 4.*) dixit, *si graviter aliquis percussus est, si mala indicia subsequuta sunt, neque ea parte, qua cutis discissa est, rima reperitur, non inconmodum est, parte altera considerare, num quis locus mollior sit & tuncat, illumque aperire, siquidem ibi fissum os reperietur.* Nec tamen magno negotio cutis sanescit, etiam si frustra facta est. Incerta tamen hæc omnia sunt, cum sæpe osse, sed non in ipso vulneris loco tamen, fissura inventa fuerit. Sic homini fuisse percusso in fronte prope supercilium dextrum, & inde mortuo, nihil erat in loco vulneris mutatum in osse, sed in oculi dextri orbita contrahissura apparebat festuipollicaris longitudinis versus sellam Turcicam tendens (*Job. Boh. de renuntiæ. vulner. pag. 142.*). Imo aliquando observatum fuit, fissuram ex vulneris loco directam fuisse ad alia etiam capitis ossa. Talem casum narrat Ruyschius (*Observat. Anatom. Chirurg. Contin. observ. 47.*), ubi a validissima contusione ossis bregmatis sinistri fissura per totum os pergebat, deinde per suturam squamosam ossis temporum, totum os petrosum, & os occipitis, usque ad magnum hujus ossis foramen, quod medullam oblongatam transmittit. Ex quo casu simul apparet, futuras non impedire, quo minus fissura in quodam cranii osse facta propagari posset ultra hujus ossis limites, uti multi voluerunt.

**FRACTA.** Differt fractura calvariæ a fissura, quia in fissura proprie dicenda superest adhuc aliqua cohesio, in fractura autem integra obtinet solutio: unde fissura angustam in osse rimam facit, fractura majorem separationem partium antea unitarum supponit. Potest jam fractura talis esse, ut fragmentum a reliquo osse liberum sit omnino, poterit & quadam sui parte adhuc unitum manere. Si integra talis solutio facta fuerit pro causam vulnerantem, fere semper fragmentum liberum intropremitur, & cerebrum lædit. Potest etiam ad fracturam referri illud, quod Hippocrates vocavit sedem sive teli vestigium (*Idem*), dum v. g. acinacis ictu vulnus insitum discissis calvariæ integumentis omnibus ipsam

os laesit. Dicit enim (*Hippocr. de capit. vulner. cap. 9. Tom. XII. pag. 119.*): *sedes (teli) autem dicitur, cum, osse in sua natura permixtate, telum ossi infixum manifestum fuerit, quia infederit; & postea addit, quod Præcisio (᾿Ρακσις), quantamvisque longitudinem & latitudinem ossis occupet, ad teli vestigium referatur, modo alia ossa, quae præcisionem circumambiant, maneant in sua natura, neque una cum præcisione desint* (intropremantur). Tunc enim voluit, non amplius teli vestigium dicendum esse, quando os undique solum mutat locum & intro subsidet, sed vocavit tunc *᾿Εγχαλοῖ*: quando nempe os abruptum undique introcedit (*Ibid. cap. 8. pag. 118.*).

**CONTUSA.** Quando nempe a gravi & obtuso instrumento calvaria læditur sic, ut nulla rima tamen nec fractura appareat. Sicut enim confuso partium mollium plurima vasa frangere potest, integra manente cute; sic etiam idem in osse confuso obtineri potest, quod nempe vasa inter lamellas ossis media lædantur a confusione, licet integrum omnino os appareat. Difficilis cognitio huius mali sæpe, nisi sero, ubi malignis symptomatibus ortis os pessime affectum fuisse cognoscitur. Hoc malum *᾿Θάσειν* vocavit Hippocrates, & simul monuit, non posse oculis dijudicari, an plus minusve ossis substantiam læserit confusio, an magis vel minus profunde penetraverit talis læsio (*Ibidem cap. 7. pag. 118.*). Si enim vasa dispersa per diploem, inter binas tabulas ossis calvarie mediam, tali confusione fracta fuerit, integro quamvis osse, facile patet, ab extravasatis & corruptis humoribus pessima produci posse mala, erodi posse

internam tabulam, & vitium sic communicari posse meningibus & ipsi cerebro.

**INTROPRESSA.** Fit hoc duplici modo: vel enim ossis pars fracta, & undique libera a vicinis ossibus, subsidet; vel os, integrum manens in sua cohesione, intropremitur. Quod imprimis in juniorum calvariis ab obtusa causa vulnerante accidit: in his enim ossa magis flexilia adhuc cedunt facilius sine ruptura. Tamen & talis intropressio in adultis observata fuit. Ossa enim cranii in homine vivente humida, & longe minus friabilia sunt, quam quidem in scetere eadem, ossa exsiccata apparent. Rarius tamen in adultis observatur talis intropressio, quin simul rima vel fractura adsit.

**VEL EVULSO FRAGMENTO SPOLIATA SIT.** Quod sæpe casum inflicto vulnere fit, quando nempe una cum integumentis ossis portio instrumentum vulnerante abscinditur. Vocaverunt tunc dedolationem cranii: qualem casum habet *Scutellus* (*Armamentar. Chirurg. Observ. XVII. pag. 214.*) ubi ad magnitudinem Thaleri Imperialis fragmentum calvarie ablatum fuerit, & scilicet tamen curatus fuit vulneratus. Constitit pariter, post validas confusiones capitis, exsiliisse fragmenta ossis de tabula cranii interna, & subiectum cerebrum læsisse: quale exemplum ex Paræo paulo ante in eadem hac paragrapho allegatum fuit.

Omnia jam hæc mala recensita possunt vel solam externam tabulam cranii, vel internam solam, vel utramque afficere: semper autem eo pejore, quo magis versus interiora penetraverint. Longe enim tunc difficiliorem medelam esse facile patet.

§. 255. **S**ic affecta (254.) scitur 1. causa vulneris forti. 2. vulneris magnitudine collata figuræ loci vulnerati. 3. specillo. 4. arramento affuso. 5. strepitu intet-mordendum. 6. visu fracti, contusi, vel punctis pallidis colorati cranii. 7. tactu ipso. 8. symptomatibus integumentorum; carne circa septimam diem abscedente, dolore, natura puris tenui, & graveolente, vulneris malignitate aliena.

Quia autem pessima mala sequi possunt calvarie læsionem, uti patebit sequenti paragrapho; ideo omni cura inquitendum est, an calvaria a causa vulnerante aliquam noxam acceperit, an non. Tumultuarii autem in his casibus examen non sufficere novimus, moniti Hippocrates ipso infortunio, qui ingenuè fassus est, se hic deceptum fuisse, dum teli vestigium non distinxerat a su-

tura, uti dictum §. 172. N. 3. De hoc autem constabit sequentibus signis.

1. Patet facile, validum ictum capiti impactum, sive obtuso sive acuto instrumento vulnerante, necessario calvariam ledere. Facilius autem hoc oculis patet, si acuto instrumento dissectis integumentis calvaria detegatur, quam si obtuso telo integra cute, vel parva tantum vulnuscule conspicuo, læsio facta fuerit.

2. De



2. De hac re dictum fuit §. 340. N. 3. In illis enim locis, ubi cranii ossa plana sunt, potest esse magnum vulnus sine ossis lésione; sed ubi magna adest horum ossium convexitas, vel in illis locis, ubi eminentem angulum formant, non potest esse vulnus magnum, quin prominentem ossis partem laeserit, nisi circumtorquendo quasi instrumentum vulnerans vulnus infictum fuisset, quod rarissime fit.

3. Chirurgi periti, dum ad tales vulneratos vocantur, aqua tepida cum vini exigua copia & aliquot falis granulis ablunt leviter vulnus; tunc prudenter deductis labiis inquirunt, an aliqua lésio in osse appareat. Deinde specillum politissimum obtuso apice donatum inmittunt vulnere, quod satis tenue & molle esse debet, quale optimum paratur ex purissimo argento candelacteo, & dein sensim refrigerato. Sic undique perterritando sentiant primo, an os nudatum sit, quod facile ex sonitu specilli ad durum os nescitur: deinde obturando per omnem ossis detecti superficiem explorant, an aliquid asperi occurrat. Ut hoc fiat sine erroris metu monuit Celsus (*Lib. VIII. c. 4. p. 514.*): *specillum oportet esse nec nimis tenue, neque acutum; ne, cum in naturales quosdam sinus incidit, opinionem fracti ossis frustra faciat; neque nimis plenum, ne parvula rimulae fallant. Ubi specillum ad os venit, si nihil nisi leve & lubricum occurrit, integrum id videri potest: si quid asperi est, utique qua suture non sunt, fractum os esse refertur. Unde patet, summopere attendi debere ad loca futurarum, quæ aliquando in variis hominibus, & in varia ætate differunt. Sic futura sagittalis in junioribus os frontis usque ad radicem nasi bifariam dividit, in adultioribus sensim oblitteratur: tamen in quibusdam hominibus satis etiam provectæ ætatis adhuc observata fuit; unde in vulneribus fronti infictis de hac futura cogitandum est. In summo senio sæpe omne futura evanescunt, & aliquando citius. Post pugnam Platzenensem cum in unum locum ossa carne nudata comportarentur, inventum fuit caput nullam futuram habens, sed ex uno osse consistens (*Herodot. Calliope pag. 540.*), imo, & quibusdam observatis consistit, in junioribus etiam aliquando futuras oblitterari penitus. Sic in cranio pueri octo circiter annorum nullum vestigium sagittalis nec coronali suture ap-*

parebat, nec in interna æque ac externa calvarie superficie. Imo & in junioribus adhuc inceptam harum futurarum oblitterationem sæpius observavit celeberrimus *Huinauld*, qui ideo credidit, non adeo raros hos casus esse, ac quidem vulgo putatur (*Acad. des Sciences l'an 1734. Hist. pag. 59.*). Præterea quibusdam locis cranii naturalis est scabrities, uti v. g. in occipitis osse. Et aliquando suture ipsæ miro modo differunt in diversis hominibus: sic v. g. calvariam servo, cuius futura sagittalis prope occiput & frontem angusta penitus erat, sed in vertice miris ambagibus decurrens pollicis fere latitudinem occupabat. Merito hinc in ipso libri sui de Capitis vulneribus initio monuit Hippocrates, *quod hominum capita neque inter se similiter habeant, neque futura capitis omnibus in eodem loco sita sint* (*Hippocr. de capit. vulner. cap. 1. Tom. XII. pag. 315.*).

Sæpe ergo multum adhuc dubii manet, post explorationem specillo factam; & difficillima detectio læsionis in osse, ubi vulnus circa futurarum loca infictum est: quali in casu ipse etiam Hippocrates se deceptum fuisse falsus est: *more scilicet magnorum virorum, & fœdiciam magnarum rerum habentium. Nam levia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt. Magna ingenia, multaque nihilominus habituro, convenit etiam simplex veri erroris confessio, præcipue in eo ministerio, quod utilitatis causa posteris traditur, ne qui decipiantur eadem ratione, qua quis ante deceptus est* (*Celsus Lib. VIII. cap. 4. pag. 515.*).

4. Ubi ex cognita causa vulnerante, & vehementia, qua vulnus infictum fuit, uti & ex pessimis symptomatibus post vulnus inflectionem secutis, vettigine, lapsu, alto sopore &c. metuendum videbatur, quod calvaria noxam contraxerit, & tamen loco detecto, nec oculis nec specillo detegeretur rima vel confusio in osse, voluit Hippocrates alia adhuc methodo lateus forte malum detegere, quod neglectum postea summa faceret mala. Jubet enim medicamento aliquo nigro liquato os obducendum, & vulnus subposito linteo oleo maderfacto, deinde cataplasmate ex maza imposito, deligandum. Postmodum vero soluto vulnere, & depurato os radendum voluit: si enim tunc os fissum vel collisum fuerit, in illo loco nigrum illud manebit, cum reliqua ossis superficies alba

alba apparebit ( *Hippocr. de capit. vulner. cap. 27. Tom. XII. pag. 124. 125.* ). Paret ergo tantum hic requiri, ut coloratum liquidum ossi de cælo impenatur, quo dein iabrafo vel de cælo apparebit, si alicubi os fissum fuerit vel contusum, quia illud coloratum profundius penetrans non poterit abtergi vel teradi tam facile, quam in reliqua ossis nudati superficie.

An vero atramento scriptorio usus fuerit Hippocrates, ex hoc loco minime constat. Celsus tamen ( *Lib. 8. cap. 4. pag. 515.* ) sic hunc locum versasse videtur dicens. *At, si ne tum quidem rimæ manifestæ est, inducendum super os atramentum scriptorium est, deinde scalprio id detradendum, nigritiem enim continet, si quid fissum est.*

Apud Æginetam ( *Lib. 6. cap. 96. versa* ) ramen, ad latentem angustam & capillarem fissuram detegendam, proponitur medicamentum aliquod liquidum nigrum, vel & scriptorium ( *κατακρητὶς καὶ μύχαι ὕψος καὶ αὐτὸς ὑγροῦς ὑγροῦς* ). Præterea & sepius liquore & aliis forte atramenti scriptorii loco usi fuerant veteres. Saltem illud, quod hodie in vulgari usu est, nisi valde dilutum fuerit, minus ad hanc rem convenire videtur, cum vitriolo, galis querquinis, corticibus granatorum & similibus adstringentissimis confect, quæ ossi nudo applicata tenerrima vascula illico sic constringerent, ut postea separari deberet lamella destructis vasculis mortua. Et certe nulla necessitas jubet, ut atramento scriptorio utamur, cum quodcumque aliud coloratum liquidum eundem effectum præstare possit; atque etiam, si color niger magis arderet, ex offibus ad nigredinem combustis, in tenuissimum pollinem tritis, & aqua dilutis, nigram tale liquidum confici posset, uti & ex aliis plurimis.

Præterea videtur fuisse, si os nudum tali liquido tingatur, & deinde iterum spongia detergatur; neque videtur requiri ut abradatur tota superficies scalprio, cum tunc iterum nova separatio superficiei derasæ expectanda sit; uti dicitur §. 266. Sicut jam exploratio per specillum fallere poterat citæ futuras, & in illis locis, ubi naturaliter ossis superficies aspera est, sic pariter & hæc methodus decipere posset, coloratum enim liquidum se insinuabat futurarum interstitiis, & adhærebat calvariz inæqualitatibus.

5. Apud Hippocratem in Coacis Præno-

tionibus ( *Nom. 501. Tom. 8. pag. 881.* ) habetur, quod ubi ambiguum sit, an calvaria rupta sit nec ne, tunc vulneratus debeat asphodeli vel ferulæ caulem inter maxillas prehendere, & manducare, simulque animadvertere, an alicubi calvaria strepitum edere ipsi videatur; fracta enim strepere videntur. Sed facile paret, strepitum talem percipi non posse, nisi satis magna fractura fuerit: certe fissura calvariz hoc signo nunquam cognosci poterit. Tota enim huius signi efficacia in eo consistit, quod musculi temporales, inter mordendum magna vi maxillam inferiorem apprimentes ad superiorem, oriantur lato ambitu utrimque a parte laterali calvariz, quæ fit a processu superiori ossis jugalis, a vicino latere ossis frontis, a processu maximo ossis sphenoidis, ab osse bregmatico, & squamosa ossis temporis parte: hinc dum a'unt hi musculi, si in vicinia intersectionis magna fractura fuerit, poterunt ossa fracta moveri & strepitum edere; cumque tor cranii ossibus diversis inferantur, & satis late pateat horum musculorum ambitus, poterunt fracturæ in pluribus calvariz locis sic cognosci, si nempe satis magnæ fuerint. Solent Chirurgi clavem ferream in ordem lam exhibere vulneratis ob eandem causam; vel & chordam jubent dentibus prehendere, quam dein manu extendunt, & tensam digito percutiunt, & dein jubent vulneratum animadvertere, an aliquem motum vel strepitum in calvaria percipiat.

6. Si nempe sponte vel arte vulnus satis pateat, ut os nudum oculis lustrari possit, tunc rimæ vel fracturæ, si adfuerint, satis apparebunt. Ubi autem sine cohesione separatione os contusum fuerit, hoc difficilius detegetur, quod jam monuit Hippocrates ( *De vulner. Caput. cap. 7. Tom. XII. pag. 118.* ), ubi dictum fuit præcedenti paragrapho.

Præcipuum signum, quod habetur, est, si os naturalem suum colorem mutaverit, qui subrubescens leviter, vel & parum subcærulefcens plerumque est. Si jam punxa pallida intercurrent, signum est, vasa subiecta, quæ pelliculæ utcumque lamellæ ossis colorem dabant, mortua esse, neque amplius liquidis transmittendis pervia; unde separatio lamellæ vas succumbentibus destituta expectanda est.

7. Monendum imprimis hic est, digito-

rum

rum attractum sæpe fallere, sic ut os intropressum credatur, licet nihil talis mali adit. In validis contusionibus integumenta cranii ruditer ad durum os suppositum appressa sæpe sic læduntur, ut plurimis vasculis fractis sub integra cute fiat collectio magna & subita effusio liquidi. Si in tali casu tangatur digito ambitus talis tumoris prope sanam partem, apparet, ac si os suppositum subderet. Ratio hæc est: integumenta cranii satis crassa sunt, & imprimis cutis: hæc autem ab effusis humoribus turgente membrana cellulosa elevatur a subiectis partibus; hinc crassum ambitum talis tumoris cutis adhuc applicata manet subiectis, paulo procedendo ad partem tumorem, cum cutis elevetur ibi, sentitur in margine, qui limitem facit inter partem sanam & locum contusum, ac si os depressum foret, tantum ideo, quia crassa cutis ibi loci elevatur a subiecto osse & Pericranio. Hoc autem sæpe Chirurgos etiam satis peritos fefellerit: imo Ruyschius fatetur (*Observ. Anatom. Medic. Centur. Observ. LX.*), quod digitis explorans ingentem frontis tumorem, post validam contusionem natum, credidisset, cranium impressum esse, uti præsens Chirurgus volebat; nisi multiplici experientia didicisset, attractum in tali casu sic fallere posse.

8. Ex his signis quidem noscitur, cranium læsum esse, sed sæpe nimis sero; cum pessima symptomata sæpe præter opinionem Medici & Chirurgi tunc orta egrum de medio tollant. Quando sine læsione calvarie vulnera infecta fuerunt, si observentur illa, quæ dicta fuerunt §. 245. & 252. sanantur sæpe satis cito, licet maxima fuerint. Ubi autem calvaria læsa fuit, nec tamen per modo recitata signa hoc cognosci potuit, tanquam simplex capitis vulnus solet tractari, & primis diebus sæpe omnia satis bene procedere videntur. Interim os subiectum læsum incipit corrumpi, integumenta ab osse affecto abscedunt, dolor augeatur, puris cocti nihil apparet amplius, sed tenuis tantum & sæpe satis olidus ichor, vulnusque ad omnia etiam optima remedia rebelles latentes mali certam notam exhibet. Omnia autem hæc symptomata serius vel citius accidunt, pro varia mali magnitudine, vulnerati temperie, & imprimis majori minori aeris calore. Pulchre hæc omnia notavit Hippocrates (*Coac.*

*Prænot. num. 501. Tom. VIII. pag. 831.*). Postquam enim signa recensuit, quibus calvarie fractura posset cognosci, addit: Progressu vero temporis fracta partem septimo, partem decimoquarto, partem etiam aliter significationem præbent. Nam & carnis ab osse abscessus fit, & os lividum, & dolores, ichoribus effluentibus. Hæc autem ægre jam auxilium admittunt. Et alibi (*De capit. vulner. cap. 31. Tom. XII. pag. 127.*) ubi signa recenset, quæ docent peritulum esse ex capitis vulnere hominem, dicit: si os fractum, aut fissum, aut contusum fuerit &c. neque per errorem raseris aut secueris, tanquam sectionem non postules, sed sanum os existat, ante decimum quartum diem hyeme plerumque febris invadit, æstate vero post septimum. Et ex illo paucus ichor effluit, &c. quod in eo inflammationem est, moritur: ubi illud contingerit, & ulcus decolor fit & glutinosum, & apparet inflar salsamenti (ὡς πικρὰ πηξ) colore fulvum, sublividum, & os deinde corrumpi (σκαυδιζέται) incipit, & nigrescit, leve existens, ad extremum autem subpallidum & exalbicans evadit. Cum vero iam purulentum existerit, pustule in lingua exoriantur, & delirans moritur. Omnia sic accuratissime in his locis Hippocrates descripsit. Quamdiu enim labia vulneris rubent, parum etiam inflammata, non multum mali metuunt Chirurgi periti; sed ubi vivus ille color perit, & incipiunt vulneris labia habere talem colorem, quem habent carnes emarcidæ, vel sale diu conditæ, norunt satis, pessima instare mala. Ideo post Hippocratem Medici peritissimi (uti dictum §. 240. num. 4.) graviora etiam mala, statim post vulnus capiti infectum apparentia, non adeo metuebant: sed quæ postea apparerent, & imprimis circa septimum diem, adeo damnabant.

Ob eandem causam valde lethale dixit Hippocrates (*Prophet. Lib. II. Tom. VIII. pag. 818. 819.*) in capitis vulnere febrem quartam, septimam, aut undecimam die incipere.

Cum ergo ossis Cranii læsionem, etiam satis levem, plurima & gravissima sequantur mala sæpissime, de quibus dictum fuit, uti & illa, quæ sequenti paragrapho enumerabuntur, patet, omni cura inquirendum esse, ut hoc in initio detegatur, & curetur; signa jam recensita sunt, quorum plura imprimis se concurrant, satis firma diagnosi habetur. Illa autem, quæ ultimo

hujus paragraphi numero recensentur, cer-  
rani quidem dant notam, os laesum esse, sed  
tunc saepe ferro nocitur malum, quod latuit  
hactenus, quod citius cognitum modelam  
accipere potuisset.

Et ex hactenus dictis patet, quare periti

§. 256. **E**ffectus hujus mali (254.) 1. partis ossæ separatae mors. (249. 250.  
251.) 2. infectio vicinorum. 3. hinc saepe totius ossis infecti putrefa-  
ctio. 4. Caries diploes. 5. Integumentorum cranii & cerebri corruptio. 6. inde  
mala affecti cerebri, convulsio, sopor, paralysis, apoplexia, mors.

1. Mors in offe fit a destructione arte-  
riarum periossei ad os deferentium vitales  
humores, uti & venarum referentium eos-  
dem humores simili abolitione. Quando er-  
go hæc vasa omni effectu carent, lamella  
ossis mortua est, cui hæc vasa prospicie-  
bant. Sive jam pericranio laeso destructa  
fuerint vasa ad os tendentia, sive ossis ipsius  
lesione vasa inter ejus lamellas ex pericra-  
nio dispersa, vel & illa, quæ per singula-  
ria foramina externæ cranii tabulæ incu-  
pta ad diploen pergunt, fuerint destructa,  
effectus erit idem: nempe mors partis, va-  
sis vitalibus humores adducantibus & red-  
ucantibus orbatæ. Sed omnis pars corporis  
omni influxu humorum vitalium carens nun-  
quam poterit recrecere cum partibus vi-  
vis, sed semper debet separari a partibus  
viviis vicinis; unde & lamellæ ossæ mor-  
tuæ sic secedunt & expellantur, uti dictum  
fuit in Commentariis ad §. 249.

2. Cranii ossa variis lamellis sibi invicem  
incumbentibus conflant, inter quas vasa te-  
nerima media feruntur; saltem antequam  
profecta ætate arctissime appressis ad se in-  
vicem lamellis hæc vasa delata fuerint. Pro-  
barum hoc fuit in Commentariis ad §. 249.  
& confirmavit hoc pulcherrima illa metho-  
dus, qua leviter pertundebatur os, non ta-  
men ad diploen ulque; & tamen ex punctis  
pertusis emergebant vascula, quorum effi-  
cacia separabatur corruptum & regeneraba-  
tur destructum Pericranium; uti dictum fuit  
in Commentariis ad §. 252. Adfuerunt ergo  
vasa in ipsa substantia ossæ tabulæ externæ,  
quæ, liberata incumbentibus lamellis ossis  
& elongata, constituiebant hanc vasculorum  
ex punctis fodicariis emergentium compa-  
gem. Mira habetur observatio apud Tul-  
pium (*Observ. Medic. Lib. I. cap. 2.*), quæ  
hoc confirmat. Homini sclopeto in occipite  
icso, licet calvaria nullas rimas egisset, ob

Chirurgi nullum capitis vulnus, quantum-  
vis leve videbatur, negligens vel perfuncto-  
rie curent; cum saepe latens ossis laesio vel  
peritissimos fallere possit, & aliquando, so-  
lis integumentis laesis, subiectum os tamen  
a pure, aere &c. afficiatur.

gravissima symptomata trepanum applicaba-  
tur; & dum terebram in capite circumage-  
ret Chirurgus, eruperunt per integrum os  
innumera sanguinis guttula roris instar uni-  
versam calvariam cooperientes; quibus spon-  
gia aliquoties deteritis, continuo novæ re-  
pullabant. Patet ergo, ex ipsa ossis sub-  
stantia vasorum continuitate patere viam  
sanguini, ut per integri ossis extimam su-  
perficiem roris instar exire possit: si ergo  
superior lamella ossis v. g. mortua fuerit,  
malum hoc facile communicabitur vascu-  
lis subiectis, a quorum lesione afficietur se-  
quens lamella; sicque malum poterit pro-  
pagari per omnes lamellas tabulæ externæ,  
dein poterit ipsa diploe atfici, & tabula in-  
terna simili modo corrumpi &c.

3. Ex modo dictis satis patet, destructis  
vasis vitam tolli in parte, unde corruptio  
mortui sponte sequitur. Et in Commenta-  
riis ad §. 242. tale exemplum fuit allega-  
tum, ubi post validam contusionem capitis,  
decem jam mensibus elapsis subito mortuo  
homine, inventum fuit cranium plane pu-  
tridum & foetidum. Apud Puzos (*Lib.  
10. cap. 22.*) habetur mirabilis casus, quo  
confluit, cranium sic penitus putrescere pos-  
se, & putrefactum separari, vita superstiti.  
Bregmati sinistro hominis ense vulnus in-  
stitutum fuerat, cum ossis lesione, quæ tamen  
ad interiorum cranii tabulam non penetra-  
bat. Consolidato jam fere vulnere, dum  
cum sodalibus calidissimis cibis & potui me-  
racioris vini liberalius indulgeret vulnera-  
tus, acuta febre corripitur, cum sensuum  
& loquelæ abolitione, & ingenti capitis &  
faciei tumore. Post aliquot dies apostema  
hic natum lanceola apertum dedit maxi-  
mam ichoris copiam, & calvarie os sub-  
jacens nigrum, putridum & foetidum appa-  
ruit per totam sui substantiam, & postea  
vivi vermes plurimi nidum hic fecerant.

Os

Os corruptum ad volæ manus magnitudinem fecerit; nec minus tamen a tan. periculo malo inter se sanari fuit, nisi quod ciccarri diu adhuc debitor & admodum sensibilibus remanserit.

4. Quando ossa corrupta in tenuem quasi pulverem fatiscunt, vocatur caries ossium, distincta omnino a feneratione lamellarum corruptarum, quæ per exfoliationem fit. Diploe inter binas tabulas crani mœba, vasis plurimis, & cellulosa ossis fabrica constat: ad hanc hic & osium mœbilitate, tam cito corruptum. Unde siue læsio ossis propagatione mali tandem ipsam diploem infecerit, siue ossis inter o. post valem conuersionem fracta in diploe vasa humores suos effuderint, poterit ab utraque causa corruptio flagrantium & extravalentium liquidorum hic nasci, ab his corruptis vasa neruina adhuc integra erodiri possunt, sicque augeri malum: quod per cellulas diploes inter binas tabulas ossis prorepens latissime se dispergere poterit: & simul facile apparet, diploe sic affecta, utramque calvarie tabulam pariter corrupti posse, unde mala plurima sequuntur.

5. Pericranium convexam calvarie partem tegit; dura mater, internum cranii periosteum, concavæ ejusdem parti firmiter adheret: utraque hæc membrana vasa

in os contiguum demittit, & ex ossis recipit: & videtur admodum probabile, Pericranii vasa externam tabulam penetrantia in diploe communicare, & uniri similibus vasis a dura matre emissis, & per tabulam internam ad diploem tendentibus. Dum ergo corruptum os crani fuerit, & imprimis si diploe ipsa sic affecta fuerit, poterunt calvarie integumenta externa & interna æque affici continuitate vasorum; quam tem & confirmant historæ paulo ante memoratæ. Sed, internis crani integumentis sic affectis, contiguum molle cerebrum facillime afficitur, & corrumpitur; uti plurima observata docuerunt.

6. Omnes sensus & motus arbitrii a cerebro pendent, uti constat ex Physiologicis. Cerebro ergo corrupto vel læso, poterunt omnes ejus actiones vel quedam tantum turbari & aboleri, prout malum totam cerebri molem, vel quasdam tantum ejus partes, infecerit. Ubi autem lente prorepens malum ab ossis læsione sensum ipsum cerebrum infecerit, sæpe ordine hic recitato symptomata sequuntur. Aliquando nec opinantur hominem subito morte sic periisse tellantur plurima observata. Sufficit hic notare, quod a levisima vertigine ad lethalem apoplexiam usque omnia cerebri affecti mala observata fuerint ab hac causa ortum duxisse.

§. 257. **E**X quibus (§. 254. 255. 256.) & cognitio, & prædictio hujus morbi nascuntur.

Ex omnibus illis, quæ paragraphis hic citatis dicta sunt, poterit determinari, quantum per artem licet, an calvaria læsa fuerit an non: licet tamen, si causa vulnerans satis valida fuerit, semper aliquis metus sit latentis mali, quamvis sensibus nullo modo detegi possit: Dum v. g. calvaria in alio loco sepe lunditur, quam ubi læsio facta fuit, uti dictum §. 254. Ubi autem per signa data constat, calvariam læsam esse, tunc in Prognosi omnia illa metuenda sunt, quæ precedenti paragrapho enumerantur: non quod hæc semper sequantur talem læsionem,

sed tamen aliquando sequi possint. Prudentia postulat, ut hæc omnia vulnerati amicis proponantur, ne postea sequentia mala medentis incuria, non autem vulneris malignitati, ascribantur. Præterea & vulneratus & amici, qui ejus curam gerunt, moniti, tam gravia mala sequi posse capitis vulnera, etiam quæ satis levia apparent, longe majori cura observabunt illa, quæ tam in dixerat regimine, quam in cura vulneris, requiruntur; a quorum neglectu toties inopinatio mors secuta fuit, cum omnia in vado crederent.

§. 258. **E**T indicatur ad curationem. 1. loci læsi detectio. 2. mundatio. 3. rebratio ossis. 4. ejus periosteii regeneratio. 5. reliqui vulneris sanatio.

1. Multum dubitari potest, an semper absolutè necessarium sit detegere locum læsum, licet magna suspicio adit, calvariam læsam esse. An non posset cranium vulneratum, vel fissum iterum coire, ut in aliis ossibus corporis fit? Hinc videtur hic

T. 2. METUEND.

utrumque extremum vitandum esse, dum quidam Chirurgi omnibus capitis lésionibus, nullo fere discrimine habito, sectionem adhibent; alii vero nimis meticulosi vix etiam in gravissimis casibus hoc facere audent. Ruyschius (*Observat. Anatom. Chirurg. Centur. Observ. LX.*), qui annoo artis usu in populosissima urbe tam multos casus viderat, dicit, etiam in vera cranii fractura, in qua symptomata non augentur, non statim ad incisionem & terebrationem esse petendum; sed post venæ sectionem fomentis cephalicis calidis, larga copia applicatis, curam tentandam esse; additque, se sic felicissime opem tulisse multis, quibus jam scalpellum imminebat. Apud Celsum (*De Medicin. Lib. 8. cap. 4. pag. 517.*) hoc jam habetur. Dicit enim, antiquiores Medicos in omni fisso vel fracto osse statim ad ferramenta venisse, quibus id exciderent. Sed multo melius est, ante Emplastrum experiri, quæ calvarie causa componitur &c. Voluit sic debere hoc tentari usque ad diem quintum: si autem caruncula increscere cœperit, & febricula aut soluta fuerit aut levior, & cupiditas cibi reverteris, satisque somni accedat, in eodem medicamento erit perseverandum &c. Hac ratione sepe rima callo quodam implentur; & quæ ex ossis velut cicatrix. Et latius fracta ossa, si qua inter se non cohererent, eodem callo glutinantur. Estque id aliquanto melius velamentum cerebro, quam caro, quæ exciso osse increscit. Si vero sub primauratione febris intenditur, brevisque somni, & idem per somnia tumultuosi sunt; ulcus madet, neque alitur, & in cervicibus glandule oriuntur, magni dolores sunt, cibi que super hac subsidium increscit; tum de-

§. 259. **L**ocus detegitur. 1. incidendo tegumenta læsa per scalpellum recta, angulosa, perpendiculari, decussata sectione, in os usque impressa, caute in fractis, & vacillantibus fragmentis, varia electa pro varietate loci, & mali. 2. separando secta a cranio exacte per scalprium. 3. infarctu carpi linei.

Postquam vulneris conditio & symptomata vulnus secuta docuerunt, locum affectum debere icti detegi, ut oculis manibusque pateat tota vulneris superficies, tunc hoc fit sequenti modo:

1. Capillis prius novacula derasis, exploratur loci læsi magnitudo, & situs respectu futurarum, muscularum, tendinum &c. tuncque primo determinatur, quali sectione opus sit; an, v. g. una sectio per

medium locum læsum sufficiat, an vero requirantur binæ sectiones; quæ iterum pro vario modo, quo concurrunt, maiorem minoremve ossis partem demudabunt. Si enim binæ sectiones sic concurrant, ut angulum foment, poterit denudari os toto spatio, quod huius anguli lateribus comprehenditur: si vero una sectio ducatur per lineam tangentem loci læsi, & altera perpendicularis per medium locum læsum ducatur ad-

præcedentibus dicta sunt, sanatio vulneris satis facilis est, & perficitur illa methodo, quæ descripta fuit §. 245.

2. Quæ hic intelligitur mundatio, vel artificialis est, per quam nempe tolluntur omnia illa, quæ in vulnere factio invenitur talia, ut cum vivis partibus amplius uniri & recrefcere nequeant: v. g. thrombi sanguinis concreti, fragmenta ossis undique libera, membranz corruptæ &c. vel est naturalis, quando per suppurationem factam secedunt omnia illa, quæ, vivis partibus licet adhuc aliquatenus cohereant, tamen illis iterum uniri & concrefcere non possunt. Utroque modo tolluntur illa, quæ vulneris consolidationem impediunt, quamdiu in vulnere hærent.

3. Agitur hic de illa terebratione, quæ minutis cuneolis fit, uti dictum §. 242. non autem de illa perterebratione cranii, quæ magnus orbiculus ex calvarie osse excinditur trepano proprie dicto.

4. Nunquam enim integra ossa accrescunt, quamdiu nudum est; sed prius debet recrefcere nova membrana ablato periotico similis, quæ vasa in os subiectum deducit, & inde redeuntia recipit. Hoc autem fit minutis foraminulis perforata calvaria, ut vasis vivis subiectis detur exitus, quæ tunc elongata retexunt talem membranam.

5. Omnibus hic peractis, quæ numeris præcedentibus dicta sunt, sanatio vulneris satis facilis est, & perficitur illa methodo, quæ descripta fuit §. 245.

priorem, patet facile, duplo majus spatium sic nudari: si jam eadem perpendicularis sectio producat, ut fecit priorem in puncto medio, patet, quatuor sic angulos nasci, unde quadruplo majus spatium nudabitur ac in illa sectione, ubi binæ lineæ concurrunt in unum angulum. Vocatur hæc decussata sive cruciformis integumentorum sectio: quæ cum omnium maximum spatium denudet, hinc illam commodissimam esse voluit Celsus (*De Medicin. Lib. 8. cap. 4. pag. 516.*), quæ duabus transversis lineis litteræ X figuram accipit, ut deinde a singulis procedentibus angulis cutis subsecetur. Eligitur jam sectio talis, quæ sufficit, ut locum affectum nuder: & patet, simplicem sectionem requiri, ubi tam parvus est locus læsus, ut dehiscentibus vulneris facti labiis in conspectum venire possit. Angulosa autem sectio conveniet, ubi locus læsus non quidem valde magnus est, major tamen, quam ut simplici sectione nudari possit. Ubi autem majus spatium detegi debet, usum habet sectio recta, ducta tangentis insar ad limitem loci affecti, cui deinde altera perpendicularis additur per medium locum læsum transiens. Ubi vero amplius admodum locus detegi debet, sectione recta per medium locum affectum ducta, altera similis priori perpendicularis illamque per medium secans, superadditur; sicque quatuor dissectorum integumentorum angulis elevatis totum illud spatium, quod binis illis sectionibus continetur, nudari potest.

Debet autem sectio fieri cultello acuto & satis forti, ne acies facile obtundatur; dura enim & callosa est calvarie cutis, & validam satis sectionem requirit. Cultelli autem acies statim debet ossi ipsi imprimi, & sic ipsum os radendo discindi simul pericranium una & eadem sectione; ne quid ex ipsa membrana, quæ sub cute calvariarum cingit, relinquatur: siquidem hoc scalp pro terribus lacerata vehementes febres cum inflammationibus excitat (*Celsus ibidem*). Nisi enim firmiter ipsi os maneat appressus cutellus, dum integumenta dissecantur, debebit postea Pericranium adhuc discindi. Verum quidem est, sic cultello crenam duci in ipso osse; sed hoc evitari nequit, & detecto loco illa ossis læsio poterit satis facile curari.

Cum igitur ad hanc rem requiratur, ut satis valida manu cutellus ipsi ossi apprimatur, patet, summa cautela prius explo-

randum esse, an forte calvaria sic fracta sit, ut fragmentum posset deprimi, dum culrellus ossi apprimitur; unde pessima mala, & mors ipsa sequi possent; uti aliquando tristibus exemplis conspiciunt. Ubi ergo digitis undique palpando aliquid vacillare deprehendimus, sectio sic dirigatur, ut ille locus evitetur. Ubi autem simul valida contusio magnum tumorem in loco affecto fecit, sæpe non sine difficultate explorari potest, an os fractum vacillet, an non.

Simul cavendum est, quantum fieri potest, ne majores arterie, per integumenta dispersæ, dissecantur; simulque vitari debent insignes nervorum rami hic dispersi v. g. in fronte supra oculi orbitam &c. ut & musculi, tendines, suture &c. Horum omnium situs ex Anatomicis cognoscitur.

2. Pericranium satis firmiter cranio vasculis emissis & receptis adheret, uti antea dictum est: hinc licet omnia integumenta una cum Pericranio discissa fuerint, tamen lata adhuc superficie cranio cohererent; unde, antequam nudum os in conspectum venire possit, Pericranium a calvaria separari debet. Aliquando elevatis angulis dissectione Pericranium sequitur, & ab osse secedit, imprimis, quando laxius ossi adheret, ut in senioribus observatur. Dum vero fortius adheret, uti sæpiissime fit, eburne imprimis & politissimo scalp pro citissime abraditur a calvaria, non sine summo dolore, nisi æger hebes penitus aut soporosus fuerit, uti sæpe in gravioribus capitis vulneribus contingit. Operandum ergo foret, ut juniores Chirurgi in vitulinis vel ovillis capitibus se exercerent, ut discant scalp pro subducto Pericranium a calvaria subito separare; in hominibus enim hoc addiscere crudele est & periculosum.

3. Separatis sic omnibus integumentis, sanguis effluens plerumque impedit, quo minus accurate detegi possit ossis nudati læsio; unde, nisi summum periculum urgeat, solet differri ulterior investigatio in sequentem diem; vel saltem per aliquot horas expectari. Ne autem partes recenti vulnere divisæ iterum concreant, quod citissime fieri observatur, plumaceola plana mollissima nudo ossi imponuntur sub integumentis elevatis, sic hoc impeditur, & sedata Hæmorrhagia, amotisque plumaceolis, tota superficies ossis nudati in conspectum venit, elevatis integumentis disiectis. Sic

enim minimo labore amplissimum vulnus frequenti die futurum monet Hippocrates (*De Capit. vulner. cap. 20. Tom. XII. pag. 124.*), qui etiam jubet cataplasma imponi, ex polenta tenuissima acetoincta, donec quam maxime glutinosa fiat,

ad præcavendam nempe nimiam inflammationem. Plumaceola enim hæc sicca absorpto cruore, vel aliis liquidis, tumet, & dilatant vulnus factum, quod semper quandam irritationem & inflammationem facit.

§. 260. **C**Ruor, pus, sanies, fordes, spongiolis absorbentur; fragmenta, festuæ, squamæ ossis, si parva, libera ab omni membrana, oculo mox patetia, sunt, eximuntur vossella; vel solvantur forfice; quæ mundatio artificialis.

Amotis dein plumaceolis, abstergo cruore, omnibusque aliis fordibus, quæ impediunt, quo minus ossis detecti superficies undique oculis pateat, onui cura investigandum, an aliquid lateat mali, quod tolli vel corrigi debet. Si vero in osse nudato nihil fracti vel confusi appareat, & nulla detegatur rima, nec ulla suspicio sit, sub calvaria: osse extravasatos hæere humores, qui cranio in hoc loco perterebroto educi possent, vulnus factum iterum consolidandum est. Peritissimis enim Medicis aque ac Chirurgis aliquando contigit hic errasse, licet ex signis evidentibus conclusissent sub loco jam aperto hæere aliquid mali. Plurima apud observatores habentur exempla, quæ hanc rem confirmant: monuerat Hippocrates in loco allegato §. 254. quod aliquando os frangatur alia capitis parte, quam qua vulnus est: & in Commentariis ad §. 254. quædam ex optimis auctoribus recensitæ fuerunt observationes, quæ evincunt, semper hic aliquid dubii esse posse. Præstat ergo, vulneratum ejusque amicos præmovere, quod quidem omnia signa doceant, locum affectum dissecandum esse ut latens malum detegatur, posse tamen aliquando in alio, & sæpe satis diffito calvaria: loco, hæere noxam. Unde prudentes Chirurghi semper Medicum vel alios Chirurgos vocari jubent, ut communi consilio concludatur, quid agendum sit in similibus casibus; sicque testes habeant, omnia secundum artis regulas peracta esse, quamvis eventus non respondeat votis.

Ubi vero constat, os nudatum læsum esse, indicatio generalis (§. 185. n. 1.) docet, auferendo esse illa omnia, quæ curam vulneris impedire possent. Liquida effusa hic hærentia spongiolis vel linteis carpsis siccis facile absorbentur: fragmenta vero ossis, vel & festuæ & parvæ squamulæ secedentes, vel inde separate per instrumentum vulnerans, possunt considerari tanquam corpora heterogenea, quæ ibi relictæ nocere possent, saltem vulneris curam multum retardare. Sed uti dictum fuit (§. 186. 187.) primo expendendum est, an sine damno tolli possint; an vero tutius ibi relinquuntur, donec sponte separentur & excidant. Si enim fragmenta hæc ossis parva fuerint, nec vivis partibus cohæreant adhuc, nulla spes est iterum uniri posse, & tuto auferri possunt instrumentis idoneis. Cum autem a libero accessu aeris ossa, periosteum nuda, pessime afficiantur, uti dictum est §. 250. requiritur præterea, ut hæc fragmenta oculis sic pateant, ut statim tolli possint, neque opus sit diu instrumentis tale vulnus scrutari. Periculosum pariter, fragmenta ossæ membranæ adhuc hærentia vi avellere; cum & magnus dolor, & nexus pericranii cum dura matre, imprimis circa futuras, pessime posset producere mala; tunc enim melius, si tolli debent, forfice abscinduntur.

Illæ autem de puratio vulneris, quæ sic manu vel instrumentis fit, vocatur mundatio artificialis; ut distinguatur ab illa, quæ sponte orta suppuratio perficitur, & naturalis ideo vocatur.

§. 261. **E**Adem nimis magna, hærentia vivis abscondita, relinquuntur, nam vel sponte separentur, vel recrefcunt ad viva. Hæc mundatio naturalis.

Ubi autem fragmenta calvaria: magna valde sunt, examinandum est, an sic corrupta fuerint jam, ut nulla spes sit, quod iterum uniri possint reliquo ossi. Hoc autem imprimis cognoscitur ex colore mutato. Si enim fragmentum tale flavum, fuscum, vel

jam



jam nigrum est, non recrecet; sed vel sponte separabitur postea, vel tollendum est statim, si commodè fieri possit. Quando autem colorem adhuc naturali similem habent talia fragmenta, & imprimis si adhuc cohaereant cum pericranio, magna spes est, quod recrecere possint. Accidit aliquando in maiorum ossium fracturis, tunc v. g. vel femoris os binis locis sic fractum esse, ut medium fragmentum ab utraque parte liberum sit, & tamen observatum fuit saepius, tale fragmentum iterum concrevisse cum reliquo osse: unde patet, non desperandum esse in similibus cranii fracturis. Observationes Chirurgicae hanc rem omnino evincunt. Homini solea ferrea mulas tam validum ictum capiti impegerat, ut frontis os fractum & intropressum esset. Trepano excidebatur orbiculus ex calvaria, ut os fractum & intropressum commodè elevari & tolli posset. Cum autem fractura a medio frontis ad oculi canthum minoreni pergeret, non audebat tollere Paræus tantam ossis portionem, sed elevavit os fractum sic, ut duram matrem non amplius posset comprimere; & feliciter curatus fuit vulneratus (*Les Oeuvres d'Ambroise Paré Liv. X. chap. 6.*). Sed & integre separatum a reliqua calvaria ossis fragmentum, cohaerens tamen adhuc Pericranio, iterum recrevit. Capiteo cuidam ense ossis frontis magna portio abscissa fuerat, circiter trium digitorum longitudine & latitudine, sic ut nuda esset omnino dura mater. Tam magnum ossis fragmentum, Pericranio adhuc coherens, una cum integumentis supra faciem reclinabatur horrendo spectaculo; & jam cogitabat Paræus, ut totum refecaret: metuens tamen, ne tanto vulnere nudata dura mater pessime afficeretur, detergo sanguine, qui duram matrem tegebat, iterum adaptavit os abscissum una cum integumentis, & levi sutura in tribus locis firmavit, ne loco facile moveri possit. Pulcherrimus successus docuit, quantum sperari possit in similibus casibus, cum tam ingens ossis integre resecti portio in homine pluribus adhuc aliis plagis saucio recrecere potuerit (*Ibidem cap. 7.*).

Quamdiu ergo vivis partibus adhuc cohaerent talia fragmenta, relinquenda videntur; spes enim est, iterum uniri posse reliquo ossi: & si hoc non succedat, & signa docuerint, ossa hæc separata incipere corrumpi, semper poterunt eximi, vel & sponte separabuntur. Unde simul patet, noxium esse, nimis curiose scrutari capitis vulnera, ut fragmenta ossis, quæ non statim oculis occurrunt, tollantur. Si enim adhuc aliqua sui parte cohaerent vivis, poterunt uniri, vel sponte per suppurationem secedent, si recrecere nequeant. Naturam sene solum sibi sufficere etiam in periculosisimis casibus, docet sequens Historia. Puella novem vel decem circiter annorum cælim ense inflicta fuerant octodecim vulnera capiti, præter alia quædam, quæ brachia & truncum corporis lacerant. Omnia hæc capitis vulnera calvariam lacerant, ossisque portiones quædam ad diploen usque ablata erant; aliis in locis tota calvaria ad duram matrem usque ablata erat. Idoneo apparatu deligabatur ram misere vulneratum caput, & singulis binis diebus tantum denudabantur vulnera. Singulis autem deligationibus ossis frustula plumaceis adhaerebant, & sic secedebant sine molestia. Illa fragmenta autem, quæ Pericranio adhuc cohaerebant, concredebant iterum, & prompte replebantur loca, ubi calvaria integre ablata fuerat; sic ut quinque septimanarum spatio tot plagis faucia convalesceret hæc puella (*Beilste Chirurgien d'Hopital pag. 82.*). Sed in hoc casu nulla modo artificialis locum habuit, sponte per suppurationem separata fuerunt omnia illa, quæ recrecere non potuerant.

Prudentissimum ergo est monitum Hippocratis, dicentis: *Quæ vero ossa intus subsederunt a naturali suo statu, fracta aut late omnino præcisa, minus hæc periculosa sunt, si membrana integra fuerit: & vixis pluribus & latioribus intus contracta minus periculosa sunt, & facilius eximuntur: neque quidquam bonum scissione (ferre) indiget; neque cum periculo tentandum est ossa auferre, priusquam sponte sursum cedant* &c. (*Hippocr. de Capitis vulner. cap. 28. Tom. XII. pag. 126.*).

§. 261. Si os contusum, album, fuscum, lividum, fissumve appareat, minoris enim viva exeunt, & mortua expellunt cito.

Aliquando contingit, ut ablatis integumentis nulla quidem fractura in osse repariatur, & tamen os male affectum sit. Hoc imprimis observatur, ubi obtusum fuit instrumentum vulnerans, vel quando homo ex alto delapsus planæ superficiei valide impigerit caput. Tunc enim vel finditur os cranii; sæpe integris licet manentibus capitibus integumentis; vel pericranium, inter resistens obstaculum & duram calvariam subiectam, sic premitur & atteritur, ut frangantur vasa, quæ ex Pericranio in calvariam tendunt, & vicissim ex hac in Pericranium redeunt; unde aboletur omnis vitalis influxus in lamellam calvarie Pericranio contiguam. Patet satis ab iisdem causis posse ladi vasa, quæ inter lamellas cranii media decurrunt, unde augmentum mali fit. Cognoscitur autem, talem confusionem & destructionem vasorum in cranii osse obtinere, ex colore ossis mutato. Naturaliter enim ossa viva & sana colorem subrubellum, vel & ex albo cærulescentem habent; quia vasa vitalia, colorato liquido plena, per albam ossis lamellam, & præ tenuitate pellucendentem, talem colorem exhibent. In omnibus illis ergo locis, ubi a confusione destructa sunt vasa supposita lamellis ossis, albedo erit: unde & §. 255. num. 6. inter signa calvarie læsæ numerabatur, si punctis pallidis coloratum cranium appareret: & Belloste (*Chirurgien d'Hopital* pag. 76. 78.), postquam nudam Pericranio calvariam minutis foraminulis perterebraverat, primum signum felices successus memorat, quod os inciperet subrubescere; manifeste nempe indicio, vitam redire in osse, antea vitali humorum influxu privato. Ubi autem os vasis suis destructis incipit corrumpi, tunc color albus in flavum, fuscum, lividum, imo nigrum emmino mutatur; eo semper majore corruptionis gradu, quo magis a naturali colore recedit, uti dictum fuit in Commentariis ad §. 249.

Cum ergo in tali casu metus sit, ne ossis hæc corruptio subiectas lamellas contingas similiter inficiat, ad ipsamque diploen

pergat, unde & subiecta tabula vitrea, & deinde ipsius encephalon infici poterunt, imprimis cum fractis vasis effusi humores & corrupti per integram contriti ossis superficiem exire nequeant; apparet iterum pulcherrimus usus methodi §. 252. descriptæ, qua nempe minutis hinc inde foraminulis perterebratur calvaria, ut effusi humores exire possint, & vasa viva supposita, dura hoc regimine mortui ossis libera, emergere & separare illud, quod mortuum & corruptum est. A vivis enim vasis suppositis solum expectandam esse separationem ossis corrupti, jam indicavit Hippocrates (*De Capitis vulneribus* cap. 28. Tom. XII. pag. 126.): postquam enim monuerat, ossa fracta non esse educenda cum periculo, nisi sponte sursum cedant, dicit: *sursum autem cedant, carne subnascente; subnascentur autem ex diploe ossis, & ex sano (osse), si superior tantum ossis pars corrupta fuerit*. Sola observatione sic didicit Hippocrates illud, quod postea recentiorum industria confirmavit: carnem enim vocaverunt antiqui Medici, (& etiam recentiores eodem vocabulo usi sunt) vascularem illam compagem, quæ in vulneribus renata jacularum substantiæ restituit. Et pulchre addidit, hanc ex diploe succrescere, per quam adeo manifesta vasa disperguntur; imo &, superioribus tantum lamellis corruptis, talem carnem renasci ex sano osse supposito, non ex diploe, manifeste indicat.

Ubi autem fissura adest, eadem hæc methodus pariter prodest. Omnia enim mala, quæ fissuram sequuntur, imprimis ab eo pendent, quod plurimorum vasorum ruptura facta fuerit, nec pateat facilis exitus liquidis extravasatis; unde corruptela ossis, & omnia quæ inde pendent mala, sequuntur. Minutis vero foraminulis circa fissuræ locum pertuso osse, exitus patet extravasatis humoribus, & facilis habetur via, qua vasa viva elongata prodire possunt, & retexere novum Pericranium.

Quam subito autem hæc methodo perficiatur cura etiam in fatis notabili ossis latione, patuit ex illis, quæ dicta sunt in Commentariis ad §. 252. & 253.

§. 263. **Q**uo ipso (262.) periossei regeneratio cita (252.).

§. 264. **S**anatio tum reliqui descripta est (245. 246. 247. 248. 253.).

De his omnibus in numeris hic citatis dictum fuit. Simulac enim novum Pericranium sic recevit, tunc reliquum curari

debet instar vulneris capitis, quod sola integumenta læsit communia.

§. 265. **I**nde patet, cur angusta fissura periculosior sæpe, quam ingens cranii confusio ( 256. ).

Omnes Medici & Chirurgi periti in hoc consentiunt, fissuram calvariæ sæpe longe majus discrimen addere, quam validam confusionem, imo & fracturam ossis.

Fissura enim difficilior cognoscitur, & sæpe non detegitur, nisi sero, imprimis si circa furas hæreat; vel & externa calvariæ tabula integra manente sola interna tabula fissa sit; uti & dum alio loco calvariæ os fissum est, quam ubi vulnus hæret. Accedit, quod fissura, licet oculis appareat, sæpe longius excurrat, quam ut tuto tota possit detegi discissis integumentis. Omnia autem hæc aliquando sic contingere, probatum fuit fidelissimis observationibus in commentariis ad §. 254. memoratis. Dum vero ingens læsio ossis facta fuit, sponte patet: & magnitudine mali incitati Medici & Chirurgi omne molimen artis adhibent, ut præcaveant metuenda mala. Fissura tam sæpe latens, imo quandoque nullo signo detegenda, vel peritissimos fallere potest, quod de seipso Hippocrates tam ingenue fassus est.

Altera causa, quare angusta fissura tam periculosa habeatur, est, quia non potest certo cognosci, quo usque penetraverit, an ad diploen usque, an etiam profundius. Si jam ad diploen usque fissa fuerit calvaria, magna satis vasa fracta erunt; effusi humores non poterunt per angustam ossis fissuram transire; corruptentur; destruunt teneram illam cellulosam ossis partem, quæ diploen constituit; prosperere poterit malum inter binas calvariæ tabulas, & cor-

rumpere omnia. Erosa dein interna cranii tabula, Encephalon ipsum poterit affici, & sic subito perit homio, dum snallum creditur latere malum; & post mortem totum os corruptum invenitur. Plurima talia habentur apud observatores Exempla. Ubi autem ingens cranii læsio facta fuit, patet exitus humoribus extravasatis, vel per artem fieri poterit, & vasa viva supposita omne cotrupum poterunt separare. Ideo tam felix sæpe cura fuit gravissimorum etiam capitis vulnerum una cum insigni ossis læsione; dum levis fissura, sero tantum cognita, nihil mali metuentes sæpe inopinato de medio fustulit. Ideo Hippocrates ausus fuit pronunciare: si os ( calvaria ) fractum fuerit, & confusum, periculo caret &c. si vero fissum fuerit, & fissura intra procedat, admodum est periculosum ( Hippocrat. de locis in homine cap. 12. Tom. VIII. pag. 371. ). Additque, ferram adhibendam esse, ne sanies per ossis fissuram affluens meningem putrefaciatur. Et alibi ( Hippocrat. de caput. vulner. cap. 28. Tom. XI. pag. 126. ) ossa capitis fracta, vel late admodum præcisa, vel rimis pluribus & latioribus divisa, minus periculi habere affirmat. Accedit præterea, quod nunquam findi possit calvaria, quin simul plus minusve confusa fuerit ( Ibid. cap. 6. Tom. XII. pag. 118. ): unde eo major numerus vasorum, in ipsa ossis substantia vel per diploen decurrentium, frangitur; hinc omnium malorum augmentum.

§. 266. **E**T patet, hanc methodam ( 252. 262. ) præferendam ulationi, scalpris, trepanis Veterum in his malis ( 249. 254. 256. 262. )

Ex illis, quæ dicta sunt in commentariis ad §. 252. paruit, levem illam perturbationem calvariæ pluribus foraminulis cito & tuto simul sanare hæc mala; unde videtur merito præferenda esse reliquis methodis. Licet autem apud Hippocratem, uti dictum fuit, jam hujus rei vestigium habeatur, tamen frequenter usi fuerant scalpris, ut deraderent ossis male affecti partem. Si tamen pendamur omnia, quæ

necessario sequuntur hanc ossis affecti abrasionem, patebit, minus tutum hoc esse, & longe tardius sic curam perfici. Ussionem ferro candenti commendaverunt quidem Chirurgi, ut os corruptum separaretur: sed non memini, apud Hippocratem in læsione calvariæ, uti nec apud Celsum, hujus mentionem factam fuisse; & certe difficile admodum foret sic adurere partem ossis corruptam, ut non læderetur pars integra ossis subje-

subjecta; quæ ergo iterum separari debe-  
ret, antequam curatio posset expectari.

Ubi autem angusta rima in osse cranii  
fisso apparebat, vel & reli vestigium in osse  
relictum erat, tunc scalpris variz magni-  
tudinis & figuræ, pro varia mali magnitu-  
dine & figura, utebantur, quibus os rade-  
bant, donec rima, vel teli vestigium dele-  
rentur. Et, ut certi essent rimam talem  
se delevam esse, prius atramento scrip-  
torio, vel alio nigro liquore ( vide §. 255.  
num. 4. ) tingebant os nudatum, ut colo-  
ratum tale liquidum in rimam penetrans  
ostenderet, quo usque penetraret; perge-  
bant enim, radendo, donec totum illud ni-  
grum deleteretur. Ubi vero altius descende-  
bat rima, neque radendo tolli poterat,  
tunc terebram adhibebant, ut magnam of-  
sis partem exciderent ( *Ibidem* cap. 23.  
& 24. *Tom. XII. pag. 134. 125.* ). Ubi

vero latior locus calvariz confusione læsus  
fuerat, & signa docerent os corruptum esse,  
tunc utebantur trepano exfoliatorio dicto,  
quod binis cuneis contraria directione pos-  
itis constabat, quibus circumrotari abra-  
debatur calvariz superficies orbiculari plaga.  
Quia convexa & in quibusdam locis inæ-  
qualis est cranii superficies, facile patet non  
adeo æquabiliter sic posse abradi illud, quod  
corruptum est. Sed præterea postquam ra-  
dendo scalpris vel tali trepano exfoliatorio  
rima deletera erat, vel ablata ossis corrupti  
pars, tunc superficies ossis abrafa mortua  
est, destructis nempe omnibus vasis; hinc  
separari debebit, antequam iterum poterit  
illi incrementum Pericranium. Apparet ergo ab  
his operationibus non multum boni exspe-  
tandum esse. Illa autem methode §. 252. pul-  
chre separatio corrupti perficitur, eademque  
opera regeneratur perditum brevi tempore.

§. 267. **C**Ranium in junioribus intropressum, in adultioribus post fracturam in-  
tropiculum, Cerebrum premit; pro varietate loci pressi, pro varia ma-  
gnitudine, profunditate, acutie, punctura prementis, producit hebetudines, sopores,  
vertigines, tinnitus, caligines, deliria, vomitum bilis, dolores capitis, convulsiones,  
paralyses, lotii secumque spontaneum exitum, apoplexias, febres, mortem.

Postquam dictum fuit de illis malis, quæ  
ossis cranii læsiones sequuntur, sequitur,  
ut videamus, quid futurum sit, si calvaria  
intropressa, vel post fracturam intropulsa,  
contentum encephalon compresserit, vel  
læserit. Constat ex Geometricis, circulum  
inter figuras Isoperimetricas maximam ha-  
bere aream; sed calvariz figura ad sphae-  
ricam accedit: hinc intropressa calvaria,  
minuetur ejus capacitas. Notum est porro  
ex Physiologicis, cranii cavum semper ple-  
nissimum esse in sanitate; unde resecta cal-  
varia statim contentum encephalon exsur-  
git sic, ut nunquam possit iterum adapta-  
ri resecta pars, nisi vi adhibita. Paret ergo,  
quod simulac mutata fuerit calvariz  
figura per intropressionem, necessario com-  
primantur contenta ejus cavo.

Sive jam figura cranii convexa mutata  
fuerit per intropressionem sine fractura,  
sive os fractum loco suo pulsus depreffum  
fuerit; effectus erit idem, nempe cerebri  
contenti compressio. In junioribus talem  
intropressionem possibilem esse sine fractu-  
ra, calvariz mollioris in hac ætate fere  
persuadet: longe major firmitas in adul-  
tis difficilius hoc fieri posse sine fractura

docet. Hippocrates ( *De capit. vulner. c.*  
*7. Tom. XII. pag. 118.* ), varias fractura-  
rum calvariz species recensens, tertio lo-  
co enumerat hanc introcessionem, quam  
*ἐσθλασι* vocavit; dicitque, semper tunc  
simul rimas adesse: *Quod enim, introprimi-  
tur, ab alio esse naturaliter se habente abrup-  
tum fractumque introcedit; itaque sane huic  
intropressioni rimam accedere necesse est.* Lon-  
ge tamen mollior est ossium humani cor-  
poris in vivente substantia, quam in scele-  
tis exsiccatis apparet: hinc forte non o-  
mnino impossibilis, licet rarior, calvariz  
depressio in adultis, non decrepitis tamen,  
sine fractura.

Cum autem ab illis, quæ cranii cavo  
continentur, tota vita & humanitas pen-  
deant, totumque encephalon molle sit &  
facile comprimendum; paret, intropresso  
cranio turbari posse, imo & integre dele-  
ri, omnes functiones, quæ ab encephali  
integritate pendunt. Quia autem cerebel-  
lum firmiter substantiæ est, & rarius re-  
conditur, quam ipsum cerebrum; hinc da-  
mna, a calvariz intropressione orta, sem-  
per fere cerebri actiones lædunt primario,  
tandemque propagato malo cerebelli actio-  
nem,

nem, a qua vita pendet, tollunt. Simul paret, effectus huius mali admodum varios esse posse, prout diversa cerebri loca comprimuntur, & prout causa comprimens majori minorive vi agit; vel etiam dum abrupta ossis fragmenta acuta cerebri substantiam ipsam vulnerant; majori vel minori profunditate. Levem etiam cerebri compressionem turbare posse ejus actionem, raro constitit Exemplo. Mulieri dimidia cranii olla ablata fuerat, quam circumferebat ostiatum stupem petens: nudam duram matrem dum digiti apice leviter quis tangeret, valide exclamavit dicens, se millenas videre candelas ( *Academie des Sciences Paris, 1700. Hist. p. 57.* ). Symptomata autem, quæ compressionem encephali ab hac causa factam sequuntur, enumerantur sequentia.

**HEBETUDINES.** Quæ levissimam tantum cerebri compressionem sequuntur. In omnibus illis, quibus a lenta & frigida causa apoplexia nascitur, prius talis insolita hebetudo sensuum omnium, & tarditas ad motus musculares exercendos, observantur, quæ designant, sensum accumulari in cranio tales humores, qui levi compressione abundant sensuum omnium vivacitatem, tandemque aucta copia penitus tollent. Si jam calvaria intropressa leviter sic cerebrum compresserit, simile malum oritur, aliquando tota vita manens, si non tollitur causa comprimens. Tale exemplum habetur apud Hildanum ( *Observ. Chirurg. Centur. 3. observat. 21.* ). Pueri decem annorum, felicissimo ingenio præditi, casu cranium circa suturam Lambdoideam impressum fuerat; cum nulla graviora symptomata sequerentur, neglectum fuit a parentibus hoc malum, manifeste hæc ossis impressio: Incepit sensum memoria & intellectus imminui, sic ut nihil addiscere poterit, vixitque sic stupidus omnino ad quadragessimam ætatis annum, tuncque peste correptus perit. Similis hebetudo etiam observatur, quando sanguis nimia copia distendit vasa majora in plethoricis; vel in morbis acutis velocitate aucta & majori relaxatione dilatata vasa sic, ut pulposa cerebri substantia incipiat comprimi.

**SOPORES.** Qui auctam cerebri compressionem indicant: simulac enim ille causæ, quæ hebetudinem fecerant, augentur, oritur somnolentia, & tandem profundissimus somnus, & lethalis, nempe apoplexia. Un-

de inter illa signa, quæ docent capite vulneratum periculose affici, recenset Hippocrates altum soporem, & tenebrosam vertiginem ( *De Vulner. Capis. c. 15. Tom. XII. pag. 121.* ).

**VERTIGINES, CALIGINES.** Vertigo omnium fere morborum cerebri levissimus est, & plerique capitis morbi, imo fere omnes, inde incipiunt; & curati pro ultimo symptomate vertiginem relinquunt. In omni vertigine plerumque est rotatio apparens rerum extra nos positarum & naturaliter quiescentium; aliquando videntur omnia ex alto deorsum labi, & contra. Quando incrementum malum, incipiunt apparere colores varii in objectis; mox sequitur vacillatio omnium musculorum; incipiunt sic affecti metuere ne labantur, obvia quæque prehendunt, ut se sustineant; enervatur totum corpus uno momento sic ut cadant, simulque tenebræ densissimæ omnem sensum visus tollunt; hocque est ultimum quod sentiunt: si enim pergat malum, in Apoplexiam, Epilepsiam, vel animi deliquium terminatur.

Levissima ergo vertigo est, ubi omnium objectorum rotatio apparet; aucto malo, tenebræ sunt, tunc *σνέδρασις*, id est, tenebrosa vertigo vocatur: tandem cadunt sic affecti. Tria hæc in loco modo citato notavit Hippocrates, signa graviter capite vulneratum recensens. Si tenebræ circumfundantur, & vertigo, vel *σέκερις*. Dum Antilochus hostem in fronte sic vulnerat, ut lanceæ cuspidis os penetraret, tenebræ oculis cooperuerunt, dixit sapiens Homerus ( *Τὸ δὲ σέκεος οὐ: ἰαδύλῃ. Iliad. Lib. IV. pag. 74.* ).

Simplex ergo vertigo levem tantum compressionem cerebri indicat; tenebrosa vero auctum malum designat: sublata autem causa comprimente, tollitur. Unde dum in morbis acutis impetu & copia sanguinis distenta vasa majora cerebrum comprimunt, oritur talis tenebrosa vertigo, quæ narium Hæmorrhagia tollitur, uti monuit Hippocrates in Prænotionibus Coacis ( *Nom. 341. Tom. VIII. pag. 871.* ) dicens: *Τεωβρικόςας vertigines ab initio sanguinis e naribus fluxus solvit.* Ut distingueret nempe a simili vertigine, quæ non adeo in morbi initio, sed tardius sæpe apparet, corrupta per morbum bile vel aliis sordibus circa præcordia collectis.

TIN.

**TINNITUS.** Vertiginem tenebrosam fere semper comitatur molestissimus in auribus sibilus, ac si millenae tinnientes campanulæ audirentur. Ubi autem sine causa externa talis sibilus percipitur, vocatur tinnitus aurium. Ille autem aliquando oritur ipsius organi auditus vitio, illoque etiam levissimo: tunc digito auriculari in meatum auditorium immisso & agitato, vel & trago auriculæ compresso, tolli solet satis cito; neque tunc aliquid mali portendit. Ubi vero ab ipso cerebro affecto aurium tinnitus oritur, tunc non facile cedit, & per annos sæpe molestus est: apoplexiæ tandem secuturæ, vel & Epilepsiæ, signum: uti in Coacis Prænotionibus habetur (Num. 161.). Eandem causam agnoscit hoc symptoma ac vertigo, & graviotes capitis lisiones fore semper sequitur.

**DELIRIA.** Cerebrum esse illud organum corporeum, a cuius integritate idearum perceptio, illarum combinatio, iudicium inde sequens, animi affectus &c. pendent, ex Physiologicis notum est. Ubi autem idearum ortus non respondet externis causis, sed ab interna cerebri mutati dispositione pendet, delirium adesse dicitur. Compresso autem cerebro ob mutatam calvarie figuram turbari possunt omnia, quæ ab huius organi illibata actione sunt in corpore. Observatur enim, pterosque, qui a natiuitate fatui sunt, vitiatam habere capitis figuram: & Hippocrates, ubi recenset funesta symptomata, quæ sequuntur calvarie lisionem quamcumque, si non adhibeatur debita cura, tandem addit, quod delirantes moriantur (Hippocr. de caput. vulner. cap. 31. Tom. XII. pag. 127.). Et alibi sepius delirium post capitis plagas, tanquam malum signum, damnavit. A plaga in capite accepta stupor aut delirium malum (Idem Aphorism. 14. Sect. VII. Tom. IX. pag. 298.). Ab osse perfracto delirium, si in vacuum penetraverit (Ibid. Aphor. 24. Sect. VII. pag. 303.) &c.

**VOMITUM BILIS.** Mirum symptoma, quod in capitis vulneribus cerebrum læsum, vel compressione aut concussionem male affectum semper denotat. Constat enim certissimis & quotidianis observatis, cerebri insignes mutationes, etiam in sanissimis hominibus, biliosum talem vomitum excitare non tantum, sed etiam sæpe bilem miro modo mutare momento fere temporis.

Non assuetus homo navis agitationi, post vertigines & summam anxietatem, bilem æruginosam vomit: idem fit, si sanissimus homo subito in gyrum roteretur: & tunc etiam vertigo præcedit, cerebrum affectum denotans. Et vicissim bilis corrupta, circa præcordia hærens, omnes cerebri actiones turbare potest miris modis, vertigines, deliria, convulsiones &c. excitando: excussa hac saburra, ilico cessant omnia hæc mala. Ex quibus patet, mirum commercium obtinere inter caput & præcordia, sic ut in se mutuo efficacissime agant: nec hæcenus hoc ex cognita corporis fabrica explicari facile poterit, licet certissimis experimentis constet, rem se sic habere. Sic Scultetus observavit, omnes fere capite vulneratos de oris amarore conqueri (Sculteti Arment. Chirur. p. 198.).

Suspectum hinc semper fuit in capitis vulneribus hoc signum. Quibus cerebrum vulneratur, febris plerumque ac bilis vomitus accedit, & corporis sudatio, & tales perniciose habent (Hippocr. in Coacis Prænotionum. num. 500. Tom. VIII. pag. 881.). Quibus perfractum fuerit cerebrum, necesse est his febrem & bilis vomitum supervenire (Idem Aphorism. 50. Sect. VI. Tom. IX. p. 283.). Bilis vomitus vulnere succedens malum: & maxime in capitis vulneribus (Idem in Coacis Prænot. num. 507. Tom. VIII. pag. 882.). Imo etiam, dum ab internis causis cerebrum incipit premi, vel alio modo male affici, bilis, & imprimis æruginosæ, vomitus, inter mala signa recensetur. In capitis doloribus æruginosi vomitus, cum sudatione & pervigilio, cito vehementer insanire faciunt (Hippocr. Proverbia. Lib. 1. Predict. 10. Tom. VIII. pag. 706. & Coac. prænot. n. 170. ibid. pag. 861.). Huiusque pronuntiati veritas in Epidemicis (Hippocr. Epidem. 3. ægror. 4. Tom. IX. pag. 232.) exemplo Philistæ probatur, cui symptomata hæc omnia eo ordine, ut recensita fuerunt, acciderunt; & quinto die morbi periit.

Patet ergo, cerebro tam ab externis, quam internis causis male affecto, bilis vomitus sequi frequenter, & quidem malo omine. Tamen hoc notandum est, cum & leviores cerebri perturbationes aliquando sequatur bilis vomitus, non semper pessima quæque prædicanda esse, dum hoc symptoma adest, nisi & alia mala signa con-

con-

concurrant. Accidit enim saepe, dum ex alto delapsi homines caput duro obstaculo impingunt, quod fiat vomitus a sola concussionis cerebri, licet postea nihil gravioris mali sequatur. In illo enim casu §. 258. ex Celeberrimo Ruyschii observationibus Anatomico-Chirurgicis recensito, cum Chirurgus mulierem, post lapsum ex curru in humum gelu duratam, aliquoties vomuisse intellexeret; pessima quoque suspicatus confusum in fronte locum cruciali incisione detexisset, nisi Ruyschius accedens hoc prohibuisset, qui solis fomentis capiti applicatis brevi sanavit totum hoc malum.

**DOLORES CAPITIS.** An ipsa cerebri vel cerebelli substantia doleat, dum male afficitur, nondum constat experimentis. Cerebri corticem sine dolore ladi posse, imo in puncto rescindi, dum in fungum excrescit, certo novimus. Medullam lissam convulsiones facere pariter constat; sed tunc illico sic turbantur omnia, ut non possit determinari, an tunc simul dolor adsit. Interim tamen constat, calvariae integumentum externa, imprimis pericranium & expansionem tendinosam huic incumbentem, (de qua dictum §. 239.) uti & ejus Periosteum internum sive duram matrem, dolere, dum laeduntur. Unde Celeberrimi in arte viri dixerunt, cephalalgiam calvariae ejusque integumentis proprium esse malum; uti delirium cerebro (*Lud. Duretus in Casus Praenot. Hippocrat. pag. 87.*). Cum ergo calvariae introgressio vel ejusdem post fracturam intropulsio non possit fieri siue lésione, vel saltem distractione, integumentorum, & ipsius durae matris, patet facile, dolores capitis sequi tale malum; nisi simul sic compressum fuerit ab ossis introcessione encephalon, ut omnes sensus aboleantur penitus. Unde dolores capitis in tali casu adhuc aliquid boni denotant, nempe cerebri functiones non esse penitus deletas.

**CONVULSIONES.** Quae semper sere docent, cerebrum sic compressum vel lissum esse, ut aequabilis spirituum influxus in nervos, motibus muscularibus interviens, turbatus sit; de qua te dictum fuit §. 230. & sequentibus.

**PARALYSES.** Quando nempe sic lissum fuit cerebrum, ut influxus spirituum in nervos muscularum motores omnino sit impeditus. Hoc malum iam, prout vel omnes

músculos, vel unum tantum latus corporis, vel denique quosdam tantum particulares músculos afficerit, varia nomina accipit, uti postea dicetur. Prout enim varia loca cerebri laesa vel compressa fuerint, diversus erit effectus. Mali semper omnis est Paralysis, capitis vulnera sequens; quia denotat, ipsum medullarem substantiam cerebri compressam vel laesum esse.

**LOTII FÆCUMQUE SPONTANEUM EXITUM.** Resolutis nempe sphincteribus ani & vesicae: & inter pessima signa, & in morbis, & in capitis vulneribus, hoc habetur. Nervi enim sphincteribus his interservientes ex ultimis nervis spinalis medullae, per ossis sacri foramina exeuntibus, originem ducunt; unde ipsius spinalis medullae originem ladi jam in cerebro patet. Distinguendum tamen est inter hanc resolutionem ani & vesicae, per quam urina & faeces sensim & continuo elabuntur, & ubi in apoplecticis aliquando, uti & in morbis acutis inflammatoris capitis, urina emittitur in vesica prius notabili copia collecta, singulis forte sex horis; infcio quidem ægro, tamen sine resolutione sphincteris vesicae, quia tanto tempore retinetur collecta in vesica clausa urina.

Longe enim gravius malum est, quando resolutio vesicae sphinctere sic clam elabatur urina, quam si notabili copia collecta effluit non recordantibus ægris. Ultimum enim illud incommodum pueris etiam sanis fatis frequens, imo & adultis aliquando accidit, licet nihil sinistri inde sequatur. Videtur & hæc distinxisse Hippocrates (*Prophet. Lib. I. prædict. 28. Toni. VIII. pag. 718. Et in Cas. Praenot. n. 390.*) dicens: *Urina non ræo tantibus emisse perniciosa; num Et ab his mejuatur, ac si sedimentum conturbaveris.* Ubi quidem magnum malum inde metuendum voluit; coerebrum enim oppressum significat. Sed in alio loco (*Cas. Praenot. nu. 474. ibidem pag. 878.*) dixit. *Quibus urina clam elabatur ad pudendum, exsolvantur desperati (ἀποσπεύει).* Sic enim legendam voluit hanc sententiam Foetus (*Foetii Hippoc. Opera omnia pag. 193.*) licet in textu vulgatum lectionem retinuerit, quæ habet: *Quibus clam urina decit, Et pudendum contrahitur, desperati sunt.* Pro τληντες, legitur ἐλαττοις apud Cornarium; & Duretus (*Lud. Duretus in Casus Praenot. Hippoc. p. 365.*) parti-

pariter huic sententiæ accedit. Unde patet, longe gravius malum indicari, si urina sic clam delabatur, resoluta vesicæ sphinctere, quam si copia quædam collecta non recordantibus agris excernatur. Et ob hanc causam Hippocrates (*Causs. Prævi. non.* 580.) postquam varias urine proprietates quoad colorem, crassitiam, & contenta recensuit tanquam perniciosas, absolute damnavit urinam qualemcumque, quæ occulte mingitur (*καθάρσις ὑπὸ μυστρί*).

APOPLEXIAS, FEBRES, MORTEM, hæc enim enarrata phaenomena designant, crani intropressionem leviori compressione tur-

§. 268. **Q**uin & ipsum Cerebrum ita ne, suppuratione, gangræna, fungo, hæmorrhagia, similia mala (267.) parit.

Præcipua malignitas vulnerum capitis inde pendet, quod vicinum cerebrum facile afficiatur: si ergo læsio tanta fuerit, ut ad cerebrum ipsum pertingat, facile patet, pessima quævis metuenda esse mala. Tota enim humanitas a mollis & pulposi huius visceris integritate pendet. Interim constat ex Anatomicis & Physiologicis, totum encephalon vasis constare, in quibus ergo compressis, vel lesis, obstructio, inflammatio, omnesque horum morborum sequelæ obtinere poterunt; uti & illa mala omnia, quæ ab extravasatis humoribus pre-mendo, vel ab iisdem corruptis rodendo, excitari poterunt. Observationes autem Chirurgicæ docent, hæc omnia cerebri læsiones secuta fuisse.

Homo acinace vulneratur in parte posteriori capitis cum læsione calvariæ: cumque in initio ab imperito Chirurgo tractatus fuisset, qui ruditer examinans vulnus specillum per calvariæ rimam in ipsam cerebri substantiam ad tertiam partem longitudinis specilli adegit; ideo prudentiores postea accedentes Chirurghi noluerunt trepanum adhibere, ne hæc operatio, quæ plurimis salutaris fuerat, infamaretur. Post varia symptomata misera vigesimo tertio die moritur: & aperto cratio deprehenditur abscessus magnus in sinistro cerebri latere, proprio folliculo circumseptus: quo pertuso ingens copia puris foetidi effluxit (*Scutellari Armentar. Chirurz. pag. 217.*). Paræus (*Liv. X. c. 23.*) testatur, se frequenter observasse, dum cadavera mortuorum

ex capitis vulneribus lustraret, ut de vulnere renunciaret ad indices, ingentem puris copiam, imo ipsius cerebri substantiæ corruptionem. Imo addit aliam Historiam, quæ docet, suppuratione intra calvariæ cavum facta superfluum tamen fuisse ægrum. Puer caput impegerrat pavimento lapideo tam vehementer, ut statim omni sensu privaretur: successit febris, delirium, & alia pessima symptomata. Septimo die ingens sudor accessit, & sternutatio, simulque magna copia puris per os, nares, & aures effluxit, cum levamine omnium malorum; & sanatus fuit puer.

Mirum Exemplum habetur (*Academ. des Sciences l'An. 1700. Hist. pag. 56. 57.*), ubi post lapsum ex alto, læso cranio, per foraminulum suture sagittali in hærens, exhibit puris satis magna copia; qua evacuatione per aliquot dies quandoque suppressa, convalescebat æger sæpius de die; exeunte puris cessabant convulsiones; tandem quinquagesima die moritur. In cadavere invenitur lara fissura sex pollices longitudine superans, sed jam coacta; in dura matre nullum vitium apparebat, sed totus lobus sinister cerebri erat suppuratus, dextro ejusdem lobo & cerebello integerrimis.

Plura similia exempla habentur apud Observatores; hæc sufficient, ut demonstretur, veram suppurationem in ipsa cerebri substantia obtinere posse. Et simul apparet, licet semper admodum periculosa sit suppuratio hic orta, non tamen semper mortem inde sequi.

Ubi.



Ubi autem loco benignæ suppurationis, quæ omne, quod legibus circulationis amplius obedire nequit, separat, gangræna cerebrum ipsum occupat, patet facile, nihil sperandum esse. Tale autem malum cerebri læsiones sequi aliquando, testantur observata. Miles post gravissimam capitis contusionem siue vulnere in Nofocomium recipitur, & post novem septimanas, dum nullum amplius dolorem nec aliud malum perciperet, jamque reditum in patriam meditaretur, noctu in lecto subito moritur. In cadavere nulla omnino læsio in calvaria detegitur, sed cerebri substantia, loco percusso subiecta, ad digiti crassitiem, poni instar putrefacti, corrupta apparebat, cum enormi, & ad ventriculos anteriores fere penetrante, putredine: levis præterea corruptio pia matris aderat, reliqua omnia apparebant illæsa ( *Scutleri Armentar. Chirurg. pag. 207.* ). Dum gravissima capitis vulnera ut cerebri substantiam penetrantia acceperat homo mense Octobri, moritur post biduum. Ablatis fasciis post mortem teter adeo exibat ex vulneribus odor, ut nullus ferre posset, vel ad cadaver accedere auderet ( *Hildan. Observ. Chirurg. Centur. 2. Observ. 25. pag. 103.* ). Tam enormis putredo bidui tempore in sanissimo homine, frigida satis tempestate, nasci potuit.

Ipsam encephalon corrumpi posse Hippocrates monuit, & vocabulo *σφακελίτις* usus est, ut hanc corruptionem designaret. Sic dicit: *Cerebro corrupto, quidam in tribus, alii in septem diebus moriuntur: illas autem si effugerint, servantur: Quibus autem scissione adhibita os disjunctum apparet, hi perirent.* ( *In Coac. prænot. num. 188.* ). & in Aphorismis ( *Aphor. 50. Sect. VII. Tom. IX. pag. 319.* ): *Quibus encephalon corruptum ( sicut autem vertunt etiam σφακελίτις ) fuerit, in tribus diebus percutit, si vero has effugerint, sani fiunt.* In his autem locis indicat, possibilem adhuc esse sanationem, licet encephalon corruptum fuerit. Patebit postea, ipsam cerebri substantiam, in fungos protuberantem, posse tolli secando, rodendo &c. superstitæ vita non tantum, sed & omnibus cerebri functionibus illæsis manentibus postea.

Deum fuit anrea §. 158. Num. 5. discifac cure, pinguedinem subiectam, æquabili pressione cutis non amplius coercitam, af-

furgere, & degenerare in carnem, fungosam dictam, in vulneribus. Simile malum in vulneribus capitis obtinet, quando & cranium ipsum, & dura mater percussa sunt. Naturaliter enim calvariæ cavum semper plenissimum est, uti aliquoties jam monitum fuit: ubi ergo cranii & duræ matris vulnere non amplius coercentur contenta, incipiunt protuberare; & quia arteriæ, antequam cerebri substantiam ingrediuntur, tunicas suas crassas elasticas deponunt, ideo impulsus vi cordis satis propinqui fluidis minus resistere possunt, unde dilantantur quam maxime, & viros tumores faciunt. Et quia præter omnem expectationem citissime emergunt tales tumores, & postquam ultra vulneris labia externa emerferunt, latissime expanduntur, in ipso vulnere magis restricti, ideo & a figuræ similitudine, & a subito incremento, fungos cerebri vocaverunt hos tumores. Omnium autem maximi tales fungi nascuntur, si valida febris impetum & velocitatem liquidi impulsu in vasa cerebri tam facile dilatanda auxerit. Quamdiu autem dura mater adhuc integra est, raro tales fungi nascuntur: hæc enim membrana satis firma coerct suppositam cerebri substantiam. Dum vero pia mater simul læsa fuit, longe magis adhuc fungi illi protuberant: nam videmus etiam in cadavere, levi vulnuscule pertusa pia matre, ilico corticem cerebri per vulnus factum emergere.

Plurima jam habentur observata Chirurgica, quibus constat, dissecto cranio & dura matre, cerebri substantiam in mirabiles tales tumores excrescere, unum alterumve tale observatum adduxisse sufficiet.

Nobili juveni lapidis iactu dextrum bregmaticis os frangitur; exit statim ipsa substantia cerebri ad dimidiæ avellanæ magnitudinem: cumque junior quidam Medicus præsens negaret esse cerebri partem, sed pinguedinem esse diceret, experimentis probavit Paræus ( *Livre X. chap. 23.* ) prodidisse de vulnere ipsam cerebri substantiam. Docet hoc Exemplum, vulnere læsis cranio & coercentibus cerebrum membranis, citissime protuberare posse ipsam cerebri mollem fabricam.

Puero quatuordecim annorum globulo ligneo inter ludendum sinistra ossis frontis pars percutitur: mox concidit, bilem vomit, & postea perrexit omnia fere ingesta evomere.

mere. Post binos menses, cum admodum male se habere pergeret, cranium terebratur; cum impetu per foramen factum pus erupit. Postea ipsa cerebri substantia incipit emergere, nec potuit coerceri; unde filo circumstricto resecabatur: mox similibus substantia fungi instar ad trium digitorum altitudinem erupit, iterum simili methodo ablata. Hocque sæpius factum fuit, sic ut fungi omnes resecti pugni magnitudinem æquaverint: tamen postea curatus fuit (*Hild. observ. Chirurg. Centur. IV. Observ. III. pag. 287.*).

Septem annorum puer ex equo delapsus gravi vulnere dextrum bregmatis os læsit. Quinto die fungus excrevit ex cranio pertuso digitum crassus, pollicem longus: Parentes accuratam vulneris inspectionem, & cranii depressi elevationem, noluerunt admittere, & constanter asseruerunt, se male filium mitiori cura tractatum mori, quam incerto cum eventu crudelis operationis molestias subire. Hinc solis excruciantibus fere fungum tollere conati fuerunt Medicus & Chirurgus. Mansit sic fungus vix mutatus per tres integros menses; symptomatibus autem pessimis, quæ in initio adfuerant, penitus mitigatis, imo fere integre abolitis: omnes actiones vitales, animales, naturales restituebantur, sic ut corporis habitus augeretur, & solitis ludis puer tempus falleret. Circa quarti mensis initium fungus multum increvit: pulvere tamen ex Euphorbio & alumine ulso inperso sublatus fuit; sed intra viginti quatuor horas alius fungus ovi gallinacei magnitudinem excrevit, cum exacerbatione omnium malorum. In hoc fungo valida pulsatio artieriarum apparebat, & ruidus tractatus sanguinem copiosissime sudit. Frustra tentatum fuit rodentibus consumere luxuriantem fungum; unde angustiores cervicem fungi filo circumducto constrinxit Chirurgus; sed oriebatur pulsatio tam enormis artieriarum in fungo, ut tota ejus moles subsillire videretur. Constringendo tamen hac methodo perrectum fuit, & maxima fungi pars cum intolerabili fetore una cum filo decidit. Residuum fungi nigricans, fordidissimum, penitus corruptum horrendo aspectu apparuit, convulsiones, tremores, hemiplegia secuta fuerunt. Tamen post aliquot dies omnes illæ partes fungi corrupta deciderunt; sed alius fungus cineri-

tii coloris, nucem juglandem magnitudine æquans, indolens, cum pulsû manifesto artieriarum, per fungosam hanc substantiam dispersarum, ex vulnere emerfit, qui post paucos dies sponte subsedit, & ingens hiatus in ipsam substantiam cerebri penetrans apparuit. Post bideum unius noctis spatio totum hoc cavum novo fungo oppletum fuit, & paucis diebus postea, prius opisthotono terribili per bideum excruciat, misellus puer, quarto mense post acceptum vulnus finito, moritur: sensus tamen omnes, loquela, & ratiocinium consisterunt ad vitæ finem usque (*Miscell. curios. Doctor. II. anno 9. Observ. CLXXIV. p. 321.*).

Mirabilis hæc historia docet, fungos tales cerebri ipsius substantia vasculosa, mirum in modum dilatata, conflare, & cito renasci, licet ablati fuerint. In cadavere deprehensum fuit, cerebri corticem in loco vulneris penitus consumtum fuisse, & pure copioso omnia diffuere.

**HÆMORRHAGIA.** Vasa sanguinea triplicis imprimis generis in encephalo solent considerari. 1. Illæ arteriæ, quæ per duram matrem dispersæ, satis fortes & validæ, & duplicatura hujus membranz defensæ, tuto satis locantur: Arteriæ autem hic satis insignes esse, docent sulci ab his arteriis cranio impressi. 2. Vasa sanguinea per piam matrem dispersa, quæ tota vasculosa esse injectionibus Anatomicis demonstratur. Arteriæ autem illæ crassis tunicis depositis, antequam piam matrem ingrediantur, tenerrimæ sunt, hinc facilius lædendæ. Simulac vero vasa illa sanguinea ex pia matre in cerebri corticem contiguum pervenerunt, jam non amplius sanguinem rubrum habent, sed longe tenuius fluidum. Naturaliter enim in cortice cerebri nihil rubri sanguinis unquam apparet. 3. Per ipsam medullarem substantiam encephali vasa sanguinea disperguntur, quod oculo etiam conspicua, quæ blando calore tenerrima flamina medullosa foveant. Similia satis magna etiam medullam oblongatam ambiunt. Et in cavis cerebri ventriculis mirabiles illi processus pie matris hærent, qui plexus choroidei dicuntur, nulli parti ventriculorum cerebri accreti, sed libere ibi fluctuantes, & toti vasculosi, uti & injectio Anatomica, & sine his nudus oculus etiam docet. In omnibus his locis per vulnera ladi possunt hæc vasa, & san-

# §. 268. ad 271. VULNERA CAPITIS.

305

sanguinem effundere: & licet causa vulnerans non adeo profunde penetraverit, solo tamen concussu valido, tenerima vasa per piam matrem & in cerebri ventriculis &c. dispersa poterunt frangi, & effusus sanguis comprimendo encephalon poterit omnes actiones cerebri turbare, imo integre delere; uti innumeris observatis constitit.

Qualicumque denum nunc causa fuerit, quæ cerebrum læserit, vel compresserit, vel denique inflammando, suppurando, putrefaciendo, destruxerit ejus fabricam; poterunt sequi omnia illa mala, quæ §. 267. recensentur, a levissima vertigine ad lethalem apoplexiam usque.

## §. 269. ID vitii (267.) noscitur tactu, visu, ablati integumentis (259.)

In prima deligatione vulnerum capitis omnia hæc sedulo examinanda sunt, quantum fieri potest: symptomata enim, capitis vulnus secuta, sæpe eadem sunt, licet diversæ partes læsæ fuerint. Nam dum cranium intropressum, vel post fracturam intropulsum, comprimit encephalon, poterunt adesse omnes cerebri morbi; atque iterum, dum cranio illeso, fractis vasculis, v. g. piæ matris, effusus sanguis contentum premit cerebrum, omnia eadem mala sequi poterunt: sed cum per sensus cognosci possit, an calvaria læsa fuerit, an non;

hoc primo explorandum est. Quod sit, si capillitio prius derafo locus affectus digitis molliissime undique pertractetur, ut appareat, an convexa calvariæ figura mutata fuerit, an non. Magnam tamen in hoc examine cautelam requiri, & tactum sæpe fallere posse, dictum fuit §. 255. num. 7. Si vero tam magna fuerit intropressio calvariæ, ut visus foveam impressam facile detegat, nullum dubium manet. Et dum ob symptomata vehementiora, discissis integumentis, nudatur calvaria, facile detegitur, an tale malum obtineat, an non.

## §. 270. A Blatio pungentis, restitutio prementis in statum naturalem, conservatio hujus status, sufficiunt

Generalis indicatio curationis tribus his continetur. Aliquando enim accidit, fracturam cranium & intropulsam acuto fragmento lædere subjectum encephalon; quandoque, obtuso & imprimis rotando obstaculo dum caput impingitur orbiculare frustum ex calvaria excutitur, quod intropressum cerebrum comprimit, non autem pungit vel lacerat. Imo aliquando contigit, externa tabula calvariæ illæsa, internam tabulam in fragmenta dissiliisse, quæ pungendo & lacerando subjectum cerebrum mortem intulerunt. Talem casum refert Peræus (*Livre X. chap. 8.*). Nobili viro caput casside armatum globo plumbeo percutitur sic, ut ferreum illud capitis tegumentum intropremetur; nihil tamen in externa cute læsum apparebat, nec ulla calvariæ intropressio poterat detegi. Sexto tamen die moriebatur apoplecticus: In cadavere appa-

ruit, calvariæ tabulam internam; externa licet integra, in fragmenta dissiliisse, quæ in cerebri substantiam penetraverant. Idem se in alio simili casu vidisse & Celeberrimis Archiatri præsentibus ostendisse dicit. Apparet facile difficultas detegendi tale latens malum: ubi autem cognoscitur adesse, summa cum prudentia acutum tale fragmentum extrahendum est; cavendo, ne circumtorquendo, vel fortius movendo, lædatur magis cerebrum. Ubi vero calvaria intropressa vel intropulsa in statum naturalem restituta fuerit, tunc requiritur ut in hoc situ retineatur, & impediatur, ne iterum introcedere facile possit. Causa tunc comprimente sublata, æquabilis humorum circuitus per partes jam liberæ restituet naturalem usum: ars in hoc casu tantum in situm naturalem reducit illa, quæ inde deviaverant.

## §. 271. E Rgo detectum cranium (259.) molle in pueris, emplastro tenaci elevatur; in adultis, si firmum, elevatorio attollitur; si vacillans terebram non sustinet, perforanda juxta fracturam calvaria, ut vecti possit attolli impressum vacillans; juvat sternutatio, & animæ retentio.

Raro deprimitur cranium sine fractura, nisi in junioribus, in quibus mollia adhuc  
Tom. I.

ossa facilius cedere possunt sine ruptura. Ut autem eleveatur cranium sic intropressum,  
V

fum, excogitaverunt Chirurghi hanc methodum, ut sursum perpendiculariter tractis integumentis os intropressum eleveetur. In juniori enim ætate pericranium firmissime ossibus adhæret, valis in omni puncto emissus & receptis: procedente vero ætate plurima talia vasa sensim obliterantur, unde observatur in summo senio minor cohesio Periostei cum ossibus. Cum ergo in junioribus firma adhæsiō Pericranii & ossium flexilitas magnam spem faciant, sic elevari posse depressum cranium, hæc methodus tentanda erit, antequam ad operosiora artis molimina procedatur: saltem nunquam nocebit hoc prius tentasse. Duplici autem modo hoc fit: vel enim loco affecto imponitur cucurbita, quæ, ubi firmiter adhæret, subito perpendiculariter sursum avellitur: sic magna vi trahuntur sursum omnia integumenta, & simul elevari poterit intropressum cranium (*Paræ Livre X. chap. 5. Hildan. Observ. Chirurg. Centur. 2. Observ. 5. pag. 82.*). Vel cuti in loco affecto applicatur tenax emplastrum ex pice, vel alio quocumque, quod firmiter adhærere possit; & monet Hildanus (*Ibid. pag. 82. 84.*) capillos non omnino abradendos esse, ut magis hereat Emplastrum; & simul voluit Emplastri magnitudinem non debere esse tantam, ut totum locum intropressum tegat, sed tantum tertiam circiter ejus partem, sic enim tota vis, dum elevatur Emplastrum, loco intropresso applicabitur. Simul debet per medium Emplastrum funiculus transire, quo prehensio possit perpendiculariter sursum trahere Emplastrum Chirurgus, postquam prius firmissime loco affecto adhæsit.

Ubi vero frustra tentata fuit hæc methodus, vel in adultis nulla spes est, posse sic restitui calvarie depressionem; tunc dissectis integumentis nudato ossi applicant illa instrumenta, quæ elevatoria dicuntur. Varia talia habentur descripta apud auctores chirurgicos, & omnium optima videntur illa, quæ spiralem terebram habent; quæ leniter circumtorquendo suspensa manu medio centro loci depressi infigitur, & deinde, ubi hæret satis firmiter, sursum trahitur una cum cranio intropresso. Varia talia instrumenta delineantur, illorum quæ usus indicatur apud Hildanum (*Observ. Chirurg. Centur. 2. Observ. 3. pag. 80. 81. 82. 83.*) Scultetum (*Armannum. Chirurg.*

*tab. 3. pag. 9.*) Parquum (*Liv. X. chap. 5.*) &c. Inio Hildanus ibidem narrat, dexterimum Chirurgum, dum aliis instrumentis careret, felicissimo successu adhibuisse spiralem terebram qua dolarii utuntur, & rudi hoc instrumento non tantum elevari depressum cranium, sed & fragmenta nonnulla extraxisse.

Quamvis autem suspensa manu infigatur loco depresso talis terebra, tamen aliqua pressio requiritur, ut applicari possit: hinc, si vacillet os depressum, periculum foret, ne profundius descendens cerebrum pessime læderet. In tali casu alia opus est methodo: si rima tam patula adsit, ut vestis intromitti possit, tunc sic elevatur os depressum, curando ut vestis hypomochilium firmæ calvarie imitatur. Ubi vero non patet talis vestis aditus, ut depresso ossi submitti possit, per artem facienda via est. Excinditur tunc tropani modio juxta locum fractum & depressum foramen, per quod immisso veste os depressum elevari poterit; & si unum tale sufficere non videatur, plura similia excindenda forant. In maxima cranii depressione septies modiolis cranium in depressionis circumferentia perforare se coactum fuisse faretur Scultetus (*Armannum. Chirurg. Observ. VII. pag. 198.*) & deinde foraminum interstitia fornice excindere debuit, ut tolleretur os depressum, quod elevare non poterat. Et quamvis tantum decimo sexto post acceptum vulnus die tam periculosa institueretur operatio, perfectissime tamen homo sanatus fuit; sic ut octo circiter septimanis post hæc peracta militare munus suum iterum potuerit obire.

JUVAT STERNUTATIO ET ANIMÆ RETENTIO. In sternutatione sentitur levissima & grata titillatio circa nares, vel & aliquando simile quid percipitur circa præcordia: simulac alterutrum vel utrumque ex his sentitur, homo cogitur suspendere omnes actiones corporis, & expectare, quid futurum sit; momento post ingens convulsio omnium muscutorum expiratori inservientium fit cum impetu non coercedo, & subitoque contractus pulmo omnem aerem contentum expellit sonoro cum sibilo. Illo ergo momento, dum validissima illa expiratio fit, sanguis per pulmonem transire nequit; hinc sanguis venosus a capite rediens impeditur, quo minus se liberet

bere in corde dextrum evacuet, unde distenduntur omnia encephali vasa, simulque validissimo hoc concussio arteriosi sanguinis impetus augetur; sicque a binis his concurrentibus causis satis valide distenditur totius encephali moles. Rem autem sic se habere patet, quia repetita sternutatione incipiunt vacillare omnes sensus & motus musculares, turget facies, lacrimae exprimuntur, nasus stillat; imo si sequentius recurrit, saepe omnes cerebri functiones mirifice turbantur. Dura vero anima retinetur, sanguinis transitus per pulmonem, retento aere & per calorem dilatato compressum, pariter impeditur; unde venae jugulares se evacuire non possunt, & hinc omnia eadem fiunt, quae in sternutatione dicta fuerunt, cum hac tamen differentia, quod tempore inter binas sternutationes medio liber iterum fiat transitus sanguinis per pulmonem; quamdiu autem anima retinetur, augetur omni momento pulmonis compressio, aere retento in pulmone, mora plus calefacto, & dilatato. Si ergo ossa adhuc flexilia fuerint in junioribus, vel in adultis sic soluta, ut levi vi mobilia sint, turgens retento sanguine encephalon poterit elevare depressam cranii partem, vel saltem adjuvare hanc elevationem, dum alia methodo tentatur.

Neque adeo levem esse hanc vim, qua distentum encephalon urget coercentem calvariam, docuit mirabilis casus. Puella tredecim annorum, tegulis ex scissili lapide factis (Ieyen) ex altissime domus tecto in caput delapsis, adeo magna fiebat impressio calvariae illo in loco, ubi sutura sagittalis cum coronali concurrebat, ut quatuor

pollices aequaret diametret loci laesi. Cum pessima symptomata urgerent, praemissa venae sectione, statim applicabatur trepanum; dumque tentaret pericrissimus Chirurgus elevare depressa calvariae frusta, invenit omnia sic separata esse a vicinis, ut tolli debuerint. Sic ingens hiatus patebat, tam magna parte calvariae ablata; felix tamen tanti vulneris cura trimestri spatio perfecta fuit. Debiliior tamen locus lamina plumbea defendebatur, quam per binos menses gessit haec puella, posteaque neglexit, nihil amplius mali metuens; sicque per septem adhuc menses sana vixit. Mala fortuna correpta fuit russi convulsiva tunc Epidemica, quae tanta cum vehementia miseram hanc puellam in lecto de nocte decubentem exagitavit, ut cicatrix sanati vulneris dilataretur, & ultra binas uncias ipsius cerebri substantiae exprimeretur de vulnere; statim paralytica facta fuit omnibus suis membris, loquela tamen & ratiocinio manentibus integris, & quinta die post tristo hoc infortunium perit (*Medical Essays Tom. II. pag. 245. — 249.*). Satis notum est, in molestissima illa tussi sic impediti omnem sanguinis transitum per pulmonem, ut horrendo spectaculo hivelat, imo nigrescat saepe, tota facies sic affectorum, cum nihil sanguinis venosi ab externis aequae a iatremis capitis partibus cor dextrum, ob convulsos pulmones plenissimum, ingredi possit, pergente interim corde sinistro urgere sanguinem per arterias. Unde distentissima Encephali moles disruptit cicatricem vulneris jam per novem menses sanati. Atque hinc patet, quanta efficaciter distenta encephali vasa urgeant calvariam.

## §. 272. IN situ tenetur cavendo pressionem externam apta deligatione.

Altera par indicationis curatoriae §. 270. descriptae erat, ut pars intropressa, jam restituta in statum naturalem, sic conservaretur. Hoc autem satis facile fieri poterit, modo tantum praecaveatur, ne aliqua pressio externa in hunc locum agere possit. Tota enim moles encephali, calvariae cavum naturaliter semper replens, a comprimente parte calvariae intropressa libera, assurgit, & sustinebit restitutum os, ne propria gravitate iterum demergatur. Unde non videtur hic opus esse magno molimi-

ne, nec instrumentis, ut restitutum os in situ retineatur. Apud Hildanum (*Observ. Chirurg. Centur. II. Observat. 4. pag. 82.*) delineatur instrumentum, quo restituti ossis subsiditiam praecavere nititur. Spiralis nempe cerebra cranio infigitur, quia in parte superiori variis foraminibus perforatur, per quae stylus ferreus transmitti posset varia altitudine, ut huius styli transversus cranio incumbens opus sustineri posset vacillans ossis pars, voluitque splenis suppositis utrique styli extremitati in omni calvariae loco

loco hoc fieri posse. Apparet facile, molestum esse, tamdiu terebram hanc calvariae infixam relinquere; & ex modo dictis patuit, hoc minime necessarium esse. Sufficit ex charta vel lineo contorto, aut alio simili quocunque corpore, annulum facere, paulo maiorem loco affecto, illamque

§. 273. **F**isso, fracto, contusove cranio, si arteriae, venae, lymphatica vasa sub cranio rupta effuderint suos humores, hi premendo cerebrum producunt mala (§. 267.), tam putrescendo incina cerebri, unde rursus similia. Hæc vasa ex cranio in duram, ex hac in piam, inde in cerebrum, sinus, ventriculos decurrentia variis locis varia periculo & latione damna producant.

Si tanto cum impetu causa vulnerans capiti fuerit applicata, ut durum calvariae os frangere, frangere, vel & valida contusione lædere poterit; patet facile, summum esse metum, ne vasa sanguinea, vel & alia, quæ tenuioribus liquidis replentur, per cerebri membranas, vel ipsam ejus substantiam ubique dispersa, frangantur; & his fractis, effusi humores, collecti sub cranio, comprimant contentum encephalon. Uti enim jam aliquoties dictum fuit, totum calvariae cavum semper exactissime plenum est; hinc non possunt effusi humores hic colligi, quin fiat ab iisdem compressio contenti encephali. Omnia ergo illa mala, quæ ab hac compressione fiunt, & enumerata fuerunt §. 267. metuenda sunt. Nihil enim refert, hoc respectu, quænam sit causa comprimens: siue cranii figura mutata minuat ejus cavum, siue humores effusi, manente eadem calvariae amplitudine, spatium occupent, quod antea a solo encephalo replebatur exactissime; effectus semper erit idem; nempe turbatio, vel abolitio functionum encephali, compressa ejus substantia.

Vasa sanguinea, quæ per duram matrem disperguntur, satis firma sunt, tunicis nempe callosis instructa, uti in reliquo sere toto corpore, unde difficilius franguntur. Sed si consideretur, duram matrem ubique calvariae firmiter adhærere, facile patet, causæ vulnerantis impetum, in calvariam agentem, substantiæ continuatæ quasi, facilius communicari duræ matri: accedit, quod, si fracta vel fracta calvaria, summum periculum sit, ne adhærens dura mater simul laceretur, vel a fragmentis offe is acutis vulneretur. Vasa autem sanguinea, satis magna, per piam matrem, ipsamque medullarem substantiam dispersa, teneri-

apta deligatione sic firmare, ut immobilis hæreat, totumque locum affectum suo ambitu contineat. Sic cavebitur, ne ligatura capiti circumducta locum affectum premere possit; neque, dum in somno pulvinaribus vel aliis obstaculis allideret caput vulneratus, poterit comprimi locus læsus.

si arteriæ, venæ, lymphatica vasa sub cranio rupta effuderint suos humores, hi premendo cerebrum producunt mala (§. 267.), tam putrescendo incina cerebri, unde rursus similia. Hæc vasa ex cranio in duram, ex hac in piam, inde in cerebrum, sinus, ventriculos decurrentia variis locis varia periculo & latione damna producant.

Præterea humores fractis vasis effusi, flagrant, spontanea degeneratione corrumpuntur; & acres facti tenerissimam encephali pulsam inflammando, suppurando, rodendo, destruent; unde iterum omnia eadem mala nascentur, quæ a compressione fieri observata fuerant; sed longe pejora; quia ablata causa comprimente spes erat restitui posse functionum integritatem; destructa vero ipsa organi fabrica, erosio tenerissimis vasis, immedicabile malum est. Ab effusis autem & corruptis humoribus talia mala fieri, constat ex illis, quæ dicta sunt in commentariis §. 170. n. 1. B. & §. 268.

Ex his etiam patet, gravissima capitis vulnera, dum fracta calvaria exitus patet effusis humoribus, sæpe minus periculosa esse, quam ubi leviori vulnere sub calvaria effusi humores retinentur. Vide commentaria in §. 265.

Arterias autem, venasque sanguineas ruptas, sanguinem effudisse sub calvaria, nemo dubitat; & ab hoc sanguine effuso, encephalon comprimente, orta fuisse omnia illa mala recensita, constat certissima observatione. An vero lymphatica vasa, per encephali fabricam dispersa, a similibus causis rupta, tanta copia lympham fundere possint; ut ab hac lymphæ collecta comprimatur encephalon, magis dubium videri posset; cum hæc vasa tam exigua sint, & rarius accidat, quod, integris manentibus vasis sanguineis per encephalon dispersis, sola lymphatica rupta fuerint. Talia tamen vasa adesse, quæ tenuissimam lympham vehunt, satis constat. Tota superficies du-

re matris, quæ piz matri accumbit, semper humida apparet; uti & tota externa encephali superficies: ventriculorum cerebri omnis ambitus tenuissimo tali liquido madet, quod nisi adesset, contiguae superficies partium brevi concreverent inter se. Illud tenuissimum fluidum, continuo halitus forma per terrerrima vascula expulsum, nisi reforescat venulis, accumulatur, & omnes cerebri morbos producere poterit; uti observata plurima apud auctores docent, lympham talem collectam fuisse inter duram matrem & cerebrum, inter piam matrem & arachnoideam ipsi accumbentem, in ipsis cerebri ventriculis &c. Observatum enim fuit, omnem ventriculorum cerebri superficiem tegi membrana tenerrima, quæ injectionibus Anatomicis, & per inflammationem hic naram, vasculosa esse detegitur ( Winslow Exposition Anatomique, Crc. pag. 623. ). Sed hæc vascula naturaliter tenuem lympham, non vero rubrum sanguinem, continent. Præterea vasa lymphatica vulgo Anatomicis dicta, quæ semper venosa sunt, hic pariter inventa fuerunt, & a Ridley delineata ( Ridley Anatom. Cereb. F. 5. lib. 45. ). Cum ergo & in aliis corporis partibus vulneratis aliquando sequatur incredibilis lymphæ tenuis effluxus; videtur & idem in encephalo obtinere posse, illudque observatis Medicis confirmatur. Puer septennis, baculo caput percussus, post cephalalgias, vigiliis, somnolentiam, vertiginem &c. vigesimo sexto die moritur. Ventriculi anteriores cerebri inveniebantur sero lymphidissimo distenti ( Robinson de remediis. vulner. pag. 182. ). Illustrius Princeps ex alto delapsus capitis sinistram partem tam valide gradibus allidit, ut semianimis sine sensu, motu, loquela jaceret per integrum fere diem;

§. 274. **C**oncussus validus capitis, integro sæpe cranio, eadem ( 273. ) facit rumpendo, comprimendo.

Aliquando accidit, lapsu ex alto, vel capitis valida collisione obroso instrumento facta, integro cranio, sic lædi cerebrum, ut omnia sequantur mala, quæ hæcenus enumerata fuerunt. Dum enim v. g. quis ex alto delapsus duro impingit obstaculo, cerebrum calvaria contentam eadem velocitate deorsum fertur; sed obstaculum resistens calvarie motum sistit primo, unde cerebri moles, adhuc illo momento prioris motus di-

rectiōnem habens, valide poterit allidi ad duram calvariam, & sic insigniter lædi. Eodem modo, ac dum quis navi vehitur, & obstaculum occurrit navis motum sistat, perget moveri antroforum, & cadet. Verum quidem est, cum encephalon calvariam exacte repleat, multum minui hujus impulsus vehementiam; tamen inde posse frangi vasa encephali, humores effundi, & omnia, quæ inde pendunt, mala sequi, docent observata Medica.

**HÆC VASA EX CRANIO IN DURAM &c.** Prout jam liquida, fractis vasis effusa, hæserint in variis locis encephali, poterunt comprimendo, vel rodendo, lædere diversas functiones. Sic v. g. dum effusum in ventriculis cerebri humores ad quartum ventriculum perveniunt, qui initium est rimæ decurrentis per totam longitudinem spinalis medullæ, poterunt hac via delabi, & varias paralyses particulares, hemiplegiam &c. producere. Cæteris autem paribus, semper erit eo pejus malum, & difficilior curandum, quo profundius hæserint humores extravasati. Sanguis enim collectus inter cranium & duram matrem, perforata calvaria, statim exiit; si inter duram matrem & piam hæserit, non nisi pertusa dura matre educi poterit. Si in ipsis ventriculis cerebri, vel & circa basem calvarie hæreant effusi humores, patet facile summum discrimen & curæ difficultas; quæ sæpe etiam omnino impossibilis est, dum nequit exitus conciliari per artem effusis liquidis encephalon comprimantibus.

rectiōnem habens, valide poterit allidi ad duram calvariam, & sic insigniter lædi. Eodem modo, ac dum quis navi vehitur, & obstaculum occurrit navis motum sistat, perget moveri antroforum, & cadet. Verum quidem est, cum encephalon calvariam exacte repleat, multum minui hujus impulsus vehementiam; tamen inde posse frangi vasa encephali, humores effundi, & omnia, quæ inde pendunt, mala sequi, docent observata Medica.

*Pulchra virgo, Novei filia, annorum viginti ab amica muliercula ludente lata manu synceps percussa est, ac tunc tenebrosa vertigine prebensa est, nec respirabat; cumque domum pervenisset, illam statim febri prebendit, & caput distulit, & rubor erat circa faciem. Septima die ad aures dextram pars prodiit grævolens, subrubrum, cyatho amplius; & videbatur melius se habere, & levata est. Cr. nona die perit ( Hippocr. Epid. lib. 2. tenui 32. Tom. LX. pag. 344. ). Facile apparet, levi tali percussione, lata manu facta, calvariam fractam, vel fissam aut intropressam minime fuisse; sed ipsum encephalon sic fuisse læsum, ut fractis vasculis effluis humores in sætidum subrubellum ichorem degenerarent, & tandem mors ipsa secuta fuerit. Plurima similia apud recentiores observatores habentur exempla, quibus constat, illeso cranio, posse tamen valida capitis percussione sic lædi encephalon, ut fractis vasculis majoribus, & sanguine effuso intra calvarie cavum, mors sequatur. Unicum tale adduxisse sufficiet. Puellæ sedecim annorum, ex lapsu quarto die defunctæ, cadaver lustravit Bobovius ( De Remediis. vuln. pag. 172. ), ut de mortis causa renunciaret ad Judices: & licet post lapsum venti adhuc puellæ ex ore & naribus copiosius manasset cruor, ac post mortem adhuc manare pergeret, nihil omnino violenti effectus in capite observabatur. Aperta calvaria, & elevato cerebro, carotidum ramus sinister anterior ruptus inveniebatur. Docet hoc exemplum, magnam arteriam, tuto sub ipsa basi cerebri reconditam, solo concussu tali, calvaria illasa, posse rumpi: unde apparet, simile malum reliquis encephali vasculis accidere posse. Cum autem constet ex Physiologicis, arterias per piam matrem dispersas, simulac corticem cerebri ingrediuntur, in tomentosam tenuitatem abire, & vasculis his tenuissimis corticalibus continuari medullas fibras minimas; facile patet valido tali concussu posse frangi vel comprimere tenerrima illa encephali stamina, unde vita & humanitas pendet: atque inde varia læsio, vel & abolitio omnium encephali functionum, sequi possunt; licet nulla læsio, aut humorum effusio, intra cavum calvarie detegatur: Omnem enim sensum hæc minutissima fugiunt. Juvenis robustus, ut evitaret rotæ supplicium, in carcere prono capite, manus post tergum*

reclis, tanta vi impexit in parietem validissimo cursu, ut ilico conciderit mortuus, nullo verbo vel clamore edito. Dum cadaver lustrabatur, nulla contusio, nullus tumor, nulla fractura apparebant in capitis vertice, quo impegerat in parietem ( uti testabantur alii eodem loco inclusi ). Integumentis omnibus ablatis, in illorum parte interiori, qua calvarie accumbant, nulla læsio apparebat; neque in ipsa calvaria, præterquam quod pars squamosa ossis temporum parum secetisset ab osse bregmatico, cui incumbit; tamen inde nullo modo tam subita mors sequi poterat. Serra discisso cranio nullum omnino damnum apparebat, sed encephalon non replebat exacte calvarie cavum, ut solet, & totius encephali substantia firmior & solidior apparebat, quam aliter observatur ( Academ. des Sciences l'an. 1705. Histoire p. 68. 69. ). Patet ex hac historia, subitam mortem, validam capitis percussione talem secutam, tantum adscribi potuisse huic encephali totius subsistentiæ, per quam tenerrima illa stamina vel fracta fuerunt, vel sic intorta aut complicata, ut non amplius pervia manserint subtilissimis totius corporis liquidis.

Simul etiam colligitur ex dictis, diversas posse functiones encephali lædi, prout variaz partes hujus organi tali concussione læsæ fuerint. Hippocrates dixit ( Aphor. 58. Sect. 7. Tom. 9. pag. 325. ), Quibus cerebrum quadam occasione concussum fuerit, illos quoniam primum voce privati necesse est; & alibi ( Hippocr. de Morbis lib. 1. cap. 2. Tom. 7. pag. 533. ) addidit, talem nec videre nec audire necesse est. Et Heurnius in Commentariis suis ad hunc Aphorismum ( pag. 504. ) dicit, se novisse quosdam, qui, cum in occiput lapsi fuissent, tota vita gustum & odoratum amiserint. Quatuor annorum puer, sine ulla difficultate loquens, de scamino in caput decidit; nullum omnino observatur damnum: tertio die surgens puer incipit balbutire, cæterum sanus; sequentibus diebus angeatur malum; deinde fomentis cephalicis capiti applicatis, aliisque quibuscumque remediis interne datis, rediit loquelæ integritas ( Miscell. curios. dec. 1. ann. 2. observ. 120. pag. 198. ). Homini cuidam post capitis percussione per plures annos manifestissima difficultas loquendi, quando decumberet ( Acad. des Sciences l'an. 1732. Hist. pag. 42. ). Neque tantum talis cerebri concussio



cussio sit, percussio capite; verum etiam accidere poterit, dum quis ex alto delapsus aliis corporis partibus impergerit. Tale exemplum habetur apud Galenum (*De Locis affectis Lib. 1. c. 6. Tom. VII. p. 295.*) de homine, qui ex alto delapsus dorso initium tertae impergerat; tertio die postea exitum vocem emisit, quarta omnino obmutuit, & resoluta simul fuerunt crura, ma-

nibus omnino illaesis &c. septima die redierunt vox & crurum motus. Galenus quidem solius spinalis medullae affectionem hic culpavit, sed cum paralysis solos inferiores artus occupaverit, facile patet, si spinalis medullae initium non fuisse laesum, aliter & manus paralyticae fuissent. Unde vocis ablatio in hoc casu cerebri concussioni potius videtur adscribenda esse.

§. 275. **C**ognoscantur mala haec (273. 274.) ex nota causa; ejus impetu; loco excipiente; vomitu bilioso; visu, auditu, olfactu, gustu, tactu minutis, depravatis, sublatiis; vertigine, caligine, lapsu; sopore, stertore; resolutione; convulsione; delirio; lethargo; apoplexia; horripilatione; febre geminata; cruore per os, nares effluente; rubore faciei & oculorum.

Agitur hac paragrapho de signis; per quae cognosci potest, effusus humores sub cranio preinendo, vel rodendo acrimonia stagnando acquisita, encephalon laedere; vel etiam concussione: sic mutata esse tenebrim hujus organi fabricam, ut ejus functiones inde turbentur, vel deleantur.

**EX NOTA CAUSA, EJUS IMPETU, LOCO EXCIPIENTE.** Omnia enim haec si cognita fuerint, magnam lucem affundunt lateant malorum inquisitioni. Obusum enim instrumentum vulnerans, valido impetu capiti impactum, semper metum facit fissuræ vel fracturæ cranii. Prout jam vario loco capitis laesio facta fuerit, iterum majus minusve periculum erit. Quibusdam enim in locis calvaria tenuissima est, aliis locis longe crassior. Satis notabiles arteriæ duræ matris in profundis sulcis calvariae haerent in certis locis, unde causa laedens, his locis applicata, facile frangere poterit hæc vasa; & effusus sanguis comprimere encephalon.

**VOMITU BILIOSO.** Ille enim vulnera capitis sequens fere semper male affectum cerebri designat; sive ab effusis humoribus compressum fuerit, sive concussione valida turbata fuerit ejus actio. De hoc vomitu autem dictum fuit §. 267.

**VISU, AUDITU, OLFACTU, GUSTU, TACTU MINUTIS, DEPRAVATIS, SUBLATIS.** Constat ex Physiologicis, cerebri integritatem requiri, & liberum commercium inter cerebrum & nervos hic sensibus inservientes, ut fiat perceptio idearum, quæ per sensus externos menti representantur. Unde patet evidenter, si post vulnera capitis minuatur, aut depravetur, vel & integre aboleatur horum omnium, vel quorundam tantum actio, cerebrum sic affectum esse,

ut origo nervorum, his sensibus inservientium, compressa, vel alio quocunque modo laesa non amplius transmittat subtilissimos spiritus cerebri fabrica secretos, & ad sensuum integritatem requisitos.

**VERTIGINE, CALIGINE, LAPSU.** Dictum fuit in Commentariis §. 267. levissimum cerebri morbum esse vertiginem, sive apparentem rotationem corporum vicinorum; ubi vero augetur malum, tunc simul tenebras apparere: & vocatur tunc vertigo tenebrosa; simul sic resolvitur tunc omne corporis robur, ut incipiant vacillare omnia membra, & tandem cadat homo. Illud autem designat, quod non tantum illa pars sensorii communis affecta sit, quæ nervis sentientibus originem dat, sed etiam malum pertigerit ad illa loca, unde nervi, motibus muscularibus inservientes, oriuntur. Unde in loco allegato in commentariis §. 240. n. 4. Hippocrates signa enumerans, quibus cognoscitur, an aliquis graviter capite vulneratus fuerit, tria hæc conjungit, tenebras circumfusas, vertiginem, lapsum. Et alibi (*Prorethor. Lib. II. c. 10. Tom. VIII. p. 818.*) monet, quod in omnibus alicujus momenti capitis vulneribus rogare oporteat, an conciderit homo, vel in altum soporem delapsus fuerit; si enim horum quidpiam factum fuerit, majori custodia opus est. Rationem addit, non quod hæc designent semper cerebrum ipsum vulnere laesum esse, sed simpliciter, quod Encephalorum vulnus tunc perceperit (*τὸ ἐν ἐγκέφαλῳ τοιαύτην τὴν τῶν ματιῶν*.)

**SOPORE, STERTORE.** In locis citatis inter mala signa semper profundus sopor numerabatur; si vero simul stertor accesserit,

**PESSIMUM** est: Quando nempe toto proflant pectore somnum, ut in Apoplecticis fit; tuncque designat, per vulnus omnes actiones cerebri deletas esse; solas autem cerebelli functiones integras mansisse; imo plerumque auctas, dum, libero humorum transitu per cerebrum impedito, tanto fortior & velocior liquidorum trajectio per cerebelli fabricam fit.

**RESOLUTIONE, CONVULSIONE.** Cum a cerebri integritate pendeat exercitium muscularis motus, quatenus voluntaris imperio subjacet; hinc ejus lesione poterunt omnes, vel aliqui musculi corporis paralytici fieri; & quia tunc muscoli sic affecti flaccidi & penduli sunt, hinc dicuntur resoluti. Ubi autem musculi voluntarii violenta & alterne repetens contractio fit, sed invita; tunc convulsio adeste dicitur; quæ plerumque tunc oritur in hoc casu, quando per quædam loca cerebri manet libera spirituum transmissio, per alia vero impeditur. Potest etiam hoc malum a spiritibus offensis, pungentibus medullarem cerebri substantiam, vel & humoribus effusis, acerbis facili & rodentibus &c. excitari. Utrumque hoc malum semper cerebrum affectum in vulneribus capitis designat.

**DELIRIO.** Quando nempe ideæ excitatæ in mente non respondent objectis externis, sed ab interna sensorii communis mutatione ortum ducunt, tunc dicitur homo delirare; unde apparet, in vulneribus capitis delirium semper malum signum esse, quia designat cerebrum ipsum affectum esse. Quod etiam monuerat Hippocrates in locis allegatis in commentario ad §. 267.

**LETHARGO.** Otiosa quasi oblivio dicitur hoc malum, quod motum & sensum tollit cum inexpugnabili necessitate dormiendi; ita tamen, ut sic decubentes omnibus illis, quæ validissime sensus afficiunt, adhuc excitari possint; sed mox iterum in somnum relabantur. Unde cerebri functiones omnes maxime impeditas designat hoc malum, ideoque semper magnum periculum denotat.

**APOPLEXIA.** Omnia, quæ hæcenus enumerata fuerunt, symptomata docebant cerebrum affectum esse, quidem, sic ut quædam ejus functiones depravatæ vel abolitæ fuerint: ubi vero omnes omnino cerebri actiones silent, omnes sensus interni & externi, motusque voluntarii, cessant, supersit sola actio cerebelli, quod vitalibus

motibus inservit; tunc apoplexia adeste dicitur; quæ summus cerebri morbus est, & plerumque in capitis vulneribus ab effusis humoribus compressum esse cerebrum indicat.

**HORRIPULATIONE.** Quæ fere semper designat in hoc casu sanguinem ruptis vasibus exire; præsertim si sine ordine recurrat, neque febrem incipientem comitetur. Videmus etiam frequenter in morbis, magnas mutationes secuturas horripulationem talem præcedere; unde in vulneribus capitis semper illa horripulatio suspecta est, cum designet intima quasi sensorii communis perturbari, unde tales concussus in toto corpore sunt.

**FEBRE GEMINATA.** Dictum fuit §. 158. n. 6. omni vulnere alicujus momenti illo tempore, dum pus fit, levem adeste febriculam; quæ ergo nihil festi designat; sed ubi hæc febricula subito augetur; vel postquam hæc cessaverit, nova & vehemens febris insurgit; semper designat, magnum latere malum. Monuit ideo Hippocrates (Coac. Prenot. nom. 500. Tom. VIII. pag. 881.) Quibus cerebrum vulneratur, febris plerumque ac bilis vomitus accedit, & corporis fulcratio, atque tales periculse habent. Et in Prothetis (loco allegato §. 240. nu. 4.) dicit, optimum quidem esse, si capite vulneratus non febriciret &c. si vero quid horum apparuerit, securissimum est, ut in principio fiat &c. at incipere febrem in capitis vulnere quarta, aut septima, aut undecima die, valde lethale est. Talis enim febris novam inflammationem aut validam suppurationem, hic adeo periculosam, designat. Unde & in illa Historia, quæ ex Hippocratis libro secundo Epidemiorum præcedenti paragrapho allegata fuit, talem febrem geminam pessima symptomata & mors ipsa secuta sunt. Puella enim illa, leviter manus palma syncope percussa, statim quidem febricitavit; sed dum septimo die pus graveolens subrubrum cum levamine extulisset, iterum increfcebat febris, somnolenta fiebat, loquelam perdidit, faciem parædextra contrahabatur, respiratio ditheilis, tremor, convulsio &c. nova die perit. Dum examinantur historici vulnere capitis apud observatores, plurima talia occurrunt exempla, quæ docent, febrem fit subito post aliquot dies incrementem, vel & de novo ortam, mali fuisse ominis; & fere semper, encephalon læsum vel compressum fuisse.

Caveo.

CRUORE PER OS, NARES, AURES EFFLUENTE. Non videtur sanguis sub calvaria effusus per has vias exire posse, eum dura mater adeo accurate omnem internam cranii superficiem involvat, ut nullus detur exitus. Verum quidem est, quod constat observatis medicis, sæpe chronica capitis mala levata fuisse, dum per has vias exirent humores, quod notavit Hippocrates (Aphor. 10. Sect. Tom. IX. pag. 253.) dicens: *Capite laboranti & circumquaque dolenti, per aut aqua, aut sanguis effluens per nares, vel aures, vel os, solvit morbum*. Non dum tamen per Anatomem hodie cognitam detectæ sunt illæ viæ, per quas humores calvarie cavo contenti sic exire possent; forte per morbum scilicet fuerunt, licet naturaliter non præexistierint. Sic & in aliis morbis tales exitus humorum observantur, licet hæcenus lateant viæ. Pleuritis enim sic sputis, per pulmonem eductis, solvitur &c. Certe si tam facilis foret exitus sanguini sub calvaria effuso, non indigeremus cranii perturbatione; quam tamen tot experimentis necessariam & utilem fuisse constat. Sed sanguis per os, nares, vel aures effluens, denotat maximo impetu causam vulnerantem caput percussisse, cum arteriæ potuerint frangi per hanc vim: ideoque summus metus est, etiam illa vasa sanguinea, quæ per encephalon decurrunt tunicis callosis suis orbatæ, rupta esse.

RUBORE FACIÆ ET OCULORUM. Sanguis ex corde per arterias carotides pulsus partim ad interiora capitis per internas dictas carotides pergit, partim per externas carotides distribuitur, quæ faciæ & externis

capitis partibus proficiunt. Ubi ergo, effuso sanguine cerebrum comprimente, liber trajetibus humorum per cerebrum impeditur, tanto majori copia per carotides externas feretur; unde faciæ magis rubicundæ, tenæ & floridæ apparebit. Et quia carotis interna, postquam ex canali osseo, per quem transmittitur, emergit, ramos dat, qui ad oculi orbitam, ipsamque oculum tendunt, ibique cum externæ carotidis ramis communicant; ideo impedito libero transfluxu sanguinis per cerebri vasa, oculi imprimis rubent, quia statim major copia sanguinis per ramos illos carotidis internæ, qui ad oculos tendunt, derivatur. Ideo faciæ & oculorum rubor tam suspectum signum dat in omnibus capitis morbis. Fortissima Apoplexia decubentes turgidam, inflatam, & rubicundam faciæ habent. In phreneticis floridus ille vultus adeo damnaabatur ab Hippocrate: Et in puella illa, cujus historia ex Hippocrate habetur præcedenti paragrafo, & quæ a levi capitis percussione perit, aderat faciæ rubor. Pluribus in locis apud Hippocratem damnatur oculorum rubor, & faciæ illa florida. Sic (Canc. Prænot. num. 167. Tom. VIII. pag. 863.) dicit: *Qui caput dolent, cum stupore delirantes, alvus suppressa, feroci oculorum aspectu, floridi, opisthotonici fiunt*. In quo loco per ferocem illum aspectum turgentis oculi & sanguine fusi, uti in summa iracundia fit, intelliguntur. Et in subsequente sententia addit (Ibid. n. 163.). *Quæ caput concutunt, oculi prærubri & manifesti delirantia, perniciofa*.

§. 276. **Q**uis vero locus intra cranium sit læsus scitur. 1. ex sensibilibus externis (249. 254. 255. 256. 262. 267. 269.), si adsunt. 2. invento loco cranii læso (255.) per artem. 3. ex tumore & rubore cutis capillis orbeæ ad applicationem emplastris. 4. ex motu spontaneo manus ad certam capitis partem. 5. ex symptomatibus lateris unius paralyticis, alterius convulsis.

Postquam constitit ex præcedentibus signis, encephalon per vulnus læsum esse, sive instrumentum vulnerans ad interiora penetraverit, sive introgressa calvaria, aut effusus humoribus, illud compressum fuerit; queritur, in quo loco encephali damnum hæreat. Patet facile, quod summi momenti res sit, hoc recte cognoscere; cum cranii perturbatione non possit institui cum fiducia, nisi prius constet, in quo loco hæ-

reat malum. Sæpe tamen satis difficile est locum affectum determinare. Nam aliquando læsio in alio longe loco inventa fuit, quam ubi causa vulnerans applicata fuerat, uti dictum fuit in commemorariis §. 264. Sæpe etiam nec ægri, nec adstantes, indicare possunt, quænam capitis pars ictum exceperit. Neque a functionibus læsis observari post capitis plagam hoc certo determinari poterit. Inde enim quidem con-

cluditur, encephalon laesum esse, sed nullus inde auderet semper certo concludere, quisnam encephali locus laesus esset. Quis auderet determinare loca cerebri, unde singuli nervi, sensibus externis inservientes primam suam originem ducunt, quae memoriae, ratiocinii &c. sedena in mirabili hoc & intricatissimo organo demonstrare poterit? Celeberrimi viri multas hic quidem inxerunt hypotheses; sed eventus docuit, summa etiam ingenia, dum speculationibus indulgent, turpiter errare posse. Magnus SIENO, tanta peritia in Anatomicis & dexteritate valens, candida in publico Eruditissimorum virorum consensu falsus est, se cerebri fabricam ignorare omnino (*Windsor Expofit. Anatom. pag. 641.*), & in pulcherrima illa dissertatione vana omnia simenta destruxit, & veram monstravit viam, qua sensum ad cognitionem huius organi ascendere posset humana industria. Interim tamen per signa hac paragrapho descripta, quantum per artem hodie cognitam licet, in locum affectum encephali inquirendum est. Et si omnibus his accurate examinatis tamen quis erraverit, non erit artificis vitium, sed artis ipsius defectus, quem forte sequentium saeculorum inventa emendabunt.

1. De his dictum fuit in Paragraphis h. citatis.

2. Numero hic citato recensita fuerunt ordine omnia illa signa, per quae cognoscatur ipsius calvariae lesio: si ergo per haec confiterit, cranium in quodam loco laesum esse, & simul appareant symptomata; quae docent encephalon affectum esse; habetur admodum probabilis ratio concludendi, encephali lesionem haerere illo in loco, quem cranium niale affectum demonstrat.

3. Ubi per signa §. 275. recensita constaret, encephalon laesum esse, neque tamen ullum indicium addit, quo locus affectus determinari posset; tunc sequenti methodo conantur invenire Chirurghi locum laesum. Omne capitulum novacula abradunt; deinde toti capiti applicant Emplastrum aromaticum quodcumque, illudque per aliquot horas relinquunt. Deinde ablato Emplastro: omni cura totum caput lastrant, an aliquid rumidi vel inflammati appareat in quodam loco; quod si inveniantur, tunc magna suspensio est, huius loco subesse le-

sionem. Dum enim hoc Emplastrum cuti capitis adheret, & blando stimulo aromatico paulo majorem motum excitat, si quid contusi fuerit, facilius hoc apparebit orto tumore. Ubi non poterat detegi, quoniam in loco capitis laesio haereret, huic calamitati nullis remediis posse subveniri Hippocrates pronuntiavit (*De Vulner. Caput. cap. 10. Tom. XII. pag. 119.*).

4. Qua ratione hoc fiat, quis dixerit? Rem ramen sic se habere, quotidiana & certissima docent observata. Ipso hoc die, quo haec scribo, hominem ex alto lapsum vidi, sine ullo sensu jacentem, qui dextra capitis & faciei parte duro oblatulo impegerat, cum valida contusione & levibus vulnusculis harum partium, continuo manu dextra in altum sublata tangebatur, imo fricabat satis fortiter affectas partes. Postquam valida missione sanguinis ad se rediisset post bihorium, nullus omnino rei se memorem esse dixit, postquam lapsus fuerat. Dum ergo videbant Chirurghi, quod automatico tali motu manus sic vulneratorum deferrebat ad locum laesum, probabili conjectura concluderunt, ubi nulla lesio externa conspiciebatur, indicari pariter locum affectum, si ad certam & semper eandem capitis partem spontaneo tali motu manus decumbentis ferretur. In Apoplecticis idem illud Phenomenon saepe apparet. Videtur certe signum hoc magnum pondus habere, cum observentur plurimi tales motus automatici, qui nullo modo a voluntatis imperio pendeat, neque a mente conscia praedeterminantur; per quos illud, quod noceret, tollere conatur corpus nostrum; mirabili hac proprietate a Creatore instructum.

5. Illud organum corporeum, unde in nobis sensus & motus voluntarii pendent, videtur in sua origine; collectione, distributione & operatione duplex esse. Carotis enim arteria dextra & sinistra est, vertebralis dextra & sinistra est: Ex his orti haemisphaerium cerebri dextrum & sinistrum, distinctissima a se invicem, tota medullae collectio in sinistram & dextram dividitur, quod in corpore calloso, fornice, cruribus medullae oblongatae, nervis opticis, olfactoriis &c. imo etiam in ipsa medulla spinali & nervis inde derivatis, evidentissime apparet. Licet tamen omnia haec sic duplicia inveniantur, tamen unus & simplex est

est homo, qui sentit: bini nervi olfactorii, adeo distincti in sua origine & progressu, tamen secundum sensum olfactus faciunt. Dum binis oculis revera bis videmus idem obiectum (uti patet limite medio inter binos oculos posito, vel leviter tantum pressio digitis alterutro oculi bulbo) tamen unica visio fit: idem in audita verum est.

Cum ergo illud organum sentiens & movens duplex sit, hinc una pars potest integra manere, dum altera, quoad corpoream speciem manens, impotens omnino fit ad omnia: uti patet in Hemiplegia: in quo morbo dimidium corporis sic resolvitur, ut nullus motus a mentis arbitrio pendens ibi supersit; tamen manet illa facultas conscia, sentiens & cogitans motum: & licet homo sic affectus omni nixa velit movere latum affectum, nullus tamen sequitur motus in musculis; imo etiam aliquando in pessima morbi huius specie simul omnis sensus aboletur in latere affecto.

Hippocrates (De Morbo Sacro, cap. 3. Tom. IX. pag. 478.) jam monuerat hoc dicens: Cerebrum hominis duplex est, uti etiam in omnibus aliis animalibus; medium autem ipse dividit membrana tenuis: quare non semper eadem capitis parte dolet, sed periculatim alterutra, aliquando vero per totum. Oritur jam subtilis questio, an origo sentiens, & principium illud movens, locetur in parte opposita illi loco, ubi effectus suos edunt; an vero in eodem latere corporis: id est, an motus & sensus origo, qui parte corporis sinistra exercentur, hæreat in parte cerebri dextra, an in sinistra. Hoc autem subtilissimum Anatomicorum observatis, & experimentis determinari debet: illudque cognitum ubi fuerit, magnam lucem affundet, ut in capitis vulneribus, ex sensum & motuum læsione in alterutro corporis latere, determinetur locus encephali, ubi læsio hæret.

Mollis & pulposa cerebri fabrica semper magnam difficultatem fecit in demonstrationibus Anatomicis; omnium autem minimam consistentiam habet in junioribus. In senectute, & imprimis in illis hominibus, qui valido labore corpus exercuerunt, firmitus est, & melius tractari potest. In talibus cadaveribus, post diuturnam macerationem dissoluta pro maxima parte corticali, cinerea, encephali substantia, luculenter apparuit, medullares fibras, in

dextera cerebri parte ortas; ad sinistram partem tendere, & vicissim. Ille autem fibrarum decursus potissimum triplici in loco animadverti potuit; in utraque scilicet priore & posteriore annulari protuberantia crepidine, atque maxime in imo medullaris caudicis, qua in spinalem abiit: omnium evidentissime duabus circiter lineis infra pyramidalia & olivaria corpora hoc apparet: si enim leniter a se mutuo deducantur pyramidalia corpora, non tenues decussari fibrillas, sed validos eandem fasciculos in adversam partem tendere evidentissime demonstratur (Santorini. Observ. Anatomic. cap. 3. pag. 61. 62.). Hoc fere totum est, quod Anatome circa decursum fibrarum medullarium cerebri detexit.

Plurima jam habentur Observata Medica, quæ decussatam illam cerebri actionem confirmant. Serva duodecim annos nata cranium contusum & ruptum habuit; sectione per seeram, non ut decebat, adhibita decimo quarto die periit. Convulsio autem manum sinistram occupabat, in dextra tamen parte potius vulnus habebat (Hippocrati. Lib. V. epidem. textu 23. Tom. IX. pag. 241.). Quibus tempora secantur, ex adversa sectionis parte convulsio contingit (In Coacis Prænot. n. 498.). Er in pulcherrimo de Capitis vulneribus libro (Capit. 19. XII. pag. 123.) idem confirmat Hippocrates monens, temporum regionem non temere secandam esse, quia sectionem talem convulsio sequitur, dicitque: At si sinistra tempora secta fuerint, dextra convulsio prebendit; si vero dextra fuerint secta tempora, sinistra convulsio prebendit. Et in eodem libro (Capit. 31. ibid. pag. 127.), ubi signa recenset, quibus noscitur, ex capitis vulnere perituum esse hominem, dicit: Pleraque etiam altera corporis parte convulsio occupat. Siquidem sinistra capitis parte ulcus habuerit, dextram corporis partem convulsio prebendit. Si vero dextra capitis parte ulcus habuerit, sinistram corporis partem convulsio prebendit. Sic jam antiquissimis Medicinæ temporibus talia fuerunt observata, quæ huic sententiæ favent.

Inter recentiores auctores Fabricius Hildanus, qui simpliciter plerumque narrat illa, quæ vidit, nulla admiscens rationi, plures habet observationes, quæ hanc sententiam confirmant. Homo quadragenarius

rius globo ferreo, qui ultra librari cum dimidia pendeat, bregma finistrum percussus fuit, cum iniqui cranii depressione & fractura. In terram quasi mortuus procidit, loquelam, visum & auditum penitus amisit, quin etiam ex opposita parte paralyti correptus fuit. Elevato cranio depresso, & reliquis idoneis auxiliis sanitati restitutus fuit (*Hildan. Observ. Cbirurg. Centur. 2. Observ. 3. Exempl. 1. pag. 78.*). Homini sexagenario lapidis ictu os frontis in sinistro latere illo in loco, ubi capilli prodire incipiunt, profundius impressum erat. Ipso momento ictus in terram procidit, vomuit, simul loquelam, intellectum, visum ac auditum amisit, & totoque latere opposito paralyti correptus fuerat. Amici noluerunt, dissectis integumentis cranium intropressum restitui, & paucis diebus postea perit (*Ibid. Exempl. 3.*).

Mulier vulnus contusum in dextro osse bregmatico cum fractura & intropressionem cranii acceperat. Evomit mox ab initio biliosum humorem, & cibum indigestum, finistrum latere resolutum est, in dextro autem convulsiones patiebatur. Convuluit tamen, licet multum de ipsa cerebri substantia per vulnus eductum fuisset (*Ibid. Centur. 1. Observ. 13. Exempl. 1. p. 21.*). Juvenis robustus baculo vulnus ad finistrum bregma cum ossis fractura recepit: dilatato vulnere, & cranii fragmentis educis, post quinque septimanas vulnus fere cicatrice obductum fuit. Ille tunc cum scorto rem habuit, paucisque horis postea recidit in febrem & dolorem capitis vehementiorem, quam ante. (Latus item oppositum resolutum est, brachium vero lateris ægrotantis spasmus correptum, & quarto die postea perit (*Ibid. Observ. 19. p. 25.*)). Puer ex alto delapsus caput laeserat; in initio levius putabatur malum. Os in medio vulnere posita incepit nudari, & in futura sagittali parvum foramen apparuit, per quod copiosum pus exibat. Puris illa excretio aliquando sistebatur per aliquot dies, tanque quater vel quinque de die fortiter convellabatur spatio quadrantis horæ brachium dextrum, uti & maxilla ejusdem lateris. Simul ac rediret puris excretio, cessabant hæc convulsiones. Moritur tandem puer, & totus lobus sinister cerebri fuit inven- tus suppuratus, dextro lobo & cerebello

integerrimis (*Academie de Sciences l'an. 1700. hist. pag. 56. 57.*).

Valsalva (*De Anre Humana pag. 81. 86. c. 5.*) testatur, se quamplurimum cadaverum sectionibus semper inveisse, quod, ubi alterius mediæ corporis resolutio facta fuerat, causa semper haberet in opposita cerebri parte, testesque eruditissimos, qui his sectionibus adfuerant, recenset. Et si aliquando ad alteram etiam cerebri partem extensam lesionem inveniret, hæc tamen erat in opposita parte multo notabilior. Inter illos autem viros doctos & graves, qui his experimentis adfuerant, nominat & Petrum Mollinellum Philosophiæ & Medicinæ Doctorem, cuius habetur notabile experimentum (*In Commentariis de Bononiensi scientiarum & artium instituta pag. 139.*), quod sic se habet: finistram cranii partem vivo cani aperuerat, tum dextram matrem iterum & lapius pungens observaverat, canem variis quidem torqueri convulsionibus, præsertim cum illa pars duræ matris pungeretur, quæ maxime ad os adhererebat, nunquam tamen apoplexia corripitur. Postremo sinistri cerebri lobum penitus extraxit. Cecidit exemplo canis, non quidem in finistrum latere, quemadmodum expectandum videbatur, sed in dextrum, & relevatus iterum ad eandem partem procubuit. Simul dextra pars corporis omni sensu carere visa fuit, contra quam accidit in sinistra, quæ & sensum retinuit & motum. Addit deinde, quod noverit, alios idem experimentum fuisse eodem exitu; & ex his omnibus concludit, quod Celeberrimi viri Morgagnus & Lancisus jure merito statuerint, facile posse conjici, utra pars cerebri offensam acceperit, si attendatur, in quodnam latere procubuerint Hemiplegici.

Plurima similia observata possent adduci, quæ & in morbis & in Capitis vulneribus hanc sententiam confirmant: hæc tamen enarrata sufficere posse credo. Impiis magnum pondus huic opinioni addit illud ultimum in vivo cane tentatum experimentum. Nec tamen dissimulandum est, quasdam occurrere apud auctores observationes, quæ huic sententiæ repugnant; quarum unam alteramve breviter recensabo.

Puer undecim annorum in lethargum gravissimum incidit, & dum profundissimo somno desinebatur, tota pars dextra corporis paralyti resoluta nec movebatur, nec

sen-

sentiebat. Forestus vocatus, cum nulla alia remedia aderant, thymum contritum cum aceto nari dextra imposuit, indeque nonnihil reviviscere videbatur puer: simul e nare materia crassa, valde corrupta, sanguinolenta & viscosa instar putridæ saniei exibat. Prædixit hinc Forestus, abscessum una cum sphacelo dextram partem cerebri occupasse. Brevis moritur puer, dumque jam ante obitum, rebus omnino conclamatis, dissecsum meditaretur Forestus, Nobilis Matrona, quæ curam pueri habebat, utroque parente absentibus, illum retinuit, ut cadavere inciso mortis causa detegi, & parentibus renuntiari posset. Cranio ablato, cerebrum & cerebellum in parte dextra vergens ad posteriorem partem, omnino saniosum, putridum, corruptum & sanguinolentum inventum fuit; sinistra vero pars cerebrum album, sanum & incorruptum habebat. Sic in cadavere præfagii veritas detecta magnam famam Foresto conciliavit (*Foresti Observ. Lib. X. observ. 11. Tom. I. pag. 414.*). Casus ille sollicite descriptus directe repugnat ante memoratis, & videtur magnum pondus habere.

Juvenis læditur in regione bregmatis sinistra; postmodum dextræ lateris convulsivi motus, & sinistra paralyticis observantur. Tota regio bregmatis sinistra confusa deprehendebatur, ut sua sponte oculo ossa separarentur, de quibus unum acutius in ipsam substantiam cerebri per utramque meningem depressum inveniebatur (*Bonæ. Sepulcret. s. Anatom. Pract. Lib. I. Sect. XV. Observ. 27. pag. 373.*). In hoc casu resolutio ejusdem lateris partem, convulsio oppositum laus tenebat; contraria ergo directione, ac in casibus paulo ante recensitis.

*Valsalva (De Aure Humana cap. 5. pag. 86.)* candidè monuit, nihil dissimulare volens, in uno alterove casu in utroque Hemispherio cerebri æqualem læsionem sibi apparuisse; frequentissime tamen vidisse oppositani lateri resolutio plagam cerebri affectam esse.

Si tamen consideretur, sæpe nihil detectum fuisse post mortem in cerebro, licet gravissimæ læsiones functionum hujus visceris adfuissent ante mortem; cum levis tantum nutatio vel compressio in tenerissimis his flaminibus sufficiat ad pessima quæque producenda mala, utri pulchro experimento docet *Valsalva* in loco citato...

Nervi Cordis ad jugulum canis filo arte contracti, & ilico soluti, adeo in stru-ctura sua insensibili labefactati fuerunt, ut canis intra aliquot dies, eodem modo, ac si nervi illi amputati essent, moreretur, licet iidem nervi rursus inspecti nullum sensibiles læsionis vestigium ostenderent. Unde potuit in talibus casibus a solo etiam concussu oppositum cerebri hemisphærium in sua fabrica læsum fuisse, licet sensibus nihil mali detegi post mortem potuerit. Quod adhuc magis probabile apparebit, si consideretur, sæpe duram calvariam in opposita parte findi, dum illa pars, quæ ictum excepit, integra manet, nisi dictum sit in commentariis §. 254.

Cum ergo numerosissimæ observationes celeberrimorum Auctorum, & experimenta in vivis animalibus capta decussatam illam cerebri sentientis & moventis actionem confirmet; pauca tantum habeantur Exempla, quæ repugnent huic sententiæ, illaque adhuc possint sic explicari, ut saltem minus repugnare videantur; patet, si non omnino certam, saltem maxime verosimilem esse hanc opinionem, quæ statuitur, quod si unum latius paralyticum, alterum convulsivum fuerit, tunc mali origo hæreat intra cranium in illa parte, quæ lateri paralytico oppositur. Si vero convulsio v. g. in dextro latere corporis appareat, & nullum omnino vitium adsit in latere sinistro, tunc ob eandem causam admodum videtur probabile sinistram cerebri partem affectam esse sic, ut æqualis influxus spirituum in musculos dextræ lateris turbetur quidem, non tamen impediatur omnino. In Exemplis modo memoratis tales casus habentur.

Notandum tamen quæ maxime, in nervis illam oppositionem directionis non obtinere, quæ in cerebro per hæc experimenta detegitur; nam nervi in dextra parte orti eidem lateri prospiciant. Celeberrimi Anatomici fuerunt in alia opinione, & imprimis crediderunt, nervos opticos se mutuo decussare, & ad oppositi lateris oculum tendere singulum; multisque opticis Phenomenis explicandis hoc inservire posse arbitrati sunt Philosophi. Fortuitus tamen casus docuit contrarium: Celeberrimus *Santorini (Observat. Anatom. cap. 3. §. 14. pag. 64.)* dissecabat cadaver hominis, cui dexter oculus jam dudum cæcus fuerat vera Amaurosi, nullo deprehensio

vicio

vicio conspicuo oculi. Nervus opticus huius oculi inventus fuit æquo gracilior, & colore obscurior, utpote cinereus; quem cum anxie persequeretur dexterimus ille Anatomicus, invenit illum nervum, coloris diversitate facile distinguendum,

semper dextrum latus tenere; & simul evidentissime vidit, nervorum opticorum fibras, non modo non desuiliari, sed ne implicari quidem; sed tantum hos nervos sibi mutuo accumbere, & dein iterum disjungi.

§. 277. **T**UM 1. cruor effusus ilico tollendus. 2. loca infecta depuranda. 3. of-  
fensula forte infixa cerebro evellenda.

Quando jam constitit, causam lædentem quancumque capiti fuisse applicatam cum tali effectu, ut functiones encephali læsæ fuerint, primo examinatur, qualis fuerit hæc læsio, an, ab intropulla calvaria contentum cerebrum premente vel acutis fragmentis pungente vel lacerante, an ab effusis sub cranio humoribus; an vero a valido concussu hoc factum fuerit. Quibus autem signis hæc causæ variz detegantur, in præcedentibus explicatum fuit. De cura intropressæ calvariz dictum fuit §. 271. 272. Per concussionem validam tenerima encephali pulpa sic potest affici, ut compressis hoc concussu minimis vasculis liber transitus humorum per hæc impediatur; sed si non fuerint fracta vel destructa omnino hæc vasa, æquabilis humorum circumductio aperiet iterum collapsos hos canaliculos, & post aliquot horas sensim redibunt functiones. Ubi autem sub calvariz olla hæret aliquid, quod comprimere vel

ledere potest encephalon, indicatio curatoria generalis jubet hæc tollenda esse, ut facile patet: tunque ad tria hæc in hac paragrapho enumerata attendendum est.

1. Patet evidenter: omne enim extravasatum liquidum, quod hic hæret, semper comprimet encephalon; cum naturaliter omnia hic adeo plena sint: & si diu maneat hæc causa comprimens, contigua minimorum canaliculorum latera concrefcere poterunt, & impervia manere tota vita; unde postea immedicabilis orietur læsio functionum encephali.

2. Quando nempe humores effusi, corrupti, in pus, ichorem vel sanies mutati, infecerunt vicina loca, quibus accumbunt; utri & ubi solide partes sic affectæ fuerint, ut sanitatis legibus amplius obedire nequeant.

3. Observationes enim docuerunt, hæc infortunia aliquando contigisse; unde & hæc tollenda erant.

§. 278. **E**XTRAVASATUS SANGUIS AUferetur. 1. reforbendo. 2. dissipando. 3. perforando cranium.

1. In contusionibus, dum sub integra cute sanguis vasis fractis effusus hæret, & nigra vel cærulea macula locum affectum deturpat, videmus sæpissime sensim dissipare omne illud extravasatum; vasis nempe bibulis venosis reforbentibus, & allabentibus humoribus tenuioribus attenuatum. Quare ergo & illud hic loci fieri non posset? sanguis autem extravasatus in loco clauso, ubi nullus datur aeri accessus, hæret potest diutissime sine corruptela.

2. Quando nempe extravasatus cruor diluentibus & resolventibus remediis sic atte-

nuatur, ut vasis bibulis venosis, in omni interna & ac externa corporis superficie patulis, reforptus dissipetur, & sensim dispareat.

3. Ubi tanta copia est effusi sanguinis, ut valida compressione encephali functiones maxime lædatur, non daretur tempus, ut lenta tali reforptione: & dissipatione tollatur extravasatum: prius enim sæpe periret homo. Unicum tunc superest, quamvis crudele, auxilium, ut calvaria perforata exitus detur sanguini extravasato.

Jam examinandum est, quomodo singula hæc fieri debeant.

§. 279. **R**EFORBETUR, si in venas, largo missu sanguinis, & succenturiata purgatione alvi, evacuatæ, vi vitæ repellitur.

Dum vivi animalis junioris (quia in his facilis cranium telli potest), calvaria ape-

ritur, apparet manifeste undique transpirans hæritus, tota superficies utriusque me-

bra.



ningis humida est, omnis ambitus ventriculorum tenui rore madet. Assidue ergo tenuissimis vasis exhalantibus effluatur tenuissimum tale liquidum, quod omnia humectat & fovet. Sed nisi pariter adessent venulæ resorbentes in illis locis, accumularetur sensim ibi latex, & totam encephali actionem comprimendo tolleretur. Hæc ergo oculis venosus debet resorberi extravasatus sanguis. Mirum forte videri posset, sanguinem, statim concrecentem, dum extra vasa hæret, tenuissimas has fistulas ingredi posse: sed si consideretur, sanguinem concretum, de vena missum, sensim iterum solvi, & deliquescere in tenuius liquidum; & quidem citius hoc fieri, dum blando calore fovetur, & præterea exhalante tenuissimo rore continuo dilui coagularum cruorem; & simul, plena cum calvaria semper sit, valide premi, & arteriosam fabricam encephali & imprimis duræ matris vasa, sanguine impulsio vi cordis nuac distendi, mox iterum se contrahere; patebit, extravasatum cruorem hic omni momento premi, atteri, tenuissimo liquido dilui, & tandem sic attenuari posse, ut minima oscula venarum absorbentium ingredi valeat. Cum autem absorbentes hæc venulæ resorptos humores majoribus venis tradant; facilius fiet hæc resorptio extravasati, si venæ majores depletæ fuerint:

& ob causam largæ missio sanguinis hic commendatur: porro per purgantia talia, quæ fortiter evacuant, & simul sine aucto motu vel majori stimulo potenter solvant, subducuntur de corpore humores, attenuantur autem illi, qui remanent, & minus ergo distendunt vasa, dum facilius per omnia transire possunt. Sic facilis patet ingressus resorptis humoribus in venas depletas, & post illas evacuationes siccus redditum corpus in omni superficiei interna & externa avidè absorbet contigua liquida. Sic observatur post validas alvi subductions sitim ingentem nasci, & assatim hausta liquida citissime resorberi venosis oculis in cavo ventriculi & intestinorum hiantibus. Quantum autem possit hæc methodus, ut extravasatus sanguis resorbeat, ad oculum apparet in validis contusionibus. Tumorem talem, qui caput infantis æquaret, in natibus post lapsum ex curru, hac methodo integre dissipatum vidi; licet tota pars nigresceret ab effuso sub integra cute hærente sanguine. Nemo autem facile dicet, extravasatum hunc cruorem transpirasse per cutim illæsam: si enim eo usque attenuari possit coagulatus sanguis, ut per exhalantia cutis vascula exire possit, facile patet, quod commode ingredi poterit absorbentium venularum oscula. Apparet ergo multum boni ad hæc methodo merito sperari posse.

§. 280. **H**inc statim ad maximam copiam, ægro tolerabilem, utraque hæc evacuatio instituenda (279.) &, si juvat, pro re nata repetenda, iterumque, si post hæc ministratas minuantur symptomata (275.)

Nunquam nocebit, modo vires consent, largas tales evacuationes facere; & imprimis maxima Venæ sectio, & repetita quidem, hic tanti usus est: Visum enim fuit sæpius, ubi omnia signa docebant, sanguinem effusum sub calvaria cerebrum comprimere, audacissimam Venæ sectionem ilico remisisse symptomata, licet jam de trepano applicando cogitaretur. Et licet finium non cederet his remediis, & trepanum postea deberet institui, nunquam nocebit per hanc methodum corpus reddidisse inflammationi minus obnoxium: sic enim pessima symptomata, perforationem calvarie quandoque sequentia; & imprimis fungorum cerebri generatio multum præcavebuntur. Hæc ergo primo tentanda videntur, antequam ad trepanationem ipsam per-

veniat. Si jam his evacuationibus incipiunt minui illa mala, quæ compressum ab effusis humoribus cerebrum sequuntur, novimus magnam spem esse, ut repetito horum usu, (semper habito respectu ad decumbentis vires) tollantur penitus. In gravissimis certe casibus pulcherrimos hujus methodi successus me sæpius vidisse lætus recorder: & Paræus (*Liv. X. chap. 10. pag. 231.*) audacter repetitæ sanguinis missionis notabile Exemplum habet. Juvenis 28. annorum lapsu bregmatis os sinistrum lapidi valide impeggerat: aderat contusio, sed nulla cranii fractura. Septima die febris valida, delirium, inflammatio magna, tumor ingens totius capitis, faciei, & colli; loquela, visus, deglutitio impeditis. Sequenti die duodecim uncias sanguinis de-

traxerat Chirurgus: postmodum Parvus vocatus, dum videbat pessima hæc symptomata non remittere, & validas esse vires, quadragesima & duas uncias sanguinis de vena misit: sequenti die, auctis adhuc potius malis, iterum duodecim uncias subduxit; & postea adhuc binis sanguinis missionibus quindecim uncias eduxit: sic ut intra quadragesimum ultra octoginta uncias sanguinis amiserit æger, & a tam periculoso malo integre curatus fuerit. Monuerat quidem magnus Hippocrates (*Aphor. 3. Sect. 1. Tom.*

*IX. pag. 7.*) *evacuaciones ad extremum du-  
ctas periculosas esse; & hinc videretur forte  
temerarium tantam copiam sanguinis sub-  
ducere; sed eadem Sectione (Aphor. 6. Tom.  
IX. pag. 11.) axioma sequens posuit: ad  
extremum morbus extrema remedia ad amissionem  
optima. Cum ergo hic vita periclitetur,  
nisi subita medela adhibeatur paret ratio,  
quare valide adeo evacuationes adhibean-  
tur. In levioribus enim malis nemo pru-  
dens hæc tentare auderet.*

§. 281. **D**iffipatio attenuati perficitur. 1. resorbendo (279. 280.) partem diffipandi. 2. attenuando per diluentia aquosa, & resolventia calide pota. 3. parti affectæ rase imponendo emplastra, cataplasmata, fomenta, ex discutientibus nervinis, cephalicisque. 4. aures, naribusque eadem applicando.

Diffipatio vocatur, quando extravasatus sanguis sponte, vel per artem, ita dissolvitur, ut minima absorbentium vasorum oscula ingredi, sicque sensim quasi evanescere possit.

1. De his dictum fuit.

2. Si sanguinem sani hominis de vena missum, & coagulatum, in aqua tepida quis conqussaverit, sensim minuetur illud coagulum, aqua affusa rubescet, & ultimo tantum parum illius massæ coagulatae supererit, ut vix credi posset: remanebit tamen semper aliquid, forte quia libero aeri tam diu expositus fuit sanguis. Videmus enim quotidie in confusionibus extravasatum sanguinem dissolvi sic, ut integre dissipetur. Ob hanc causam, post sanguinis missiones & purgantia, datur tanta copia decoctionum aquosorum, quantum corporis vires ferre & mobilem reddere possunt: sic sanguis omnis diluitur, & exhalanti fluido copiosa materia suppeditatur, ut resolvatur sensim illud coagulatum, & solum resorbeat venulis minimis absorbentibus. Quia autem aquosa sola potare, imprimis post magnas evacuationes, corpus enervant sic, ut hæc assumpta inciperent colligi in cavis corporis, & corpus ad hydropem disponent; ideo simul his decoctis adduntur lenia aromata, quæ blanda solvendi vi commendantur, & simul levi stimulo parum plus movent; quod nunquam nocebit post hæc evacuationes prægressas. Totus enim scopus est sanguinem reddere sic dilutissimum, ut copia tenuis liquidi per exhalantia vascula continuo applicetur ex-

travasato cruri, & ille sic dilutus & attenuatus resorberi possit venosis osculis. Formula talis decocti in materia medica habetur.

3. Verum quidem est, quod horum omnium efficacia non directe & immediate agere possit in extravasatos humores, qui sub calvaria hærent, cum externa capitis fere tantum a carotide externa suos humores excipiant. Proderunt tamen, dum externis capitis partibus sic fortis & laxatis minuitur humorum impetus versus interiora capitis; uti & dum horum remedium pars per venas resorbentes externæ cutis sanguinem ingreditur, & postea communi circulationis lege ad locum affectum deferri potest. Neque videtur semper anxie disputandum esse, quomodo & per quas vias remedia applicata agant, modo consistet profuisse. Sic in morbis acutis inflammatoriis capitis interiora obsidentibus, fomenta ex aqua, aceto, nitro tanso cum fructu dera- tio prius capiti applicantur. Unde in periculoso tali malo, omnia artis molimina adhibentur, per quæ aliquid emolumentum, quantumvis etiam leve hoc fuerit, sperari potest. In usu tamen horum semper animadvertendum est ad illas cautelas, de quibus dictum fuit §. 245. 246. 247. semperque curandum, ut Cataplasmata, vel fomenta talia applicata, in debito calore retineantur; quod pannis calidis sæpe applicatis fieri poterit. Talis Emplastrum & fomenti formula in Materia Medica ad numerum 247. habetur.

4. Verum quidem est, duram matrem omnem

omnem superficiem internam cranii exactissime obducere, sic ut totum encephalon in proprio quasi territorio seculum ab omni aliis hæreat. Tamen per observata Medica constat, bina hæc loca esse celebri quasi spiracula, per quæ sæpe miris modis humores exeunt. Dictum fuit in commentariis ad §. 275. Chronica sæpe capitis mala levati citissime, dum per nares vel aures, aqua, pus &c. effluunt; illudque Hippocratis testimonio confirmatum fuit. Notum est, in omnibus morbis capitis, qui ab infarctis encephali vasis a nimia plenitudine, vel & inflammatoria humorum densitate, sunt, sanguinis per nares effluxum adeo prodesse. Enarrata fue-

runt Exempla in commentariis ad §. 273. quibus constat, post gravissimas capitis lésiones, lymphæ per aures effluxum sanasse etiam, ubi communi expertissimorum Medicorum & Chirurgorum consilio jam trepanum applicandum erat. Hinc proximus ad interna capitis hic videtur pate- re aditus. Certe summis naribus incumbit tenuis ossis Ethmoidis lamella, foraminulis pertusa, quæ quidem in homine vivo duræ matris vaginalis emissis, & nervis fibrillis, opplentur exactissime, tamen quam tenue est illud sepimentum, quod calvarie cavum a naribus hic dividit, unde vapores per nares attracti fere immediate encephalo applicantur.

**Q**Uæ (279. 280. 281.) si statim non tollunt, minuantur valde symptomata (275.), sed hæc vel persistunt, vel augentur, ilico perforandum cranium, ut exitus detur humoribus (273. 277. 1.º) & facultas depurationi (277. 2.º) & evulsioni fragmentorum (277. 3.º)

Crudele videtur & temerarium omnino ilico semper calvariam perforare, ubi signa docent, post capitis vulnera encephali functiones valide læsas esse. Nisi enim certo censlet, cranium depressum esse, vel fragmenta excussa encephalon lædere sic, ut non possint tolli hæc mala sine perforatione calvarie, præstat semper prius per aliquot horas saltem expectare, & interim validis evacuationibus tentare, an leventur symptomata. Plurimi enim tales casus occurrunt quotidie, ubi ex alto delapsi homines omni sensu & motu privati jacent, & paucis horis postea sensim reviviscunt, valido tali concussu turbato cerebro, licet nulli humores effusi fuerint. Et licet trepanum applicari deberet, valida sanguinis missio prius facta nocebit nunquam; sed e contra summopere proderit. Unde videtur methodus, tribus præcedentibus paragraphis recensita, prius semper tentanda esse; & si intra duodecim horas ab his remediis applicatis nullum levamen percipitur omnino, sed omnia mala potius augeantur; tunc unicum auxilium superest, nempe ut perforata calvaria detur exitus humoribus effusis. Monendi tunc sunt amici vulnerati, certam mortem instare, anceps tantum hoc & operosum fore esse remedium, a quo jure merito multum boni expectari potest; tamen nunquam certa cura promittenda est. Pote-

ruat enim effusi homines hæreere in talibus locis, ut aperta calvaria exire tamen nequeant; possunt valido concussu fracta esse tenerissima illa stamina medullæ encephali, unde tota vita & humanitas pendet. Ubi vero hæc operatio requiritur, quo citius tunc perficitur, eo melius: pergent enim liquida effluere fractis vasis, major fiet compressio encephali sic omni momento aucta copia liquidi extravasati, unde sæpe medullozæ fibræ tenerimz, soli tenuissimo totius corporis liquido perviæ, compressis lateribus & contiguis factis desinunt esse canales aperti, & posita,eductis quamvis liquidis comprimentibus, æquabili liquidorum circumductione contigua semel facta latera minimorum horum vasculorum non amplius a contactu removeri poterunt; unde concre-scent inter se, & sequetur immedicabilis læsio omnium illarum functionum, quæ a subtilissimi liquidi motu per minima hæc vascula pendeant. Præterea humores effusi, diu hic relictis, poterunt corrupti, & acquisita acrimonia rodere omnia vicina. Ex quibus omnibus patet, semper hic in mora periculum esse: licet tamen observationes fideles docuerint, magno etiam post vulnus insitum temporis intervallo perforationem cranii institutam fuisse summo cum fructu. Homo capite vulneratus fuerat, cum nulla adessent mala symptoma-

ta, intra quatuordecim dierum spatium vulnus hoc cutatum fuit. Diu post ingens capitis dolor, vertigo, caligo oculorum, dextrique brachii paralysis latere hic malum evidenter demonstrabant; & Scultetus (*Artem. Chirurg. Observ. 13. pag. 211. 312.*), vigesima nona post vulnus inflictum septimana, detecto cranio, angustam rimam videns, binis, foraminibus perforavit calvariam, & medium inter hæc foramina interstitium ferra versatili excidit: patula tali apertura evacuebatur collectus sub calvaria humor, & mensis spatio felicissime pristinae sanitati restituebatur vulneratus. Sed facile apparet ex hac historia, non fuisse in initio extravasati liquidi sub calvaria copiam, sed angusta rima fissa cranio, sensim hic collectum fuisse pus vel saniem. Sed ubi fractus valis statim copia effusus liquidi sub calvaria colligitur, patet facile, non posse diu differri hanc operationem sine magno periculo. Unde dicit

§. 283. **L**ocus, ubi terebra applicanda, cognoscitur. 1. ex loco læSIONIS noto (276.) ubi optime fit, si nihil vetat.

Postquam conclusum fuit, calvariam terebra perforandam esse, ut concilietur exitus effusis humoribus, tunc inquiritur, cuam loco calvarie terebra applicari debeat. Apparet facile, postquam per signa descripta §. 276. detectus fuit locus læsus, ibi debere terebram applicari, quia maxime venosum est, ibi hæsurum effusum sanguinem. Sed sequenti paragrafo patebit, plurima esse loca, ubi cranii peterebratio vel impossibilis omnino vel periculosa admo-

**GAPITIS. §. 182. ad 184.** Hippocrates (*De Capit. Vulner. cap. 22. Tom. XII. pag. 124.*), in illis casibus, ubi peterebranda erat calvaria, intra triduum ad seditionem veniendum esse, neque ultra hoc tempus expectandum esse, præcipit si calida anni tempore quis ab initio curam susceperit. Tamen agebatur hic loci tantum de læsione calvarie, quæ scalpro eradi non poterat: Ab effusis autem humoribus sub cranio magis præceps discrimen inunimet.

Peterebratio cranii solebat etiam institui, uti dictum in commentario §. 271. ut os depressum & vacillans vecte posset elevari: sed in hoc casu triplex inde potest expectari utilitas, nempe ut extravasatis liquidis liber pateat exitus, deinde si per suppurationem deberet aliquid separari a vivis partibus, ut puri factio pateret via; ultimo ut ossis fragmenta, encephalon pungendo, lacerando &c. lædencia, commode possint tolli.

dum est; unde sub hac tantum limitatione generalis hæc tegula locum habet. Maturo autem consilio, nec festinanter, determinari debet locus, cui terebra applicabitur, ne postea crudelis hæc adeo apparens adstantibus operatio (vulnerati enim ipsi fere semper stupidi & hebetes in his casibus vix dolorum sentiunt) reperti debeat; sicque aliquando ansa derur illis, qui petusforis causam defendunt, imputandi mala secuta Chirurgis & Medicis.

§. 284. **V**Etat 1. futura. 2. muscoli plurimi. 3. cavitates ossis frontis. 4. arteria major ossi inserta. 5. inferior situs loci. 6. vacillatio fracti, contusi, carioli ossis. 7. inæqualitas eminentis & excavati iterum cranii.

1. Dum in cadavere ferra undique divisi cranium elevare nuntur Anatomici; vident evidenter, datam matrem in omni fere puncto calvarie adhærere; sed in locis futurarum hanc læSIONem tam validam esse experiuntur, ut vecte ferreo interposito vix summa vi avellere possint. Paret ergo, quod, si terebratio his locis instituitur, non posset orbiculus ossis excidit tolli sine magna dilaceratione datæ matris; unde dolor ingens, convulsio, & alia pessima mala sequi possent. Hinc communi omnium Auctorum consensu illa loca

vitantur, potiusque ab utroque latere futuræ terebratur cranium, quam in futuræ loco. Dum homini grave vulnus secuti inflicta fuerat illo in loco, ubi futura sagittalis cum coronali uniter, post gravissima symptomata, plurimis fragmentis ossis extractis, convalescit quidem, sed nulla arte potuit evitare Hildanus (*Observat. Chirurg. Centur. 2. Observ. 8. pag. 85.*), quin fistulosum ibi maneret nlcus: unde & curæ difficultatem recenset inter illa argumenta, quibus improbat ut terebratio applicatio in loco futurarum. Hanc tamen operationem in futuro

suturis institutam, se vidisse, dum studiorum causa in Italia venisset, testatur Celeberrimus Medicus *Juratus Federicus Werdenbergius* in Epistola ad Hildanum de hac re data ( *Ibid.* pag. 86. 87. ). Apparet tamen evidenter ex modo dictis, periculosum semper esse, trepanum ipsis suturis applicare.

2. Notum est, circa occiput validissimos musculos calvariae insigi, & lateralem partem cranii utrimque occupari temporalibus musculis. Unde merito videntur & illa loca vitanda esse, si fieri possit. Monuerat Hippocrates ( *De Capit. Pulsarib.* cap. 19. Tom. XII. pag. 123. ): *Caput secanti reliqua quidem capitis duo discindere licet, tempora autem, & quod aditus supra est, iuxta venam, quae per tempora fertur, secari non debent. Convulsio enim secum prebendit.* Et in loco allegato in commentariis §. 241. dicit, quibus tempora secantur, illis ex adversa sectionis parte convulsio contingit ( *Craepareus*, num. 498. ). Ex quibus concludere licet, semper periculosum fore, hos musculos laedere; quamvis tamen non semper lethalia mala inde sequantur. Plurima enim observata evincunt, secios fuisse musculos temporales, applicatum fuisse trepanum illi loco, quem occupant, & tamen curatos fuisse aegros. Ex magno satis similium observatorum numero unum alterumve Exemplum recensere. Homo acinace vulneratur in tempore sinistro, cum fissura calvariae adeo patente, ut digitum indicem facillime caperet; tamen a tanto vulnere brevi temporis spatio incolumis evasit ( *Sculteti Anatomiae Chirurg. Observ.* 3. pag. 195. 196. ). Riverius in observationibus, ipsi communicatis a Samuele Formio Chirurgo Monspelienfis, qui quinquaginta annorum spatio artem exercuerat, habet ( *Riverii Opera* pag. 572. *Observ.* 19. ) sequentem. Mulier vulnus acceperat ictu lapidis in tempore sinistro; cum trepanum necessarium necessarium videretur, in consilium vocatus exercitissimus ille Chirurgus non dubitavit cruciali incisione discindere temporalem musculum, & loco detecto trepanum applicare; neque ullum grave symptomata inde ortum esse testatur. Similem casum, ipsi communicatum ab alio Chirurgo, habet alibi ( *Ibid.* pag. 580. ). In puero duodecim annorum ex alta arthore delapso os temporis adeo confractum fuit, ut coactus fuerit Chirurgus notabilem partem muscu-

li temporalis tollere, ut latens malum posset detegi, & trepanum applicari. Felix tamen fuit curae successus, praequammodum maxilla inferior parum versus latus oppositum distorta manserit ( *Garengot Opera de Chirurg. Tom. III. Observ. XV. pag. 131.* ). Ubi ergo necessitas urget, praestat etiam in his locis trepanum applicare, quam certe morti relinquere vulneratum.

3. Notum est ex Anatomicis, ossis frontis tabulas a se invicem diductas facere sinus frontales dictos, plerumque satis capaces; variae magnitudinis in variis hominibus; supra oculorum orbitas fore ad media supercilia productos; aliquando ossis labellis in minora cava distinctos; qui binis satis magnis aperturis ad utrumque septi natum litus patent, & sic narium internam capacitatem augent. Sinus illi membrana illa, quae nares internas investit, undique obducuntur. Si ergo trepanum hic applicaretur, externa tabula perforata, illico occurreret membrana illa internam ejus superficiem involvens, quae tolli deberet; uti & illa eiusdem membrana pars, quae internam tabulam simili modo investit, antequam posset terebra perforari interna tabula. Patet facile, hoc difficillimum, si non penitus impossibile, esse, cum membrana hac, narium cava investiens, adeo sensilis sit, ut vel levissima plimulæ agitatione in naribus irritata, sternutatione excitata, totum corpus convelli faciat. Simul norandum, quod vix unquam ad cicatricem perducí possit vulnus, quod ad sinus frontales penetravit. Hoc jam apud Celsum ( *Lib. 8. cap. 4. in fine pag. 521.* ) habetur, qui monet omnibus capitis locis perirebratis commode cicatricem induci, excepta illa frontis parte, quae paululum super id est, quod inter supercilia est. Ibi enim vix fieri potest, ut non per omnem etatem exulceratio, quae lintolo, medicamentum habente, contingenda erit. Postea recentiorum observata hoc confirmaverunt. Hac ergo loca, ex Anatomicis cognita, in applicatione trepani vitanda esse patet.

4. Si consideretur calvaria humana mundata, in interiori ejus superficie plurima apparent impressa, saepe etiam satis profunde, vestigia, quae maiorum arteriarum, per duram matrem distributarum, ramificationibus respondent: si autem major talis truncus, dum terebra in osse circumducitur,

proximus est. Circa hanc rem tamen notanda sunt quadam fatis magni momenti. Dura mater undique quidem calvariae adheret, sed omnium fortissime in locis suturarum, uti dictum fuit paragrapho praecedenti num. 1. unde sanguis effusus, haerens inter calvariam & duram matrem, poterit illam separare a cranio, sed ubi suturae sunt, ibi hoc fieri non poterit; unde certis limitibus haerebit semper sanguis effusus inter cranium & duram matrem, nec poterit facile ultra suturarum loca pergere. Si jam v. g. locus laesus esset in ossis bregmatici illa parte anteriori, quae ob viciniam suturae coronalis, per quam frontis ossi jungitur, & ob magnam arteriam plerumque hic locatam, tuto perterebrari non posset; tunc quidem locus proximus eligendus esset, talis tamen, qui ipso bregmatico osse contineretur. Si enim in osse frontis ad alterum latus suturae coronalis terebratio fieret, non posset sanguis, durae matri sub bregmatico osse, incumbens, exire quia dura mater in loco suturae coronalis firmissime haerens impediret, quo minus illic venire posset. Unde sub hac limitatione tantum generalis haec regula locum habet, quae jubet locum proximum eligendum esse, si in ipso lesio-

nis loco terebratio fieri non possit. Sanguis enim intra cranium & duram matrem effusus sic in diversis quasi cameris haerere potest, quae penitus distinctae cum aliis non communicant. Omnium maximum tale spatium sub ossibus bregmatici haeret, sutura sagittali in medio divisum in duas tales distinctas cameras. Idem etiam in fronte verum est, quod iterum distinctum tale spatium habet; & cum os frontis media sutura ad radicem nasi plerumque divisum sit in junioribus, imo saepe etiam adultis, patet, & illud spatium sic bifariam dividi.

Ubi vero sanguis effusus haeret intra duram & piam matrem, iterum notandum est, totum calvariae cavum internum bifariam dividi. Durae enim matris processus, falciformis dictus, a crista ossis Ethmoidalis per totam longitudinem suturae sagittalis pergens usque ad processum durae matris transversalem, (qui cerebellum tegit & ab incumbens cerebri pressione defendit) & intra bina cerebri hemisphaeria profunde demersus, dividit bifariam internum cranii cavum, & impedit, quo minus sanguis in dextro latere effusus ad sinistram pergere posset. Unde & in illo casu ad hanc rem pariter attendendum est.

§. 286. **Q**uin, urgentibus symptomatibus (273. 275.), licet nullus locus certo inveniatur (276., tamen trepanum applicandum & ab una, & ab altera, parte cranii, in finem descriptum (277.)

Aliquando accidit, omnia signa quidem docere, quod effusus sub calvaria sanguis comprimat encephalon; interim tamen non adsunt certa indicia, quibus determinari possit, in quonam loco cranii haereat: tunc nihil superest, quam vulneratum certae morti tradere, vel incerto penitus eventu cranium perterebrare. Potest enim sanguis effusus ipsam basin calvariae occupare: potest in ipsis ventriculis cerebri haerere, potest in longe alio loco accumulatus esse, quam est ille, cui terebra applicabitur. Videtur tunc, praemonitis prius de ambiguo successu vulnerati amicus, melius esse anceps remedium experiri, quam nullum; praesertim cum innumeris observatis constiterit, trepani applicationem, rite administratam, non esse adeo periculosam; & vulnerati tates plerumque omni sensu careant: sic ut narret Dionysius (*Operat. de Chirurgia*

pag. 350.), se nobili juveni, trepano applicato, effusum sub calvaria sanguinem eduxisse: nec noverat tamen vulneratus se hanc operationem passum fuisse donec perfecte curato hoc indicabatur. Hinc licet adstantibus adeo crudele videatur, dum frustra instituta haec operatio in alio loco calvariae repeti debet; tamen decumbentibus non adeo molesta esse solet. Ubi autem nihil omnino cognoscitur de loco affecto, tunc solet os bregmatici perterebrari; quia & maximam partem ossis calvariae constituit, & satis magna vasa huic ossi supponuntur. Si nihil inveniat, in oppositi lateris osse bregmatico idem tentatur. Apud Hippocratem non invenitur, quod repetitis vicibus in eodem agro trepanum appliceretur: sed quantum potui colligere ex pulcherrimo ejus libro de vulneribus capitis, non perforavit calvariam, ut humoribus sub cranio effusus viam face-

rat, sed tantum ut calvarie male affectæ partem tolleret. Notavit quidem, quod os calvarie male affectum pus colligere possit, illudque infra ad cerebrum transfundere (*Hippocr. de cap. vulner. c. 4. Tom. XII. pag. 117.*) sed de extravasatione humorum, vasis fractis sub integra calvaria, nullam mentionem fecit. (Unde non videtur applicuisse trepanum, nisi ubi constaret, calvariam vinctam esse, & cognitus esset locus lésus: & ideo, ubi os fractum erat alia capitis parte, quam qua vulnus erat, huic calamitati nulli remedii subveniri posse asseruit (*Ibid. cap. 10. pag. 219.*). Celsus tamen talem sanguinis extravasationem novisse videtur, dicit enim: *raro, sed aliquando tamen, evenit, ut os quidem totum integrum maneat, intus vero ex ictu vena aliqua, in cerebri membrana rupta, aliquid sanguinis mittat, isque ibi concretus magnos dolores movet, & oculos quibusdam obacret. Sed sepe contra id dolor est, & eo loco cute incisa, pallidum os reperitur, atque id quoque os excidendum est* (*A. Corn. Celsi Medic. Lib. VIII. cap. 4. pag. 516.*). Et in eodem Capite jubet pluribus foraminibus cranium perforandum esse, si tripla longius patet.

Plurima Exempla habentur apud recentiores Chirurgos, quibus constat, felici successu pluribus locis perterritam fuisse calvariam. Homini ex equo delapso vulnus in osse bregmatico apparuit: applicato trepano, multum sanguinis exivit, sed sine levamine symptomatum: post triduum tumor in occipite apparuit; quo aperto, alterum trepanum ossi occipitis applicatum fuit: copiosius exibat ex foramine facto sanguis; & dum ille efflueret, incepit ad se redire, & perfecte convaleuit. Hæc historia pulchre

§. 287. **I**nvento loco (276. 283. 284. 285. 286.), abrafo capillitio, inciduntur integra (259.) separantur a cranio, elevantur labia, siccatur os, tegitur carpitis linteis, sistsitur cruor (218.) lenitur dolor (227. 228. 229.), prohibetur inflammatio (235.); & si non urget valde malum, rite facta deligatione in diem sequentem relinquatur apparatus.

Postquam determinatus fuit locus, cui trepanum applicabitur, requiritur, ut calvaria integumentis suis nudetur perfecte, ne modiolis dentes molles partes relietas lacerent; imprimis sollicite cavendo, ne aliquid de Pericranio relinquatur: illud enim, scalpro terebrivse laceratum, vehementes febres cum inflammatione excitare, jam Celsus monuerat (*A. Corn. Celsi Medic. Lib.*

confirmat illa, quæ dicta sunt paragrapho præcedenti; quod sanguis intra duram matrem & calvariam effusus in distinctis cameris hæreat, quæ non communicant inter se (*Dionis Operat. de Chirurg. pag. 340.*). In eodem loco idem auctor alium casum narrat puellæ, cui in utroque osse bregmatico trepanum applicuerat, felici etiam cum successu. In maxima cranii depressione septies in circumferentia depressionis craniani modiolis perforare coactus fuit Scultetus (*Arment. Chirurg. Observ. 7. pag. 189.*) una & eadem die in Capitaneo, qui tamen binorum mensium spatio a tam gravi vulnere curatus manus suam militare cum laude exercere potuit. Et in mirabili illa historia, de qua dictum fuit in commentario §. 284. duodecim annorum puellæ cranium duodecies perforatum fuit, cum integra tamen sanatione. Longe adhuc mirabiliorem historiam narrat Celeberrimus suo tempore Chirurgus Solingen (*Manuale Operationum der Chirurgie &c. cæsse Dec. cap. 7. p. 29.*): Philippus Nasavius ex illustri Auriacorum stemmate oriundus, ex equo delapsus sic caput impiegit stipiti, ut calvaria variis locis fracta fuerit; & ideo vigeties septies ipsi cranium trepano perforatum fuit a Chirurgo Neomagensi; tamen inde convaleuit: huiusque rei testimonium sanati nobilissimi viri autographo confirmatum, vidit Solingen; additque, illum postea adeo pancreaticæ voluisse, ut inter pocula tres compositores postea morti tradiderit.

Ex quibus omnibus patet, tutam satis esse, quamvis frequenter repetitam, trepani applicationem, si rite instituitur, quod quomodo fieri debeat, in sequentibus dicetur.

§. 288. **I**nvento loco (276. 283. 284. 285. 286.), abrafo capillitio, inciduntur integra (259.) separantur a cranio, elevantur labia, siccatur os, tegitur carpitis linteis, sistsitur cruor (218.) lenitur dolor (227. 228. 229.), prohibetur inflammatio (235.); & si non urget valde malum, rite facta deligatione in diem sequentem relinquatur apparatus.

*VIII. cap. 4. pag. 516.*) Unde crinibus abrais integumenta ad os usque cruciali incisione dissecantur; uti dictum §. 259. Anguli quatuor vulneris sic facti elevantur, & digitus vel scalpro pericranium a calvaria separatur; mollissimis plumaceolis parum calefactis abstergitur cruor ab ossis nudati superficie; dein simile plumaceolum, pauculo malliches tenuissime tritz imposito, applica-

plicatur nudæ calvariz: similiter & lineæ carptæ supponuntur elevatis integumentis, ut magis ab osse nudo fecedant. Hæmorrhagia plerumque levis esse solet, & brevi cessat: si vero major parum ramus arteriosus discissus fuerit, alcoholo calido compesci poterit; vel idonea ligatura leviter comprimendo per aliquot horas sistetur sanguinis fluxus: vel etiam, si urgerent symptomata, filo transmissio per integumentorum locum, ubi hæret arteria discissa, poterit satis commode ligari. Patet enim facile, non posse trepanum applicari, quandiu Hæmorrhagia durat: sanguis enim effusus continuo impediret, quo minus explorari posset, quousque perforatio calvariz processisset. Dolor, si adeest, leniri poterit levi inunctione Unguenti Populei, quod molissimum & simul anodynum est: plerumque tamen tales vulnerati hebetes & stupidi jacent. Si inflammatio metuatur, & imprimis si non statim applicabitur trepanum, sed insequentem diem differetur operatio, poscia fovere locum convenit. Sic Hippocrates, loco in commentariis §. 249. num. 3. allegato, dum detegenda erat calvaria, discissis integumentis, iussit vulnus linamentis implendum esse, ut hæc in vulnere relicta quam minimo labore illud amplissimum exhiberent: sed simul monuit, quamdiu hæc linamenta adhibentur, caraplasma applicandum esse ex tenuissima polenta, aceto subacta & incocta, ut inflammatio nimis præcaveatur.

Queritur nunc, an, detecto jam cranio, ejus perforatio differri debeat per aliquot horas, vel in diem sequentem, an vero statim perfici debeat? Videtur semper hæc operatio citissime instituenda esse; raro enim adhibetur, nisi in urgenti malo. Binæ plerumque sunt causæ, quare differri voluerunt operationem quidam Chirurghi. Primo: quia capillorum abrasio, integumentorum dissecio & separatio a cranio, satis temporis

requirunt; unde amici vulnerati sæpe eggererent, diuturniori cruciatu torqueri miserum. Secundo: ob Hæmorrhagiam post dissecia integumenta metum, & denique, quia dissecitæ partes sponte retrahitæ vulnus fictum magis patulum reddent, unde facilius patebit terebræ aditus. Sed si consideretur, plerumque tales vulneratos omni sensu carere, vel saltem admodum hebetes jacere; hæmorrhagiam idoneis remediis satis cito posse compesci, saltem ad hoc tantum fere requiri paucarum horarum moram; & dissecia labia, modo satis amplius fuerit locus discissus, posse facile sic diduci, ut terebræ via pateat; apparebit facile, omnium optimum esse, si statim post nudationem cranii ad ejus perforationem pergatur.

Nec obstat huic sententiæ Hippocratis auctoritas: ille enim dissecitæ integumentis, ut ossis lesionem investigaret, voluit hoc examen in posterum diem differri (*Hippocrat. de Vuln. Cap. c. 20. & 21. Tom. XII. pag. 124.*): verum, uti præcedenti paragrapho dictum fuit, non videtur perforationem calvariz instituisse, ut extravasatis humoribus daretur exitus; sed tantum, ut male affectam cranii partem tolleretur: quod malum certe longiorem moram fert sine tanto discrimine. Ubi vero vasa fracta humores contentos pergunt effundere; nisi subito liber fiat his exitus, summus metus est, ne sic comprinatur encephalon, ut postea functiones læsæ restitui nequeant, licet perforata calvaria educti fuerint humores extravasati. Tamen & Hippocrates in eodem libro (*Cap. 31. 32. ibidem pag. 127. 128.*), postquam recensuit illa signa, quæ indicant capite vulneratum hominem periturum esse, dicit: *si cognoveris febrem occupasse, vel aliud aliquod signum adesse, minime differendum est; sed or ad membranam usque ferre secandum, aut scalpulo eradendum est.*

§. 288. **T**Um capite firmato, auribus obturatis, aere calefacto, deterfso ossi terebræ cum stylo applicatur æqualiter & modice acta, frontis supposita, terebratione agitur, donec vestigium rite sit impressum.

¶ Ut instituat hæc operatio cum successu, attendendum imprimis ad sequentia. Caput ægri debet sic firmari, ut penitus immobile hæreat: unde lectulus, in quo recumbit, sic ponendus est, ut ab omni

parte Chirurgus & ministri commode accedere possint. Pulvinari, cui caput ægri incumbit, solent supponere assorem, vel pannam stanneam, aut simile quid; ne inter operandum cedat molle pulvinar, & sic turbetur.



betur operatio. Præterea certus debet esse Chirurgus de constantia illorum, qui caput vulnerati immobile retinebunt: nisi enim affuerit fuerint intrepido animo hominum calamitates intueri, sæpe in animi deliquium labuntur, dum hæc operatio satis crudelis videtur, & sæpe satis notabili tempore durat. Solent quoque plerumque aures vulnerati gossypio obturari, ne ingratum ferræ stridorem audiat: monet tamen Dionisius (*Cours d'Operations de Chirurgie* pag. 495.) sæpe hoc neglectum fuisse sine ullo damno; nec mirum, cum plerumque illi, quibus trepanum applicabitur, sine sensu jaceant.

Omnibus illis instrumentis, quæ ad hanc operationem requiruntur, prius ordiue dispositis, & calefacto aere vicino, & repleto fumis accensæ succini, massiches, & similibus, cereo ellychnio commodissime illuminatur locus, cui terebra applicanda erit. Terebra autem, quæ ad hanc rem utuntur, cavum orbiculum refert: atque tali cava terebra Hippocratem jam usum esse satis patet (*Hippocr. de Caput. Vulner. cap. ultimo Tom. XII. pag. 129.*). Celsus vocavit modiolum, ferramentum concavum, teres, imis oris serratum, per quod medium clavus, ipse quoque interiore orbe cinctus, demittitur. Videtur autem tantum usus fuisse modiole, dum locum ossis corrupti poterat comprehendere modiolus: ubi vero latius vitium erat, tunc terebra fabrilis, vel simili huic instrumento, foramen faciebat in ipso sine vitio ossis atque integri: deinde alterum non ita longe, tertiumque, donec totus in locus, qui excidendus est, his cavis cinctus sit. Tum excisorius scalper ab altero foramine ad alterum molliolo adactus id, quod inter utrumque medium est, excidit; ac si ambitus similis ei sit, qui in angustiores orbem modiolis inprimatur (*A. Cora. Celsi Medicæ VIII. asp. 3. pag. 510. 511.*).

Si jam comparentur illa instrumenta, quibus veteres in perterebratione calvariæ usi fuerunt, cum illis, quæ hodie in usu sunt, apparebit facile, magnam perfectionem his instrumentis accessisse, dum sensum vitia, quæ usus demonstrabat, correctæ fuerunt. Diu enim adhuc usi fuerunt trepanis cylindricis: sed hic magnum periculum erat, ne circa finem operationis depressa terebra duram matrem laderet: unde postea conicæ figuræ trepana adhibue-

runt; quæ sensum latecentia sustinebuntur marginibus ossis diffecti, neque facile poterant demergi & duram matrem ledere. Sed facile patet, conicum talem modiolum, non posse descendere, dum circumagitur, nisi ejus latera acuta marginem ossis radere possent, & sic viam facere latiori sensui facto modiole. Unde pulchro invento modiolum talem cavum hodie faciunt ex plurimis lamellis chalybeis, a parte superiori & latiori oblique descendentes, & sibi mutuo incumbentes omnibusque versis eandem partem inclinaris; Singulæ hæc lamelle in acutum apicem desinentes dentem ferræ faciunt; ex quibus dentibus inferior orbiculus trepani constat: latera autem harum lamellarum acuta radendo marginem orbiculi diffecti, viam faciunt sensui descendenti modiole; & obliquarum lamellarum ad invicem inclinatione efficitur, ut ossis derasi scobs sursum emergat sponte, & excidat; quæ aliter impeditet terebræ liberam circumductionem. Interna modiole superficies politissima & conicæ figuræ esse debet; sic enim diffecti ossis orbiculus cavum modiolum facillime poterit ingredi; & circa finem hujus operationis ad hoc illudve latus poterit inclinari terebra, prout requiritur; quod fieri non posset, si cavitas modiole cylindrica foret, ut facile patet. Figuræ trepani cum omnibus suis requisitis, apud auctores expressæ, meliorem dabunt ideam hujus instrumenti, quam quidem ex sola descriptione haberi posset. Videatur *Garengeot (Nouveau traité des Instruments de Chirurg. Tom. II. pag. 98. 118. 134. 135.)*, apud quem omnia hæc habentur.

Si nihil verat, modiolus major præferendus erit minori; nullum enim periculum metuitur a foraminis excidendi majori amplitudine: & liberissima via sic datur effusus sub cranio-humoribus, quæ exire possent. Ut autem caveatur, ne vacillet terebra, dum calvariæ applicatur, in medio posuerunt stylum chalybeum inferius acutum, paulo eminentem ultra serratum modiolis extremum; qui stylus calvariæ innitens sic firmat modiolum, ut non aberrat; sicque poterit ferræ vestigium rite calvariæ imprimi. Vocatur tunc *Trepans mat*, quando in medio talem stylum habet; qui si absit, dicitur *Trepans finima*. Olim solebant.

bant semper habere binos ejusdem magnitudinis modiolos; quorum unus talem styllum habebat, alter non, quia non poterat ad finem operationis stylus ille adesse, ut facile patet: citius enim penetraret calvariam, & duram matrem laderet, quia ultra marginem ferratum modioli eminet. Hodie sic hæc instrumenta conficiuntur, ut stylus ille austeri commodissime possit, postquam vestigium calvariae impressum fuerit. Præstat tamen semper binos modiolos ejusdem magnitudinis habere, ne turbetur operatio, si forte casu frangeretur lamella quædam ex illis, quæ modioli ferratum ambitum constituunt.

Omnibus illis sic rite paratis, in medio centro orbiculi excindendo, trepano, perforativo dicto, leve vestigium imprimitur, quod stylum trepani maris excipiet, licet etiam hoc omitti posset, si stylus ille tre-

pani maris bene paratus fuerit; tunc enim facile una alterave terebræ circumductione stylus ille sibi viam faciet. Perpendiculariter tunc applicatur terebra, stylo suo instructa, loco excindendo: deinde sinistræ manus index digitus cum pollice summatim vertibuli trepani sic applicatur, ut cavum forment circulum; cui frontem imponit Chirurgus, qui operationem perficiet; vel & montum, ut alii volunt, ut minimam etiam terebræ aberrationem statim sentire possit, & corrigere: deinde dextra manu prehensio vertibuli manubrio terebram lente & æqualiter circumducit aliquot gyris, donec, stylo medio sensim profundius adacto, dentes modioli calvariam radere incipiant; sicque pergit, donec crenata talis calvariae insculpta fuerit, quæ sine vacillationis periculo, stylo exemplo, terebram postea facilius penetrare poterit.

§. 289. ¶ Xempto tunc stylo pergitur, terebra lente adacta, scobe assiduo erasa, donec cruor erumpens, ossis mollities, mutatio soni, diploen attractam doceant; quæ sæpe non præsens frustra expectatur.

Postquam tale vestigium terebra cranio insculptum est, tunc stylus medius tollitur, ne citius penetrans duram matrem lædat. Videtur in antiquiorum trepanis jam stylus ille mobilis fuisse; dicit enim Celsus (Lib. 8. cap. 3. pag. 510.) hanc operationem describens: *At, ubi jam iter modiolus impressum est, medius clavus educitur, & ille per se agitur.* Si autem postea, uti dicitur §. 291. orbiculus, calvariae excisus cochlea eximitur, præstat hanc iam applicare, antequam ad diploen usque penetraverit terebra; quia aliter, dum huius instrumenti circumrotatione spiralis ductus imprimitur ossis substantiæ, posset aliquando tabula cranii externa separari ab interna; & tunc difficilior foret orbiculi discissio: unde prius hoc instrumentum applicandum est, ut viam in osse faciat, dum adhuc binæ tabule cranii firmiter coherent: quo facto eximitur iterum, & applicato modiolio lente & prudenter pergitur terebrando: *est enim, (ut Celsus (Ibidem.) monuit), quidam premendi modus, ut & foratur & circumagatur: quia, si leviter imprimitur, parum proficit, si graviter, non movetur.* Veteres, qui non videntur adeo adhibuisse trepanum, ut effusus sub calvaria humores educerent, sed potius, ut

corrupti ossis partem tollerent, pergebant terebrando, donec crederent modiolum penetrasse ad sanam ossis partem usque: unde dixit Celsus, (Ibid. pag. 511.), *cum sanitas inferioris partis febre cognita, est modiolus removetur.* Os enim vitiatum alieno colore inficitur: hinc quandiu terebra in corrupta ossis parte circumagatur, scobs abrasa similis coloris est; ubi autem profundius penetrans terebra sanam ossis partem radit, color scobis mutatus hoc docet. Cum autem hodie trepanum hanc ob causam rarissime adhibeatur, sed tantum ut perforata calvaria exitus detur humoribus effusis, vel ut depresso cranium commodius elevari possit, & fragmenta avulsæ tolli &c. ideo pergitur, donec ad diploen perventum fuerit. Cum autem lente & prudenter circumducatur terebra, & scapis tollatur, ut scobs in crena collecta & inter lamellas trepani hærens auferri possit; non videtur adeo magnus metus esse, ne terebra a valido attritu nimis incalcesceret. Dum illud metuebat Hippocrates (De Capite, vulner. cap. 35. Tom. XII. pag. 129.), iussit, *terebram inter secundum scapum asserendum esse, & in aquam frigidam demergendam, ne os incalcescat.* Terebra enim, dum circumducitur, incalcescit, os calcescit & excis-

*canis incendit, & facit, ut plus abscedat ab osse in sectionis ambitu, quam abscedere debebat.* Eandem cautelam adhibendam voluit Celsus (*Lib. VIII. cap. 3. pag. 512.*), dum terebra cranium perforabatur; ubi vero modiolus applicabatur, dixit: *neque alium est, infillare paululum rose vel lactis, quo magis lubrico circumagatur (ib. p. 510.).*

Ad diploen autem pervenisse terebram cognoscitur mutato sono, dum non amplius per duram ossis substantiam modiolus circumducitur; unde & minor resistenter sentitur: & cum vasa sanguinea saepe satis insignia per cellulosa hanc ossis fabricam decurrant; his laceratis ferræ dentibus, cruor erumpit; vel saltem scobis deersæ color, albus prius, tunc mutatur in rubrum. Huc usque audacter terebram circumduci posse, dixerunt fere omnes, nullumque omnino periculum subesse, antequam ad diploen penetraverit modiolus: imo

in initio parum festinandum esse voluerunt plurimi, cum circa finem adeo lente & suspensa manu procedendum sit. Sed constat certissimis observatis, aliquando diploen deesse, imprimis in senili ætate: & vidi tales calvarias, in quibus diploe in quibusdam locis aderat, in aliis aberat omnino; unde sic turpissimus error committi posset. Videtur jam Celsus hoc monuisse, dum dicit: *sed tum majori cura agendum est, cum jam aut simplex os dimidium perforatum est, aut in duplici superius. Illud spatium ipsum, hoc sanguis significat (A. Bern. Celsi Medic. Lib. VIII. cap. 3. pag. 512.).* Licet enim in hoc capitulo, uti & in præcedenti, de ossium vitis in genere videatur agere; tamen illa, quæ mox sequuntur, evincunt, quod de cranii perforatione hic loquatur: cum dicat, metum esse, ne mucrone cerebri membrana lædatur &c.

§. 290. **E** Loto tum cruore, & per alcohol calidum compresso, exemta accurate scobe, summa cum cautela, lente, patienter, uno altrove gyro tantum. agendus modiolus, assiduo everrenda scobs, perpetuo inspiciendum, an color in circulo exarato mutetur, assiduo exploranda fundi æqualitas, tum variata pressione terebræ, pro vario colore apparente, os solvitur eo usque, ut parum adhærescat & æqualiter.

Ubi ad diploen penetravit modiolus, apparet facile, quanta cautela opus sit: sola enim interna tabula cranii, vitrea dicta, superest; quæ saepe tenuissima est in quibusdam calvariis, in aliis iterum multo crassior. Præterea arteriæ duræ matris, in profundis sulcis, cranii internæ tabulæ sculptis, locantur; unde si pars talis sulci in orbiculo illo dissecto hæreret, posset terebra in illo loco jam penetrare calvariam, & insigne tale vas lædere, cum in aliis locis satis crassa adhuc pars cranii perterebranda resisteret. Inæqualis in plurimis locis cranii crassities pariter in causa est, quare tanta hic tarditate & prudentia opus sit. Si ergo, dum terebra per diploen transit, sanguis copiosior erumpat, ille alcohole calido sisti dehebit; impedire enim liberum conspectum crenæ in osse factæ. Scobs continuo everrenda est, post unam alteramve terebræ circumductionem; & attendendum ad coloris mutationem, quæ in scobe abrasa apparet: quamdiu enim in diploe terebra circumagitur, tamdiu scobs rubicunda apparet; ubi vero terebra inter-

nam cranii tabulam incipit radere, scobs iterum alba incipit fieri. Sæpissime stylo immisso orbiculi dissecti fundus explorandus est, an ubique æqualis sit; an in omni loco os resonet ad styli attractum; an vero in quodam loco, dissecto jam osse, mollis membrana tangatur. Simul attendendum est, ad motum cereo ellychnio, an in fundo crenæ color albus ubique æqualis appareat; an vero, pellucente per tenuem ossis lamellam dura mater, in quodam loco mutetur jam color. Ex omnibus enim his peritus Chirurgus novit, quibus locis major terebræ appressio conveniat, quibus vero non; sicque sensum summam cum prudentia pergit, donec tenuissima tantum lamella superfit: integre enim excindere orbiculum periculosum foret, quia vix sine læsione duræ matris, cranio coherentis, fieri posset; unde graves inflammationes cum periculo mortis oriri monuit Celsus (*Lib. VIII. cap. 3. pag. 512.*).

Ob hanc causam Hippocrates, qui (ut jam dictum fuit) hanc operationem adhibuit, ut ossis vitia tolleret, non ut exitum

rum faceret effusus sub calvaria humoribus, noluit os ad membranam usque secandum esse, si quis in initio curam susceperit; ne in ipso opere terebra membranam vulneret: verum ubi parum abest, quin os totum jam dissectum sit, illudque jam vacillet, desistendum jubet, & permittendum esse, ut os sponte sua abscedat. Secto enim ossi ad talem profunditatem nihil mali contingere posse asserit: quia tenue est illud, quod relinquatur (*Hippocr. de capit. vulner. c. 34. Tom. XII. pag. 128.*). Ubi vero per initia curationem quis non susceperit, sed ab alio traditam tardius perficere debeat; tunc ad membranam usque excidendum esse jubet: & pulcherrime recenset omnes illas cautelas, quas adhuc hodie adhibent prudentes Chirurghi, ne in tali casu duram matrem tertæ dentibus lædant. Specillo enim terebræ circuitum sæpius tentandum jubet, & in partem ossis crassissimam terebram semper adigendam monet; simulque sæpe tentandum esse, an dimovendo os educi possit, antequam nempe integre dissectum fuerit. Omnia hæc eadem observanda monet, si quis ab initio suscepta curatione os ad membranam usque excindere voluerit (§. *Ibid. cap. ult. p. 129.*).

Simul patet, quantum usum habeat conica interni modiolii cavitas: nam os dissectum ascendit facile in latorem semper factum modiolum, & inclinari facile po-

test modiolus in omni ambitu, dum circa finem operationis non amplius æquabiliter circumduci debet, sed hanc illamve crenæ partem, ubi crassius esse os specillo detegitur, fortius radere. Si enim cylindrica foret interna modiolii cavitas, non posset inclinari, quin apprimereur os dissectum cavitatis internæ parietibus; impediretur libera terebræ circumductio; & sæpe secederet superior calvariæ tabula a diploe; unde postea residuum os difficilius tolli posset. Hoc aliquando accidisse patet ex Celso (*Lib. VIII. cap. 3. p. 512. 513.*); si ve de industria hoc factum fuerit, dum solam externam tabulam tollerent, non alius penetrante ossis affectione; si ve vitio instrumenti hoc contigerit: Dicit enim: ubi totum os ejectum est, circumradende levandeque sunt ora, & si quid scobis membrane infedit, colligendum. Ubi, superiore parte sublata, inferior relicta est, non ora tantum, sed os quoque totum levandum est, ut sine mora postea crasis increseat; quæ aspero ossi innascenti protinus non sanitatem, sed novos dolores movet. Simul apparet, si nulli, certe in hac operatione, periculosissimam esse festinationem; imprimis circa finem; & omnium optimum esse, ut tenuis lamella relinquatur: poterit enim tunc vacillans jam ille orbiculus sine periculo tolli: quod quomodo fieri debeat, docebit sequens paragraphus.

§. 291. **U**BI color cærulescens, ejus per totum ambitum æqualitas, segmenti vacillatio docent, fere perforatum esse cranium, segmentum vestæ, cochlea, vel cochleari eximendum.

Postquam constitit signis hic recensitis, modiolum eo usque penetrasse, ut sine periculo læsionis duræ matris ulterius pergi non possit; tunc pars ossis disseci educenda est. Hoc autem tentaverunt variis modis: vel enim vestæ parum incurvo, immisso intra orbiculum dissectum, tentabant elevare jam fere ab omni cohæsiōe liberum os; sed tunc facile patet, quod, dum ab uno latere elevatur, in opposita parte necessario deprimitur, atque ita dura mater lædi posset aspero margine ossis sic disseci: & licet prudeniter in omni ambitu tali vestæ frangeretur cohærens adhuc ossis pars, tamen adhuc cohærebit firmiter duræ matri vas emissis & receptis; & sic hac methodo difficulter tolli poterit. Omnium optimum videtur, si perpendiculariter sur-

sum trahendo educi posset: quod fieri poterit, si cavo semicirculari instrumento, utrimque intra crenam immisso, prehendantur disseci orbiculus, & deinde hæc simul sursum ducantur; dum calvariæ margo instar hypomochlii his instrumentis interservit. Si autem in vicinia fracta fuerit calvaria, facile patet, neque hoc tuto fieri posse. Pulcherrime fit, si cochlea spiralis applicetur medio centro orbiculi disseci, ubi vestigium est a stylo trepani maris impressum; (uti dictum fuit in commentario §. 289.) deinde illa leniter circumtorquendo sic infigatur ossi, ut firmiter hærear: potest ita commodissime tunc leniter hinc inde moveri disseci orbiculus; & postea, ubi vix amplius cohæreere videtur, perpendiculariter sursum educi.

§. 292. **D**Ein asperitas lateralis ossis radenda lenticulari cultello, scobs demenda, via paranda cruori & fordibus exituris per sternutationem, animæ retentionem, & depressorium prudentissime & raro, foramen implendum tegendumque tenui, molli linteo, imbuto medela membranæ amica, & apta lamella plumbi anata.

Cum operatio hæc, si ex arte instituta fuerit, semper relinquat marginem foraminis facti alperum, & ossis festucis hirtum; quia orbiculus excisus tenui adhuc parte coherens sursum vi evellitur; & statim contentum calvaria encephalon in hunc locum affurgat; læderetur ab his aculeis dura mater: nisi statim cultello lenticulari (sic dicto, quia obtusum ejus extremum lentis figuram refert) abradatur omne illud, quod in margine foraminis facti eminet. Illa autem, quæ in figura hujus instrumenti & usu quam maxime observanda sunt, videri possunt apud *Garengeot* (*Neuroan traité des instrumens de Chirurgie Tom. II. pag. 321. &c.*). Scobs sic abrasa, duræ matri jam nudæ incumbens, postea tollitur.

Aliquando accidit, ut, perforata calvaria, statim sanguis, vel pus aut ichor, inter cranium & duram matrem collecta, prodeant; sæpe etiam, licet hæc adsint, nihil exit. Dura mater enim ubique cranio adhæret, uti jam sæpius dictum fuit: hinc si, v. g. in quodam loco calvariaë effusi humores duram matrem a cranio separaverint, & recipiam non fuerit directe applicatum huic loco; poterit sic dura mater, undique adhærens, coercere collectos humores, ut non possint per foramen factum, quamvis faris etiam vicinum fuerit, exire. Tuncque nihil superesset, quam in alio loco iterum cranium perforare. Tamen antea tentatur animæ retentio, vel & sternutatio; quia sic majori copia sanguinis distenditur encephalon, (reditu libero per venas impedito, affluxu interim per arterias manente, uti explicatum fuit in commentario §. 271.) illudque distensum effusus humores versus foramen factum premet, ubi minor resistentia est. Aliquando & observatum fuit, licet statim non exiverint per foramen factum collecti humores, sequenti die sponte illos prodisse. Ut vero promoveatur facilis exitus effusi liquidi, cum prudenter lenissime deprimentur Chirurgi duram matrem instrumento, quod *Meningophylax* vocatur, ac, si diceres mem-

branz custodem. Instrumentum illud obtusum talem apicem habet, uti cultellus lenticularis, qui rotundo cylindro politissimo continuatur. Hoc instrumento, parum reposita prius, ne frigore his partibus detectis insolito noceat, lenissime premitur dura mater, ut ab ambitu foraminis excisus parum recedat, sicque facilis via pateat humoribus in vicinia foraminis effusis: simul etiam sic impeditur, ne dura mater, dum animam retinet vulneratus, acuto foraminis margini appressa lædatur. Simile quidem nomine instrumentum, sed diversæ structuræ & usus, apud *Celsum* (*Lib. 8. cap. 3. pag. 512.*) describitur: Erat enim lamina aenea firma, paulum resiliens, ab exteriori parte lævis, qua utebatur, ut, factis prius in calvaria foraminibus, eorundem septa media scalpro tuto excidere posset; loco enim excindendo submittabatur hæc lamina inter cranium & duram matrem, ne scalprum malleolo percussum hanc membranam læderet. Eadem hæc lamina etiam utebatur, ut os depressum attolleret (*Ibid. cap. 1. pag. 519.*).

Postquam humores effusi educti fuerint, notandum quam maxime, quod in loco foraminis facti desit calvaria coercens; & cum ejus cavum semper plenissimum sit, nisi cautela adhibeatur, incipiet attolli in hoc loco encephalon: imprimis si dura mater simul læsa fuerit, & in fungum excrescere. Et quamvis dura mater illæsa fuerit, tamen, nisi idoneo apparatu coerceatur, inciperet sensim attolli, & super ossa eminere, ut *Celsus* monuerat (*Ibid. pag. 520.*). Unde apta ligatura compensari debet deficiens pressio. Sumitur orbiculus ex linteo mollissimo, parum major, quam est foraminis excisus amplitudo, ille applicatur duræ matri, & sub limbo foraminis inter duram matrem & cranium in omni ambitu subducitur, sicque caveretur, ne acuto margini foraminis appressa dura mater lædi posset. Centro hujus lintei filum adhæret, ut postea commodè semper tolli posset. Infundantur tunc aliquot guttulæ balsami Peruviani tepidi, vel alterius si-

milis

§. 292. 293. 294. VULNERA CAPITIS. 333

milis balsami vulnerarii, deinde foramen repletur plumaceo is rotundis, ejusdem cum foramine diametri, & fundit balsamo madidis : repleto sic foramine, applicantur plumaceola parum majora, integumentorum dissectis labiis mollissima digestiva applicantur; dein idonea ligatura firmatur totus apparatus.

Pulchrum laudatur inventum peritissimi Chirurghi Belliste ( *Le Chirurgien d'Hopital pag. 69. &c.* ), qui lamellam plumbeam ejusdem diametri, ac est foramen trepano factum, binis anis utrimque instructam, parvis foraminulis perforatam, & balsamo vulnerario tepido madidam, immittebat foramini; deinde huic lamellae imponebat plumaceola mollissima, quae effluentes humores imberberent; ansas utrimque reflectebat supra calvariam, deinde apta ligatura firmabat apparatus. Sic leni tali pressione impediatur, ne exurgeret in foramen dura mater: poterant renovari plumaceola, relicta hac lamella plumbea, quae tamen etiam, si opus videretur, facile tol-

li & reponi poterat. Hac lamella per quatuordecim dies urebatur, deinde tollebat ne ossis consolidationi noceret diutius relicta.

Quia autem, nisi idonea ligatura retineat, a tumente encephalo posset elevari haec plumbea lamella, imprimis cum foramen conico modico excisum ab inferioribus sursum semper laescat; ideo & alia methodo usi fuerunt Chirurghi. Sumptum nenipe laminam plumbeam, quae foraminis inferiorem diametrum aequabat: hanc filo instructam in medio centro applicabant duræ matri, dein huic transversim imponebant plumbeam lamellam, lineam Geometricam circiter latitudine aequantem, & longitudine parum excedentem diametrum prioris laminae: hujus lamellae extrema utrimque sub cranio prudenter demittebant, quae ergo impediobat, quo minus encephali pressio posset elevare orbiculum illum plumbeum. Huic lamellae pariter filum affigebatur, ut commodè tolli posset ( *Garrigue Traité des opérations de Chirurgie pag. 212.* ).

§. 293. CURATUR dein ut vultus membranae ( 185. ad 139. )

Illae, quae in generali vulnerum cura dicta sunt, sufficiunt, ut habeatur cognitio illorum, quae requiruntur, ut fiat sanatio perforatae calvariae; imprimis si simul considerentur illae, quae habentur in commentario ad §. 245. Maxime hic requiritur aeris moderatus tepor, dum nudatur plaga, & rara deligatio; praeterquam in initio, dum adhuc prodeunt extravasata liquida; uti etiam quamdiu valida adest suppuratio. Nimis humida & laxantia, uti & pinguis, fere semper noxia fuerunt; Olibanum, mastiche, sarcocolla, & similia lenia roborantia, in tenuissimum polvinem trita, & vulneri aspersa, pulcherrime profuerunt. Hac methodus confirmatur Hippocratis ( *De Ca-*

*pitae vulner. c. 26. Tom. XII. pag. 126.* ) auctoritate: qui, postquam monuerat, omnia capitis vulnera, ubi repurgata sunt, siccantibus tractari debere, subiungit: *Eadem quoque est ratio membranae cerebri ambientis: illa enim proutinque esse facta & exemplo denudata quam citissime purgari & sicari debet; ne, si diutius madescat, nimia ulcine tabefiat & in tumorem exurgat. His enim ita se habentibus periculum est, ne ipsa putrescat. Summa quies animi & corporis, dieta tenuis, imprimis commendanda sunt: cum levia etiam vitia in usu sex rem non naturalium in capitis vulneribus adnoceant; uti in praecedentibus pluribus Exemplis confirmatum fuit.*

§. 294. **I**TA enim intra 40. & 50. dies separati sunt margines ossi foraminis; quotidie enascitur caro cavum replens, quae sensim diutius, tandem calli ossi, cavati, vel eminentis formam adipiscitur: ubi debilitas & dolor aliquis remanent.

Omnis ambitus foraminis, excissi ferre dentibus, & abrasione per cutellum lentilcularem, confusus fuit: hinc omnis illa superficies ossis quasi gangraenosa est, & se-

parati debet, antequam poterit fieri regeneratio perditae. Optime hoc notavit Celsus dicens, *Si quod etiam os adustum est, a terebra calefacta, dum circumagitur cele-*

riter) a parte sana recedit; & subitque inter integram atque emortuam partem caruncula, quæ, quod abscessit, expellat. Eaque fere, quia testa tenuis & angusta, *λινός*, id est squama a Grecis nominatur (Celsi Lib. VIII. cap. 3. in fine p. 513.). Hæc separatio ferius ocysive fit; imprimis pro varia ætate vulnerati; incipit tunc tota superficies foraminis fulca fieri, imo aliquando nigrescere: totum tamen illud sponte benigna suppuratioe separatur; tuncque incipiunt ab omni ambitu foraminis, imprimis a diploe & ab ipsa dura matre, vasa viva elongari, sibi mutuo occurrere, impleari, & retexere sic dependitam ossis substantiam. Pulcherrime hanc rem notavit Celsus (Lib. VIII. cap. 4. circa finem pag. 521.) dicens: *Ubi bene res edit, incipit ab ipsa membrana; vel, si os eo loco duplex est, inde quoque caro excrescens id, quod inter ossa vacuum est, replet: nonnunquam etiam super calvariam excrescit.* Renata hæc substantia primo tenerum mucum refert; sensim in callum mutatur, & tandem osseum fere duritiem acquirit; sed non nisi longiori mora. Si æquabilis pressio semper adhibita fuerit, pulchra fatis erit cicatrix; si minor pressio luxuriare fecerit renascentia hæc vascula, eminebit callus supra æquabilem superficiem calvarie; si nimia pressio, vel valida exsiccantia applicata fuerint, cava erit cicatrix. Plerumque intra quadraginta vel quinquaginta dies hæc cura absolvitur, si nihil sinistri acciderit, quod consolidationem retardaverit.

Observatione quam maxime dignum est, quod, quamvis perfectissime videatur recessisse callus, raro tamen totum foramen integre repletum fit tali substantia, quæ osseam duritiem acquirit: plerumque in me-

dio mollior locus manet, ubi carnea magis substantia, duræ matris forte propago, concurret cum illa, quæ ex ossis ambitu undique recrevit: unde plerumque in medio talis cicatricis debitor locus adest, forte nunquam in perfectum os indurescens. Hoc in pluribus calvariarum defunctorum, qui hanc operationem passi fuerant, se observasse testatur *Garengnot* (*Traité des opérations de Chirurgie Tom. III. pag. 214. 215.*) & præsertim in calvaria hominis, cui ante viginti annos celeberrimus Chirurgus trepanum applicuerat: invenit enim in illo loco foramen inæquale, quod minus pifum transmutare poterat. Non mirum ergo, si debilitas in hoc loco cranii, & aliquis dolor sæpe remaneant; imprimis a subita tempestatum mutatione: simulque apparet, debere locum illum, quamvis sanatum, diu adhuc muniri, ne ambientium injuriis lædatur. Alia occasione, in commentario ad §. 271. dictum fuit de memorabili illo casu, quo tredecim annorum puellæ, magna parte calvarie ablata, post novem menses elapsos post integram consolidationem, cicatrix rupta fuerit a vehementissima tussi, sic ut binæ uncie ipsius cerebri substantiæ expressæ fuerint; & post quinque dies inde perierit.

Cura autem bene procedere monet Celsus, si membrana mobilis ac sui coloris fuerit; caro increfcent rubicunda: facilis motus maxillæ atque cervicis. Mala signa sunt, membrana immobilis, nigra, vel livida, vel aliter coloris corrupti, dementia, acris vomitus, nervorum vel resolutio, vel dissentio, caro livida, maxillarum rigor, atque cervicis. Et paulo post subiungit: *capite fracto, donec jam valida cicatrix sit, vitentur Sol, ventus, frequens balneum, maior vini modus.*

§. 295. **I**nflammatio, suppuratio, gangræna, fungus excrescens raro membranam, & ipsius etiam corticis imprimis cerebri, tolluntur remediis, quæ his malis propria; tum applicatione antiphlogisticorum, detergentium, antisepticorum, filo, & lamella plumbea (292.). Cæterum malignitas vulnere capitis censetur. 1. loco, in occipite, vertice, pariete, futuris, pessima. 2. symptomatibus. febris post septimam cum frigore, tremore, vulnere pallido, arido, livido, osse aspero, flavo, hemiplegia, convulsione. 3. ætate. 4. temperie. 5. tempestate anni. 6. malignitate impuri, putrisque aeris.

Superest jam ut considerentur illa symptomata, quæ post institutam calvarie perforationem aliquando sequuntur, & magnum sæpe periculum inducunt. Cum enim abla-

to osse, ob calvarie plenitudinem, contentum encephalon una cum dura matre per foramen factum affurgat, nisi hoc caveatur illis, quæ dicta sunt §. 292. ad marginem.

nes duri offis appressa dura matre, impeditur liber transitus sanguinis per ejus vasa, oritur inflammatio, & omnia, quae illam sequi poterunt, mala; imprimis suppuratio & gangraena. Multum huc facit insolitus aeris, imprimis frigidi, attractus. Idem malum fieri poterit in pia matris vasis, ipsiusque cerebri corticali substantia, unde omnes encephali functiones laedi poterunt. Generalis cura inflammationis, de qua dicitur postea, tollere praesens malum poterit; tutius vero praecavere, antequam natum fuerit. Venae sectio larga, epispastica pedibus applicata, clysmata lenissima, tenuis victus, potus copiosus feri lactis, hydrogale &c. corpus sic disponent, ut ab inflammatione alienissimum sit. Eadem huc natam inflammationem tollere valebunt, audacter etiam repetita, si urgeant symptomata. Periculosissimam enim hic esse suppurationem, lethalem fere semper gangrenam, nullus dubitat; unde omni artis molimine praecavendi sunt hi inflammationis exitus.

Frequens satis, & valde metuendum malum, solet sequi calvariae perforationem; fungosa nempe, & subitissime increfcescens encephali dilatatio: quae raro, vel nunquam forte, contingit, quamdiu dura mater integra est; hac vero discissa vel erosa, pia mater, adeo tenuis, coercere nequit huc assurgentem cerebri substantiam: quae adhuc citius protuberabit, si pia mater simul laesa fuerit. Ob incrementi celeritatem, & figurae similitudinem, fungi vocantur, uti dictum in commentario §. 268. Celsus videtur simile malum observasse, sed credidit esse rumentem duram matrem. Aperto enim cranio, & detecta dura matre, dicit: *Quod si membrana per inflammationem intumuerit, infundenda eris rosa tepida. Si usque eo tumebit, ut super ossa quoque emineat, coercetis eam bene trita lentacula, vel folia vitis contrita, & cum recenti vel butyro vel adipis asserino mista.* (A. Corn. Cels. Medic. cap. 4. pag. 520.). Videretur autem omnibus observatis constare, fungos illos fieri a corticali pulposa cerebri substantia, coercentibus membranis & osseo tegmine orbata, & immaniter dilatata ab impulsu arteriosa vi humoribus; omnium maxime, si febris circulationis velocitatem auxerit. Cum autem cortex cerebri naturaliter nihil rubri sanguinis habeat, ideo & hi fun-

gi secti, & erosi, raro sanguinem fundunt; nisi maxima dilatazione horum vasculorum diametri eo usque auctae fuerint, ut rubrum sanguinem admittant: quod raro quidem fit, tamen aliquando factum fuisse testantur observata. In mirabili enim illo casu, in commentario §. 268. recensito, fungosa talis excrescens, pertuso cranio, moles valide pulsantes habebat arterias, & rudius tractata sanguinem copiosissime fundebat. Ob hanc causam, imminuto circulationis impetu, fungi illi ante mortem saepe subsident; uti in eodem casu aliquot ante mortem diebus observatum fuit: fungus enim nucem juglandem aequans, coloris cineritii, indolens, sponte subsedit, paucis ante mortem diebus; & ingens hiatus in ipsa cerebri substantia apparuit. Scultetus in homine, acinace caput vulnerato, rimam cranii magnam & latis latam cum duobus fungis invenit: post mortem autem, dum vulnus inspiceret, vidit fungos subsidisse quam plurimum (Sculteti Armament. Chirurg. Observ. 19. pag. 217.). Quae omnia confirmant quod fungosae tales excrescentiae a corticali vasculosa encephali substantia, ab impulsu humoribus dilatata, nascuntur.

Quaeritur jam, quid agendum sit in tali casu? ubi fungus talis eminet, retropremi nequit, encephalon enim comprimetur, & pulposa hac vascula levi etiam pressione destruerentur; unde putredo summa, & pessima mala. Abscindere vel erodere ipsam cerebri substantiam periculosum nimis forte videbitur. Tamen innumera observata docuerunt, fungos tales resectos fuisse, superflite vita non tantum, sed & omnibus encephali functionibus illaesis manentibus postea. Puero quatuordecim annorum, post trepani applicationem, talis fungus ex foramine calvariae emerit: filo circumstricto abscissus fuit; renascebat similis, eodem modo resectus; hoc cum aliquoties factum fuit, ad pugni magnitudinem de substantia cerebri sic perisse constitit: tamen a tanto malo incolumis evasit; licet & quaevis obvia fumeret pauperulus, & satis negligenter ipsum vulnus a malierculis curatum fuerit, dum Chirurgus abesset (Hildani Observ. Chirurg. Centur. IV. Observ. 3. pag. 277.). Puero ejusdem aetatis a ponderoso lapide, in dextrum latus capitis ex alto delapso, ingens



cranii fractura accidit. Cum, exentis pluribus calvariae fragmentis, omnia pulcherrime cedere viderentur, & cum pars durae matris, a cranii fragmentis impetis lacerata, separata fuisset, elapso die vigesimo, enatus fuit de vulnere fungus, qui intra viginti quatuor horas ad magnitudinem ovi gallinaei extra cranium eminuit: tamen asperso pulvere aromatico exsiccante, & emplastro ex similibus composito &c. intra quatuordecim dies totus fungus subiecit, & postea plenissime convaluit vulneratus (*Ibid. Crazur. I. Observ. 11. pag. 127. 23.*). Plura Exempla, quae docent impune rolli posse hos fungos, apud eundem Auctorem habentur. Actioribus tamen remediis fungos tales tentare videtur periculosum: & eodem in loco Hildanus casum narrat, quod rudis Chirurgus, contempto prudentioris consilio, fungo tali pulverem vitrioli & aluminis uti insperferit, unde statim dolor vehementissimus, febris acutissima, inflammatio, delirium, & paucis diebus postea mors ipsa secuta fuit.

Si consideretur mirabilis ille apparatus, quo arteriae ad encephalon tendentes ubique communicant inter se, postquam calvariam ingressae sunt; & simul notetur, quod injectiones docuerint, pia mater arterias ubique anastomosibus inter se uniri; idemque in tomentosis illis ultimis corticis vasculis obtinere ex analogia admodum sit probabile; patebit ratio, quare, magna etiam parte corticalis substantiae cerebri ablata, functiones cerebri illibatae manere possint. Simul notandum, quod parva etiam corticis cerebri moles, coercentibus tegumentis libera, in immanem molem possit extendi; cum vasculis adeo teneris & facillime dilatandis consistat.

Omnium optimum videtur ergo maiores fungos sile circumducto resicare prope calvariae foramen; ubi semper angustiores sunt; minores vero exsiccantibus compescere: cui scopo spiritus vini, cum malliche vel olibano coctus, pulche convenire videtur; vel & pulverem malthicis, sarcocollae &c. fungo inspergere,

Licet autem fungus ablatus fuerit, recrescet brevi, uti innumeris observatis constitit, nisi restituatur aequalis pressio, quae impediatur nimiam luxuriantiam vasorum distensionem; simulque adeo moderata fiat circulationis velocitas & impetus,

ut non nimis urgeantur tam facile dilatanda vascula. Prius perficietur linreis carptis replendo foramen; vel & applicando lamellam illam plumbeam, de qua dictum §. 292. & deinde idonea ligatura haec sic firmando, ut in loco maneat. Posterius impetrabitur, si missione sanguinis minuat copia distendens liquidum: quiete corporis & mentis; diluentibus antiphlogisticis magna copia potatis; victu tenui & blando; lenibus anodynis poterit compesci nimia circulationis velocitas. Clysmata ex similibus facta, somenta applicata partibus inferioribus, epispastica &c. derivabunt impetum versus inferiora.

Ex tota hac vulnerum capitis historia, uti & ex illis quae de vulneribus in genere dicta sunt, satis constitit, levia saepe capitis vulnera praeter omnem expectationem funestum habuisse exitum; atque iterum, gravissimas non tantum calvariae, sed etiam ipsius encephali lésiones, sine ulla abolitione vel lésione functionum, aliquando curatas fuisse. Plurimae observationes ex optimis auctoribus enarratae fuerunt, quae haec confirmant. Unde videtur pro axiomate haberi posse, quod nullum capitis vulnus, quantumvis leve videatur, per functione tractandum sit; neque facile desperandum esse, etiam in gravissimis malis. Ut tamen, quantum per artem hodie cognitum licet, vulnerum capitis Prognosis habeatur, sequentia consideranda sunt.

1. OCCIPITE. Validissimi hic muscoli calvariae insignuntur; cerebellum, a quo tota vita pender, hic reconditur; sinus magni transversales hic ponuntur. Effusus si fuerit vas fractis sanguis, difficillime hic educi poterit, imo si sub expanso durae matris velo, quod cerebellum tegit, & a pressione incumbentis cerebri tuto defendit, haerint effusi humores, impossibilis omnino videtur horum educio.

VERTEX. Calvaria enim omnium tardissime ibi osseam duritiem acquirit; in junioribus diu membranaceus talis locus manet, quem fontanellam vocant. Falci-formis durae matris processus satis valide adheret ibi, & sinus longitudinalis supponitur: unde facile patet magnum discrimen vulnere, quae huic loco insignuntur.

PARIETE. Quia satis saepe tenuia plerumque inveniuntur bregmatica ossa imprimis

mis circa medium centrum, & sulci im-  
pressi his offibus docent, satis magnas ar-  
terias duræ matris hic locari. Præterea hæc  
ossa capitis pro maxima parte solis inte-  
gumentis communibus teguntur; unde Hip-  
pocrates ( *De Capite vulner. cap. 3. Tom. XII. pag. 116. 117.* ) magis periculosa  
huic parti inflicta vulnera concludit, quia  
os imbecillum, minima carne tectum, &  
plurimum cerebrum subest.

**SUTURIS.** Quia pericranium hic cum du-  
ra matre videtur uniri, & cranium hic for-  
tissime cum dura matre coherere, unde ma-  
la in externis parribus orta, substantiæ con-  
tinuitate, ad interiora facile propagari po-  
terunt. Accedit, quod, si effusi humores,  
perforata calvaria, educi debeant, nun-  
quam hæc operatio possit institui in loco  
saturarum, semperque magnum dubium ad-  
sit, si inter cranium & duram matrem ef-  
fusus hæreat sanguis, a quo futuræ latere  
calvaria perterebrari debeat, cum dura ma-  
ter firmissime sadærens futuris in diversis  
quasi cameris locare possit extravasata li-  
quida; uti latius dictum fuit in commen-  
tario ad §. 285.

v. Symptomata, post vulnus inflic-  
tum orta, docent, quænam functiones læsæ fue-  
rint, & majus minusve metuendum ex vul-  
nere periculum: quo ergo plura hæc, quo  
graviora fuerint, eo major semper metus.  
Sed dictum fuit in commentariis §. 240.  
num. 4. gravia symptomata, statim post  
vulnus inflic- tum apparentia, sæpe minus  
formidolosa esse illis, quæ post aliquot dies  
elapsos apparent; illudque Hippocratis tes-  
timonio confirmatum fuit. Pessima semper  
omnis habita fuit febris, quæ post septi-  
mum diem a vulnere inflicto oritur; no-  
vam enim inflammationem, vel suppu-  
rationem, hic adeo metuendam, fere semper  
designat; & ab Hippocrate ( *De Capite  
vulner. cap. 31. Tom. XII. pag. 127.* ) da-  
mnatur hæc febris, tanquam signum male  
affecti cranii, & neglectæ ejus curæ. Vul-  
neris autem ruber color mutatus in palli-  
dum vel lividum; uti & quando instat car-  
nium emaricarum, vel sale diu condita-  
rum, labia vulneris apparent, & arida  
sunt; designat, omnia hic in mortem &  
corruptionem tendere; uti fufius dictum  
fuit in commentariis §. 255. num. 8. Cum  
atem cranium læve, & coloris candidi ru-  
belli aut subceruleiscentis naturaliter sit;

Tom. I.

ejus asperitas & mutatus color in flavum;  
vel & fuscum, docent, illud corruptum  
esse, & natura, vel arte separari debere  
sic affectam partem: videantur de his illa  
quæ dicta sunt in commentario §. 249. He-  
miplegia autem, uti & convulsio, cere-  
brum ipsum affectum esse docent; si ve il-  
lud compressum fuerit ab intropressa cal-  
varia, uti dictum §. 267. si ve ab affusis sub  
cranio humoribus pressione vel corruptela  
ledatur cerebrum; vel & sola valida con-  
cussione, sine notabili liquorum effusio-  
ne, tenerrima encephali fabrica insigniter  
mutata fuerit, vel destructa: de quibus vi-  
de paragrapho 273. 274. 275.

3. In junioribus ossa molliora facilius  
cedunt, & minus resistere possunt causis  
vulnerantibus: in adultis omnia hæc fir-  
miora sunt: in senibus dura quidem sunt  
omnia ossa, sed maxime fragilia. Præte-  
rea ossa omnia in juniore ætate magis va-  
sculosa sunt, & hinc majori humiditate  
scant; cum procedente ætate plurima va-  
sa complanata concresecant; uti pulchre  
notavit Hippocrates, ( *Ibidem cap. 29.  
Tom. XII. pag. 127.* ) dicens: *Puerorum  
vero ossa & tenuiora sunt, & molliora idcirco,  
quod sanguine magis redundant &c. unde ab  
eodem, vel & leviori vulnere, junioris pue-  
ri et magis & citius, minorque temporis spa-  
tio purulentum evadit, quam senioris. Et si  
alioqui ex vulnere moriendum sit, junior se-  
niore citius perit.* Accedit quod juniores  
mobilissimum habeant totum systema ner-  
vorum; unde etiam levioribus de causis  
adeo facile convelluntur; ideoque a capi-  
tis vulneribus in hac ætate majus pericu-  
lum imminet. In senibus vero tardior se-  
paratio ossis affecti, & difficilior regenera-  
tio perditæ observatur semper: quia minor  
numerus valorum vitalium in ossis substancia  
in hac ætate; imo sæpe integra diploe,  
quæ tota fere vasculosa est, in summo se-  
nio evanescit.

4. Temperies vulnerati dupliciter consi-  
derari potest: vel enim est temperies sana,  
vel morbosa. Unicusque enim homini  
privata & propria sanitas est, quæ tantum  
ratione hujus singularis corporis talis dici  
potest: & videmus diversissima in solidio-  
rum compage & sudorum attributis cor-  
pora tamen sana esse. Hæc vocatur sani-  
tas temperiei; quam in calidam & frigi-  
dam, humidam & siccam &c. distinguunt

Y

Veto.

Veteres Medici. Patet facile inde magnum discrimen obtinere in omnibus vulneribus, & imprimis capitis: in calidis enim & biliosis hominibus longe validior inflammatio, & multo maior degeneratio humorum extravasatorum expectanda sunt: in frigidis, mucosis, debilibus hominibus, contrarium obtinet. Temperies autem morbosa ex prædominante cacochymia cognoscitur: pessima autem in capitis vulneribus illa temperies morbosa, quæ ossa inficere & corrumpere solet; uti scorbutica, rachitica, Venerea &c.

5. Summus æstus, & glaciale frigus, semper capitis vulneribus noxia; vernus tepor imprimis prodest. Æstivos tamen calores hyemali frigore magis noxios damnavit Hippocrates (De Capit. Vulner. cap. 4. Tom. XII. pag. 117.), dicens: *Et hyeme diutius vivet homo quam æstate, si quis ceteroquin periturus sit ex vulnere, quacunque demum capitis parte vulnus habeat.* Et alibi (Ibid. cap. 31. pag. 128.), postquam signa recensuit, quibus cognoscitur, capite vulneratum perituum esse, dicit: *æstate ante septimum diem, hyeme ante decimum quartum percutit.* Longe etiam facilius acce frigus accenso foco temperari potest, quam intensus calor. Forte & ob hanc causam in calidis regionibus capitis vulnera difficilius curari observatum fuit: sic in Italia

boc constitisse Ludovicus Duretus monet. Alia tamen & hujus ratio data fuit in commentariis §. 245.

6. Dictum fuit in commentariis §. 245. aeris, imprimis frigidiusculi, liberum accessum capitis vulneribus nocere: & in commentariis ad §. 200. demonstratum fuit, purum aerem, sæpe renovatum, & ab omnibus putridis exhalationibus liberum, omnibus vulneribus tam pulchre prodesse. Unde post conflictus bellicos, qui frequentissime æstivis caloribus contingant, dum in nosocomiis ingens vulneratorum numerus decumbit, tot exhalationibus putridis repletur aer, ut plurimi pereant; imprimis illi, qui ex capitis vulneribus decumbunt. Unde peritissimus Chirurgus Belloste inter utilitates præcipuas, quas pulchra ejus methodus minutis terebris calvariam nudatam & male affectam perforandi, describit §. 252. 253. 262. habet, recenset, quod vulnerati sic longe citius curentur; nec cogantur diu languere in nosocomiis, ubi a malignis illis exhalationibus robustissima etiam corpora pessime affici, quotidianis experimentis constat: & affirmat, se centies vidisse, sanatos jam, & abutim meditantes, putridis febribus, hæmorrhagiis, diarrhæis &c. correptos periisse (Belloste Chirurg. d'Hopital pag. 67.).

§. 296. SI cruro, pos, lorfes sub membrana latentes deprehenduntur post perforatum cranium, audacter incidenda, pertundenda erit membrana coarctans.

Perforata calvaria exitus quidem patet humoribus effusis inter hanc & duram matrem; sed si sub dura matre extravasata liquida hæserint, facile patet, hæc non posse educi, nisi discindatur vel pertundatur dura mater. Verum quidem est, quod omnes Medici & Chirurgi semper sollicitissime caverint, ne modiolis dentes, dum calvaria perterebatur, duram matrem lædant; inde enim graves inflammationes cum periculo mortis oriri testatur Celsus (Lib. VIII. cap. 3. pag. 512.): sed aliud quid est dentibus serræ lacerare hanc membranam, aliud cuspidem lanceolæ acutissimæ prudenter pertundere. Nec aliud in tali casu superest: si enim relinquuntur hæc extravasata liquida, corrumpantur, & destruent teneram ensephali fabricam, vel

dura mater corrupta & gangrænosa facta secedet; qualem casum refert Scultetus (Armament. Chirurg. Observ. 2. p. 195.). Videtur autem hoc satis tuto fieri posse, cum constiterit observatis, magna etiam parte dutæ matris rescissa in periculossimo vulnere, profunde in ipsam substantiam cerebri penetrante, sanatum fuisse ægrum. Illud parit in mirabili illo casu memorato in commentariis §. 187. ubi bis applicato trepano ingens pars calvarie excindebatur, & simul dura mater dissecebatur per omnem ambitum tam magni foraminis. Dum vero sanguis effusus coagulatus hæret sub dura matre, sæpe color niger per hanc membranam pellucet; & dum forcipe tollere veller gramum sanguinis Chirurgus, arriporet duram matrem. Si de hac

re

re dubitatur, digito saliva madido leviter tantum fricetur ille locus; colore enim sanguineo digitus tingetur, si thrombus coagulati sanguinis nudus ibi hæreat; si vero sub dura matre reconditur, non colorabitur digitus. Ubi vero pertusa fuit dura mater, ex ante dictis patet, periculum esse, ne fungus cerebri nascatur; quod ergo idonea pressione præcavendum erit. Si autem hu-

mores effusi non hæserint intet duram & piam matrem, sed profundius in ipsis v.g. cerebri ventriculis locentur; nulla medela superest. Quis enim auderet cerebri ipsius fabricam perturbare? Unica spes est, pressione encephali, calvariam semper exacte replentis, alibi hærentes effusos humores posse sensim forte derivari versus aperturam factam.

## VULNERA THORACIS.

§. 297. **V**ulnera Thoraci inflicta, nec in cava penetrantia, cognoscuntur aspectu, stylo, aere nulla arte exillente, injectæ tepidæ repulsæ; corporis situ, ut in accepto vulnere, eodem, signis certis adnati pulmonis ad illum locum pleuræ, quem transit ictus.

Thorax vocatur illa pars trunci corporis, quæ antè sternum, postèrùs dorsum vertebra duodecim, a latere arcuatis costis, superius costis binis superioribus terminatur, & inferius per diaphragma a cavitate abdominis separatur. Cum autem diaphragma arcuatum fornicem faciat & oblique positum, sic ut antèrùs satis alte assurgat, postèrùs autem profundius descendat, patet, thoracis cavum versùs postèriora multo amplius esse. Interne tora hæc cavitatem membrana politissima, pleura dicta, undique investitur, quæ binas quasi cava vesicas formans, uti dictum §. 170. num. 4. sibi mutuo accumbentes prope sternum, thoracis cavum bifariam dividit. Inter binas illas pleuras locatur Pericardium una cum corde inclusum, quod tertium thoracis cameram constituit.

In omni vulnere thoracis primò queritur, an in cava thoraci penetrer, an non? ubi instrumentum vulnerans pleuram membranam, vel pericardium perforaverit, tunc dicitur in cava thoracis penetrasse, aliter non. Plurimæ autem lædi possunt partes, & quidem magno cum periculo, licet vulnus thoraci indictum non penetrer in ejus cava. Utriusque enim lateris pleura, ubi pervenit ad latus columnæ vertebrarum utrimque, sededit a finibus ultimis costarum, & assurgens inde spatium satis amplum relinquit, quod cellulosa membrana occupatur, per quam œsophagus, aorta, ductus thoracicus &c. pergunt. Omnes ergo partes hic positæ possunt lædi, licet vulnus non penetrer in cava thoracis. Rarius tamen hoc fieri posse facile patet, quia

a parte postèriori vertebrarum columna tuto defenduntur. Vulnus autem in pectoris cava non penetrasse, sed sola externa læsisse, cognoscitur sequentibus signis.

**ASPECTU.** Si nempe vulnus satis patulum fuerit, & recta penetraverit.

**STYLO,** ex plumbo vel argento mollissimo, sine ulla vi adhibita per vulneris aperturam introducto. Sed facile patet, maturum situm corporis, pinguedinem vulnus obstruentem, thrombum sanguinis &c. stylo viam facile sic impedire posse, ut resistencia inveniatur, quamvis vulnus in cavum thoracis penetrer.

**AERE NULLA ARTE EXILLENTE.** In commentariis §. 170. n. 4. demonstratum fuit, quamdiu thoracis cavum clausum est, pulmonem pleuræ semper exacte congruum esse, nullumque omnino aerem inter pulmonem & pleuram hæere; ubi vero instrumentum vulnerans pleuram penetravit, aer ingredi potest, pulmo illius lateris collabitur: & spatium sic natum repletur aere ingresso. Ille aer autem, calore rarefactus, iterum per vulnus pro parte exibat, novus aer iterum ingrediebatur, sicque ibat & redibat hanc viam; imprimis si vulnus pleuræ non nimis parvum fuerit: tunc enim aliqua adhuc dilatario pulmonis ab aere per glottidem ingresso fieri poterit, ut latius dictum fuit in loco modo allegato. Omnia jam cura periti Chirurgi in vulneribus thoracis inquirunt, an aer cum impetu per vulnus exeat, imprimis sequenti modo. Postquam Chirurgus pollice vel digitis vulneris labia sic compressit, ut nullus aer ingredi vel exire possit, jubet vulneratum va-

Y 2 lide.

lide inspirare aerem, & inspiratum aerem in pulmonem retinere, clausa larynge: deinde, antequam expiraret vulneratus, candelulam ceream prope vulnus ponit, tuncque subito labia vulneris diducit: si jam aer cavum pectoris ingressus fuerit, ille cum impetu efflabitur de vulnere, & movebit flammulam candelule cereæ. Dum enim aer, pertusa pleura, in cavo pectoris hæret, clauso vulnere, a corporis calore rarefiet; simul, si valida inspiratione adhuc parum dilatari tantum possit pulmo illius lateris, aer in pulmone, clausa glottide, retentus & rarefactus expandet pulmonem; hinc urgebitur eo magis aer in cavum pectoris ingressus; qui ergo, simul ac aperto vulnere libera datur via, cum impetu & sibilo exibat. Facile autem apparet, certissimum quidem esse, si per vulnus inflictum hac methodo aer exeat, quod vulnus in cavum thoracis penetraverit; interim tamen accidere posse, quod thorax quidem parvossus sit, & nullus aer tamen ingressus sit, pinguedine, imprimis post mutatum corporis situm, replente statim viam instrumto vulnerante factam; vel etiam, licet pauculum aeris sic ingressum fuerit, ille non facile poterit iterum exire per vulnus ob eandem causam. Imprimis autem hoc fiet, si angustum vulnus in thoracis cavum penetraverit. Ex his ergo apparet, qualem hoc signum certitudinem dare possit.

**INJECTÆ TEPIDÆ REPULSU.** Tutissima videtur hæc methodus, & omnium certissima. Exploratori enim per stylum facta sæpe fallere potest, cum aliquando mutato corporis situ, imprimis in obelis, membrana cellulosa viam impediât, quæ minus stylus immixtus ad suum vulnus possit pertingere. Aliquando etiam insigni longitudine stylus poterit immitti, nec tamen penetrare in pectoris cavum, vulnerante instrumto supra costas per pinguedinem adducto, uti constitit observatis Chirurgicis. Studiosus in singulari certamine gladio sic vulnerabatur in dextro thorace, ut vulnus, quod obliquo corpore a latere inflictum fuerat, in sinistro thorace exiret, nec tamen penetraret in pectoris cavum, ense supra costas gliscente. Aqua tepida syringa per vulneris orificium leni vi injecta: si insignis aquæ copia sine resistèntia sic immitti possit, nullusque tumor in vicinis parti-

bus a collecta aqua in membrana cellulosa oriatur, novimus aquam in pectoris cavum per viam vulnere factam intrasse; si vero statim magna resistèntia sentiatur, & redeat aqua injecta per vulneris orificium, contrarium pater. Neque ullum inde metuitur malum, licet aqua tepida per syphonem injecta in pectoris cavum sic delabatur. Facile enim inde poterit educi idoneo situ corporis, vel aliis methodis, de quibus dicitur §. 303. Imo, licet ibi relinquere-  
retur, vas bibulis venosis, omnem thoracis interni & pulmonum superficiem occupantibus, resorbere. Sic enim contenta in thoracis cavis liquida dissipari posse, frequentissimè docuerunt observationes. In Encephymate, pus resorum per sputa, urinas, vel alvum, evacuatam fuisse aliquando constat; uti & idem pus, venas ingressum, sanguini mistum, metastasi ad varia corporis loca delatum fuisse. Dum ex amarissimum medicamentum injiceret thoracis cavo Paræus, ut detergeret & munderet hæc loca ab extravasato & corrupto sanguine, mirabatur, paulo post vulneratum percipere summum amarorem, & vomendi conatum (*Les Oeuvres d'Ambroise Paré Lib. X. Capit. 32. pag. 251.*), ideoque postea ab his abstinuit.

**CORPORIS SITU &c.** Quantum usum habeat in determinanda vulneris inflicti natura, & præfagio malorum, quæ a vulnere metuenda sunt, cognoscere situm corporis, quem habuit vulneratus, dum vulnus accepit, dictum fuit in commentario §. 168. num. 1. Sæpe enim omnino impossibile foret indagare viam, qua instrumentum vulnerans penetravit inter corporis partes, nisi in eodem situ reponatur vulneratus, quem habuit, dum vulnus ipsi inflictum fuit. Varia enim musculorum actionis modis mutare potest partium situm, uti pulcherrime expressit Eustachius in tabulis suis Anatomicis: ibi enim trigesima tabula dextrum brachium elevatum, flexo cubito, apparet, sinistrum vero extenso cubito deorsum porrigitur. Si in hac figura conferatur dextrum thoracis latus cum sinistro, patebit insignis differentia in postura partium.

**SIGNIS CERTIS ADNATI PULMONIS &c.** Cum pulmo toto vitæ tempore pleuræ contiguus maneat, & in inspiratione pariter ac in expiratione, uti ex Physiologicis con-

stat;

fiat; tamen naturaliter undique liber est in pectoris cavo, asperæ arteriæ coherens per vasâ suâ aërea, vasis vero sanguineis cordi unitur; cæterum in nullo puncto pleuræ adhæret. Præcipua autem causa, quare non concrescant hæc partes inter se, videtur esse hæc, quod in omni puncto pleuræ & pulmonis fistulæ minimæ arteriolæ omni vitæ tempore exhalent tenuissimum rorem, qui impedit, ne pulmo cum pleura concreseat. Quam rem Hippocrates coucinna brevitate, ut solet, pulcherrime expressit, dicens: *Omne enim non concretum, siue cute, siue carne tegitur, cavum est, implaturque sanum quidem spiritus, infirmum vero ichor* (Hippocrat. de arte cap. 8. Tom. II. pag. 150.). Ubi autem, inflammatione distentis vasis majoribus, minima hæc compressa non essent tenuissimum illud liquidum, siccæ superficies concreverint inter se satis cito; unde post Pleuritidem, Peripneumoniam, Empyema, toties invenitur pulmo pleuræ accretus. Si ergo constat, vulneratum hos morbos passum fuisse, de hac re cogitandum est. Si enim vulnus inflictum fuerit tali loco, ubi pulmo cum pleura concrevit, poterit instrumentum vulnerans pulmonis substantiam penetrare, nec tamen intrare pectoris cavum, cognosci poterit, si aqua

per siphonem injecta in vulneris orificium tussiculam exciter, & per asperam arteriam expellatur, tunc enim vulnus in pulmonem quidem, sed non in pectoris cavum penetravit.

Hæc sunt illa signa, quibus solet concludi, vulnus sola externa læsisse, non autem penetrasse in pectoris cavum. Accidere tamen aliquando potest, ut omnia hæc, sollicitissime quamvis observata, fallant tamen; imprimis si angulo instrumenti vulnus inflictum fuerit: tunc enim educto instrumento poterit pinguedo sic obstrare vulnus factum, ut nec aeri, nec stylo, nec aqua injectæ pateat via, & tamen pulmonis vasâ læsa v. g. poterant effundere sanguinem in pectoris cavitate. Unde simul attendendum est, an respiratio læsa fuerit si enim vel aere ingresso, vel sanguine extravasato, pectoris cavum angustetur, semper erit difficilis respiratio: quæ ergo si observetur post vulnera pectoris, semper videtur periculum indicare, quamvis nullo alio signo appareret, vulnus ad interiora thoracis penetrasse. Summa enim in his cautela opus est, ne sanæ detrimentum accipiat Medicus vel Chirurgus, dum periculosum & sæpe lethale vulnus leve & nullius fere momenti habuerit.

§. 298. SI obliqua descendunt illa ( 297. ) supra, vel intra costas, sæpe dein pleura erosa in cava Thoracis pus deponunt, maxime, si puri ad externa egressuro via quacunque arte impeditur. Tumque Empyema fit, & inde multa mala.

Licet jam constiterit, vulnus non penetrasse in pectoris cava, tamen inde pessima mala oriri possunt. Si enim vulneris fuerit talis conditio, ut ejus orificium altiori loco ponatur, interim satis profunde inter musculos descendat; humores effusi hic colliguntur, mora & stagnatione aciores fiunt, sinus formantur varios, tandemque poterunt, erosa pleura, in pectoris cavum delabi: quotidie ex tali sinuoso ulcere collectum pus depletur, augebitur cavo thoracis contentorum liquidorum copia, fiet Empyema, pulmo maceratus, pure quotidie aciori factio, tabesiet: unde post summas miseras toleratas tandem mors ipsa sequetur. Omnium molestissima hæc mala sunt, quando fistulose tales cavitates pone costas descendunt; tunc enim nec dilatazioni nec compressioni ullus fere locus fu-

Tom. I.

perest. Præterea sterni & costarum substantia ossea vel cartilaginea læsa si fuerit, poterunt inde multa mala sequi, & curatio sæpe erit difficillima; uti patebit, ubi de ossium morbis ageretur. Memorabile historiam, quæ hæc confirmat, habet Galenus ( *De Anatom. administr. Lib. VII. cap. 12. Tom. IV. pag. 161.* ). In palæstra puer ictus fuerat in sterno: neglectus primo fuit, nec postea pulchre curatus. Post menses quatuor pus in parte percussa apparuit: Medicus incidit locum, & satis cito, ut credebatur, ad cicatricem perduxit. Postea nova inflammatione orta iterum festus fuit puer, nec potuit amplius ad cicatricem deduci factum vulnus. Galenus postea, cum pluribus aliis Medicis advocatus, invenit sterni os fiderarum, cumque omnes reculerent curam aggredi, Galenus

Y j

Stet.

sterni partem corruptam excidit, subiecti Pericardii partem putridam invenit, & nudum cor vidit; & tamen brevi satis tempore puer sanatus fuit. Et de hoc casu videtur etiam locutus fuisse in ipso initio libri primi de Placitis Hippocratis & Platonis ( qui liber primis quatuor capitulis truncus tantum habetur ), dum dicit,

se in tali puero tam aperte cor vidisse, uti in animalium dissectionibus; ubi consulto & dava opera ad denudatum; addique, puerum hunc servatum fuisse ( *Galen. de Hip. & Plat. pl. c. Lib. I. c. 5. T. I. p. 78.* ). Omnium maxime hæc mala memenda sunt, quando vel vulneris situ, vel pectoris arte, impeditur exitus puris versus exteriora.

§. 299. **Q**uare in curatione abstinendum ab omni turunda, emplasticis, compri-  
mentibus; contra depurantibus, balsamicis, plumaceolis, levi ligatu-  
ra utendum; & situ corporis apto.

Cum ergo tot & tanta mala oriri possint in thoracis vulneribus ab humoribus extravasatis retentis in vulneris cavo, ibique novas sæpe vias sibi facientibus per membranam cellulosam, patet evidenter, liberum exitum his procurandum esse omni modo. Quondam communi omnium fere Chirurgorum usu plerisque vulneribus, & imprimis thoracis, immittebantur turundæ; ut scilicet impeditur orificii vulneris subita nimis consolidatio, nondum concreta interna vulneris superficie; & ut facilius esset exitus corporum heterogeneorum in vulnere relictorum; & simul ut facile ad fundum vulneris usque venire possent remedia vulneraria. Peritissimus Chirurgus *Belloste* ( cui etiam præcipue debetur pulchra illa methodus ossa periosteio suo nudata minutis foraminulis perverberandi, uti dictum fuit §. 252. 262. ) huic torrenti se opponere ausus fuit, & solidissimis argumentis demonstravit noxium turundarum usum, imprimis in thoracis vulneribus ( *Belloste Chirurgien d'Hôpital pag. 1. ad 43.* ): simul pulcherrimis exemplis ostendit, rerum usum confirmare illa, quæ ratio dilataverat. Turundæ enim, ex lioteis carpis contortis vel similibus paratæ, vulneris orificio immixtæ, effusus humoribus resorptis rument, & nisi tenaci emplastro vel ligatura firmetur, expellantur brevi: si vero coercantur sic, ut exire nequeant, turgent lentæ dilaceratione vulneris orificium dilatant non sine magno dolore & irritatione paritum; & simul, dum vulneris orificium obturant, impediunt exitum puri aliisque liquidis effusis; quæ ergo novas sibi vias faciunt, & vulnus in ulcus passum sinuosum poterunt convertire: imo &, pleuraecola, poterunt delabi in pectoris cava; unde tristissima sæpe mala. Præterea singulis vitæ,

momentis mutatur thoracis capacitas, moventur costæ illisque adhiæ musculi, etiam in placidissima respiratione; unde nemquam quiescit tale vulnus, & continuo vulneris labia turundæ attrahuntur; unde dolor, inflammatio, & tandem callositas nascitur in labiis vulneris, quæ postea tolli debet, antequam ad consolidationem vulnus deduci poterit. Ex quibus omnibus satis apparet, nihil boni a turundarum in vulneribus thoracis usu expectari posse. Forte tantum prodesse possent, si vulneris orificium nimis angustum dilatarî deberet, quamvis tamen, uti dictum fuit §. 238. cultro facilius hoc fiat: & si huic usui inferre debeant turundæ, uno alterove die applicatæ hoc efficere poterunt, neque ideo necesse sit illas toto curæ tempore applicare. Quin imo turunda ex spongia rite præparata ( uti ibidem dictum fuit ) orificio vulneris immixta paucis horis poterit insignem dilatationem facere. Ob eandem rationem patet, quare & tenacissima Emplastrum hic nocent: quia nempe liberum humorum per vulnus æstusum impediunt. Optime ergo vulneribus thoracis applicantur plana plumaceola, balsamo vulnerario, vel pro re nata mollissimis digestivis innacta: his dein imponitur Emplastrum non nimis tenax, foraminulis plurimis perforatum; & idonea dein applicatur ligatura, si opus videatur; hac cum cautela, ut splenis applicatis vel alio quocumque modo impediatur, ne fasciæ circumductæ, vulneris aperturam comprimendo, exitum extravasatis humoribus impediunt.

Monuerat Hippocrates ( *In Coacis Prænot. n. 430.* ): *Quicumque thoranem vulneris externa parte vulneris sanati sunt, interna non, periclitantur, ne suppurati fiant.* Quibus autem debilis natura facta fuerit cica-  
trix,

*trix*, & sic dicitur. Unde apparet, sui namque cautius adhibendum esse, ut interna vulnus si superficies consolidata fuerit, antequam externum eius consecrat orificium. Hinc forte videtur ut concurri possit, quod rurunda, impediens concretionem orificii exteri, prolesse possit. Sed si consideretur, rurundam illi vulnus obstruere, ut pus collectum in cavo vulnere exire nequeat: patet impediri concretionem vulneris interni, dum pus rerentum in vulnere a contracta removet partes uniendas, & idem copia auctur novas vias sibi faciat, & sic augebit vulneris interni superficiem. Non autem fuisse Hippocratis mentem, ut rurundi occluderetur in tali casu vulneris orificium, ex alio memorabili loco eiusdem auctoris patet, qui pulchre Coacem Praenotionem modo allegatam explicat. Dicit enim: *quicumque a vulneribus purulentis fuerint* (ubi eodem vocabulo *πύον* utitur, ut in Coaca praenotione, illudque vocabulum frequentissime sumitur pro collectione puris in thoracis cavis) *sive basta, vel pignore, vel saculo intus vulnerati sunt, quamdiu quidem ulcus foras respirationem habet per antiquum vulnus, & hac frigidum in se attrahat, calidum vero a se emitat, tum pus facile, tum sanum: si quid aliud expurgatur. Et si quidem interna & externa pars simul sanescent, omnino sanus evadit. Sin vero externa quidem pars sanescent, interna vero non, purulentus (πύον) fit. At vero*

*si simul tum interna tum externa pars sanata fuerit, cicatrix antea: intus debilis aspera & livida existat, quandoque restricta ulcus, & ab hoc purulentus evadit* (Hippocr. de morbis Lib. 1. c. 9. Tom. VIII. pag. 542.).

Ex quo loco satis patet, non perturbationem tenari debere curam, ut interna & externa aequabiliter & semiter consolidentur; sed situ corporis tali, ut contenta cavo vulneris liquida proprio pondere versus aperturam externam delabantur; & ubi fundus vulneris demissior est eius orificio, nec tamen situ vulnerati hoc: corrigi possit; tunc splenis, vulneris: fongis: applicatis, & idonea ligatura poterunt pelli humores contenti versus vulneris orificium, & sic uniri partes in vulnere fundo, liquidis expulsi, ut contiguae factae conrescant facile. Interint pus, continua exiens per orificium vulneris, facile impedit, ne illud conrescat, antequam interiora sanata fuerint. Si autem vulneris interna superficies, sordida facta, prius requirat deputacionem, antequam consolidatio expectari possit; tunc applicari possunt illa auxilia, quae §. 207. enumerata sunt; de quibus etiam postea dicitur in Fistularum curatione. In horum usu pergitur, donec pus album, blandum, viscidum, laeve, & quale, inodorum adsit; & postea leni compressione, sensum a vulnere fundo ad eius orificium procedente, tentatur consolidatio parti jam vulneris.

§. 300. **I**N cava Pectoris adire scimus 1. considerata causa cum amplitudine: vultus. 2. Specillo corporis, in situm vulnerandi reposito, applicato. 3. Aeris in pulmonem inspiratu forti, dum clausum vultus, mox naribus & ore clausis nixu expirantis edito, tumque detecto subito vulnere, expiratione, & saepe sono ejus agitati in cava pectoris. 4. Iniectione. 5. Emphysemate, quando aer thoracis cavo contentus, pertusi pulmonis actione assidue auctus; calefactus; rarefatus; pressus inspiratu; exire impeditus libere ex vulnere; in labiis vulneris actus per membranam cellulosam; auctus, facit, ut saepe totus homo, hinc inde ad 11. pollices, tumore pellucidum, levi tumeat; solis plantis pedum, manuumque volis exceptis. Ac reg. Sc. 1713. hist. p. 15. 18. Item 4. 14. & 119. 120. ubi emphysema lethale a costis fractis illata cute. 6. cruoris spumosi exitu.

Magna cautela opus est, dum determinabitur, an vulnus inflicium in: pectoris cavum penetraverit, an non. Nam thoracis cavum anterius multo altius ascendit, a parte posteriori profundius descendit. Unde saepe turpes errores acciderunt, dum credebantur vulnera thoracem penetrasse; cum

tamen in abdominis cavum transierint. Sic habetur apud Ruyschium (Observ. Anatom. Chirurg. Centur. Observat. LXV.), quod temerarius Chirurgus, in loco quodam suburbano habitans, thoracis paracentesim cum institueret vellet, ipsam in consilium vocari iusserat; cum autem Ruyschius ob-

Y. 4.

ad-



adversam valetudinem venire non posset, ille Chirurgus solus thoracem, ut putabat, peioravit. Mox hydatides multæ eruperunt; quibus visus territus Chirurgus turundam immisit vulneri factæ. Paulo post misera femina perit, & aperto cadavere patet, nihil liquidi præternaturalis in thoracis cavis hæere, sed ignarum Chirurgum abdomen perforasse, non thoracem, & hepar vulnerasse, quod ibi, peritonæo accretum, in hydatides degenerasse visum fuit, quæ per vulnus factum eruperant. Unde patet, ex Anatomicis diaphragmatis situm & nexum rite cognosci debere, ut certi quid hic statui possit.

Vulnera autem possunt in pectoris cava penetrare, dum abdomini insiliat per diaphragma transeunt: cuius rei certa signa non habentur, & fere tantum post mortem in cadaveribus hoc apparuit: quales casus enarrati fuerunt in commentario §. 170. n. 4. Vel vulnera thoracem proprie dictum perforantia in cava ejus transeunt, de quibus hic agitur; illudque cognoscitur sequentibus signis:

1. Cum fere omnia instrumenta, quibus punctum vulnera insiguntur, conicæ sint figuræ; patet, vulneris amplitudinem, collatam cum instrumento vulnerante, docere posse quousque penetraverit instrumentum vulnerans. Fallere tamen in hoc casu posset hoc signum, si vulnus supra costas inter musculos adactum fuerit: potest enim tunc instrumentum vulnerans magna sui parte penetrasse, nec tamen ingredi thoracis cavum.

2. De hac re dictum fuit §. 168. n. 1. & §. 297. ibique patuit, mutato situ corporis musculos alio modo positos, & pinguedinem in vulnus pressam, facillime aditum stylo exploratorio impedire posse.

3. De hoc signo etiam dictum fuit §. 297. Imprimis hic cavendum, ne hac exploratione aer ingreditur pectoris cavum: ductis enim vulneris labiis, & dilatato per inspirationis nixum thorace, posset facile ingredi aer, licet hac usque nondum intrasset. In obesis enim, insisto vulnere in cavum thoracis penetrante, pinguedo sæpe educto instrumento vulnerante ilico viam sic obtineat, ut aer ingredi nequeat. Unde, dum hoc tentatur, primo sollicitè comprimenda sunt vulneris labia; deinde forti inspiratione haustum aerem retineat vulne-

ratus; tuncque naribus & ore clausis nixum expirationis clar. Aer tunc reerens, calore expansus, validissime dilatabit pulmonem; hinc comprimet aerem, qui inter pleuram & pulmonem hæret, calore loci pariter admodum rarefactum: detecto tunc vulnere, nullus metus est, aerem per externum vulnus posse ingredi in thoracis cavum, quia pulmo distentissimus applicabitur undique pleuræ, si nullus hæctenus aer in cavo pectoris hæret; si vero aer jam ingressus fuerit, ille calore rarefactus, a pulmone dilatato pressus, prævalebit atmospheræ pressioni, & cum imperu exibat de vulnere. Si autem vulnus tale fuerit, ut liber satis aeri ingressus in thoracis cavum pateat, nec tamen tam parvum fuerit, ut glottidis aperturam multum superet (vide §. 170. num. 4.) ibit & redibit aer cum sibilu manifesto per vulneris aperturam: tuncque nullum dubium superest.

4. De hoc signo etiam dictum fuit §. 297.

5. In §. 244. de mirabili hoc symptoma re dictum fuit, quatenus vulnera capitis aliquando sequatur. Longe tamen frequentius pectoris vulnera, in cavum penetrantia, hoc malum sequitur, & tunc brevi satis temporis spatio per totum corpus mirus talis tumor disperi poterit. Dum enim per vulnera ingressus fuit aer in thoracis cava, & orificium externum per emplastra tenacia, vel pinguedinem clausum fuerit; calore loci rarefactus aer viam sæpe sibi facit per panniculum adiposum. Imprimis autem maximi tales tumores oriuntur, si pulmonis vasa aerea, per vulnus læsa, inspiratum aerem in pectoris cava deposuerint; tunc enim omni momento augetur malum. Mirabile casum habet Paræus, qui hac referri potest, quem jam memoravi in commentariis §. 249. Ubi constitit, aspera arteria læsa in collo, aerem per vulnus huius elapsum se insinuasse in panniculum adiposum, & miro modo sic intumuisse faciem, ut nasus & oculi penitus disparerent quasi. Cumque vulneratus jam pro derelicto haberetur, peritissimus Chirurgus, profundis scarificationibus hinc inde factis, ingresso panniculum adiposum aeri viam fecit, & ex ipsis oris faucibus vulneratum eripuit (*Les Oeuvres d'Ambrise Paré Liv. X. chap. 30. pag. 249.*). Mirabile emphysema, post vulnus thoracis penetrans & pulmonis substantiam lædens, habet.

habetur in Actis Parisiis (*Academ. des Sciences Paris 1713. Mem. pag. 5. &c.*). Homini triginta annorum, sanguineae temperiei, & valde carnosus habitus, infligebatur vulnus in pectoris cavum penetrans, a quo quinta die periit. Ante mortem totum corpus miro tumebat emphysemate, exceptis plantis pedum & volis manuum, & capitis vertice. In pectore tumor ille undecim pollices crassus erat, in ventre novem, in collo sex, in reliqua autem corporis superficie quatuor pollices aequabat. Oculi in cadavere pro parte extra orbitas eminebant, aeris magna copia distenti in tunica cellulosa. Rarissimus alter casus observatus fuit (*Ibid. Mem. pag. 155. &c.*), ubi integra cute costis fractis emphysema lethale ortum fuit. Homini sexaginta annorum, carpenti rotis super pectus transiuntibus, quarta & quinta costa vera lateris sinistri in medio fractae erant: paulo post in loco affecto tumor notabilis apparuit ab aere ingresso panniculum adiposum; qui quotidie una cum difficultate respirationis crescebat, donec quarta die post hoc infortunium moreretur homo. In cadavere patuit, Emphysema totam corporis superficiem occupasse, exceptis plantis pedum & manuum volis. Dilatata cute & reliquis integumentis, quae incumbabant costis fractis, in musculus intercostalibus parva & vix perceptibilis apertura inventa fuit, sine ulla ecchymosi; aperto vero thorace, membranae externae pulmonem investientis exigua particula lacerata apparebat, quae partim adhuc cohaerebat pulmone, partim affixa erat costae fractae: nihil autem sanguinis extravasati in pectoris cavo inveniebatur.

Ex quibus omnibus satis patet, emphyse-

ma pectoris vulnera saepissime sequi; imprimis si vulnus aereum quidem admisit in pectoris cavum, sed interim quacumque de causa impediatur liber exitus aeris ingressi ex vulneris orificio. Omnium autem maximos tales tumores fieri docent haec observata, si simul pulmo laesus aereum inspiratum in pectoris cavum dimiserit; praecipue si simul non addit magna haemorrhagia: tunc enim sanguis, in cavum thoracis delapsus illudque replens, impedit, ne tanta copia aeris in pectoris cavo accumuletur, quae toti corpori inflando sufficeret. Simulque apparet evidens ratio, quare, si vulnus thoracis subito sequatur tale emphysema, merito concludatur, illud penetrasse in pectoris cavum.

6. Hoc signum denotat certo pulmonem esse laesum: sanguis enim tunc, laesis sanguineis vasis effluens in aerea vasa pulmonis, cum aere mistus spumescit; unde tunc vel per asperam arteriam eructant spumoso cruorem, vel undatim talis sanguis de vulnere externo effluit. Sed pulmo laedi nequit, nisi instrumentum vulnens in pectoris cavum penetraverit; nisi forte pulmo illo in loco pleurae fuisset accretus: de qua re distum fuit §. 297. Pulcherrime hoc expressit Virgilius (*Aeneid. Lib. IX. v. 700. &c.*), ubi Antiphaten a Turno vulneratum describit:

Volat Italia cornus

Aera per tenerum, stomachoque infixa  
sub altum

Pectus abit: reddit specus atri vulneris  
undam

Spumantem, & fixo ferrum pulmone  
tepefcit.

Ob eandem causam, si sanguis spumosus in morbis per os rejicitur, ex pulmone illud prodire concluditur.

§. 301. **E**ffectus talis vulneris saepe. 1. aeris ingressi pressio in pulmonem, respirationi hinc, & circulationi ineptum. 2. Effusus cruor in Thoracem, & accumulatus. 3. ejus extravasati, caesacti, moti, clausi undique, putrefactio. 4. hinc pleurae, pulmonem, mediastini, diaphragmatis, pericardii maceratio, erosio, corruptio, fœtor. 5. infiniti ex his oriendi morbi. 6. cruoris excreatio.

Enumerantur jam illa mala, quae observata fuerunt aliquando sequi vulnera thoracis in cavum penetrantia, quae omnia imprimis ab aeris admissione, vel extravasatis humoribus pendunt.

1. In commentariis §. 170. n. 4. demonstratum fuit, inter pulmonem & pleuram

in homine sano naturaliter nunquam esse; hocque requiri necessario, ut pulmo, pectore dilatato, distendi possit aere per glottidem irridente. Unde, simulac per vulnera thoracis aer in cavum pectoris admittitur, patet, liberam pulmonis expansionem impediri, imo a parulis vulneribus

late-

integre tolli. Eodem loco per varia experimenta constitit, quomodo & quamam sub limitatione hoc verum sit. Si enim aer liberrime per vulnus factum ingredi possit, non poterit dilatari pulmo; si angustiori vulnere ingrediatur minor aeris quantitas, quam per rimam glottidis apertam intrare potest, fiet aliqua pulmonis expansio, non tamen tanta ac in sanitate fieri debet. Quam rem pulcherrime expressit Galenus (*De Anat. administr. Lib. VIII. c. 3. Tom. IV. pag. 172.*) dicens: *Notum vero est, inspiratione per animantis os facta, tantum necessario perire ob vulnus, quantum ejus loco extrinsecus influit circumfusi aeris in thoracem. Quanto autem minus inspiraverit per os ad necessitatem, tanto etiam minus effluvi; quanto autem efflavit decreverit, tanto vocem sequi breviorem. necesse est.* Si jam aer ingressus pectoris cavum, quacumque de causa iterum per vulneris orificium exire nequeat, ille calore rarefactus expandetur, pulmonemque fortiter comprimendo impediet inspirationem, & dilatationem pulmonis inde factam; quæ in homine nato requiritur, ut sanguis, corde dextro expulsum, libere per arteriæ pulmonalis angustias transire possit. Omnium autem horum ratio facile deducitur ex cognitis aeris proprietatibus, & illis requisitis, quæ ad respirationem peragendam, & liberum sanguinis circulum per pulmonis vasa, necessaria esse in Physiologicis demonstrantur.

2. Si arteriæ intercostales læsæ fuerint, v. g. sanguis ingenti copia colligi poterit in thoracis cavo; vicinum enim cor magnâ vi sanguinem in has arterias pellit; motus thoracis per respirationem impedit, ne arteriæ læsæ quiescant: & se contrahere tam cito possint. Si jam pulmonis vasa sanguinea dissecta fuerint, facile patet, subito ingentem cruoris copiam accumulari debere: si vero ex corde egressa vasa maxima lædantur, brevis mors sequetur. Sanguis autem sic effusus, nisi per vulneris aperturam externam effluat, colligitur in thoracis cavo, & impedit liberam pulmonis dilatationem; unde summa anxietas, respiratio impeditur.

3. Cruor sic effusus hæret in loco calido & humido, & per respirationem assidue motus, hinc facillima degeneratio in putridam corruptelam hic obinet; imprimis cum per vulnera, in cavum thoracis penetra-

tia, sepe semper aer ingrediatur; uti etiam, si pulmo in aeris suis vasibus hæsus fuerit, & aerem inspiratum in pectoris cavum dimiserit. Observata jam Chirurgica docent, parvo satis temporis spatio putrescere hic effusum sanguinem. In commentariis §. 172. num. 3. ubi agebatur de illis malis, quæ vulneratis acciderent observantur aliquando ex neglectu vel errore Chirurgi, enarratus fuit ille casus, quo militi thoracem vulnerato sic, ut sanguinem cum tussi per os rejiceret, imperitus Chirurgus vulneris labia futura univit ita, ut nihil exire posset. Sequenti die advocatur Paræus, qui illico futuram rescidit, & digito immisso thrombum sanguini coagulatum, vulneris orificium obturantem, removit, & eduxit de pectoris cavo uncias octo sanguinis, jam corrupti & fetentis. In nobili viro, thoracem vulnerato gladii ictu in cavum penetrante, post septem vel octo libras sanguinis perditas, dum circa finem primæ diei post vulnus inflatum removeret apparatus Bellosæ (*Le Chirurgien d'Hôpital pag. 93.*), eduxit sex septemve uncias sanguinis iam fenicorrupti. Dixerat Hippocrates (*De Morbis cap. 2. circa finem. Tom. VII. pag. 533.*): *Quod si sanguis ex vulnere aut venæ fluxerit in superiorum ventrem, necesse est illud puri fieri.* Sed demonstratum fuit in commentariis §. 172. num. 1. ubi ex Aphorismis similis locus allegatus fuit, quod hic suppurationis nomine intelligatur quæcumque sanguinis corruptela; uti Galenus in explicatione illius Aphorismi monuerat.

4. Tam brevi temporis spatio nata corruptela effusi sanguinis augebitur omni momento: calor enim hic summus ob viscerum vitalium viciniam adest; hinc in putridissimum liquorem mutabitur cruor. Pulmo, in hoc gangrenoso corrupto liquore hærens, macerabitur, & putrescet; sic & pericardium, pleura &c. Præcedenti numero constitit, citissime cruorem effusum in pectoris cava corrumpi posse; sed & summum corruptelæ gradum acquirere posse, docuerunt observata. Homini in dorso sic percussus, ut per pectoris cavum transiens ensis in pectore sinistri mammam penetraret, cum pessima urgerent symptomata, applicata fuit paracensis; & sexto die post inflatum vulnus notabilis satis copia effluxit puris, sed tam fetidi, ut nullus in cubiculo manere auderet, ubi decumbebat vulnere.

neratus ( *Sculter. Armament. Chirurg. Observat. 43. pag. 255.* ). In alio vultuato, dum, tertia die post inflictum vulnus, illud dilatastet Sculterus, ex cavo thoracis effluxit libra sanguinis, sed adeo calidi, ut profluens patientem magis ureret, quam candela accensa ( *Ibid. Observat. 50. pag. 262.* ). Unde non mirum, viscerum tam putrido rabo immerforum, substantiam consumi & erodi posse, quod in ipsis cordis adeo firma substantia contigisse legitur apud Hildanum ( *Observ. Chirurg. Centur. 2. Observ. 28. pag. 106.* ). Rusticus plaustrum senu onusti everisionem & ruinam corpore exceperat, & de doloris aliquo sensu, cordis quadam compressione, & spirandi difficultate conquestus fuit: post quadriduum tamen ad consueto labores rediit. Aliquot diebus elapsis ardenti febre, asthma, delirio, vigiliis, liporhynia &c. correptus, undecima die morbi vitam finivit. In cadavere invenitur Pericardium plenum sanioso pure, cui velut immersum cor magna sui parte, ad utramque potissimum auriculam, partim exesum, partim emarcidum inveniebatur. Pulmo ejusdem labis particeps apparuit.

§. 302. Humores effusi poterunt comprimento, vel & nata acrimonia putrida rodendo, turbare, vel & abolere omnes functiones illorum viscerum, quæ hic locantur. Inde dyspnœæ pessimæ, immanes cordis

palpitationes, anxietates intolerabiles, inflammationes, exulcerationes, gangrenæ &c. harum partium nasci possunt. Sed & sanguis effusus, mora & calore putrescens & attenuatus, venis bubulis, in superficie harum partium locatis, resorberi poterit, sanguini misceri, & putridam cacochymiam pessimam inducere: unde febres acutæ putridæ, & resorpti tabi putridi ad alia corporis loca miræ metastases, phthisis, atrophia, mors. Unde merito concluditur, innumeros morbos, illosque pessimos, ab extravasatis in pectoris cavis humoribus nasci posse.

6. Si statim post vulnus infictum sanguis excrescat, designat pulmonem læsum esse; imprimis si spumescens exeat: unde in cavum pectoris ex pulmonis vasis læsis delabi poterit sanguis, nisi forte pulmo in loco vulneris pleuræ fuerit accretus. Si aliquot diebus post vulnus infictum cruenti quid expuitur, poterit hoc fieri, quia sanguis extravasatus, mora & calore attenuatus, pulmonis vasis resorptus fuerit. Quomodo hoc fiat, non dispuo: certum tamen est, ipsum Empyema per spumam purulentam sanatum fuisse. In vera pleuritis spuma flava cum stris sanguineis pulmone excreta morbum torres sanaverunt, uti innumeris observatis praticis constat. Unde patet possibilitas, quod sanguis, effusus in cavum thoracis, sponte cruenta facere possit.

§. 302. Effusi hic cruoris signa. 1. orthopnœa. 2. decubitus in dorsum commodior, in larus læsum difficilis, in sanum impossibilis. 3. sequelæ descriptæ ( 301. ). 4. pondus in Septo. 5. fluctuatio materiæ. 6. natura, & situs vulneris inficti. 7. debilitas ingens, cum pallore, sudore frigido. 8. omnium ferme symptomatum incrementum perpetuum.

Postquam jam consistit, vulnus in thoracem penetrasse, alia questio magni momenti proponitur; an nempe, vasis discissis, notabilis copia sanguinis effusi in cavo thoracis hæreat? Neque semper adeo facile est, hoc determinare, cum multa signa, mox recensenda, fallere possint; hinc requiritur concursus plurium signorum, ut quid certi de hac re statui possit. Multum autem mali posse nasci, si in hac Diagnostica fallatur Medicus vel Chirurgus, patet, quia sanguis effusus tolli debet vel per vulnus factum, vel per novam aperturam: si vero hoc renatur, dum nihil sanguinis hæret in pectoris cavo, aer admittitur,

semper hic nocens, vulnus irritatur &c. unde summa cautela ad omnia attendendum est, ne vulneratus inutilem molestiam patiarur, vel medentes famæ periculum incurrant.

1. Orthopnœa vocatur anhelosa, difficilis, & stertens, cervicæ & thoracis erectis tantum absolvenda, respiratio; quæ semper designat, liberam pulmonis expansionem ab aere inspirato impediri esse, & quacumque demum causa hoc fiat. Cum autem sanguis effusus in thoracis cava illud spatium occupet, quod dilatatus pulmo replere debebat, patet facile, difficilem respirationem hinc fieri. Dum autem ero-

do

Quo corporis situ vulneratus hæret, sanguinis effusi pondere depressum diaphragma thoracis cavitatem augeat, unde tunc poterit adhuc aliqua pulmonis expansio fieri; saltem major, quam in alio situ corporis. Signum autem hoc, si solum consideretur, fallere posset: aer enim cavum pectoris ingressus, impediens liberam pulmonis expansionem, orthopnoeam facere posset. Snammodica pulmonis contractio in Asthmaticis simile malum efficit: unde, si vulneratus tali morbo obnoxius sit, non multum certi daret hoc signum.

2. Magnum pondus habet hoc signum. Diaphragma enim versus posteriora corporis profunde descendens capacitatem thoracis multum augeat; unde sanguis effusus in cavum pectoris, dum homo decumbit; sponte inferiorem, & posteriorem thoracis locum occupat, & illa pars diaphragmatis facilius cedit deorsum: pars enim media tendinea diaphragmatis, cui pericardium lata basi accrescit, deorsum deprimi non facile poterit, uti dictum in commentariis §. 170. num. 4. Unde pater, in hoc situ sanguinem extravasatum omnium commodissime locari. Dum vero in laus latusm decumbit, difficilior quidem, sed ferenda tamen, est corporis positura: sed si in laus sanam decumbat vulneratus, sanguis effusus pondere suo premet mediastinum & pericardium versus alterum pectoris cavum; unde minuetur & huius capacitas, & augebitur respirationis difficultas, quam dum sentiunt sic decumbentes, statim vel invitati corporis situm mutant, ob suffocationis metum.

3. Sequelæ illæ imprimis a corruptela sanguinis extravasati pendent, & labe visceribus impressa, quæ putridus talis tabus alluit: unde his cognoscitur quidem sanguinis extravasati præsentia, sed sæpe nimis sero.

4. Dum erecto corporis situ ponitur æger, sanguis effusus toto suo pondere diaphragma premit deorsum: unde ponderis incumbentis sensus tunc percipitur, & dolor circa illa loca, quibus diaphragma nectitur. Sæpe etiam a diaphragmate depresso in illo latere abdominis tumor apparet. Hinc aliquando in Empyemate a copia puris aggregati depressum diaphragma, & sensim magis magisque distentum, sic abdomen protuberare facit, ut Ascitem mentiatur morbus.

5. Ubi suspicio aderat, in pectoris cavis pus accumulatum hære, iubet Hippocrates (*De Morbis Lib. II. cap. 16. Tom. VII. pag. 56.*) ægrum multa calida lotum in seila stabili collocari; & dum alter manus tenet, Medicus agitato humero auscultet, quoniam in latere affectio strepitus edat. Eandem methodum adhibebat, ut degeret latentem in pectoris cavis Hydropem (*Ibid. cap. 24. pag. 577. & de internis affectionibus cap. 14. ibid. pag. 656.*), & determinaret locum, quo aperto accumulatum in pectore serum educi posset. Apparere autem facile, hoc signum aliquando fallere posse, dum sanguis extravasatus in pectoris cavis colligitur, ille enim stagnando trumescit, & hinc difficilior ejus fluctuatio percipitur: præterea si magna copia crivioris repletur pectus, ob plenitudinem nullus audietur, concussio thorace, sonus: Unde prudenter hoc monuit Hippocrates (*In Coacis Prænot. num. 432. Tom. VIII. pag. 877.*) dicens: *Quibus suppurationis, dum concutitur humeri, multus strepitus sit, manus puris habent, quam quibus, difficultas spirantibus, & melius coloratis, exiguit. Quibus autem strepitus nullus sit, valida tamen spirandi difficultas adest, & ungues lividi, pleni sunt pure, & perniciose habent.*

6. Dum enim locum vulneris, & viam instrumenti vulnerantis per partes novimus, ex Anatomicis scitur, an magnæ arteriæ vel venæ læsæ sint, an non. Sic trunci majores arteriarum intercostalium prope marginem inferiorem costarum decurrunt; Mammariæ internæ ad latus sterni utrunque transversæ digiti distantia ab hoc osse, pone costarum cartilagineas ponuntur. Magna vena Azygos ad dextrum latus vertebrarum dorsi locatur &c. Ex quibus omnibus bene cognitis majus minusve periculum vulneris determinatur.

7. Sunt homines tam pusillanimes aliquando, ut, dum alienum vulnus vident, in animi deliquium cadant: talibus vulneratis etiam levissime omnia hæc symptomata accident. Sed facile in tali casu ad se redeunt aqua frigida respersi, vel stimulante cardiaco exhibito, neque adeo diu durat debilitas inde orta. Ubi vero post vulnus in thoracis cavum penetrans ingens debilitas, contracta & pallida facies, oculi pallidi languidi, sudor frigidus gutta-

tum

tim in cute collectus hærens, imprimis in faciei & pectore, pulsus vix observabilis, deprehenduntur; tunc novimus, discissis vasis tantam copiam sanguinis effundi, ut vix ullus ad cor redeat, sed omnis fere extra corpus profundatur, vel in cavis pectoris collectus hæreat. Unde nunc summum periculum imminere monendum est; sæpe enim subito tunc moriuntur. Pulchre hoc monuit Hippocrates (*Prærob. Lib. I. num. 150. Tom. VIII. pag. 791.*) dicens: *sanguinem profusentia cuius sudationis vultus maligna. Tales enim loquentes occulere perunt.* In Coxæ prænotionibus (*N. 328. ibid. pag. 870.*) idem pronunciatum habetur, præterquam quod loco *ipsæ-ræ* ibi legatur *in ipsæ-ræ*; sed & alibi rigores succedere largis hæmorrhagiis monuit (*Prærob. Lib. I. num. 152. ibid. pag. 799.*), & dixit, rigorem sanguinis fluxionem sistere: sed patet in hoc loco ex prædictis, quod de narium hæmorrhagiâ ibi agat. Ubi autem in thoracis vulneribus magna vasa, cordi adeo vicina, læsa fuerint, patet facile, rigorem quidem largam hæmorrhagiam sequi posse, sed non ideo sanguinem sisti in hoc casu.

8. Vasa sanguinea maxima hic sunt, & cordi admodum vicina: hinc, illis læsis, perger sanguis effluere in thoracis cava: unde compressio pulmonum, anxietas, dyspnœa &c. augebuntur perpetuo, donec minoris viribus vulnerati, vel contracto vase discisso, cesset effluxus sanguinis. Multa etiam symptomata adesse possunt vulneratis in hoc casu a comitante errore, ira, &c. quæ sensim minuuntur; illa autem mala,

quæ ab effuso sanguine sunt, pergent, quamdiu durat Hæmorrhagia; & ideo symptomatum augmentum perpetuum recensetur merito inter illa signa, quibus cognoscitur, sanguinem in thoracis cava effundi. Ubi autem signa docent, vulnus in corporis cava majora penetrasse, & simul merito metuitur, ne vasa discissa pleno rivo sanguinem effundant interius, licet nulla Hæmorrhagia externe appareat, summa cautela opus est in Prognosi determinanda, ne fama Medici vel Chirurgi periclitetur, si nihil metuendum pronunciarint: sæpe enim tales vulnerati opinato pereunt, & mors vulnerati eorum ignorantia imputabitur ab his, qui illius, qui vulnus inflixit, causam defendunt. Quanta autem cura attendendum sit ad omnia phænomena, ut determinari rite possit, an cruor extravasatus in thorace hæreat, an non; patet inde, quod & peritissimi aliquando hic decepti fuerint. *Mery (Academ. des Sciences l'an 1713. Memoires pag. 159.)* ingenue faretur, quod in juvene, cui ense vulnus inflictum fuerat parti anteriori, & superiori brachii dextri, jam tribus horis post vulnus inflictum tot viderit, & tanta symptomata, ut non dubitaret, quin pectoris cavum cruore extravasato plenum foret, unde de paracentesi thoracis instituenda serio cogitabat. Postea tamen eventus docuit, nihil tale factum fuisse, cum ostidui spatio perfecte sanatus fuit vulneratus. Admodum autem verosimile videbatur, tendinem pectoralis musculi læsum fecisse dolorem summum pectoris, respirationem difficillimam &c.

§. 303. **E**stque tam illico educendus. 1. situ, motu, nixuque corporis. 2. suffurjecto liquoris diluentis, resolventis, depurantis. 4. dilatazione vulneris. 5. alia apertura inter secundam & tertiam costam veram inferiorem, ad distantiam quatuor digitorum a vertebri, & ab angulo inferiori omoplatae, facta instrumeto scicante, sectione costis parallela, inter has media, deorsum directa acie.

Postquam constitit ex signis præcedenti paragrapho recensitis, sanguinem extravasatum in rhoracis cavis hædere, indicatio curatoria quidem jubet, illum tollendum esse illico, ne compressione, vel corruptione, noceat; tamen simul quam maxime notandum est, illum sanguinis effusi educationem fieri non debere, antequam cou-

stiterit, vasa læsa non amplius sanguinem fundere. Quid enim proderit, educere cruorem, si motu corporis, sultu, inspectione &c. sic irritetur vasa læsa adhuc parula, ut pergant sanguinem fundere. Si jam pulsus sit satis fortis & æquabilis, calor ad extrema corporis usque adsit, nullus sanguis, nulli spasmi appareant, & virium supul.

simul adit constantia, novimus cessare internam Hæmorrhagiam, & tuto tentari posse illa artis molimina, quæ requiruntur ad educationem sanguinis in cavis thoracis hærentis.

Dubitari præterea posset, an semper arte educi debeat sanguis extravasatus, cum fidelissimis observatis constiterit, sanguinem, pus, aquam &c. ex thoracis cavis evanuisse sensim, resorptam in venas, & per sudorem, urinas &c. deinde excreta. Talis casus recensetur ab Hieronymo Fabricio ab *Aquaspendente* (Opera Chirurg. part. 1. Lib. II. cap. 12. pag. 214.). Amicus ejus thorace vulnerabatur tam angusto vulnere, ut stylo non potuerint detegere Medici, quod in thoracis cavum penetraret; illud tamen parit ex sputo sanguinis, ponderis sensu diaphragma prementis, tussi, febris, respiratione impedita &c. Cum autem nihil ex vulnere poterat educi, Medici statuerant, thoracis Paracentesin sequenti die instituendam. Interea accidit, ut æger cyathum cruoris plenum mejeret, unde a dolore, febre, & omnibus symptomatibus levatus est. Alter casus similis habetur apud *Belliose* (Chirurgien d'Hopital pag. 265.). Centurioni vulnus insculum fuerat in thoracis penetrans cavum lesione pulmonis, stipatum omnibus symptomatibus, quæ similia vulnera solent comitari. Dum vena secabatur, loco sanguinis verum pus exivit, cum levamine omnium malorum. Casum hunc libi a peritissimo Chirurgo narratum, & pluribus fide dignissimis testibus oculatis confirmatum fuisse, testatur auctor. Urinæ copiosam excretionem, & sudorem profusum profuisse in similibus casibus, observatum fuit sæpius (Ibid. pag. 94. 95.). Plura talia observata occurrunt, sed hæc sufficiunt, ut probeatur; miris modis naturam, quæ toris sibi soli sufficit, sanasse talia vulnera. Tamen rarius hæc contingunt, & prudentiæ medicæ quidem est sedulo attendere, an signa quædam doceant, naturam tale quid moliri: interim tamen, si tali naturæ hoc opus relinqueretur, certum est, plurimos perituros, corrupto extravasato cruore viscera viralia tabefaciente, qui per artem, hoc cruore educito, servari potuissent. Illa autem educio tentatur sequentibus modis.

1. Si sanguis adhuc fluidus in thoracis cavo hæreat, vulnusque satis patulum non

oblique decurrat per integumenta, sed directe penetrat; si tunc vulneratus ponatur in tali situ, ut propria gravitate versus vulneris aperturam sanguis descendere possit, effluet sponte. Unde & peritissimi Chirurgi in tali casu per aliquot horas nihil imponunt omnino vulneris orificio, ut sanguis liberrime exire possit. Hominem ense sub mamma dextra thoracem perfossum sic traxit Dionisius (Operationes de Chirurgie pag. 295. 296.). Cum enim inveniret pelioris cavum sanguine plenum, dilatato prius vulneris orificio, tota nocte plagæ incumbere jussit, & sequenti mane vacuum omni sanguine invenit thoracis cavum; & optime sanatus fuit vulneratus. Pedibus elevatis, capite declivi, hominem similiter vulneratum jussit poni Paræus (Livre X. chap. 32. pag. 251.), sicque digitis per orificium vulneris immisis, remoto thrombo coagulati cruoris, eduxit sanguinem effusum, & ab imminente suffocatione liberavit vulneratum.

Multum juratur hæc sanguinis extravasari educio per vulneris orificium, si abdomen fascia lata, vel manibus comprimat, & inspiratum aerem diutissime retineat vulneratus; interinque clausa glottide expirationis nixum faciat; sic enim dilatato quam maxime pulmone, & sursum presso diaphragmate, exprimitur per vulneris aperturam sanguis in thoracis cavum effusus.

2. Cum sæpe incommodum admodum sit in multis thoracis vulneribus ægrum in tali situ retinere, ut propria gravitate extravasatus sanguis per vulneris aperturam exeat, ideo excogitaverunt aliam Methodum. Tubum nempe flexilem ex auro (Sculter. Armentum. Chirurg. Tab. II. figur. 9. & 10.) ad latera multis foraminulis pertusum, stylo aureo ejus cavum obturante instructum (ut possit commode flecti sine angustatione sui cavi) caute per vulneris orificium dimittebant in thoracis cavum quam profundissime; deinde vel suctu, vel siphone applicato extrahebant effusum sanguinem. Obtusus apex talis tubi requirebatur, ne pulmonem læderet. Similis rubus ex plumbo, uti & ex corio flexilis & balænz offe, parari posset in eodem usus. Tali instrumento in angulum curvato, extracto dein stylo obturante, sine ulla suctione adhibita magnam sanguinis extravasati copiam de.

de thorace eduxit Scultetus ( *Ibid. Observ.* 42. pag. 248. ).

3. Facile patet, binas precedentes methodos tantum locum habere, ubi sanguis extravasatus adhuc fluidus est: si vero in grumos concreverit, non poterit facile exire per vulneris orificium, multo minus ingredi foramina rubi immitti. Verum quidem est, quod sanguis coagulatus sponte quidem dissolvatur postea, sed tunc simul putrescit, quod hic summopere noceret: & ite ob compressum pulmonem tanta urget anxietas, ut spontanea illa sanguinis concreti resolutio expectari non possit. In tali casu in thoracis cavum injiciunt aquam repidam cuni melle & salis pauculo, addito sapone Veneto ( de quibus dictum fuit in commentario §. 276. ) deinde illud liquidum immixtum respiratoris motu agitur, & conteritur quasi cum grumis illis concenteris, qui sic solvuntur, ut una cum injecto liquido per vulneris aperturam exire possint. Pro varia jam indicatione liquidum illud injiciendum diversis ingredientibus medicatum redditur. Dilutioni & resolutioni concreti sanguinis sufficit aqua tepida, cum melle & pauxillo salis; ubi vero jam putrescere incepit cruor extravasatus, infusum Scordii, Rutæ, Marrubii, & similia antiseptica, & leviter detergentium, cum pauxillo aceti, convenit.

4. De hac dictum fuit §. 278.

5. Ubi vulneris talis est conditio ut non possint educi per illud collecta in thoracis cavo liquida, tunc nihil aliud superest, quam novum vulnus facere tali in loco thoracis, versus quem sponte sua ob thoracis interni figuram liquida hæc delabuntur. Hoc imprimis requiritur, ubi superiori thoracis parti vulnus infictum fuit, tunc enim vix possibile est, ut effusus sanguis per vulneris aperturam exeat. Cum autem thoracis cavum a posterioribus ob inclinatum diaphragmatis posituram profundius descendat, hinc in posteriori parte thorax perforatur, loco ram demisso, ac fieri potest sine periculo lisionis diaphragmatis, quod inferioribus costis adnascitur, & a posteriori parte thoracis versus anteriora adscendens angulum satis acutum cum vertebrarum corporibus format. Ne autem lædantur validi illi muscoli, Sacrolumbalis, Longissimus dorsi &c. qui ad utrumque spinæ dorsi latus positi per lum-

bos & dorsum adscendunt; apertura illa thoracis quatuor transversis digitis a vertebra distare debet ad minimum. Plerumque solet hæc apertura fieri inter secundam & tertiam, vel inter tertiam & quartam costam spuriam, ab inferioribus sursum numerando. Cum autem Diaphragma in dextra parte altius adscendere in thoracem ex Anatomicis constet ( *B. Siegf. Albini Hist. Musculorum hominis lib. 3. c. 81. pag. 300.* ), ideo in dextro latere thoracis dum instituitur Paracentesis, solet illud fieri inter tertiam & quartam costam, in sinistro vero latere, inter secundam & tertiam costam spuriam fieri posse, uti monuit *van Solingen* ( *Manuale Operatum &c. ruerde Deel c. 2. pag. 118.* ). Forte ob hanc causam Hippocrates inquirens, cuinam pectoris lateri lectio adhibenda esset in Empyemate, optabat, pus hæere in latere sinistro ( *Hippocrat. de Morbis Lib. II. cap. 16. Tom. II. pag. 568.* ). *Dionysius* etiam inter tertiam & quartam costam hoc fieri iussit ( *Dionis Cours d' Operations de Chirurgie. Demonstre. 5. pag. 296.* ). Unde videtur in textu huius paragraphi error subrepisse, dum locus incidendus inter secundam, & tertiam costam veram indicatur, cum & mox sequentia locum longe inferiorem indicent, & §. 1191. 7. ubi de thoracis perforatione in cura Empyematis agitur, indicetur locus inter costam quintam & sextam, vel quartam & quintam ab inferioribus numerando; quem locum *Ægineta* ( *Paul Æginet. Lib. VI. cap. 44.* ) etiam in cura Empyematis indicat a quibusdam dissecari, licet ab hac operatione vel subitanam mortem, vel insanabiles fistulas præfagiar. Unde crederem in textu legendum esse, INTER SECUNDAM ET TERTIAM COSTAM SPURIAM INFERIOREM: nisi forte hic intelligeretur perforatio thoracis in anteriori parte faciendi, quæ certe optime inter secundam & tertiam costam veram, ab inferioribus numerando, tunc institueretur, uti & habet *Dionysius* ( *Cours d' Operations de Chirurgie &c. pag. 296.* ), qui unicum tantum Paracentesis in hoc loco institutz commodum memorat, quod nempe vulneratus, absente Chirurgo, propriam vulnus curare posset. Sed major thoracis in posteriori parte profunditas, & decivis sponte via sanguinis effusi versus aperturam factam, dum decumbit homo, facile persuadent, per-



perforationem thoracis in parte posteriori & inferiori præferendam esse. Hippocrates ( *De Morbis Lib. II. cap. 16. Tom. VII. pag. 568.* ) de Emp. rematis curatione agens, non quidem exacte designavit locum incidendum, tamen dixerat nar, hoc infimo loco, & a parte posteriori, faciendum esse. Dicit enim: *As si præ crassitudine & copia (puris) nullum strepitum ediderit, quo illud apprehendatur sit enim hoc aliquando) utrumlibet latus intumuerit, ac magis doluerit, illud infima parte secare (oportet) a posteriori magis tumoris parte, quam ab anteriori, ut facilius tibi sit puris effluxus. Secare vero inter costas &c.* Et alibi ( *Ibid. Lib. 3. cap. penult. pag. 593.* ) de eodem morbo agens dicit: *secare aut urere oportet quam proxime ad septum transversum, cavendo tamen ipsum septum, ne lædatur nempe.*

In pectoris hydropse, dum aqua educenda erat, jubet Hippocrates ( *De internis affect. cap. 24. Tom. VII. pag. 656.* ) tertiam ab ultima costam ad os usque secari, deinde terebra acuta perforari, & dum perforata fuit, aquæ paniculum educi lubet &c. Ex quo loco satis patet, infimum thoracis locum elegisse Hippocratem, ut illo perforato contenta liquida educerentur.

Locus ille sic determinatus facile invenitur, nudato corpore ægri, costas numerando: in obesis autem, uti etiam si Emphysema adfuerit, difficilius hoc cognoscitur. Unde alia methodo conari fuerunt Chirurghi locum incidendum determinare. Quidam situm a cartilagine ensiformi recta ad spinam dorsi ducebant, deinde illud filum dividebant in tres partes æquales, & tunc locum determinabant in tali distantia a sternone, quæ binas tertias longitudinis sili haberet ( *Van Solingen Manuale Operationum ræcedæ deel cap. 1. pag. 118.* ). Dionisius ( *Cours d'Operations de Chirurgie, Demonstr. 5. pag. 296.* ) mensurabat quatuor digitorum transversorum distantiam ab infimo angulo omoplætæ, & ad similem distantiam a spina dorsi notabat locum incidendum. Cum autem scapula mobilis sit, & locum mutare possit varia actione musculorum ipsi affixorum, patet, non adeo certam semper esse hanc methodum. Unde præstat, loco sic invento, digitis pertere, an quidem costarum interstitio respondeat.

Solet tunc locus incidendus, jam cogni-

tus, atramento notari, ne postea lateat. Sed, cum mobiles costæ sint, patet facile, mutatæ corporis positura cutis situm etiam mutari. Unde merito monuit Hippocrates ( *De Morbis Lib. III. cap. penult. Tom. VII. pag. 593.* ): *Quum vero secare aut urere velis, nota impressa, fac ut eandem figuram servent inter secundum aut urendum, ne felat cutis figura mutatione sursum vel deorsum vergent.* Apertura tunc fieri debet instrumento secante; non autem pungente, uti fit in paracentesi abdominis, quæ stylo chalybeo cannulæ argenteæ cavæ immisso perficitur; quia magnum periculum foret, ne pulmo vulneraretur sic pungendo. Ut autem instrumentum secans penetraret in cavum thoracis, debent dissecari cutis, paniculus adiposus, latissimus dorsi, intercostales musculi & pleura; quod ut tuto fiat, parum reclinato versus posteriora corpore ægri, ut cutis laxa sit, digitis elevat Chirurgus omnia integumenta communia, & simul, si neri possit, latissimum dorsi; & illa sic elevata simul & semel satis lata plaga dissecat ad trium quatuorve digitorum transversorum longitudinem. Hoc factò, antrosum, & simul parum in oppositum latus flectatur corpus ægri, ut collæ a se mutuo plus recedant, & tendantur musculi intercostales; tunc scalpello teniter incurvo, cujus dorso in tota longitudine applicatur digitus index, & simul apex scalpelli digiti extremo regitur, tensos musculos intercostales & pleuram dissecat, caute in cavum penetrando parvo vulnere, ne pulmonem lædat: simul ac dissecta plena est, statim pulmo collabitur & a collis recedit; unde runc ratio vulnus dilatarari potest. Sectio autem fit costis parietela, & medio inter binas costas loco, acie scalpelli deorsum directæ, ut videntur vasa intercostalia, quæ collæ superioris imæ parti, in sulcum cavatæ, adiacent.

His cautelis tutissime perficitur hæc operatio. Quædam præterea monita circa hanc rem apud auctores occurrunt, quæ minoris momenti videntur. Sic Hieronymus Fabricius ab Aquapendente ( *Operat. Chirurg. cap. 45. pag. 490. 491.* ) voluit, illo temporis momento, dum pleura pertunditur, debere expirare ægrum, ut nempe pulmo a pleura recedens hoc tempore scalpello non lædatur. Sed ex Physiologicis hodie novimus, & in inspiratione & in expiratione pul-

pulmonem semper pleuræ contiguum esse, illum pectoris dilatationem sequi. Monuerat Hippocrates ( *Aphor. 27. Sect. VI. Tom. IX. pag. 263.* ) quod, si Empyici, vel hydropici, uruntur aut secantur, & pus vel aqua conferim emittatur, moriantur omnino: hinc & voluerunt quidam, non simul & semel omnem extravasatum sanguinem educendum esse, sed partitis vicibus. Sed in Empyemate, vel hydropse pectoris, pulmo diu maceratus fuit pure vel sero extravasato undique alluente, unde tota hac colluvie simul & semel educta, sanguis subito dilatans fere tabefacta pulmonis vasa, illa rumpere posset; unde subita mors. In vulneribus autem thoracis dum hæc operatio instituitur, raro tam diu solet differri, ut hoc metuendum sit: & plurimis observatis Chirurgicis constitit, ruto omnem sanguinem extravasatum sic subito eductum fuisse. Multum faciliat hanc operationem, quod extravasati humores pulmonem comprimendo, & diaphragma suo pondere deprimitendo, faciant, ut, pleura pertusa, non adeo facilis fiat læsio harum partium.

Dictum fuit §. 297. pulmonem aliquando pleuræ adnasci: si jam mala fortuna acciderit, illo in loco, ubi paracentesis facta fuit, pulmonem pleuræ accrevisse, patet facile, magnam inde oriri difficultatem. Plerique Chirurgici auctores, qui de hac re scripserunt, sibi hoc accidisse restantur; & tunc jubent, ut Chirurgus digito per vulnus immisso prudenter separet pulmonem a pleura, cui cohesit. Certe nihil aliud superest, quam hoc tentare, licet crudele videatur in vivente homine partes concretas sic lacerare: nisi enim hoc fiat, frustra instituta fuit Paracentesis. Mirus habetur apud Hippocratem ( *De Morbis Lib. II. cap. 23. Tom. VII. pag. 575.* ) locus, qui hæc facere videtur. Describit enim illa mala, quæ oriuntur, quando pulmo in larus procidit ( *ὁ πνεύμων προσπίπτει ἐς πλῆθρον* ) quæ satis conveniunt cum illis phænomenis, quæ post morbos acutos inflammatorios pectoris, pulmone pleuræ accreto, apparent: & medela, quam ad hunc morbum sanandum commendat, satis etiam respondet. Postea autem addit: *si vero ex vulnere illud fiat, aut Empyio factu ( sit*

*enim ) huic vesicam fistula alligant, flutu immittit, & intus immittit, & penicillum flavum solidum imponere, & ulteriores repellere ( oportet )*. Ex quo loco forte concludi posset, quod Hippocrates, ut pulmonem a pleura divelleret, vesicam conihcatam per vulnus immiserit, dein inflaverit, ut illa statu distenta in cavo pectoris avelleret pulmonem a pleura. cui concreverat. Sæpe hoc videtur inde deduci posse, quod tentata fuerit jam antiquitus hæc separatio pulmonis concreti cum pleura membrana. Ob meritum hujus concretionis voluerunt nonnulli, integumentis discissis musculos intercostales prudentissime dissecandos esse sine læsione pleuræ, & tunc pleuræ locum nudatum examinandum esse sedulo, an ex crassitie ejus insolita & callositate metuendum sit, pulmonem huic loco accrevisse: in quo casu magis conducere, sectionem parum producere, donec liber ab hac cohesione locus inveniat. Sed facilius sic demonstratur in cadavere talis operatio, quam in vivente homine instituitur, in quo tardam talem sectionem per strata quasi facere crudele admodum videtur. Mirabiles vero tales concretiones pulmonis cum pleura aliquando observantur, quæ irritant omnino facerent hanc operationem: Vidi sic in cadavere nobilis juvenis, post hæmoptysin subita apoplexia extincti, pulmonis dextri medium lobum undique pleuræ ita accretum, ut thoracis dextra cavitas in bina cava distinctissima divideretur. Si tali in casu vulnus superiori parti pectoris dextri inflatum fuisset, facile patet, paracentesim nullo modo profuturam, si solito loco institueretur. Rari autem hi casus sunt; & error inde natus non artificis, sed arti ascribendus foret, cum nullis indicibus latens tale malum cognosci posset.

Perforato sic thorace, omnia illa, quæ præcedentibus numeris hujus paragraphi memorata fuerunt, adhiberi poterunt, ut sanguis extravasatus educatur. Si autem liquida, concretum sanguinem dissolventia, immitti debent, satis commode per vulnus prius inflatum injiciuntur, quia altiore locum thoracis occupat, & deinde facile per novam aperturam factam exire poterunt.

§. 304. SI nullis diffunduntur turundis, raro deteguntur, aer arceatur, fuctu artificioso, & nixu respirationis debito expellitur aer admissus, frigus caute vitatur, brevi & optime sanantur, si curabilia sunt.

Expofitæ fuerunt §. 299. illæ rationes, ob quas turundarum ufus in vulneribus thoracis non penetrantibus damnabatur; nec videtur minus obesse in vulneribus thoracem penetrantibus. Ubi autem conducere videtur, non simul femel, sed parvis vicibus educere contenta cavis pectoris liquida, quod rarius fit in pectoris vulneribus, sed aliquando pure vel aqua in thorace collectis, juxta monitum Hippocratis observatur, tunc turunda vulneri facto immittitur, ut pro lubitu evacuare possit stagnans in pectore liquidum. Etiam post institutam Paracentesim, prima die turundam applicari debere, ne recenti vulnere divisa pleura concresecat, monuit Bellioſte (*Chirurgien d'Hôpital. part. 3. chap. 6. pag. 218.*), qui in aliis casibus ubique fere turundarum usum tanquam perniciosum damnavit. Postea autem semper nocere videntur, dum tumentes absorptis humoribus dilatantur, & a motu thoracis affricantur lateribus vulneris, quæ inde callosa facta difficilem curam faciunt. Aeris accessum ad interiora thoracis, sic prohibere voluerunt; sed remota in singulis deligationibus turunda, per patulum foramen aer liberrime ingreditur, ejusque exitu dein nova turunda intrusa impedito, calore dilatata miras sæpe vias sibi faciet, & pessima Emphysemata producere poterit. Præstat ergo potius plano plumaceolo vulnus tegere, & liberam viam relinquere humoribus per vulnus factum elapsuris; & si vulnera satis patula fuerint, sollicitè cavendo, ne plumaceola imposita in cavum pectoris delabantur, quod turundis immissis aliquoties accidisse testantur auctores. Nobili Dano vulnerato, & negligentius a Chirurgo habito, turunda in thoracis vacuum elapsa fuit; & post sextum mensem ore excreta, & postea tamen integra sanitate fruebatur (*Tulp. Observ. Medic. Lib. II. cap. 85. pag. 123. 124.*). Homini dextrum pectus prope axillam gladio, inter secundam & tertiam costam veram, perfoſsum fuerat; ex quo vulnere per quindecim dies sanguis fluxit, & simul sanguinem tussiendo excreabat. Post varia, illaque satis gravia, symptomata vulnus tandem cicatrice

obductum fuit. Mansit tamen respirationis difficultas, tussis continua, & puris fetidi & viridis excreatio. Tribus mensibus elapsis a curato vulnere, tussiendo una cum multo pure eiecit binas turundas, diverso tempore in vulneris curatione sub Emplastro perditas (*Hildan. Observ. Chirurg. Centur. 1. Observ. 46. pag. 41.*).

Alteram, quod hic requiritur, est, ut aer arceatur, ne per vulnus in cavum pectoris ingrediat; vel si ingressus fuerit, inde educatur. Quamdiu nondum extravasata liquida educta sunt ex pectoris cavis, impossibile est aerem arcerè, cum liber exitus requiratur humoribus effusis; sed ubi nihil amplius de vulnere exit, tunc aer, in thorace hærens inter pleuram & pulmonem, educendus est, & omni cura cavendum, ne postea iterum ingrediat. Constat enim ex Physiologicis, requiri ad liberam pulmonis ab inspirato aere expansionem, ut nullus aer in pectoris cavo hæreat. Hoc autem fieri potest, vel sugendo, vel omnium optime sequenti methodo. Detecti vulneris labia digitis adducuntur, ut nullus aer ingredi possit, deinde æger lenta & profunda inspiratione magnam copiam aeris hauriat, illumque retineat in pulmone, quamdiu hoc commode facere poterit: aer ille sic retentus, calore rarefactus expandet pulmonem, & comprimetur aer inter pleuram & pulmonem hærens. Si tunc, antequam expiret æger, deducantur vulneris labia, pars magna aeris, contenti in cavo thoracis, exprimetur: statim iterum claudenda vulneris labia, & tunc expiret æger, non prius. Dum hoc repetitur, aliquoties, omnis omnino aer ex pectoris cavo expelletur, & sentiet vulneratus statim, se longe commodius respirare. Omni aere sic expulso; subito vulneri applicatur tenax Emplastrum: illo tempore, dum æger inspiratur, aërem in pulmone retinet, tunc enim pulmo distensus, pleurae contiguus, obturabit viam aeri per vulnus ingressuro. Relinquitur autem hoc Emplastrum distissime; & si renovari debeat apparatus, aliud simile Emplastrum iterum imponitur iisdem cum cautelis: & si ulibet, certe in talibus thoracis vulneribus, rara deligatio summam utilitatem adfert. Methodi

hujus

# §. 304. ad 306. VULNERA THORACIS.

355

hujus efficaciam probant etiam illa experimenta in vivis animalibus capta; quæ §. 170. num. 4. enarrata fuerunt. Dum enim, per-  
fosso utrimque thorace parulo vulnere, cessaret omnino respiratio; & animal mortuum videretur; simili arte educto aere illapso ex pectoris cavis, reviviscebatur animal, & vox perditam redibat statim.

Cum autem omnes partes thorace contentæ, caloris fontis, cordi nempe, proximæ, blando tepore foveantur semper, summo-  
re cavendum est; ne detecto vulnere insolitum frigus intendant, unde aer semper calidus hic requiritur, imprimis, quando re-  
novabitur apparatus.

Hac methodo vulnera thoracem penetrantia, licet periculosissima fuerint, & sævis  
symptomatibus ita parata; aliquando sanantur, neque facile desperandum esse; mira obser-  
vata docuerunt; & §. 170. plura talia exem-  
pla ex fideiis auctoribus enarrata fuerunt. Magnum quidem malum semper ab his vul-  
neribus metuendum esse nullus dubitat; cum  
vitalia viscera; cor nempe & pulmones, &  
maxima totius corporis vasa sanguinea hic  
locentur: sed cum non semper absolute le-  
thalia sint ipsius etiam cordis vulnera, de  
quo dixerat Plinius (C. Plinii Secund. Nat.  
Hist. Lib. XI. cap. 37.) quod solum hoc vi-  
scerum vitium non maceratur, nec supplicia vi-  
taris, læsumque mortem illico offert, patet;  
etiam in gravissimis vulneribus sæpe

spem aliquam superesse; cum etiam, maxi-  
mis vasculis læsis, pro mortuis derelictis homi-  
nes aliquando emerferint; dum nulla illorum  
cura gereretur; nullique refocillarentur car-  
diacis. Non autem solum constat, gravissi-  
ma talia vulnera sanata fuisse; sed etiam  
brevis admodum tempore. Centurioni gladio  
pectus dextrum perfossam fuerat prope axil-  
lam; & satis subito septem vel octo libras  
sanguinis perdidit; nec cessabat hæmor-  
rhagia, licet idoneo apparatu vulnus religa-  
tum esset. Pulsus debilis, inæqualis, fre-  
quentia animi deliquia; febris &c. acerbam  
prognosis faciebant. Postridie, nondum ces-  
sante hæmorrhagia; cogeatur vulneratus lo-  
cum mutare, unde omnes illum in itinere  
expiraturum credebant. Tamen dum tertia  
die solo Emplastro tegebatur vulnus, co-  
piosa urina evacuatione; & sputis sanguineis  
eductis; & profuso sudore sequenti nocte adeo  
levabatur; ut omnia symptomata evanesce-  
rent, vulnusque solo Emplastro; incarnati-  
vo dicto, curaretur brevi; & quinta die post  
vulnus infectum equo satis commode vehe-  
retur, neque amplius decumberet de die  
(Belloste Chirurgien d'Hospital part. 2. c. 8.  
pag. 92.) Apud eundem auctorem plura ta-  
lia Exempla habentur, quæ docent, gravis-  
sima thoracis vulnera; pessimisque stipata  
symptomatibus, sine turundis & rara deli-  
gatione felicissime & satis brevi tempore cu-  
rata fuisse.

## §. 305. Tumque præcaventur omnia illa & sæva symptomata (301.)

Pessimæ sequelæ, quæ post vulnera tho-  
racis apparent; fere tantum oriuntur ab  
aere admissio in pectoris cavis; vel ab ex-  
travasatis liquidis pectoris cava angustan-  
tibus; aut illorum corruptela; quæ nocent  
visceribus contentis. Dum vulnera hæc non  
obstruantur turundis, effusus sanguis libere  
effluit; rara deligatio & cautela modo ex-  
positæ aeris ingressum impediunt, idemque

jam admissas methodo dicta educi poterit.  
Unde felix successus semper curæ sequitur,  
nisi tales partes læsæ fuerint; sine quarum  
integritate vita consistere nequit: simul-  
que patet, historiani & curam vulnere  
thoracis magnam lucem affundere multis  
morbis pectoris, & viscerum contentorum;  
uti postea in Empyemate; pectoris Hydro-  
pe &c. patebit.

## VULNERA ABDOMINIS.

§. 306. Abdominis vulnera non penetrantia in cavitatem noscuntur: 1. stylo,  
& situ 2. injectu 3. causa vulnerante cognita, & natura vulneris.

Truncus corporis in duas magnas cavi-  
tates dividitur, quarum superior & minor  
thorax, inferior & major abdomen voca-  
tur. Abdominis autem cavum a thorace  
per diaphragma dividitur. Omne ergo, quod  
in trunco corporis diaphragmati subjacet,

Z 2 2 ad.

ad abdomen pertinet, five partes continentes fuerint, five contentæ. Omnis thoracis ambitus costis tegebatur; sed abdominis maxima pars mollibus integumentis tantum defenditur. Si enim exceperis superiorem lateralem utrimque partem abdominis, quæ costis spuriis circumvallatur, pone quas magnum hepatis & lienis, adeo friabilia viscera, tuto reconduntur; & vertebrarum columnam, posteriora abdominis pro parte occupantem; denique inferiorem & lateralem partem, quæ ossibus innominatis utrimque defenditur; reliqua omnia abdominis mollia sunt. Uti jam thoracis cavitas pleura dicta membrana undique cingebatur, sic & totum abdominis cavum undique simili membrana obducitur, quæ Peritonæum vocatur. Atque inde iterum generalis divisio vulnerum abdominis sumitur: omnia enim vulnera, quæ partes abdominis continent lædunt, integro manente peritonæo, vocantur non penetrantia; ubi vero peritonæum perforatum simul est, tunc in cavum abdominis penetrare dicuntur. An autem penetraverint vulnera, cognoscitur sequentibus signis.

1. De hac re dictum fuit in commenta-

§. 307. **S**I profunde sere usque ad peritonæum penetraverint, debilitatis ibi tegumentis, herniæ occasionem præbent in corpore robusto; Pejus nihil, quam, si oblique decurrentia inter integumenta abdominis fistulosa vulnera effecerint.

Quantum possit extendi peritonæum in gravidis & ascite laborantibus, satis patet. Unde vulnera abdominis non penetrantia aliquid singulare habent; quod neglectum sæpe pessima produxit mala. In singulis enim inspirationibus depresso diaphragmate contenta abdominis omnia comprimuntur, muscoli abdominales in expiratione iterum reprimunt; unde patet, contenta abdominis continuo a diaphragmate & muscularibus abdominalibus premi. Si ergo, difficilis profundo vulnere integumentis abdominis fere ad peritonæum ulque, tollatur æquabilis pressio in quodam loco, per viam respirationis expandetur adeo facile dilatabile peritonæum, & saccum formabit, quem intestina, omentum &c. ingrediuntur; & sic faciunt herniam: quæ nil aliud est, nisi dilatatio peritonæi in quodam loco; quem locum dilatatum contenta abdomine viscera ingrediuntur. Rarissimo enim, si unquam, a rupto peritonæo herniæ fiunt; se-

rius §. 300. num. 2. sed in abdomine adhuc major adest difficultas, imprimis in obesis ob magnam pinguedinis molem, quæ in his abdomen tegit. Unde & peritissimi Chirurgi styli exploratione nihil certi hic detegi posse dixerunt: mutatus enim partium situs, tumor laborum vulneris, sanguinis thrombi vulnus obturantes, pinguedo in vulnus pressa, viam stylo, per vulneris aperturam immisso, impediunt. Accedit, quod vulnerati sæpius ignorent, vel male indicent posituram corporis, quam habuerunt, dum vulnus infligebatur.

2. Dum aqua tepida syphone vulneris aperturæ injicitur: de qua re dictum fuit in commentariis §. 300. n. 4.

3. Si enim ex figura instrumenti vulnerantis, comparata cum amplitudine vulneris, constiterit satis profunde illud adactum fuisse, & recta penetrasse; possumus concludere, illud in cavum abdominis ivisse; & contra, si ex iisdem signis pateat, non satis profunde adactum fuisse, vel obliqua via. Sed patet facile, in illis, quibus pinguis aqualiculus propenso sesquipedie exstat, instrumentum vulnerans profunde posse adigi sine perforatione tamen peritonæi.

re semper ab eodem in saccum expansio; licet in alia opinione videatur fuisse Celsus (*Lib. VII. cap. 4. pag. 453. & ibidem cap. 17. pag. 454.*): & observata certissima docuerunt, in omni abdominis ambitu hernias posse nasci, modo æquabilis pressio deficiat in quodam loco. In cadavere mulieris inventa fuit hernia ad latus sinistrum lineæ albæ, quatuor digitis transversis supra umbilicum, omenti & intestini coli portionem continens. Ortum duxerat hæc hernia a valida percussione abdominis in hoc loco (*Acad. des Sciences l'an 1714. Mem. pag. 259.*). Mirabilem casum habet Sennertus (*Lib. IV. part. 1. sect. 2. cap. 16. Tom. II. pag. 39.*), qui docet, debilitato abdominis quodam loco, immanes tumores herniosos posse nasci. Victoris uxor, cum narium in pectus incurvanda juvaret, ab illa resiliente percussa fuit ad sinistrum inguen. Paulo post in hoc loco parvus tumor oritur, sed brevi tempore admodum incre-

scens;

scens; & postea evidenter apparuit, misere huic feminae gravidæ uterum tumentem dilatata abdominis integumenta in faccum ingentem ingressum fuisse; poteratque & visu & tactu in hoc loco vivi infantis motus percipi: & cum nihil aliud superesse videretur, partus tempore instanti, dissesto utero eductus fuit vivus infans; tuncque præsens Sennertus vidit, dissectis communibus integumentis peritonæum integrum fuisse, non disruptum, sed ab uteri mole insigniter dilatatum. Post sanatum abdominis vulnus, in plagæ loco insignis hernia nascebatur in homine, qui hanc negligentius tractans post sex annos gangræna hic orta periit (Tulp. Observ. Medic. Lib. III. cap. 20. pag. 211.). Quo jam robustior fuerit homo sic vulneratus, eo majus herniæ futuræ periculum, quia tanto fortior pressio in reliquum abdomen agit, unde facilius & citius dilatabitur debilior locus. Accedit, quod robusti corpus validis exercitiis movere solent, unde majore respirationis nixu magis dilatabitur pars minus resistens.

PEJUS NIHIL &c. Notum est, semper magnam pinguedinis copiam abdomen occupare, nisi macilentissimus homo fuerit, hæc autem pinguedo non tantum musculis abdominalibus imponitur, sed & inter illos ubique locatur: si ergo vulnus inter abdominis integumenta obliquo ductu decurrat, humores extravasati, vel pus hic collectum, si non possunt ob quamcumque causam libere exire per vulneris aperturam, miro sæpe modo viam faciunt in panniculo adiposo, & inter musculorum interstitia profundos cuniculos agunt, tuncque ingens fit curæ difficultas: imo sæpe omnino impossibile est fistulosa talia ulcera, ex vulneribus abdominis nata, curare, cum ad hoc requiratur, ut vel pressione artificiosa fundus talis fistulæ comprimitur, libera manente apertura; vel sectione detegantur omnes ejus anfractus. Utrumque autem in his casibus sæpe fieri non posse, patet facile consideranti membranz adiposæ magnam crassitiem

in abdomine, ejusque infertionem inter musculorum abdominalium interstitia. Celsus (Lib. VIII. cap. 4. pag. 413.) monuerat, pessimas hic fistulas nasci, dicens: *Ventri nullum os subest; sed ibi perniciosæ admodum fistule sunt: adeo, ut Sistratus insanabiles esse crediderit. Id non ex toto ita se habere usus ostendit.*

Inprimis autem abdominis fistulas periculosas credidit, quia, dum exciduntur, herniæ occasionem præbent; & ideo dixit (Ibidem): *tutior fistula est contra jecur & lienem & ventriculum, quam contra intestina; non quo perniciosior ibi res sit, sed quo alteri periculo locum faciat.* Fistulam in inguine puellæ incurabilem doluit Tulpus (Observ. Medic. Lib. 3. cap. 28. pag. 230. 231.), quæ longa & anfractuosa via a costa spuria cariosa ortum duxerat. Plures tales casus observantur, de quibus in Capitulo de Fistulis latius dicitur: Unum alterumve Exemplum hic adduxisse sufficit. Capitaneo ense vulnus infligebatur ad distantiam duorum digitorum transversorum ab umbilico, versus superiora & posteriora vergens: cumque non penetraret in cavum abdominis, plumaceolo plano & simplici Emplastro rectum fuit vulnus, & sequenti die clausum erat. Post sex dies abdomen miro modo tumebat & dolebat; sed post venæ sectionem & molissima fomenta abdomini applicata, leniebatur dolor, & sequenti die in loco vulneris tumor parvus eminens apparuit, quo aperto, incredibilis copia puris effluxit, & octidui spatio perfecte convaleuit (Traité complet de Chirurgie par Mr. de la Motte Tom. III. pag. 97.). In alio vulnerato gladius ad binorum digitorum distantiam a linea alba in epigastrio intraverat: cumque planus esset & facile plicabilis sine ruptura, secundum ductum costarum ad vertebrae dorsi usque penetraverat, tunc fistulosum ulcus nascebatur, cujus fundo aperto felix curatio sequebatur (Ibidem 108. ad 113.).

§. 308. Q Uare futura, ligaturaque his prospiciendum: in cæteris curatio communis vulnorum sufficit.

Illa, quæ dicta sunt de generali cura vulnorum, hic conveniunt; & sufficerent, nisi herniæ vel fistulæ metus foret. Angusta & profunda simul integumentorum vulnera fa-

cile in fistulas degenerant; unde idoneo sit vulnerati, & artificiosa pressione impediri debet, ne humores collecti in panniculo adiposo sinus forment. Latiora autem

integumentorum vulnera summum periculum hernie faciunt, unde convenit illa futura unire (vide §. 214.) & fasciis sple. niisque ex arte applicatis debilem hunc locum sic firmare, ut contenta abdominis huc pressa non possint dilatare peritonæum. Cum autem omnis nixus validas respirationis hic adeo noceat, sollicite vitanda sent illa omnia, quæ faciunt, ut homo fortius respiret: imprimis cavendum, ne inspiratum aerem clausa larynge diu retineat, uti fit, verbi gratia, in alvo exoneranda, maxime si duræ feces magno molimine excerni debeant. Unde leni cly-

mate eluenda alvus, dein victus talis debet institui, unde minima copia crassiorum fecum in intestinis colligitur: verbi gratia ex jure carniam, quo solo vita sustineri potest; & tamen per integrum mensem sine damno stricta poterit esse alvus, cum vix ullæ feces inde in intestinis accumulæntur. Ob eandem causam urina diutius retinenda, ut sponte fere & minimo nixu exeat. Tussis, si forte adsit, compescenda diacodiatis; clamor, risus, sternatio &c. vitanda, quantum fieri potest: quies summa debet imperari ob eandem rationem.

§. 309. **A**T eadem in cavitatem Abdominis ire liquet. 1. Stylo, & situ. 2. Iniectione. 3. Causa vulnerante cognita, & natura vulneris. 4. egressu contentorum.

De signis illis, quæ tribus prioribus numeris recensentur, actum fuit §. 306. & §. 309. n. 1. 2. 4.

4. Si per vulnus factum exeant illa, quæ abdominis cavo contineri novimus, nullum potest manere dubium, quin vulnus in cavum abdominis penetraverit. Imprimis autem perforato abdomine, intestina vel omentum excidunt. Intestina elapsa facile cognoscuntur, sed in obesis pinguedo, dissectæ cutis pressione liberata, per vulneris aperturam, extuberat, & pingue omentum

refert; unde in vulneris diagnosi nasci posset error. Simul etiam vulnus, in cavum abdominis penetrans, pinguedine huc pressa, sic posset obturari, ut nec stylo, nec injectione aquæ tepidæ hoc detegeretur. Si jam contenti vasæ & visceribus abdominalibus humores exeant, ut sanguis, urina, bilis &c. de quibus dicitur §. 312. evidens habetur signum, vulnus in cavum abdominis penetrasse non tantum, sed etiam abdominis contenta laxisse.

§. 310. **S**I tum omnia Symptomata levia, dolor, febris, inflammatio absunt, posito in vulnus ægro cruor non exit, injectus liquor immutatus redit, interiora illæsa scimus.

Postquam jam ex signis constitit, vulnus penetrasse in cavum abdominis, tunc inquirendum est, an contenta abdominis cavo viscera & vasa læsa fuerint, an non? Cum autem singula viscera suis functionibus conspirent ad sanitatem, patebit primo, nihil alicujus momenti hic læsum esse, si non observentur multæ functiones turbatæ esse, quæ ab integritate horum viscerum pendunt. Quia autem viscera abdominalia præcipue chylopoiesi inserviunt, hinc cibi & potus receptio, retentio, mutatio in chylum, hujus reorptio, & fecum residuarum excretio si fiant illa lege, ut in sanitate fieri solet, certissimum, causam vulnerantem, licet in abdominis cavum penetraverit, tamen non læsisse hæc viscera. Cum autem, (licet minus proprie, quia extra peritonæi ambitum locantur)

& organa illa, quæ urinae secretandæ & excernendæ inserviunt, uti & generationi dicatæ partes multæ in abdomine dicantur hæerere; hinc & attendendum est, an symptomata, vulnus secuta, has partes læsas esse demonstrent.

Præter has viscera abdominalium læsiones aliquando accidit, mesenterii nervos discissos solos gravissima symptomata, & mortem ipsam producere; uti ex Ruyschii observatis in commentariis §. 170. num. 3. dictum fuit: sed tunc immanis dolor, inflammatio, & febris satis docent, periculum adesse. Unde hæc si absunt, optima spes facilis curationis habetur. Sed magna vasa sanguinea, chylosa, & lymphatica, per abdominis vulnera lædi possunt; unde ægro in vulnus decumbente satis parvulum, si nihil effluat sanguinis, vel aliterius liquidi,

# §. 310. 311. VULNERA ABDOMINIS. 359

quidi; novimus vasa hæc illæsa esse: quia autem sanguis effusus & coagulatus in cavo abdominis hæreæ posset, nec exire tamen, ideo aquam tepidam syphone per vulneris aperturam insinuant, quæ si non mutata redeat, nihil tale meretur. Notandum tamen, in homine vivente & sano

abdomen semper halitu plenum esse, qui aperto maclatorum animalium ventre tam manifeste apparet: ille frigore aeris admixti, vel alia quacumque de causa, condensatus & collectus lymphæ tenuis specie de vulnere posset exire, licet interiora omnia illæsa forent.

§. 311. | Llico arcendus aer, ingressus fuctu & expirationis nixu excludendus; gastroraphia consuenda integumenta, turundæ auferendæ; balsami illitu, decubitu in vulnus, quiete corporis, victu leni, humido, parco, rara deligatione percurabitur.

**AER ARCENDUS &c.** Ubi per modo dicta constitit, interiora omnia abdominis illæsa esse, talis vulneris cura consolidatio requiritur. Sed notandum est, aerem per vulnus aliquando ingredi, & in cavo abdominis retentum, calore rarefactum immaniter expandi posse; & comprimere omnia viscera, si per vulnus exire impediatur. Ab eodem aere, in panniculum adiposum se insinuante; mira Emphysemata oriri possunt, uti in thoracis vulneribus §. 300. n. 5. dictum est. Unde antequam de consolidatione vulneris talis cogitatur, debet constare, nullum aerem in cavo abdominis hæreæ; & si adiri, debet prius educi. Hoc autem fit simili modo. ac §. 304. dictum fuit: Inspiratum nempe aerem vulneratus retinet, quam diu ferro potest; & tunc, elausa larynge, expirationis validum nixum facit: sic enim depresso diaphragmate, simulque agentibus in expirationis nixu musculis abdominalibus, contenta abdominis valide premuntur, & aer contentus per vulneris aperturam expellitur. Ne autem eodem tempore omentum vel intestina exprimantur, linteo raro tegitur vulnus, quod aerem quidem transmittit, reliqua autem egressura coerct.

Excluso sic aere requiritur ex generali indicatione in cura omnium vulnorum (§. 185. num. 2.) ut partes, per causam vulnerantem separatæ, uniantur iterum; & in hac adnatione retineantur: quod fit in vulneribus abdominis in cavum penetrantibus peculiari methodo, nempe:

**GASTRORAPHIA CONSUENDA INTEGUMENTA.** Antiquis jam descripta fuit hæc operatio, & uti videtur, diversis etiam tentata modis. Galenus (*Method. Medic. Lib. VI. cap. 4. Tom. X. pag. 140. 141.*) metus, ne peritonæi disseci labia dædiceret.

concreverent inter se, cum membranarum nervosam & exsanguem esse crederet, sic instituit hanc operationem; ut peritonæi discissis labia abdominis disseci oppositis lateribus concreverent. Juber enim, acum ab externa parte per cutim introrsum adigendam esse, non pertundendo peritonæum; & deinde in latere opposito vulneris peritonæum una cum omnibus incumbentibus tegumentis ab interiori parte extrorsum eadem acu transfigebat; & postea in eodem vulneris latere cutim & musculos iterum pertundebat acu ab exteriori parte introrsum, vitando peritonæum; sed tunc vicissim in opposito latere peritonæum cum omnibus incumbentibus acu ab interiori parte extrorsum transadacta perforabat. Hac methodo conabatur efficere, ut peritonæum discissum concreveret cum musculis abdominis discissis lateris oppositi. Tamen & ibidem Galenus aliam methodum Gastroraphiæ recenset, qua cognatæ nature partes inter se uniantur & coalescunt; peritonæum nempe peritonæo, musculi musculis &c. & quæ ob hanc causam etiam melior esse videtur. Celsus (*Lib. VII. cap. 16. pag. 453.*) hanc operationem describens illam sic fieri jussit, ut prius interiori membranz sutura iniciatur, deinde hoc facto eadem fila; eademque acus, ad eum transferantur; similique modo etiam sutura uniebantur vulneris labia: dicit enim, suturam summæ cutis, neque interioris membranz, per se satis proficere; sed utriusque. Voluit etiam e duobus linis faciendam esse suturam, & spissiore quam alibi; quia & rumpi facilius motu ventris potest, & non æque magnis inflammationibus hæc pars exposita est. In hac sutura perficienda imprimis requiritur, ut minimo cum dolore, & sine periculo læsionis omenti, vel intestinorum,

Z. 4. fiat;



fiat, neque ullus metus sit, ne futura facta ob continuum abdominis motum lace-  
retur. Quia autem cutis abdominis tena-  
cissima est ( uti experiantur omnes, qui  
cadaverum apertorum ventres consueunt ) &  
difficillime perforanda ; ideo acus valde  
acutæ, & a latere scindentes, requirun-  
tur, ad tertiam circiter suæ longitudinis  
partem incurvæ, cæterum rectæ. Filum  
forte, vel & plura fila simul, non contor-  
ta inter se, sed in eodem plano posita,  
transiuntur suis extremis per binarum  
talium acuum capita ; deinde acus unius  
cuspis, pulpa indicis digiti occulta, cau-  
te sub peritonæo in abdominis cavum di-  
mittitur, ne lædantur intestina vel omen-  
tum, perforatur peritonæum & integu-  
menta, transdigendo hanc acum ad digi-  
ti circiter transvers. distantiam a vulne-  
re. Simili modo per oppositum vulneris  
labium altera acus adigitur, & fila trans-  
missa prius suppositis spleniolis nodo con-  
stringuntur. Repetitur jam hæc futura,  
prout vulneris amplitudo requirit. Reliqua  
autem, quæ in Gastroraphiæ applicatione  
notanda sunt, apud *Garcagne* ( *Traité des  
Opérations de Chirurgie* Tom. I. pag. 124.  
&c. ) & alios auctores habentur : videan-  
tur & illa, quæ dicta sunt in commenta-  
rio §. 214.

**TURUNDÆ AUFERENDÆ.** Illæ enim in  
hoc casu semper nocerent, cum requiratur  
partium separatarum unio, quam semper

impediet quodcumque corpus heterogeneum  
interpositum. Noxium autem in abdomi-  
nis vulneribus turundarum usum, ratione  
& experimentis pulchre probat *Belloste*  
( *Chirurgien d'Hôpital part. 2. chap. 15.  
pag. 124.* ).

**BALSAMI ILLITU, DECUBITU IN VUL-  
NUS &c.** Cum autem per futuram adductis  
labiis requiratur illorum unio, ad hanc suf-  
ficiet, si secundum dicta in vulnere cuta  
generali §. 204. balsamo vulnerario leni le-  
virer illinatur, vel & plumaceolum tali  
balsamo niadidum superinponatur. Situs  
autem vulnerati talis imprimis requiritur,  
ut vulnere incumbat, ut sponte sua pus &  
alia forte extravasata huc tendant. Quies  
summa hic requiritur, quia corporis motu,  
tussi, risu, sternutatione, alvi exoneratio-  
ne difficiliore, augetur respirationis vis ;  
& periculum foret, ne futura laceraretur,  
vel saltem rudiori tali abdominis motu di-  
stracta fila irritarent partes, per quas trans-  
mittuntur : unde inflammatio, dolor, &  
alia inde sequentia mala oriri possent. Oh-  
eandem causam vietus lenis & humidus re-  
quiritur, parca copia simul, ne repleto ven-  
triculo dislindatur abdomen ; imprimis car-  
nium juscula hic commendantur, ut dictum  
fuit in commentariis §. 308. Si jam nullus  
dolor aut pruritus, nulla inflammatio &c.  
superveniant, rara deligatio curam accele-  
rabit, uti dictum fuit in generali vulne-  
rum cura.

§. 312. **S**I acutus dolor, febris, inflammationis signa, crux, ichor, potus, ci-  
bus, chylus ; bilis, pus, urina, stercus, sctor, ex vulnere exeuntia ;  
causa vulnerans, situs & natura vulneris ; pallor, sudor frigidus, inquietudo, ani-  
mi deliquia, pulsus defectus, præsentia considerantur, docebunt, læsa vasa vel vi-  
scera abdominalia, & quæ.

Hactenus considerata sunt vulnera abdo-  
minis, quæ vel sola communia integumenta  
lædant, integro manente peritonæo ;  
uti & illa, quæ in cavum abdominis pe-  
netraverant quidem, sed tamen non læsan-  
t contenta vasa vel viscera. Sequuntur  
jam illa signa, quibus noscitur, interiora  
læsa esse ; simulque ex iisdem concluditur,  
quænam parte, abdominis cavo contentæ,  
vulneratæ fuerint. Signa autem hæc desu-  
muntur vel ex illis, quæ de vulnere exeunt ;  
vel ex functionibus læsis.

**ACUTUS DOLOR.** Suspectum quam maxi-  
me in vulneribus abdominalibus signum,

denotans partes membranaceas, vel nervo-  
sas esse læsas. Quantum autem ex illarum  
partium læsione imminet periculum, de-  
monstrant illa, quæ dicta sunt in commen-  
tariis §. 170. num. 3. Ibi enim conflictit ex  
*Ruysschii* observationibus, vulnera mesente-  
rio inserta, sine læsione aliarum partium,  
post enormes dolores abdominis, intra duos  
tresve dies fuisse lethalia : simulque appa-  
ruit, admodum probabile esse, a nervis  
mesenterii læsis omnia hæc mala orta fuisse.  
*Celsus* ( *Lib. V. cap. 26. pag. 286.* ) inter  
signa vulnerati jecinoris recenset pun-  
ctiones, doloresque usque ad jugulum, ju-  
ctura.

étumque ei latum scapularum os, intentos. In renibus vulneratis dolorem ad inguina. & testiculos descendere monet: Percussa vulva dolorem in inguinibus, coxis, & feminibus esse dicit &c.

FEBRIS. Quæ, si non ex animi perturbatione ortum duxerit in vulneratis, semper vel acerbior doloris comes est, vel inflammationem natam sequitur; quæ in nervosis illis partibus, mesenterio nempe, intestino &c. semper periculosa.

INFLAMMATIONIS SIGNA. Horripilatio nempe, illamque sequens calor febrilis, sitis, anxietas, respiratio laboriosa, pulsus durus, lingua sicca &c. Quam funesta autem sit inflammatio plurimorum viscerum abdominis, docent Ileus, & herniæ suffocatz, a quibus morbis vel robustissimi homines sæpe paucarum horarum spatio pereunt.

CRUOR. Designat vasa sanguinea majora læsa esse, si cum impera erumpat, & quidem arteriosa, si coccineo colore fulgeat; venosa vero, si magis nigricans appareat.

ICHOR. Ex variis partibus, per vulnus abdomini inflictum læsis, tenuis talis aquosus liquor prodire possit. Lymphatica hic plurima vasa sunt, quæ talem lympham fundere possent. Ductus pancreaticus, porus hepaticus, renum pelvis, si vulnerata fuerint, possent incredibilem copiam talis ichoris in cavum abdominis effundere. Imo halitus in abdomine sani animalis, ex vasis perspirantibus expulsi, condensatus frigore admissi aeris per vulnus, nec reorptus iterum per venas, hinc collectus, per aperturam vulneris posset exire sæpe satis notabili copia, licet interiora omnino illæsa forent.

POTUS, CIUS. Hæc designant, ventriculum esse læsum: cujus vulnera periculosa semper esse, non tamen absolute lethalia, constitit ex illis, quæ dicta sunt in commentariis §. 170. num. 5. Quibus addi posset & illud, quod habetur in Miscellaneis Curiosis (Decad. 2. Ann. V. pag. 2.), exemplum hominis, cui ventriculus vulneratus per undecim annos partem cibi & potus per vulneris aperturam, callosis factis labiis non consolidatam, emittebat.

CHYLUS. Si per vulnus exeat, intestina tenuia esse læsa docet, vel ductus chyli-

ros, in quibus candidissimo colore distinguitur a chylo intestinelorum semper magis griseo, vel & flavescere, si intestinum tenue vulneretur prope illum locum, in quo bilis chylo miscetur.

BILIS. Designat læsionem ductus communis, vel cystici, vel intestini: forte duodenum vulneratum esse circa illum locum, ubi ductus communis huic intestino inferitur: imprimis autem magna copia bilis in abdominis cavum effluit, si ipsa vesica felleis læsa fuerit. Rarus admodum talis casus habetur in Actis Anglicanis (Num. 341. Abridgem. Tom. VIII. pag. 571. 572.) de milite, cui vulnere in cavum abdominis penetrante vesicæ felleæ fundus perforatus fuerat, absque ulla notabili læsione vicinarum partium. Mira satis symptomata secuta fuerunt hoc vulnus: statim enim distendebatur abdomen, ac si Tympanitide vel Ascite laboraret: neque augebatur vel minuebatur tumor ille ad mortem usque, quæ septimæ diei initio post inflictum vulnus contigit. Nulli tamen ructus, flatus, aut borborygmi aderant, & alvus tot hoc tempore manebat pertinacissime stricta, licet acris satis purgantis & clivmæta adhiberentur. Somnus vix ullus aderat, licet opiata satis magna dosi exhibita fuissent. Vulnus externum flaccidum, pallidum, sine pure. Pulsus erat fortis, æqualis, tardus, pridie ante mortem: leviter subinde intermittens; mens constabat ad mortem usque, levis singultus & nausea adfuerant quinta die post vulnus inflictum: Ex hac historia patet, pessimum signum esse, si bilis per vulnus abdominis exeat.

PUS. Designat factum jam suppurationem internarum partium a vulnere inflicto; nisi forte præexistit vomica purulenta instrumento vulnerante nunc aperta.

URINA. Si exeat ex vulnere, pelvis, ureterum, vel & vesicæ læsionem significat, uti facile patet.

STERCUS, FÆCOT. Constat ex Physiologicis, ingesta alimenta actione ventriculi & intestinelorum tenuium sensim sic emulgeri, & per bibula venarum mesentericarum & valorum lacteorum oscula resorberi partem maxime solubilem, ut circa finem intestini ilei solæ fere species non solubiles residuæ in cæcum dictum intestinum delabantur; inde per totam coli intestini longitudinem

Z. 5, fen-

Tom. I.

senfem propylse ad rectum intestinum perveniunt, & alvo excluduntur. Simul observatum fuit, nullibi percipi factorem illum stercorem, incipientis patetinis indicium, nisi in cæco, colo, & recto; nunquam autem in tenacibus intestinis. Ideo in cæco in-estimo *fecera stercorem fermentum, corruptionis obit, non nutritionis*, dixit Helmontius (*Ortus Medicinæ. pag. 175. num. 18. in fine capituli: Septuaginta digestio alimenti humani.*). Ubi cæco stercus exit per vulnus intestinum, vel fœtor talis de vulnere aspirat, concluditur, crassa intestina læsa esse. Unde Celsus (*Lib. V. cap. 19. pag. 287.*), postquam dixerat communes esse notas jejuni intestini & ventriculi vulnerati, subiungit: *Cœtera intestina illa vel stercus, vel ejas odorem exhibent.*

**CAUSA VULNERANS, S.TUS, ET NATURA VULNERIS.** Instrumen-um, quo vulnus intestinum fuit, si haberi possit, sæpe docet, quo usque vulnus penetraverit, si comparetur cum vulneris intestini amplitudine: simul patet, multum differre vulneris intestini naturam pro varia directione; qua instrumentum vulnerans in cavum abdominis penetravit, sursum, deorsum ad latera &c. sed præterea abdominalium viscerum situs multum differre poterit, pro varia positura corporis, quam vulneratus habuit illo tempore, dum vulnus infligebatur, uti etiam aliis de causis. Sic notavit accuratissimus Anatomicus Winslow (*Exposition Anatomique &c. Traité du bas ventre num. 267. 268. pag. 350.*), hepar in homine ligamentis suis quidem sic firmari, ut non facile ab uno latere in aliud dilabatur, nequaquam tamen ab his suspendi, sed sustineri a ventriculo & intestinis; imprimis quando hæc viscera repleta sunt. Unde post diuturnam inædnam proprio pondere depressum hepar trahit diaphragma, & molestum sensum facit; quem ventriculo male adscribi credit idem auctor. Unde si, vacuo ventriculo, stanti homini vulnus infligatur ad binorum digitorum distantiam sub costis spuris lateris dextri, poterit lædi hepar in tali casu ultra costarum limbam prominens: quale Exemplum refert Garengot (*Traité des Opérations de Chirurgie Tom. I. pag. 81.*) hominis sic vul-

nerati, in cuius cadavere apparuit abscessus in hepate a vulnere intestino, natus. Idem jam verum est de ventriculo, qui repletus admodum satis profunde sæpe descendit.

**PALLOR, SUDOR FRIGIDUS, INQUIETUDO, ANIMI DELIQUIA, PULSUS DEFECTUS.** Omnia hæc signa vitam deficientem denotant, & plerumque largam sanguinis ætuturam sequuntur: unde, licet nihil sanguinis per vulnus effluat, si hæc signa adsint, de interna Hæmorrhagia cogitandum est, & magna vasa sanguinea læsa esse concluditur: sanguine enim sic in cavum abdominis effluente, parca copia tantum ad cor redit: hinc ejus vires imminuantur, unde pulsus incipit vacillare, intermittere, & tandem penitus deficere in perfecta syncope. Inde & pallor collapsis vasibus sanguine vacuis, & frigidus sudor, resolutarum virium certum indicium. Incipit tunc illa læsa vita cum morte, quam agoniam vocaverunt: anxietas nempe summa, & inquietudo, sic ut continuo situm corporis mutant, quantum vires permittunt; tandemque animi deliquium, vel & mors ipsa sequitur. Videantur & illa, quæ dicta sunt in commentariis §. 302. num. 7.

Aliquando forte & hæc symptomata ori-ri possunt a nervorum, per viscera abdominalia disperforum, læsione. Magnum enim hos nervos habere imperium in vitales functiones docent subitanæ mortes, etiam in sanissimis & robustissimis hominibus ab herniis suffocatis, intestinorum susceptionibus &c. in quibus morbis omnia hæc signa apparent, & paucarum sepe horarum spatio mors sequitur. Unde & Celsus (*Lib. V. cap. 26. pag. 287.*), signa ventriculi vulnerati enumerans, dicit: *Ventrum motus clanguescunt, sudores tenues oriuntur, per quos extrema partes frigescent.* Et statim addit, communes jejuni intestini & ventriculi vulnerati notas esse.

Ex his omnibus signis cognoscitur, partes abdominis cavo conventas læsas esse: & sæpe ex iisdem satis evidenter patet, quænam partes læsæ fuerint: unde ex his Diagnosticis horum vulnorum habetur. Sequens paragraphus Prognosis docebit.

§. 313. **T**Um infinita mala sequuntur, partim 1. a natura viscerum, tenui, vasculosa, non musculosa, difficillimæ circulationis, nec nisi clauso abdomine absolventur. 2. a functione læsa visceris. 3. ab effusis cruoris copia, corruptione. 4. ab aeris ingressu, tarsiacti, prementis, actione.

1. Constat ex Physiologicis, omnia viscera abdominalia, quæ chylopoiesi inferiunt, venosum suum sanguinem deferre ad sinum venæ portarum, qui dein in ramos divisus per omnem hepatis molem venosum hunc acceptum sanguinem distribuit sic, ut non amplius ab angustis ramis in latiores fluat, sed ut in arteriis a latiore basi in angustos fines pellatur. Unde patet, difficillimam hic humorum circulationem esse, cum sanguis venosus, qui maximam partem motus, a corde & arteriis accepti, amittit, hic iterum per angustias convergentium vasorum transire debeat. Sed circulum humorum juvat actio diaphragmatis, & musculorum abdominalium, per quam omnia viscera abdominalia premuntur alternis vicibus: Inspirationis enim tempore diaphragma deorsum tendens cavum abdominis arctat, & omnia contenta comprimit, expirationis vero tempore contracti musculi abdominalis eodem modo reagent. Hinc omni vitæ momento alternis his pressionibus promoveretur sanguinis circulatio per abdominalia viscera. Unde in illis hominibus, qui oriosam vitam degentes salubre corporis exercitium negligunt, toties circa hepar & alia abdominalia viscera difficiles nascuntur obstructions, & pessimi morbi chronici. Ubi ergo per vulnus læditur vel turbatur actio diaphragmatis vel musculorum abdominalium, patet, tolli hoc adminiculum, quod requirebatur omnino ad expeditam humorum circumductionem per abdominalia viscera. Hoc apparet evidenter in vivis animalibus dissectis: dum enim cani decussata sectione diffiscantur musculi abdominales & peritonæum, post aliquot momenta venæ omnes viscerum abdominalium apparebunt dilatissimæ, quia non potest commode sanguis venosus per hepatis angustias pelli, deficiente actione musculorum abdominalium. Facile interim patet, non ab omnibus abdominis vulneribus hanc noxam expectandam esse, sed tantum ab illis, quæ diaphragmatis vel musculorum abdominalium actionem insigniter lædunt. Accedit, quod per patula vulnera aer illapsus

in solito frigore quam maxime nocere possit abdominalibus visceribus: & a binis his causis videtur deduci posse, quare omentum, vel intestini, extra vultus dilapsa tam facile gangrænescant.

2. Singula hæc viscera proprios usus habent ad chylicificationis opus consurgentes: uno ergo, vel pluribus læsis, turbabitur chylicificatio. Sic v. g. intestino tenui dissecto prope pylorum, omnis chylus in cavum abdominis decideret, vel nec vultus exibat, nutrimento suo defraudabitur corpus, & vero peribit marasmo. Felle vesicula læsa, ut dictum fuit precedenti paragrafo, bilis in cavum abdominis decideret, & alvus manebat pertinacissime sticta, nullis remediis auscultans, cum subita & permanente abdominis inflatione: Quæ mala non facile quis prævidisset futura a tali vulnere. Unde simul patet, quanta sit bilis necessitas ad abdominalium viscerum plurimorum actionem. Sed bilis ex sanguine venoso viscerum chylopoieticorum, in singulis forte divertio, & mire mutato per hepatis fabricam, conficitur; unde læsis visceribus abdominalibus sæpe tolluntur quædam requisita ad bonæ bilis secretionem; quæ ergo a naturali sua indole degenerans chylopoiesin miris modis turbare poterit. Sic hepar, & lien quasi spongiæ sanguine plene apparent: ab horum ergo læsione copiosa cruoris effusio, inflammatio, suppuratio in amurcam quasi horum viscerum substantiam convertens &c. expectari possunt.

3. Discissis vasis sanguinis, quæ tam numerosa & satis anipla per abdominis viscera distribuuntur, ingentem sanguinis copiam in cavum abdominalis posse effundi, facile patet. Ille copia sua premendo viscera nocere potest, uti & nata corruptela; imprimis, si simul aer libere accesserit, tabescere possit omnia. Modicam vero sanguinis effusionem, siue visceris ullius nobilioris læsione: & impedito libero aeris accessu, non adeo periculofam credidit Ruyschius (*Observ. Anatom. Chirurg. 66.*), edoctus experimento in vivo animali capto. Cani enim

enim mediocrius magnitudinis, prius ligaris valis splenicis, lienem exciderat: neglexerat autem ligare arteriolam Epiploicam, quæ tantam tamen sanguinis copiam fundebat, ut janjam moriturus canis videretur. Hanc tamen arteriolam sine ligatura abdomini intrusit, ubi procul dubio perrexit sanguinem fundere: sutura vulnus abdominis univit, & vulnere intra sex septemve dies consolidato canis convaleuit. Ex hoc experimento conclusit, sanguinem extravalsatum in cavo abdominalis, modo secludatur aer, posse resorbe-

ri sic, ut nihil inde mali postea sequatur. 4. Si per vulnus aer in cavum abdominis intraverit, & interim ejus exitus a pinguedine, vulneris orificium obturante, vel alia quacunque de causa, impediatur, calore corporis rarefactus aer distendere poterit abdomen in molem immensam: sed & simul eadem vi comprimer omnia contenta abdominis. cavo viscera: imprimis autem ventriculum, & intestina, illaque penitus complanare poterit: unde miserrima mala, sola educatione rarefacti aeris sananda.

§. 314. **U**nde lethalia sæpe sunt. At intestina læsa, & pertractationi oblata, consuenda, si magnis; sibi linquenda, si parvis vulneribus læsa sunt, & reliqua peragenda, ut (311.) dictum est.

Ex omnibus prædictis patet, quantum disticimen sit vulnus in cavum abdominis penetrantium, una cum læsione contentorum valorum vel viscerum. Si jam simul considerentur illa, quæ de vulnere lethaliitate dicta sunt §. 170. num. 3. & 5. uti & illa mirabilia mala, quæ diaphragmatis læsionem sequi observata fuerunt, de quibus ibidem num. 4. agebatur; patebit facile, mortem inevitabilem sæpe vulnera abdominalia sequi.

Sequitur jam, ut considerentur illa, quæ fieri debent in cura abdominalium vulnorum, si intestina læsa fuerint, & manibus pertractari possint. Hippocrates (*Apbor. 18. Sect. VI. Tom. IX. pag. 257.*) tenuium intestinorum vulnera lethalia pronuntiavit: Galenus tamen in suis commentariis non quolibet vulnera tenuium intestinorum lethalia esse voluit, sed rarissime sanari dicit illa, quæ in cavum usque intestinorum penetrarent. In alio Aphorismo (*Ibid. 24. Sect. VI. pag. 261.*) Hippocrates dixit, non coalescere intestinum tenue dissectum. Celsus (*Lib. VII. cap. 16.*) pariter dixit: Si tenuius intestinum perforatum est, nihil profici posse. Latine: *intestinum sui potest non quod certa fiducia sit, sed quod dubia sperata desperatione suo potius interdum enim gliscitur.*

Hodie tamen plurimis, illisque fidelissimis, observare constat, intestina tenuia etiam integre discissa fuisse, & tamen superfluitate fuisse vulneratos. Si ergo intestinum læsum fuerit, neque vulnus adeo magnum sit, ut parula via contenta intestini

cavo in abdomen delabi possint, sibi relinquenda sunt: sponte enim tunc solent sanari. Simulac enim intestina per vulnus abdominis erumpunt, solent valide distendi flatibus, si integra fuerint; & tunc tenuia & membranacea apparent: ubi vero in naturali statu considerantur, satis crassa & solida apparent; unde parvum vulnus non adeo nocere poterit. Exemplo hominis Maniaci (de quo dictum fuit §. 170. num. 5.) qui octodecim vulnera proprio abdomini infixerat, constitit, sanari sponte tales intestinorum etiam tenuium læsiones, uti docuerunt cicatrices sanatorum vulnorum in cadavere postea repertz. Dum cani majori (uti ibidem dictum fuit) intestinum tenue secundum longitudinem dissecaretur, nulla sutura intestini in abdomen retrusum facta, animal tamen convaleuit. Imo observata docuerunt, larga satis intestinorum vulnera, per quæ contenta exhibant, sponte sanata fuisse. Homini globo plumbeo majori vulnus inflictum fuerat in cavum abdominis penetrans cum insigni læsione intestini colici; sic ut per bimelle spatium excrementa per vulnus exirent: tandem tamen sine ullo artis adminiculo illud vulnus consolidatum, & homo sanatus fuit (*Belloste Chirurgien d'Hopital pag. 3. chap. 5.*). Insigni decoctiori vulnus abdomini indigebatur cultro, sic ut acies penetraret in latius dextri lateris intestinum; quod, licet ultra triginta horas pependit extra corpus, jam abunde refrigeratum, reductum tamen fuit in locum suum sine ullo malo. Profluebant quotidie per vulnus

neris hiatum faeces alvinæ, & licet perdidit belluo nullam dæmæ rationem servaret, felicissime tamen intestini vulnus consolidabatur, uti post sextum annum a vulnere inflicto in cadavere apparuit ( *Tulp. Observ. Medic. Lib. III. cap. 20. p. 221.* ).

Ubi autem vulnera intestinis inflicta tam magna sunt, ut inde iure metendum sit, ne contenta in cavum abdominis delabantur, ibique accumulata & putrescenda corrumpant omnia; tunc, si detur manus pertractandi tale intestinum vulneratum occasio, hæc consuenda sunt. Solent Chirurghi in tali casu uti sutura, quam pelliionum vocant: quia solent pelliões laceras animalium pelles tali sutura unire. Hæc autem sutura fit, dum ambo vulnerati intestini labia simul acu perunduntur, quam sequitur filum sericeum planum: dein sequens punctura similiter fit ad distantiam binarum linearum a priore, semper ab eodem latere intestini incipiendo: hoc repetitur, donec labia vulneris contigua sunt: Sic spirali circumvolutione filum continet vulnerati intestini labia, & filii pars satis longa ex vulnere pendula relinquitur, ut

postea consolidato intestino commodè educi possit. Ob hanc causam etiam majoribus intervallis puncturæ faciendæ sunt, nec filii extrema subducenda spirales gyris ejusdem filii per intestini labia circumductis, ut multi auctores voluerunt, tunc enim postea non posset protrahi filum sine corrugatione violenta intestini confusi: unde acerrimi dolores, inflammatio, gangrena &c. sequerentur. Videatur de hac sutura *Garengot ( Traité des Opérations de Chirurgie Tom. I. pag. 105. &c. )* ubi optima methodus hanc perficiendi describitur.

Patet facile, nonnisi urgente necessitate hanc suturam instituendam esse, cum requirat intestini extra abdomen protracti satis longam moram in aere externo, & rudiorum ejusdem intestini pertractationem. Unde & notaverunt auctores, sæpe funestum eventum sequi. Exempla tamen illa, quæ in commentariis §. 170. num. 5. allegata fuerunt, ubi ipse ventriculus, vulnere divisus, consuebatur; uti & illa, quæ dicuntur postea in commentario §. 317. probant satis, non posse hanc operationem tanquam damnosam aut inutilem repudiari.

§. 315. **S**I per latum vulnus illarsum intestinum exit, fovetur animalibus vivis dissectis applicatis, vel tomento idoneo; reponatur; fiant reliqua, ut ( 311. ).

Intestina, quamdiu in abdomine hærent, semper undique repido rore exhalante humectantur, & simul pingui subtilissimo lubricantur; uti solus etiam attractus docet in animalibus vivis dissectis. Ubi ergo per vulnus iussitum intestinum evolvuntur, carent blanda & repida atmosphæra; unde refrigerantur, siccantur, & satis cito sæpe in mortem tendunt: quod inprimis mutato colore cognoscitur. Pulcherrimè hanc rem expresse Celsus dicens: *Protinus considerandum est, an integra ea sint; deinde, an his color sui maneat &c. Tum, si strumli-bet intestinum ( crassum nempe & æneum ) lividum, aut pallidum, aut nigrum est; quibus illud quoque necessario accedit, ut sensu careat, medicina omnis inanis est. Si vero ea adnæ sui coloris sunt, cum magna festinatione succurrendum est: momento enim alienantur, externo & insueto spiritu circumdata ( A. Corn. Celsi Medicin. Lib. VII. cap. 26. pag. 452. ).* Quod autem pulchre intellexerit Celsus, intestina naturaliter irri-

gari non tantum tenui lymphæ sed & pingui simul oleo, patet evidenter, quia paulo post addit sequentia: *Ac, si jam succiora sunt intestina, perluenda aqua sunt, cui paululum admodum olei sit adjectum ( Ibidem. ).* Ubi ergo patulo de vulnere intestinorum orbes evolvuntur, statim reponenda sunt, si nondum refrigerata vel exsiccata fuerint. Multum faciliatur hæc positio intestinorum, si tali situ ponatur vulneratus, ut contenta abdominis non urgeant propria gravitate locum vulneris; unde resupinandum hominem, coxis erectioribus, voluit Celsus ( *Ibidem.* ). Hæc enim positio corporis contenta abdominis cavo viscera diaphragma premunt in thoracis cavum, sicque abdominis capacitas augetur & unde facilius possunt egressa intestina recondi. In hac positione intestinorum iterum pulchre monet Celsus ( *Ibidem pag. 453.* ) quod Medicus prius semper intestina, quæ posteriora prolapsa sunt, condere debet sic, ut orbium singulorum locum servet. *Re-*  
*positio*

*pressis omnibus leniter homo concutendus est, quo fit, ut per se singula intestina in suas sedes reducantur, & in his confidant. Nisi enim hoc observetur, tormina validissima, & plurima alia mala sequi possent.*

Aliud adhuc monitum, & satis magni momenti, habetur apud *Carengos* (*Traité des Opérations de Chirurgie Tom. I. pag. 120.*); nempe, quod si vulnus esset in abdomine medio sub umbilico, per rectum abdominis musculum, in alterutro latere penetrant, tunc intestinum, vel omenti pars prolapsa, saepe possent recondi sub musculo recto, inter hunc & ejus vaginam tendineam, quæ musculum sub umbilico admodum laxè ambit; & male crederetur, hæc reposita esse in cavum abdominis. Facile patet, a tali errore pessima mala sequi debere; intestini nempe, sic valide a musculo incumbente pressi, inflammationem, dolorem &c.

Ubi autem intestina prolapsa jam refrigerata fuerint, vel & ab aere exsiccata, tunc omnium optimum est; si blando prius tepore soveantur, & humectentur.

simul. Nihil tunc melius excogitari potest, quam si abdomine discisso vivum & sanum animal imponatur elapsis intestinis; tunc enim naturali quam maxime forma calefunt & humectantur. Unde etiam in Ileo, terribili adeo morbo, saepe tantum solamen habetur, uti & in herniis incarceratis reducendis. Si viva animalia præsto non sint ad hunc usum, aqua calida cum lacte dulci & pauxillo olei blandi, decoctum carnis vitulina subpingue; decocta emollientium herbarum &c. adhiberi possunt in eodem usum, modo semper rapida retineantur. Verum quidem est, quod intestina prolapsa & refrigerata; si recondantur abdominis cavo, ibi calefcent & humectabuntur; sed debemus prius certi esse, antequam hæc reponantur, vitam dedisse in his partibus, cum refrigeratis & femimortuis: Aliter enim, si jam gangræna adfuerit, pessima corruptio expectanda foret; & licet separatio corrupti fieret, contenta intestinali fistula in cavum abdominis delaberentur: unde post summam miseria toleratas tandem mors sequeretur.

§. 316. **SI** per parvum exeunt foramen; rumentis siarum, inflammato, force, reduci non possit; foras, puncto, dilatato vulneris, reponitur.

Quando amplo vulnere abdomen perforatum est; intestina facile evolvuntur; sed etiam tunc sine magna difficultate reponi possunt. Ubi vero per angustum vulnus pars intestini expressa fuerit, longe periculosius malum est. Intestinum enim egressum comprimitur vulneris ambitu, & inflammabitur, & brevi timebit distentum flaribus, vel & ingestis alimentis motu peristaltico hinc pulsus, nec redire potentibus, ob intestini angustationem in vulneris loco. Unde suffocatio & gangræna satis cito sequuntur; uti in herniis incarceratis toties visum fuit: Facile patet, non posse reduci intestinum, nisi mimatur illius distensio, vel dilatetur vulnus. Prius semper tentandum est, quia dilatio vulneris non sine molestia fieri poterit. Fomenta illa, de quibus dictum fuit precedenti paragrapho, calide applicantur; dein leniter manibus palpando tentatur, an flarus vel contenta in rubo intestinali possint iterum propelli per vulnus, tunc enim detumescent intestinum, & reduci poterit. Si autem flatus distentum fuerit, & per aliquot horas so-

menta talia frustra applicata sint, tunc acu hinc inde pertundendum est intestinum distentum, ut flarus exire possint. Neque aliquid metuendum videtur ab his vulneribus, nam flatu expulso contrahetur intestinum, & disparebunt parvula tales aperturæ, nihilque contentorum intestini per illas poterit egredi. Tales intestini puncturas se felici cum successu instituisse dicit *Parvus* (*Livre X. Chapit. 39. pag. 259.*). Ne tamen ignaris detur occasio culpandi hanc intestinorum perforationem, præstat hoc clare pericere, quod facile fieri poterit. Funestus enim talis vulneris eventus aliquando adscriberetur Chirurgo, licet ex arte hoc fieri debere in tali casu satis pateat.

Si autem ne sic quidem detumescat intestinum, sola dilatio vulneris superest; quam *Celsus* etiam in hoc casu commendavit dicens: *Si angustius vulnus est, quantum intestina commode refundantur, incidendum est, donec satis pateat* (*A. Corn. Cels. Medic. Lib. VII. cap.*). Summa autem causa hic opus esse facile patet, quia intestinum.

stinum elapsum in loco vulneris arctissime comprimitur a peritoneo & integumentis, unde facile ladi posset. Ut hoc evitatur, specillum sulcatum introducunt in abdominis cavum, parum etiam protracto, si opus sit, intestino; tunc ut Chirurgus certus sit, intestinum non esse interceptum inter specillum & vulneris marginem, parum adhuc protrahit intestinum; deinde cultellum sulco specilli imponit, & caute discindit peritonæum: hoc facto elevat specillum una cum cultello jam in ejus sulco hærente & discindit integumenta abdominis, donec pateat satis vulneris amplitudo, ut commode intestina prolapsa refundi possint in cavum abdominis. Si vero tanta sit strangulatio intestini prolapsi, ut impossibile sit specillum sulcatum introducere, tunc indicis digiti pulpa premitur intestinum, ut parum recedat a vulneris margine, & deinde supra anguem ejusdem digiti indicis parum discinduntur integumenta & peritonæum, ut via fiat specillo sulcato introducendo.

§. 317. **S**i vulnere, suppuratione, gangræna, fistulæ intestinalis pars ablata est, pars superior se offerens, vel prudenter adducta, assuenda foramini vulneris.

Ubi autem intestinum integre dissectum est; vel per vulnus angustum exiens, nec in tempore reductum, gangræna vel suppuratione partem sui amisit, tunc continuitas fistulæ intestinalis sublata est, & si refunderentur in cavum abdominis disjuncta extrema, facile patet, effuso chylo intestinorum in abdominis cavum, ibique accumulato & corrupto, miserrimam sequi debere & inevitabilem mortem. Idem verum est, si intestinum integrum quidem adhuc, sed jam in parte quadam gangrenosum, reponeretur: illud enim postea separari deberet, tuncque omnia eadem fierent mala, Totum fere, quod tunc habet ars, est, ut affigat externi vulneris margini discissi intestini extremum; sicque tota vita manebit hic turpis cloaca, quæ ani vicem supplēbit. Separata enim intestini extrema coalescere iterum posse, ne quidem sperare quondam andebant Medici & Chirurgi, cum Hippocratis obstat auctoritas, dicentis: *Si intestinum reme dissectum, non convescit* (Aphorism. 24. Sect. VI. Tom. IX. pag. 261. & in Coacis Praenot. num. 503.). Mira tamen observata docuerunt, non semper etiam de hac con-

cretionē desperandum esse. Homo robustus jam ab octo annis laboraverat hernia, quæ tamen ipsi non admodum molesta fuerat; subito intumuit hernia una cum duritie summa, quam frustra cataplasmatibus emolliere tentabat Chirurgus. Tandem suppurabatur tumor, illoque aperto, partem intestini putrefacti quatuor digitis longam abscidit Chirurgus; postea similis longitudinis pars intestini sponte secessit. Cum jam crederetur, quod hoc in loco apertura maneret, quæ ani vice fungeretur tota vita, præter omnem expectationem incipit minui humorum per vulnus effluxus, & triginta trium dierum spatio percuratum fuit, & sanissimus postea vixit (Academ. des Sciences Par. 1723. hist. pag. 41. &c.). Alter casus adhuc evidenter docuit, coalescere posse intestina integre divisa. Homini hernia laboranti tubi intestinalis portio, sex pollices longitudine æquans, gangræna corrupta perierat. Filo transmissio per mesenterii partem illam, quæ intestino corrupto coheserat, utrumque intestini extremum in vulneris apertura retinebatur hac spe, ut accrescerent vulneris margini, & extremum intestini superius ani

Dilatato sic vulnere, repositisque intestinis elapsis, omnia illa dein fieri debent, quæ §. 311. dicta sunt.



arti vice fungeretur, altero extremo inutili manente: sed præter spem mensis spatio sic uniebantur hæc extrema, ut ingesta alimenta consueta via iterum per anum exernerentur: & convaleuit homo, hoc tantum habens incommodi, quod, si nimium manducasset, dolore colico corriperebatur, qui a vulneris loco incipientis sensum diminuebatur. Videtur autem hoc factum fuisse, quia in loco, ubi bina extrema concreverant, tubus intestinalis angustior parum erat, & firmioris substantiæ, nec tam facile cedere poterat (*ibid. pag. 44.*). Hanc rem confirmat aliud mirabile Exemplum. Serenissimi Ducis Brunsvicensis Chirurgus aulicus *Randobrius* sceminæ, post herniam incarceratam sponte ruptam, insignem partem tubi intestinalis corrupti abstulit; deinde extremum superius intestini immisit inferiori extremo, & levi sutura univit, & in abdomen reposuit. Ex ipsis orci faucibus erepta hæc scemina postea sana vixit, sed post annum pleuritide correpta periit, atque inciso cadavere peritit, intestini extrema inter se coaluisse. Intestina hæc una cum parte abdominis, cui accreverant, a dextrimo Chirurgo dono data, servat Heisterus (*Influra. Chirurg. part. 2. cap. 217. pag. 818.*).

Facile autem patet, divisi intestini unionem talem fieri non posse, si bina extrema in abdomine fluctuarent; sed requiri ad hanc rem, ut cuidam parti vicinæ accreta maneant contigua. Ob hanc causam frequentius hæc unio fit in herniis, quia per abdominale anulum duplicatum intestinum exiens contigua habebit hæc extrema, uti pulchre demonstratur, & figuris elucidatur a Celeberrimo *Morand* (*Academ. des Sciences Paris. 1735. Mem. pag. 335. &c.*), qui ex structura partium concretionis rationem, & alia inde sequentia solidissime deducit. Ubi simul probatur, semper in loco unionis minorem esse capacitatem tubi intestinalis: quod etiam sæpius post mortem in cadaveribus illorum, qui has calamitates passi fuerant, se vidisse testatur idem Auctor. Ob hanc causam, nisi duobus edulis abstinere, nec nimiam ciborum copiam insurgentem, periculum est, ne hæc in illa angustia hæreant; unde dolores acerrimi, imo sæpe ruptura loci, jam consolidati dudum: Quale Exemplum habetur sceminæ ab hac causa mortuæ,

pluribus annis elapsis post integram sanationem: in cuius abdomine & ingesta alimenta, & medicamenta, effusa reperiebantur disrupto intestino in illo loco, ubi bina extrema intestini, antea divisi, concreverant (*ibid. pag. 343.*).

Ubi vero nulla spes est, divisa intestinalis fistulæ extrema posse simul uniri & consolidari, tunc hoc solum superest, ut extremum superius, aliquando sponte in vulnere hærens, vel & prudenter illud adductum, assuetur vulneris aperturæ, ut ibi artificialis anus tota vita maneat. Alterum extremum ligatum, ne eius contenta hoc tempore in abdomen delabantur, tota vita manebit inutile. Sic vita servari poterit, modo tanta adhuc sit longitudo intestinalis tubi a pyloro ad anum hanc artificialem usque, ut ex ingestis alimentis sufficiens copia chyli possit sanguinem ingredi, ut inde testantur illa, quæ inevitabili sanæ viæ effectu quotidie corporis substantia pereunt. Ut autem cognosci possit, quoniam ex binis extremis intestinali diffecti sit illud, quod duodeno continuum superius dicitur, signa quedam habentur, a clarissimo *Littre* recensita (*Académie des Sciences P. an. 1700. Mem. pag. 394.*). Illud enim extremum manifestum motum vermicularem habet, materia chylosa repetitis vicibus per hoc extremum exit, & illius parietes non apparent integre collapsi; vel si quandoque collabuntur, paulo post iterum elevantur a materia intestini cavo contenta, & huc propulsa. In altero autem extremo intestini diffecti, quod recto intestino continuatur, motus peristalticus deficit, nihilque exit inde, nisi in initio, vel quando convulsu motu retrogrado ab inferioribus sursum aliquid exprimitur; quod nunquam tamen tam regulariter fit, ac in extremo superiori apparet. Illud extremum, quod duodeno continuum esse sic deprehensum fuit, tribus in locis, quæ ejus circumferentiam trifariam dividunt, unitur per suturam vulneris foramini, vel filis transmissis retinetur intestini extremum in vulneris aperturæ, donec ibi concreverit. Sic per artem vita servatur, sed non sine sædo satis incommodo, cum tota vita fœces hac via exire debeant. Quandoque etiam contigit, naturæ folius beneficio extremum superius intestini diffecti vulnere aperturæ accrescere.

# §. 317. ad 319. VULNERA ABDOMINIS. 369

scere. Sic Merry ( *ibid.* l. x. 1701. pag. 372. 373. ) in virgine viginti octo annorum, post herniam incarceratam, & gangræna corruptam, abscidit quinque pedum longitudine circiter putrefactum intestinum, & orificium superius accrescebat inguini, per quod tota vita postea fæces exibant; satis etiam duræ & figuratæ, si facile digerendos cibos modica copia simul assumeret. Plures tales casus occurrunt post confectus bellicos, dum milites pugionibus bombardis impositis in adversos hostes ruunt;

unde frequentia satis abdominis vulnera cum intestinorum dissectione contingunt. Memini, me ante viginti circiter annos vidisse militem, cui post talem plagam dissectum intestinum colon vulneris orificio exteriori accreverat; & facile patiebatur, cum ostium stipem pereret, ut examinaretur intestinum, aliqua sui parte extra vulneris aperturam prominens, ubi pulchre interior superficies intestini lustrari poterat. Jam decem elapsi tunc erant anni post vulnus inflicum, & videbatur optima sanitate frui:

## §. 318. SI omentum exierit, & humidum, calidum, rutilo sanguine rubescens adhuc est, reponendum, ut ( 316. ).

Dixerat Hippocrates ( *Aphor.* 58. *Secl.* VI. *Tom.* IX. pag. 289. ): si omentum excidat, necesse est putrefcere. Certe tenerima omenti fabrica non potest diu aeris externi frigori exponi, quin vitalis humorum circuitus per hanc partem lædatur insigniter; imo sæpe integre destruitur. Unde, si fieri potest, reponendum illico. Notandum tamen est, quod omenti membrana adeo tenuis sit, ut rudioreni pertractationem sine laceratione ferre nequeat. Un-

de summa hic circumspeditione opus est; aliter enim rudius tractatum omentum, dum reponitur, fractis vasibus postea inflammatione, suppuratione, vel & gangræna corruptum pessima mala producere possit. Ob hanc causam potius dilandum vulnus est, ut sine vi reponi possit. Humiditas, calor & rutilus sanguinis, per tenera vasa omenti pellucens, color docet, vitalem superesse adhuc humorum motum per omenti elapsi de vulnere substantiam.

## §. 319. SI siccum, frigidum, lividum, ligatura, sectione, foru, curatum reponendum est.

Ubi vero omentum diu extra vulnus hæsit, solet emori, & quidem satis cito; quod ex frigore, siccitate, & livido vel nigro colore cognoscitur. Mortuam talem partem abdomine recondere periculosum foret: illa enim postea a vivis partibus separata in abdominis cavo putrescet, & viscera omnia inficere possit. Unde voluit Celsus ( *Lib.* VII. *cap.* 16. pag. 453. ), ut, intestinis jam abdomine conditis, omentum consideretur, ex quo, si quid jam nigri & emortui est, scissure excidi debet; si quid integrum est, leniter super intestina reduci. Si tamen, mutato quavis colore, aliqua spes superesse videatur, vitam redire posse in hac parte, sementis mollissimis, & imprimis vivis animalibus dissectis impositis, fovenda est; si signa vitæ redeuntis appareant, humiditas nempe, calor, & ruber color, in abdominis-cavum reponenda; sin minus, tolli debet illud, quod corruptum est. Tamen celebres Chirurgi, si licet tantum livesceret omentum-elapsum,

illud reposuerunt, nec ullum inde damnum secutum fuisse testantur ( *Dionis Cours d' Operations de Chirurgie Demonstrat.* 2. pag. 73. *Garengot Traité des Operations de Chirurgie Tom. I. pag. 120.* ): tunc enim naturali corporis calore redibat facile vita in hac parte. Ubi autem mortua pars omenti tollenda est, tunc per partem ejus sanam filum transadigitur, deinde ligatur, & sub ligatura ad digitum citius transversa distantiam abscinditur illud, quod corruptum est; reliquum abdomine conditur, curando, ut filii pars satis longa ex vulnere pendeat, ut separatione facta illud commode tolli possit. Neque multum mali observatum fuit talem omenti resectionem sequi. Galenus ( *De usu part. Lib. I. cap. 9. Tom. IV. pag. 277.* ) quidem dixit, ablata parte omenti frigidorem feri ventriculi, & minus recte concoquere: illudque se vidisse affirmat in gladiatore, cui vulnerato fece totum omentum abfunderat, & qui postea coquebatur assidue lanis ventrem obvol-

obvolvitur, ne ab externo frigore laederetur. Tamen postea numerosissimis observatis constitit, omenti ablati onem hæc mala non sequi (*Acad. des Sciences l'an. 1725. bibl. pag. 23.*). Unde satis tuto tolli pos-

se videtur. Quod etiam confirmatur, quia sæpe in cadaveribus omentum pro maxima parte deficit, licet functiones viscerum abdominalium satis integræ fuerint in talibus hominibus.

§. 320. **M**issio sanguinis largior, clysmata in initio injecta si crassa illæsa, dicta, blanda respiratio, quies, situs, palmaria hic remedia.

Ex hæcenus dictis quædam geæteria auxilia deducuntur, quæ etiam in periculosissimis vulneribus abdominalibus summopere semper profuisse certis experimentis constitit. Nempe

**MISSIO SANGUINIS.** Nihil plus hic metuitur, quam inflammationem viscerum abdominalium, quæ post enormes dolores cito in gangrænam tendens sæpe subito necat: sed summum remedium præbet: larga missio sanguinis, quæ præsentem inflammationem tollere, futuram vero præcavere efficaciter solet. Sic in hernia suffocata vix ulla remedia juvant: nisi audacissima sanguinis missione sic debilitentur vires, ut motus inflammatorii careant urgente nimis vitali impetu.

**CLYSMATA &c.** Si crassa intestina læsa essent, patet facile, Clysmata nocitura fore: liquidum enim sic injectum delabere: in abdominis cavum. Ubi autem constat, hæc illæsa esse, tunc omnium maxime conveniunt, clysmatibus injectis duras fœces, crassis intestinis contentas, educere; ne postea vulneratus cogatur alvum durum nixu valido exprimere. Dum enim alvus exoneratur, diaphragmate deorsum pressa ob inspiratum ærem, & simul agentibus musculis abdominalibus, validissime comprimuntur omnia abdominis contenta; quæ ergo urgebunt vulneris locum; sique intestina vel omentum exprimentur; vel dilacerabitur iterum illud, quod jam inceperat consolidari. Unde patet: satis clysmatum in vulneribus abdominalibus utilitas.

**DIÆTA.** In generali vulnerum cura §. 192. dictum fuit; vulneratis prodesse illa simplicissima alimenta; quæ blanda, nec facile putrescentia, facili digestionis atque assimilationis essent; si parca copia simul, repetitis vicibus, sumerentur. Sed in abdominalibus vulneribus præterea considerandum est, sæpe læsam esse actionem illorum viscerum, quæ crudis ingestis efficacissimam

mutationem imprimere debent, quæ apta evadant, ut postea pulmonis & vasorum efficacia in nostram mutantur naturam; simul etiam a majori copia assumtorum ventriculorum & intestina statim disendi. Unde patet; adhuc majori cautela hic opus esse. Sed præterea summi usus est hic dare talia, quæ minimam copiam crassarum fœcum in intestinis relinquunt, cum alvi exoneratio, per clysmata pius eductis omnibus fœcibus, hic vitanda sit; quantum fieri potest. Omnibus his indicationibus nihil melius respondet; quam jusculorum ex carnibus juniorum animalium usus: Si enim omni bithorio unciz tres quatuorve sumantur, addito pauxillo succi citri, ut nimis facilis in putredinem degeneratio caveatur, sustinebitur vita, nullaque fere actione ventriculi & intestinorum opus erit ad hæc ingesta mutanda; simulque vel nullæ, vel paucissimæ fœces, in intestinis accumulabuntur: fœces, unde per plures dies; imo septimanas, sine molestia alvum retinere poterant: Panis tostus poterit immergi; vel & incoqui his jusculis; modo tollatur postea, ne fœcum copias in crassis intestinis inde angeatur. Pro potu sola aqua, modica vini quantitate addita, sufficeret. Posset tamen & panis, vel hordei aut avenæ decoctum; vel & mollissima: cerevisia concedi. Lac hic vitatur, quia: nimiam copiam crassarum fœcum relinquunt; uti patet in infantibus; qui solo materno lacte licet utantur; tamen duras tenacesque admodum fœces sæpe alvo deponunt.

**BLANDA RESPIRATIO, QUIES, SITUS.** In singulis enim inspirationibus disenduntur musculi abdominales, & contrahuntur iterum expirationis tempore; unde vicissim omnia abdominis contenta premuntur; quo ergo pacator fuerit respiratio; eo minus movebuntur partes vulneratæ; ergo & facilius consolidabuntur. Ob eandem causam quies his summopere necessaria est. Situs autem talis sit, in quo commodissime diu-

manere poterit vulneratus; nempe ut in le-  
thulo, erecto parum corpore, sedenti fere  
similis ponatur, & quantum commodè fieri  
poterit, declive vulneris orificium, ut pus,  
sanguis &c. facillime exire possint, neque  
accumulentur in cavo abdominis.


Hæc sunt illa, quæ in omnibus vulneri-  
bus abdominalibus conveniunt, uti etiam  
post calculi sectionem vel fistularum ani.  
Nisi enim tunc caveatur alvi exoneratio,  
sepe felicissime peractam operationem pos-  
sima mala sequuntur. Gravissima etiam  
vulnera abdominalia, & pessimis sympto-  
maribus stipata, hac methodo curata fuis-  
se felicissime, constat observatis. Unicum  
tale adduxisse sufficiet, cuius jam alia oc-  
casione in commentariis §. 170. numer. 5.  
mentio facta fuit. Maniacus homo sibi ipsi  
cultro octodecim vulnera infllexerat abdo-  
mini, quorum octo penetrabant in cavum  
abdominis, & ladebant contenta viscera.  
Febris valida, tensio abdominis, respiratio

difficilis & dolens, nausæ, vomitus, diar-  
rhœa &c. acerbam dabant prognosin, sic  
ut fere pro derelicto haberetur. Septies re-  
peritâ Venæ sectio primis quatuor diebus;  
dieta tenuissima ex solis fere jusculis car-  
nium, additis quandoque lactuca, cicho-  
reo, portulaca & similibus mollissimis ole-  
ribus; quies summa, lenibus emulsis dia-  
codatis impetrata; rara & prudentissima  
vulnorum deligatio, effecerunt, ut bime-  
stri spatio a tot vulneribus incolumis emer-  
geret non tantum, sed & mentem sanam  
in corpore sano haberet. Post septemdecim  
menses iterum maniacus factus ex alto se  
precipitem dedit, & ilico mortuus fuit.  
In cadavere cicatrices inventæ docuerunt,  
lobum medium hepatis latum fuisse, uti &  
intestinum jejunum ac colon (*Academ. des  
Sciences l'an. 1705. Mem. pag. 40. &c.*).  
Hæc historia docet, quantum ab hæc me-  
thodo expectandum sit in periculosissimis  
etiam casibus.

## FINIS TOMI PRIMI.

# INDEX CAPITUM HUIUS TOMI.

<i>Prolegomena.</i>	Pag. 1
<i>Morbi fibræ solidæ simplicis.</i>	14
- . . <i>debilis &amp; laxa.</i>	16
- . . <i>rigida &amp; elastica.</i>	29
- . . <i>Vasorum minimorum &amp; majorum.</i>	34
- . . <i>viscerum debiliū &amp; laxorum.</i>	36
- . . <i>forsium &amp; rigidorum.</i>	44
<i>De simplicissimis humorum visis &amp; spontaneis.</i>	55
<i>Morbi spontanei ex acido humore.</i>	ibid.
- . . <i>a glurinoso spontaneo.</i>	65
- . . <i>ex alcalino spontaneo.</i>	77
<i>De morbis oriundis ab excessu motus circulatorii solo.</i>	91
<i>Dem orbis, ex defectu circulationis, &amp; plethora.</i>	103
<i>Morbi compositi simplicissimi obstructio &amp; vulnus. Obstructio,</i>	19
<i>De vulnere in genere.</i>	149
<i>Hæmorrhagia.</i>	238
<i>Dolor.</i>	245
<i>Convulsio &amp;c.</i>	258
<i>Vulnera Capitis.</i>	269
- . . <i>Thoracis.</i>	339
- . . <i>Abdominis.</i>	355



005673775

